

230.387

LOUIS VIDAL

DICTIONNAIRE  
DE SPÉCIALITÉS  
PHARMACEUTIQUES

1932

OFFICE DE VULGARISATION PHARMACEUTIQUE  
107, Rue Lafayette - PARIS (10<sup>e</sup>)

11247-1932

LOUIS VIDAL

# DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

*Exemplaire de prêt*  
**1932**




*Transfert Poê  
Médecine 2014*

OFFICE DE VULGARISATION  
PHARMACEUTIQUE

**107, Rue Lafayette, PARIS (X<sup>e</sup>)**

Tél. : Trud. 41-05.



\*



## **NOTA**

**Les prix des spécialités  
pharmaceutiques  
donnés dans cet ouvrage  
sont ceux pratiqués en France.  
Ils varient  
pour chacun des autres pays.**

**TABLE**  
**par Indications Thérapeutiques**  
**des Spécialités**  
**figurant dans cet ouvrage**

---

## Table par indications thérapeutiques des Spécialités figurant dans cet ouvrage

---

- I. Alimentation — Régimes.
  - II. Analgésiques.
  - III. Antiseptiques externes — Désinfectants.
  - IV. Appareil circulatoire.
  - V. Appareil digestif (estomac, intestin).
  - VI. Appareil digestif (annexes: foie, pancréas, etc.).
  - VII. Appareil génito-urinaire.
  - VIII. Appareil respiratoire.
  - IX. Dermatoses — Plaies.
  - X. Gynécologie — Obstétrique — Allaitement.
  - XI. Hémostatiques.
  - XII. Maladies infectieuses.
  - XIII. Maladies de la nutrition (rhumatismes, arthritisme, goutte, obésité, diabète, etc.).
  - XIV. Maladies parasitaires.
  - XV. Ophtalmologie.
  - XVI. Opothérapie.
  - XVII. Produits divers — Instrumentation.
  - XVIII. Oto-rhino-laryngologie.
  - XIX. Reconstituants — Recalcifiants — Toniques.
  - XX. Stomatologie.
  - XXI. Syphilis.
  - XXII. Système nerveux (sédatifs, hypnotiques, anesthésiques).
  - XXIII. Système nerveux (stimulants).
  - XXIV. Tuberculose.
  - XXV. Tumeurs — Cancer.
  - XXVI. Vaccinothérapie — Sérothérapie — Bactériophages.
-



## I. — ALIMENTATION — RÉGIMES

Adral.  
Aliment Tinardon.  
Amino-sel Byla.  
Arachise.  
Atural.  
Babeurre La Faye.  
Babeurre Nutricia.  
Bémax.  
Blédine Jacquemaire.  
Boldine Houdé.  
Boldo Gmet.  
Calcoléol.  
Caoglands.  
Céréales Bébé Favrichon.  
Céréaline Tulivet.  
Clupeyl.  
Decorpa.  
Diasés Progil.  
Dryco (Lait sec).  
Extrait de malt français  
Déjardin.  
Farine alimentaire Suckine.  
Farine de malt Heudebert.  
Farines de régime Bloch.  
Farine lactée diastasée  
Salvy.  
Forcival.  
Fucus Gmet.  
Gastropeptyl.  
Glaxo.  
Gouttes halogènes du  
D<sup>r</sup> Bern.  
Lait en poudre Guigoz.

Lait Mont Blanc.  
Lait sec Lo-Lo.  
Maltea-Moser cristallisé.  
Malt français Déjardin  
(Extrait de).  
Maltosan.  
Malt pailleté Progil.  
Malt Wander ou Gloma.  
Neuro-moka.  
Nutro (Lait en poudre  
Nutricia).  
Nutrobiase.  
Oléo-mel laxatif.  
Pain essentiel Heudebert.  
Pains spéciaux Heudebert.  
Pampryl (Jus de raisin).  
Pepticol.  
Peptogil.  
Peptone Vassal.  
Phosphogène Favrichon.  
Pilules lithuranées du  
D<sup>r</sup> Boveil.  
Quassine Houdé.  
Quina Baron.  
Quinquina Gmet.  
Sucre Edulcor.  
Triganol Vigier.  
Ultracao Laurençon.  
Ultravitamine 4.  
Veguva.  
Vitaminol.  
Vitamyl.

---

## II. — ANALGÉSQUES

Alcacyl.  
Algocratine.  
Algophagine.  
Allophaquina.  
Amphotonyl.  
Ampoules Reipar.  
Antalgol Dalloz.

Antialgos Christiaens.  
Antiphlogistine.  
Asciatine.  
Ascéine.  
Atophan Cruet.  
Atophanyl.  
Beaume Adol.

**Baume Aroma.**  
**Baume Bengué.**  
**Baume Rhodia.**  
**Bétul-Ol-Midy.**  
**Cachets du D<sup>r</sup> Boveil.**  
**Calmosuppos sédatifs.**  
**Camphro-Salyl Fraisse.**  
**Cataplasme du D<sup>r</sup> Lelièvre.**  
**Cérébrine Fournier.**  
**Chéloïdine.**  
**Chloral bromuré Dubois.**  
**Chloréthyle Bengué.**  
**Cibalgine.**  
**Colchi-Sal Midy.**  
**Complexes colloïdaux du D<sup>r</sup> Riquoir.**  
**Crédone Dehaussy.**  
**Crésopirine.**  
**Cryogénine Lumière.**  
**Curatine Brunet.**  
**Curogène**  
**Cynurol Rosa.**  
**Delcaine Roques.**  
**Dialacétine Ciba.**  
**Dialyl.**  
**Diathermie.**  
**Didial.**  
**Erythra.**  
**Fango Fisch et C<sup>ie</sup>.**  
**Génomorphine.**  
**Glutaspirine Merminod.**  
**Gosiérine.**  
**Grains céphalgifuges.**  
**Hémypnal.**  
**Hypalène.**  
**Immuno-vaccin antirhumatismal.**  
**Infra-Rouges.**  
**Iodex au salicylate de méthyle.**  
**Iosorbine.**  
**Irénine Gonnon.**  
**Ixium.**  
**Liqueur Laville.**  
**Magsalyl Mg.**  
**Mensuosedyl.**

**Mésothorium Buisson.**  
**Nadolor.**  
**Naïodine Logeais.**  
**Nestosyl.**  
**Neubryne.**  
**Névoral Rafey.**  
**Névralgol Brossard.**  
**Névrosol.**  
**Nisaméline Trouette-Perret.**  
**Nitroyl Leisyn injectable**  
**Novacétine Prunier.**  
**Nutrobiase.**  
**Odynal Chevalier.**  
**Onction Leisyn.**  
**Optalidon Sandoz.**  
**Pantopon Roche.**  
**Paradoline.**  
**Pavéron Dausse.**  
**Percaïne Ciba.**  
**Pilules de Moussette.**  
**Pilules V.-E. Doumer.**  
**Plexorine.**  
**Potion Adol.**  
**Pyréthane.**  
**Quinsal.**  
**Rhoféine.**  
**Salène Ciba.**  
**Salicéral.**  
**Salysérum.**  
**Sédatine Christiaens.**  
**Seti.**  
**Sodothioli.**  
**Solutions du D<sup>r</sup> Clin.**  
**Spécifique Bejean.**  
**Stovaine.**  
**Théball.**  
**Théinol.**  
**Thigénol Roche.**  
**Ulmarène Gigon.**  
**Uromil.**  
**Valériane Gmet.**  
**Valérianose Gigon.**  
**Vaso neurine.**  
**Véganine.**  
**Véralgine.**

### III. — ANTISEPTIQUES - DÉSINFECTANTS

Agesulf.	Hydralin.
Airol Roche.	Hypochlorine.
Anaquinine Lescène.	Inolène.
Anexol.	Iodex.
Aniodol.	Iodo-vitasine.
Antiphlogistine.	Iodure d'amidon Lumière.
Baume Delacour.	Iosorbine.
Baume Sélénia.	Ixogyne.
Boricine Meissonnier.	Kerlactine.
Borostyrol.	Kerlol.
Bulgarine Thépénier.	Laurénol médicinal.
Cataplasme du D <sup>r</sup> Lelièvre.	Lusoforme.
Centrosérum Grosjean.	Mésororme.
Céthocal.	Néo-collargol.
Chloral-géranie.	Néol.
Chloraseptine Optima.	Noviode.
Clonazone Daufresne.	Pennès (Produits).
Coaltar saponiné Le Beuf.	Plagéine Soulas.
Collutoire V.-E. Doumer.	Pommade Raimoa.
Comprimés Aqua Pura.	Préventyl.
Comprimés d'Alibour.	Pulvéol.
Comprimés Guillaumin.	Salubrine Phénix.
Comprimés gynécologiques	Sanoformine.
Merminod.	Sanoram.
Créoline Pearson.	Savon Pérusol.
Créosoforme Lambiotte.	Séphydine.
Crésyl Jeyes.	Stéramine.
Dermo-Rhinhistol.	Thigénol Roche.
Détergine.	Tinctiode.
Ektogan Bocquillon.	Tochlorine.
Eranol.	Tulle gras Lumière.
Evine.	Tulle rose Beslier.
Flavurool.	Ulcéobande.
Formint Merminod.	Ulcéoplaque.
Gélotube 29.	Végétol externe.
Glyco M.	Vioforme.
Gomenol.	Vitargyl.
Hermophényl Lumière.	

---

### IV. — APPAREIL CIRCULATOIRE

Acécoline.	Adrénaline Invar.
Acésine Guillaumin	Adrénine.
Adrénaline Clin.	Adrépatine.



Aérophagyl..	Cipromarol.
Afatyl.	Citrofluyl.
Alcamfétol.	Citropaine.
Algatan.	Citrosodine Grémy.
Allisatine Sandoz.	Colloïode Dubois.
Allium Coirre.	Complextrait marron
Aloysine.	d'Inde.
Amphotonyl.	Coramine Ciba.
Ampoules Boissy.	CratæGINE.
Ampoules de Digalène	Crataegus Gmet.
Roche.	Crayon antifissure Do-
Ampoules de Sécacornine	mergue.
Roche.	Crème résolutive du
Ampoules de spasalgine	D <sup>r</sup> Rap.
Roche.	Curiode.
Ampoules de Théobryl	Delbiase.
Roche.	Dépuratif Kromelinck.
Anaclasine Ranson.	Dépuriodé du D <sup>r</sup> R. Weber.
Androcalcion.	Diasclérol.
Angioxyl du D <sup>r</sup> Roussel.	Diathermie.
Anoïde.	Dicaliode.
Anfirrhoïde.	Digalène Roche.
Antonal.	Digibaine.
Anusol.	Digifoline Ciba.
Anxiol.	Digitimialbaine.
Aphloïne Trouette-Perret	Digitaline cristallisée
Armosine capsules.	Mialhe-Petit.
Artérase.	Digitaline Invar.
Artérion Vincardi.	Digitaline Nativelle.
Artério-veinine.	Dioséine Prunier.
Artoradine.	Diurégine.
Asclérosol.	Diurène.
Athérolysine.	Diurétique Gmet.
Bain carbogazeux Wolo.	Diurocalcine Gros.
Bain Carré.	Dragées Hecquet.
Bain Salvia.	Dragées Lumeval.
Baume Suelta.	Dragées toni-cardiaques
Baumolacpinine.	Le Brun.
Benzoflorine Julien.	Eléodermine.
Benzyanyl.	Elixir de Virginie Nyrdahl.
Benzylol.	Emgé Lumière.
Bi-Citrol Marinier.	Eniode Lefebvre.
Bouchon Bouteille Emania.	Epholéine.
Bursol.	Eranol.
Caféine Invar.	Ergotine Lamante.
Calcional.	Esculéol.
Campho Dausse.	Eugynol Grandval.
Campho-spartéine.	Eupaveryl Pachaut.
Camphostyl Lacroix.	Euphytose.
Camphydryl Robin.	Eupnine Vernade.
Cantéine Bouteille.	Eurectol.
Cardialgine Dubois.	Eutensyl Grémy.
Cardibaine.	Feminadène.
Cardiosthénine.	Fluveinose Mauchant.
Catalyl Mg.	Fluxine (gouttes).
Catemenyl.	Fondant iodotannique
Centrosérum Grosjean.	Dausse.

Formocitrine.  
 Génosthéniques.  
 Génomtrychnine.  
 Globules Fumouze.  
 Gouttes antispasmodiques  
   Dausse.  
 Gouttes de Séru.  
 Gui Byla.  
 Gui Gmet.  
 Guipsine.  
 Guitose.  
 Gynopausine.  
 Hamaméline Roya.  
 Hamaméliode.  
 Hamamélis Gmet.  
 Hamamélis Grandval.  
 Hémaxol.  
 Hémodrome.  
 Hémoductyl.  
 Hémosfluidol.  
 Hémoluol.  
 Hémopausine.  
 Hémophiline Planche.  
 Hémoplase.  
 Hémorroidine gouttes.  
 Hémorroidine pommade.  
 Hémorroidine Supposi-  
   toires.  
 Hémostyl du Dr Roussel.  
 Hémoveine.  
 Hirudinase.  
 Hormotone.  
 Hypersan.  
 Hypotan.  
 Indhaméline Lejeune pluri-  
   glandulaire.  
 Indhaméline Lejeune sim-  
   ple.  
 Infra-Rouges.  
 Insuline Fornet.  
 Intrait de marron d'Inde  
   Dausse.  
 Intrait de strophantus  
   Dausse.  
 Ioda.  
 Iodalose Galbrun.  
 Iodamélis Logeais.  
 Iodascérine.  
 Iodassium.  
 Iode organique Boissy.  
 Iodex.  
 Iodinjectol Jammes.  
 Iodogénol Pépin.  
 Iodo-Maisine.  
 Iodométine.  
 Iodone Robin.  
 Iodonucléol.

Iodostarine Roche.  
 Iodo-Vitasine.  
 Iodural Novat.  
 Iodurase.  
 Iodures Pachaut.  
 Iodure Philippe.  
 Iodures Souffron.  
 Ionyl.  
 Juraisin Macon.  
 Kerlol.  
 Kluchol Remeaud.  
 Kola granulée Astier.  
 Kola Monavon.  
 Lacpinine.  
 Laminiodé.  
 Lipiodol Lafay.  
 Lipoides Iscovesco  
 Lipoiodine Ciba.  
 Magiodyl.  
 Marcynase.  
 Ménovarine.  
 Mésothorium Buisson.  
 Mialbaine.  
 Micelliode.  
 Mictasol.  
 Moroidol Ch. Gautier.  
 Natibaine.  
 Natirose.  
 Néoriode.  
 Néospasme.  
 Neptal.  
 Nestosyl.  
 Névrosan.  
 Onction Leisyn.  
 Opochol.  
 Opothérapie           Henning  
   (Myostone).  
 Opotonine.  
 Orthogénol.  
 Ouabaine Arnaud.  
 Papavéryl.  
 Passiflorine.  
 Paxène.  
 Phléboguil.  
 Phlébotonine.  
 Phosoforme.  
 Phylla.  
 Pilules Philippe.  
 Pituilobine Byla.  
 Pneumogéine Renard.  
 Polyiodure Gonnon.  
 Polypeptonal.  
 Pommade Logeais.  
 Pommade Midy.  
 Poudre Escoulaire.  
 Pragmoline.  
 Proveinase Midy.

Pulmocardine.	Suppositoires Logeais.
Pulsamone.	Suppositoires Midy.
Quinicardine.	Sympathyl Chantereau.
Quinoidine Duriez.	Tablettes Zéva.
Rectoline.	Técarine.
Réfistine.	Tétranitrol Roussel.
Rénaleptine.	Théisine Dubat.
Rhocya.	Théobromine Invar.
Rhodazil.	Théobromose Dumesnil.
Riodine.	Théobryl Roche.
Rythmosystol.	Théosalvose.
Saint-Aré (Source).	Théovadil.
Salsanos.	Théoxantine.
Salvénase Legoux.	Thyroidine Gory.
Sanedrine.	Tiodine Cognet.
Santhéose.	Tonicardine Gonnon.
Scillarène Sandoz.	Tonyol « F. ».
Scérosérol.	Toritanol Lamo.
Scérosérum.	Tot'Hamelis.
Scéroveine Hardy.	Trinitrine caféinée Dubois.
Sécacornine Roche.	Trinitrine-papavérine La-
Sédatuline.	leuf.
Sel hépatique U.-N. Arque-	Trinitrine Roussel.
vaux.	Trisodyl Rozet.
Sérum hypotensif Fraisse.	Trynol.
Sérum Normet.	Trypsogen.
Silguine.	Ulcéosine.
Silicate de soude Pélissier	Uraseptine Rogier.
(Voir Opéthérapiques Pél-	Uricémine.
lissier).	Uroïodine.
Silicyl.	Variscéline.
Silisode.	Vascurol.
Solucalcine.	Vaso-neurine.
Solucamphre Delalande.	Veinhormones.
Sornyal.	Veinoposine.
Spasmalgine Roche.	Veinosérum.
Spasmine Jolly.	Veinosine.
Spasmopurine.	Veinotrope F. et M.
Spasmosédine.	Vénecine.
Spectrol.	Verticurine.
Sthénoléine.	Vin et sirop Nourry.
Strophantine Catillon.	Visco-véine.
Strophantus Catillon.	Viscosérum.
Suppositoires à l'Esculéol.	Viscum Zyma.
Suppositoires au nestosyl.	Vulnérine.

---



## V. — APPAREIL DIGESTIF (ESTOMAC - INTESTIN)

Acécoline.	Blédine Jacquemaître.
Acimyl.	Boldolactol.
Acolitol.	Boléase Monal.
Adipolysine.	Brides-les-Bains (tablettes,
Adrénaline Invar.	pilules, thé, sel de Fruc-
Adrépatine.	tia).
Aérophagyl.	Bucmine.
Agarase.	Bulgarine Thépenier.
Alcalinose.	Cachets Cy-Troène.
Allisatine Sandoz.	Calcomagnésie.
Aloïne Houdé.	Calcozymase.
Aloysine.	Calmag-Na.
Alsodine.	Calomel Vicario.
Alucol Wander.	Capsules Taetz.
Alunozal.	Carbalcaloïdes.
Amibiasine.	Carbatropine.
Amidal.	Carbocitrol.
Amiphène Carron.	Carbolactyl bilié.
Amphotonyl.	Carbolactyl simple.
Ampho-vaccins.	Carbolin Midy.
Ampoules de Spasmalgine	Carbonate de bismuth.
Roche.	Carbonésie.
Amylodiastase Thépenier.	Carbos.
Anapeptone Vassal.	Carbosanis.
Angioxyl du Dr Roussel.	Carminase.
Aniodol.	Carypaine.
Appétyl.	Cascara Midy.
Atural.	Cascarine Leprince
Azym.	Cethocal.
Babeurre La Faye.	Cétrarose Gigon.
Babeurre nutricia.	Charbon Fraudin.
Bacté-Coli-Phage.	Charbon Tissot.
Bacté-dysentéri-phage.	Chéralys (comprimés).
Bacté-intesti-phage.	Chloramine Freyssinge.
Bactériophages Leclerc.	Chlorhydropeptine.
Bemax.	Chloridia.
Benzophosphine Christiaens	Chlorobacilline.
Benzylol.	Chlorobyl.
Béryline du Dr Fayès.	Choléine Camus.
Bi-Citrol Marinier.	Choléine lactique.
Bilexabol.	Choléokinase.
Bileyl Fournier.	Choléolactol Daguin.
Biliboldo.	Chophytol.
Biliogastrine.	Citrocarbine.
Bioenterase.	Citrofluyl.
Biolactyl Fournier.	Citropaine.
Bis-Ka-Ma.	Citrosodine.
Bismysodine.	Colitique.
Bismuth Desleaux.	Complexes colloïdaux du
Bismuth du Dr Quesne-	Dr Riquoir.
ville (Crème de).	Complextrait condurango.
Bismuth Tulasne.	Comprimés Adrian.

Comprimés de Pantolaxine  
 du D<sup>r</sup> Boveil.  
 Comprimés Salvé.  
 Comprimés Vichy-Etat.  
 Coréine.  
 Crayon antifissure Do-  
 mergue.  
 Crésentyl.  
 Cristolax.  
 Cryptargol Lumière.  
 Decorpa.  
 Dépuratif Kromelinck.  
 Désitin.  
 Diasés Progil.  
 Diasto-Pepsine Richepin.  
 Diathermie.  
 Digestif Harvey.  
 Digestonic.  
 Doloma.  
 Dolophos.  
 Dragées Elkin.  
 Dryco (Lait sec).  
 Dyspeptine Hepp.  
 Elixir Bonjean.  
 Elixir Ducro.  
 Elixir du D<sup>r</sup> Mialhe.  
 Elixir Dussaud.  
 Elixir cupeptique Tisy.  
 Elixir Grez.  
 Elixir Spark.  
 Elkin.  
 Emgé Lumière.  
 Entéralthine.  
 Entéro-antigènes.  
 Entérobyl Dehaussy.  
 Entérohépatine.  
 Entéroseptyl.  
 Entéroxin Leclerc.  
 Entéro-vaccin Lumière.  
 Enzypan.  
 Eugastrol.  
 Euonymine Paul Thibault.  
 Eupaveril Pachaut.  
 Eupeptique Monavon.  
 Eurectol.  
 Evolaxine.  
 Evonyl (Tablettes).  
 Extrait de Malt Français  
 Déjardin.  
 Facmine Longuet.  
 Farine de malt Heudebert.  
 Farines de régime Bloch.  
 Ferment pur de raisins  
 Jacquemin.  
 Florhépatine.  
 Fluobyl.  
 Formocarbène.

Formine Adrian.  
 Fucosine.  
 Furol.  
 Galabactéine.  
 Gastrépatine.  
 Gastricine du D<sup>r</sup> Duhou-  
 cau.  
 Gastrocalcine.  
 Gastrocaol.  
 Gastropansement du D<sup>r</sup> Zi-  
 zine.  
 Gastropeptyl.  
 Gélobarine.  
 Gélogastrine.  
 Gélo-pansements gastro-  
 intestinaux.  
 Gélor.  
 Gélotanin.  
 Génatropine.  
 Génésérine.  
 Génhyoscyamine.  
 Glaxo.  
 Glyco-lactimase.  
 Glyco-Thymoline.  
 Gouttes antispasmodiques  
 Dausse.  
 Gouttes halogènes du  
 D<sup>r</sup> Bern.  
 Gouttes Magalo.  
 Grains d'Evian.  
 Grain de Vals.  
 Hépariline Optima.  
 Hépatismine.  
 Hépatobyl.  
 Hépatodiase.  
 Hépatosodine.  
 Hexafel.  
 Hipposarcine Roy.  
 Hopogan Bocquillon.  
 Hormobiline.  
 Huile de ricin Crolas.  
 Hypotan.  
 Infra-rouges.  
 Innerclean.  
 Iodure d'amidon Lumière.  
 Ionyl.  
 Isacène Roche.  
 Isotonyl Bouret.  
 Juraisin Macon.  
 Kaobrol.  
 Kaolinase.  
 Kenol.  
 Kerlactine.  
 Kinéchol.  
 Kolà Monavon.  
 Kolatinés.  
 Kymosiné Rogier.

Lab-lacto-Ferment Mialhe.  
 Lac-Ser.  
 Lactaris.  
 Lacticholéine Tulivet.  
 Lactimase.  
 Lactobacilline.  
 Lactobyl.  
 Lactochol.  
 Lactofermentine Thévenot.  
 Lactolaxine Fydaü.  
 Lacto-sérum Lavril.  
 Lait de magnésie Phillips.  
 Lait Mont-Blanc.  
 Lansoyl.  
 Larosan Roche.  
 Laxadonal.  
 Laxamalt.  
 Laxamer.  
 Laxatifs Miraton Châtel-  
 guyon.  
 Laxaul.  
 Laxocholéine Tulivet.  
 Laxogélose Tulivet.  
 Laxopectine Girard.  
 Laxor.  
 Levure B 17.  
 Levure fraîche Mycéta.  
 Limonade Godfrin.  
 Lin-Tarin.  
 Loraga.  
 Magnésie bismurée.  
 Magnésie lourde de Durel.  
 Magnétone Selamon.  
 Maltéa Moser Cristallisée.  
 Malt français Déjardin.  
 Maltosan.  
 Malt pailleté Progil.  
 Mangaine.  
 Marrubiase.  
 Mésogastrine.  
 Moroidol Ch.-Gautier.  
 Mucicarbos.  
 Mucilaxine.  
 Mucinum.  
 Naphtocarbène.  
 Néo-Collargol.  
 Néo-laxatif-Chapotot.  
 Néotrophène.  
 Neuro-Moka.  
 Neutralcaol.  
 Neutralisine Bureau.  
 Nigérine Vincent.  
 Normacol.  
 Normalarine.  
 Novolactol Daguin.  
 Nujol.  
 Nutrobias.

Oléo-mel laxatif.  
 Opobyl.  
 Opothérapie Henning (in-  
 testinal).  
 Opozones Lumière.  
 Orthogastrine.  
 Orthogénol.  
 Ostéline.  
 Pampryl (jus de raisin).  
 Panbiline.  
 Pancréanne.  
 Pancréastase Defresnes  
 granulée.  
 Pangastrol.  
 Pangestyl Narty.  
 Panglandine.  
 Papaine de Trouette-Per-  
 ret.  
 Papavhydrine.  
 Papavéryl.  
 Paragélose.  
 Paralactine Byla.  
 Paralaxol Tulivet.  
 Parlax.  
 Pepsodia.  
 Peptalmine.  
 Peptalmine magnésinée.  
 Pepticol.  
 Peptodiase.  
 Peptogil A. et L.  
 Peptozym.  
 Péristaltine Ciba.  
 Persodine Lumière.  
 Phélaixine.  
 Philogastrine.  
 Phosoforme.  
 Phosphobrome.  
 Phylla.  
 Plasma de Quinton.  
 Polyferments Laleuf.  
 Poudre laxative de Vichy.  
 Poudre Paterson.  
 Poudre Rocher laxative.  
 Poudre Stom.  
 Prises Delqué.  
 Protiodyne.  
 Proxytol.  
 Prunine Sentini.  
 Pulsamone.  
 Purganol Daguin.  
 Purgos.  
 Quassine Houde.  
 Quinquina Gmet.  
 Radiopaque Heudebert.  
 Réalphène.  
 Recto-Panbiline.  
 Régyl.



Rhéothymine Ch. Gautier.	Super digestif Legrand.
Rhizotanin Chapotot.	Suppositoires au Nestoxyl.
Riceyl Billault.	Suppositoires Gonnon.
Ricigel.	Suppositoires Pépet.
Ricomalt.	Sympathyl Chantereau.
Royérine Dupuy.	Tablettes Perroud.
Saint-Aré Source.	Tamar Indien Grillon.
Salsanos.	Tapo.
Sanluol.	Taxol.
Scuroforme.	Thaolaxine.
Sédatine Christiaens.	Théinol.
Sédatuline.	Thé Suédois.
Sédogastrine.	Thiocitrol Thévenot.
Sélamon.	Thoroxyl.
Sel de Hunt.	Tréparsol.
Sel d'Ewald.	Tridigestine Dalloz.
Selunic.	Triseptine.
Sirop Axaria.	Ultra Levure.
Sirop de la Maternité.	Uvargol.
Sirop laxatif Gobey.	Vaccinothérapie atoxique.
Sirop Sentini.	Cépède.
Sirop Teyssèdre.	Vaccins Ronchèse (ampho-
Sodogastrol.	vaccins).
Sodolactine.	Vacuoline.
Sornyal.	Valériane Gmet.
Spasmacol.	Valérium Paul Thibault.
Spasmalgine Roche.	Vanadine Chevrier.
Stal-Kosal.	Varilaxine.
Staphylase.	Vasolaxine.
Stomal.	Vichy-Laxatif.
Stomarine Billault.	Vigardyne.
Stoméol Vichy.	Vin de Chassaing.
Stomobrol.	Vin Raimoa Tonic.
Stomophyle.	Vulcase.
Stomoxygène.	Wismuthane.
Stupho.	Yaourtine.
Sulfobyl.	Zymatine Lescène.
Sulfoïdol Robin.	Zymogastrine Kervan.

---

## VI. — APPAREIL DIGESTIF (ANNEXES : FOIE - PANCRÉAS, ETC.)

Adipolysine.	Ampoules de Spasmalgine
Agocholone.	Roche.
Amibiasine.	Amylodiastase Thépénier.

Anaclatine Ranson.  
 Anapeptone Vassal.  
 Antidiabétique Monavon.  
 Babeurre La Faye.  
 Babeurre nutricia.  
 Bacté-intesti-phage.  
 Bactériophages Leclerc.  
 Baldisédan.  
 Benzophosphine Christiaens  
 B - Citrol Marinier.  
 Bilexabol.  
 Bileyl Fournier.  
 Biliboldo.  
 Biliase Raby.  
 Bilisluine.  
 Biliogastrine.  
 Bilirhéine.  
 Boldine-Houdé.  
 Boldo Gmet.  
 Boldolactol.  
 Boldorhéine.  
 Boldo Verne.  
 Boléase Monal.  
 Brides-les-Bains (Tablettes,  
 Pilules, Thé, Sel de —  
 Fructia).  
 Bucmine.  
 Calcomagnésie.  
 Calcozymase.  
 Calomel Vicario.  
 Caparlem.  
 Capsules Bardet.  
 Carbocitrol.  
 Carbolactyl bilié.  
 Carbolactyl simple.  
 Carbométine.  
 Carypaine.  
 Cascarine Leprince.  
 Catalyl Mg.  
 Chéralys (Comprimés).  
 Chloro-magnésion.  
 Chlormagnésium Fisch.  
 Cholécystine.  
 Choléine Camus.  
 Choléine lactique.  
 Cholélyse Carbou.  
 Choléoboldine Thévenot.  
 Choléo-combrétol boldinisé.  
 Choléokinase.  
 Choléolactol Daguin.  
 Cholergine.  
 Chophytol.  
 Citrocarbine.  
 Citrofluyl.  
 Citropaine.  
 Complexes colloïdaux du  
 Dr Riquoin.

Comprimés Salvé.  
 Crypthiol.  
 Curatoxine.  
 Delbiase.  
 Dépuratif Kromelinck.  
 Dépuratif Rob Lechaux.  
 Diabétifuge.  
 Diabétuline.  
 Diasto-Pepsine Richepin.  
 Diathermie.  
 Doloma.  
 Dolophos.  
 Dragées Elkin.  
 Dryco (Lait sec).  
 Elixir Dussaud.  
 Elixir eupeptique Tisy.  
 Elixir Spark.  
 Elkin.  
 Emgé Lumière.  
 Endopancrine.  
 Entérobyl Dehaussy.  
 Entérohépatine.  
 Entéroseptyl.  
 Entéro-vaccin Lumière.  
 Entéroxin Leclerc.  
 Euphoryl.  
 Evonyl (Tablettes).  
 Euchol Morellet.  
 Euonymine Paul Thibault.  
 Exonérol.  
 Farine lactée Salvy.  
 Félamine Sandoz.  
 Florhépatine.  
 Fluobyl.  
 Foriod.  
 Formocarbos.  
 Formocitrine.  
 Formine Adrian.  
 Gambéol.  
 Gêlotanin.  
 Glyco-lactimase.  
 Gouttes antispasmodiques  
 Dausse.  
 Gouttes hallogènes du Dr  
 Bern.  
 Gouttes Magalo.  
 Grains d'Evian.  
 Grains de Vals.  
 Hémopanbiline.  
 Héparbiline Optima.  
 Hépatisme.  
 Hépatobyl.  
 Hépatodiase.  
 Hépatosodine.  
 Hépatozyl.  
 Hermophényl Lumière.  
 Hexafel.

Héxotal.  
 Iloglandol Roche.  
 Infra-Rouges.  
 Insuline.  
 Insuline buccale Fornet.  
 Insuline Byla.  
 Insulyl du D<sup>r</sup> Roussel.  
 Iodascérine.  
 Iodone Robin.  
 Iodo-Thyroidine Catillon.  
 Iodurase.  
 Iodure Philippe.  
 Jécol.  
 Juglane.  
 Juraisin Mâcon.  
 Kenol.  
 Kerlactine.  
 Lac-Ser.  
 Lacticholéine Tulivet.  
 Lactochol.  
 Laminiodé.  
 Laxadonal.  
 Laxocholéine Tulivet.  
 Levure fraîche Mycéta.  
 Lipiodol Lafay.  
 Lipoiodine Ciba.  
 Lobuline.  
 Magnésium Hardy.  
 Magnétone Selamon.  
 Micelliode.  
 Naphtocarbène.  
 Néo Mg Fèvre.  
 Néoriodine.  
 Néotrophène.  
 Neutralisine Bureau.  
 Nutrobiase.  
 Oléocidase.  
 Oléoformine Corbière.  
 Olivéol.  
 Opobyl.  
 Opochol.  
 Opothérapie Choay (pep-  
 tosthénine).  
 Opothérapie Henning.  
 Opozones Lumière.  
 Orthogastatine.  
 Orthogénol.  
 Osmovaccin P. L. « Coli-  
 bacilles ».  
 Oxydothyridine.  
 Pampryl (Jus de raisin).  
 Panbiline.  
 Pancréanne.  
 Pancréastase Defresne  
 granulée.  
 Pancrépatine Laleuf.  
 Pangestyl Narty.

Papavéryl.  
 Paradoline.  
 Peptalmine.  
 Peptalmine magnésinée.  
 Peptogil A. et L.  
 Pepto-kola-Robin.  
 Peptozym.  
 Persodine Lumière.  
 Phosoforme.  
 Phylactone Byla.  
 Pilules du D<sup>r</sup> Debouzy.  
 Pilules du D<sup>r</sup> Séjournet.  
 Pilules Lithuranées du  
 D<sup>r</sup> Boveil.  
 Pilules Philippe.  
 Pipérazine Midy.  
 Polyferments Laleuf.  
 Polypeptonal.  
 Poudre Stom.  
 Protiodyne.  
 Pyrélaine Collas.  
 Quinquina Gmet.  
 Radiotétrane Gérard.  
 Radiotropine.  
 Recto-Panbiline.  
 Rhodazil.  
 Riodyne.  
 Romarantyl.  
 Saint-Aré (Source).  
 Salantale.  
 Salsanos.  
 Sédatine Christiaens.  
 Sélamon.  
 Sel hépatique U. N. Arque-  
 vaux.  
 Selunic.  
 Sinahin.  
 Sodothiol.  
 Sornyal.  
 Spasmalgine Roche.  
 Splénodose (voir Opothé-  
 rapie du D<sup>r</sup> Frayssé).  
 Spléno-magnésium.  
 Stomoxigène.  
 Sulfobyl.  
 Sympathyl Chantereau.  
 Synthaline B.  
 Tapo.  
 Thiocitrol Thévenot.  
 Thiorine.  
 Triseptine.  
 Trypsogen.  
 Uralysol.  
 Uraseptine Rogier.  
 Uricémine.  
 Uriclarine.  
 Urisanine.

Urobuccol Malmanche.  
Uroclase.  
Uroformine Gobey.  
Uroiodine.  
Urométhyl.  
Urométine Lambiotte.  
Uromil.  
Urophile.

Urosalyl.  
Vaccinothérapie atoxique  
Cépède.  
Vulcase.  
Wismuthane.  
Yaourtine.  
Zymatine Lescène.  
Zymogastrine Kervan.

---

## VII. — APPAREIL GÉNITO-URINAIRE

Absuric.  
Adrépatine.  
Agesulf.  
Airoglyce.  
Algocratine.  
Amibiasine.  
Ampho-vaccins.  
Ampolases et Opolases.  
Ampoules de spasmalgine  
Roche.  
Ampoules de Théobryl  
Roche.  
Androcalcion.  
Anexol.  
Aniodol.  
Antiphlogistine.  
Antivirus.  
Anusol.  
Argycuprol.  
Arhéol.  
Aseptone.  
Bacté-Coli-phage.  
Baldisédan.  
Benzophosphine Chris-  
tiaens.  
Benzylol.  
Blennosine.  
Boricine Meissonnier.  
Bucmine.  
Calcional.  
Calmosuppo sédatifs.  
Caparlem.  
Capsules Bardet.  
Chloraseptine Optima.  
Citrosodine Grémy.  
Clonazone Daufresne.

Complextrait G. P. V.  
Comprimés Guillaumin.  
Comprimés gynécologiques  
Merminod.  
Comprimés Vichy-Etat.  
Créosoforme.  
Cryptargol Lumière.  
Crypthiol.  
Curatoxine.  
Curiosan.  
Cynurol Rosa.  
Cytotropines.  
Delbiase.  
Delcaine Roques.  
Dépuratif Rob Lechaux.  
Désitin.  
Dialyl.  
Diasclérol.  
Diathermie.  
Dismine Favrot.  
Disolurane.  
Diurégine.  
Diurène.  
Diurétique Gmét.  
Diurocalcine Gros.  
Dragées ferro - ergotées  
Mannet.  
Elatine Bouin.  
Elgine Julien.  
Elixir ferro - ergoté  
Mannet.  
Entéro-antigènes Danysz.  
Eranol.  
Ergotine Lamante.  
Eumictine.  
Eupnine Vernade.

Eutensyl Grémy.  
 Evine.  
 Extrait Hamyd.  
 Fango Fisch et C<sup>ie</sup>.  
 Félicol.  
 Féminadène.  
 Florhépatine.  
 Fluobyl.  
 Formine Adrian.  
 Formocarbène.  
 Formocitrine.  
 Fosyls Carron.  
 Gélotube 29.  
 Génostychnine.  
 Globules Romon.  
 Gomenol.  
 Gonacrène.  
 Gonagone.  
 Gui Byla.  
 Gui Gmet.  
 Hamamélis Gmet.  
 Hémypnal Ciba.  
 Hépatismine.  
 Hermophényl Lumière.  
 Hexotal.  
 Hydroxydase.  
 Ivula.  
 Ixium.  
 Juraïsin Macon.  
 Kerlactine.  
 Lipidol Lafay.  
 Magnésium Hardy.  
 Mictasol.  
 Mictoseptol.  
 Mictualine.  
 Moroldol Ch. Gautier.  
 Naphtocarbène.  
 Néo-Dmégon.  
 Néothorium Millot.  
 Neptal.  
 Nestosyl.  
 Neubryne.  
 Nitium Buisson.  
 Novanol Jacques Midy.  
 Noviode.  
 Nutrobiase.  
 Opothérapie Henning.  
 Orthogénol.  
 Osmo-vaccin PL gynéco-  
 logique  
 Papavéryl.  
 Paradoline.  
 Pelvisédol.  
 Pericols du Dr Legros.  
 Percaine Ciba.  
 Phaguryl.  
 Phosoforme.

Phosphomagnésium.  
 Physiosthénine.  
 Pilules V.-E. Doumer.  
 Pipérazine Midy.  
 Plagéine Soulas.  
 Pneumogéine Renard.  
 Pneumo Lipase.  
 Préventyl.  
 Prostaphile Leisyn.  
 Psathanol.  
 Pyrélaine Collas.  
 Pyri-pyridium.  
 Radiotropine.  
 Réargon.  
 Rectagine.  
 Réthragine.  
 Rhéantine Lumière.  
 Saint-Aré (Source).  
 Salantale.  
 Salsanos.  
 Salvatyl.  
 Santal Midy.  
 Santal Monal.  
 Santhéose.  
 Scillarène Sandoz.  
 Sel hépatique U.-N. Arque-  
 vaux.  
 Selunio.  
 Séphydine.  
 Solucalcine.  
 Solurol.  
 Solution huileuse au Nes-  
 tosyl.  
 Solvuric.  
 Sornyal.  
 Spasalgine Roche.  
 Spasmodurine.  
 Spyrolides.  
 Stanion.  
 Stéramine.  
 Técarine.  
 Terpène Gonnon.  
 Théisine Dubat.  
 Théobromine Invar.  
 Théobromose Dumesnil.  
 Théobryl Roche.  
 Théosalvose.  
 Théovadil.  
 Théoxanthine.  
 Tonicardine Gonnon.  
 Tonyol F.  
 Triseptine.  
 Trousses Dosurine.  
 Uracétose.  
 Uralysol.  
 Uraseptine Rogier.  
 Urazine.



Ur-Clar blanc.  
 Ur-Clar bleu.  
 Uricémine.  
 Uriclarine.  
 Urifluine.  
 Urisanine.  
 Urobuccol.  
 Uroformine Gobey.  
 Uroiodine.  
 Urométhyl.  
 Urométine Lambiotte.  
 Uromil.  
 Urophile.

Urosalyl.  
 Urosan Dufayard.  
 Urozéa.  
 Uvargol.  
 Vaccin Démonchy antigonococcique.  
 Vaccinothérapie atoxique Cépède.  
 Vaccins Ronchèse (amphovaccins).  
 Végétol externe.  
 Vitargyl.  
 Yo-Androl.

## VIII. — APPAREIL RESPIRATOIRE

Acobella.  
 Acodros.  
 Adrénaline Invar.  
 Adrénoleine  
 Æthone.  
 Alcamfétol.  
 Algatan.  
 Allium Coirre.  
 Allocrysine Lumière.  
 Aloysine.  
 Ampho-Tablettes.  
 Ampho-vaccins.  
 Ampoules Boissy.  
 Ampoules de Sécacornine Roche.  
 Ampoules suractivantes Leisyn.  
 Anaclasin Hanson.  
 Anapepton Vassal.  
 Anaquintine Lescène.  
 Antiasthmatique Domergue  
 Antasthme Cibrand.  
 Antiasthme Bengalais.  
 Anti-asthme Dehaussy.  
 Antiphlogistine.  
 Antiphymique Vadam.  
 Anxiol.  
 Aquintol.  
 Arcanan.  
 Arséniodé Buriat.  
 Artoradine.

Asthmylose.  
 Azufrol.  
 Bacté-rhino-phage.  
 Balsamol Lescène.  
 Baume Aroma.  
 Benzoquinol.  
 Benzyanyl.  
 Benzylol.  
 Béxinine.  
 Biopulmoï.  
 Biotrignon.  
 Borosodine Lumière.  
 Broméine Montagu.  
 Bronchitol.  
 Bronchodermine.  
 Broncosol.  
 Cachets Kapytan.  
 Cachets Roche de Thiocol.  
 Cacodyle Gonnon.  
 Calcozymase.  
 Capsules Dartois.  
 Capsules et Sirop Préga.  
 Capsules Noguès.  
 Cétémol.  
 Chlorinol inhalant.  
 Cinalose.  
 Citrosodine Gremy.  
 Codocol.  
 Codoforme.  
 Collo-Iode Duhois.  
 Colloïdogénine du Dr Bayle.

Comprimés Maver.  
 Comprimés Roche de Thio-  
 col.  
 Coramine Ciba.  
 Créosal Dubois.  
 Créosote soluble Vacheron.  
 Cryogénine.  
 Curiode.  
 Cytobiase.  
 Dépuriode du Dr R. Weber.  
 Dermo-Rhinhistol.  
 Désensibilysine.  
 Diasés Progil.  
 Diathermie.  
 Dicaliode.  
 Diénol.  
 Dioradin.  
 Edistol.  
 Elatine Bouin.  
 Elbon Ciba.  
 Elixir Duchamps.  
 Elixir Ducro.  
 Elixir Thiogaiacolé Arque-  
 vaux.  
 Emgé Lumière.  
 Éniode Lefebvre  
 Entéro-antigènes.  
 Entérozone.  
 Epholéine.  
 Eranol.  
 Ercérhinol.  
 Ergotine Lamante.  
 Eucalyptine Le Brun.  
 Eupaveryl Pachaut.  
 Euphon.  
 Euphoryl.  
 Eupnine Vernade.  
 Formint Merminod.  
 Freinix.  
 Galform.  
 Gatercodéine.  
 Germose.  
 Glottyl.  
 Goménol.  
 Gouttes antispasmodiques  
 Dausse.  
 Gouttes livoniennes de  
 Trouette-Perret.  
 Gouttes Malone.  
 Gouttes Nican.  
 Gouttes paidophiles.  
 Gouttes Pilka.  
 Gouttes scandinaves.  
 Granions d'argent.  
 Granules des Vosges.  
 Granules minéral sulfu-  
 reux Crosnier.

Guéthural.  
 Hélénine de Korab.  
 Hémopectal.  
 Hémoplasé.  
 Hépatismine.  
 Hergénol.  
 Holaseptine.  
 Hyol.  
 Hypophédrine.  
 Infangyl Carlier.  
 Inhalol.  
 Inhalone.  
 Inhaloxyl.  
 Ioda.  
 Iodaméllis.  
 Iodarsenic Guiraud (Goui-  
 tes paidophiles).  
 Iodasclérine.  
 Iodassium.  
 Iodéine Montagu.  
 Iode organique Boissy.  
 Iodex.  
 Iodogénol Pépin.  
 Iodo-Maisine.  
 Iodométine.  
 Iodone Robin.  
 Iodonucléol.  
 Iodostarine Roche.  
 Iodo-Vitasine.  
 Iodurase.  
 Iodure Philippe.  
 Iodures Pachaut.  
 Iodures Souffron.  
 Kipsol.  
 Kluchol Remeaud.  
 Koch-i-cide Leisyn.  
 Lacpinine.  
 Laminiodé.  
 Lipiodol Lafay.  
 Lipoiodine Ciba.  
 Lucodal.  
 Magbromyl.  
 Magiodyl.  
 Malt Wander ou Gloma.  
 Marinol.  
 Marrubène.  
 Maruhor.  
 Micelliodé.  
 Miroxyl gouttes.  
 Miroxyl sirop.  
 Morrhuol.  
 Morrhuoxine.  
 Mycolysine.  
 Myothermine.  
 Nareyl.  
 Nazinette.  
 Néopancarpine.

Opotonine.  
 Oxy-injecteur du Dr Fialip  
 Oxymenthol Perraudin  
 (tablettes).  
 Ozobiase opothérapique.  
 Papavéryl.  
 Papier iodogène Eymonnet.  
 Paroxyl.  
 Pastilles Fayes à la sulfo-  
 caine.  
 Pâte Mireille.  
 Pâte Neyret.  
 Peptalmine.  
 Peptalmine magnésinée.  
 Pepticol.  
 Perles taphosote Lam-  
 biotte.  
 Pérubore.  
 Phagocytine Bureau.  
 Phagolysine.  
 Phiamine.  
 Phosoforme.  
 Phosote Lambiotte.  
 Phosphogaiacol Mary.  
 Phusasmine.  
 Physocrisine.  
 Pilules Philippe.  
 Pneumogéine Renard.  
 Pneumogénol.  
 Pneumo-Lipase.  
 Pneumostyl Daguin.  
 Polyiodure Gonnon.  
 Polypeptonal.  
 Potion des Cordeliers de  
 Sééz.  
 Poudre et cigarettes Escou-  
 flaire.  
 Poudre et cigarettes Zani.  
 Prévalidine.  
 Prézymase.  
 Pulmocardine.  
 Pulmogyl.  
 Pulmosérum.  
 Pulvéol.  
 Pyraton2.  
 Pyrélaine Collas.  
 Quinthéryl.  
 Résurrex.  
 Révulsif Boudin.  
 Révulsif Milko.  
 Révulsif Procipha.  
 Rézyl.  
 Rhinadrol.  
 Rhocya.  
 Rhodazil.  
 Riodyne.  
 Rosalyl A et B.

Salypsol Narty.  
 Sanedrine.  
 Sanex-Inhalant.  
 Séroléine granulée Baron.  
 Sérum anti-asthmatique  
 de Heckel.  
 Silicyl.  
 Sinaplasme.  
 Sirop aux hypophosphites  
 de Fellows.  
 Sirop Brahma.  
 Sirop de créosote Vache-  
 ron.  
 Sirop de glycérophosphates  
 Vacheron.  
 Sirop de Sirtal.  
 Sirop Famel.  
 Sirop Gribell.  
 Sirop Maver.  
 Sirop Mireille.  
 Sirop Noguès.  
 Sirop phéniqué Vial.  
 Sirop minéral sulfureux  
 Crosnier.  
 Sirop Roche au Thiocol.  
 Sirop Vacheron au gaiacol.  
 Soderséine.  
 Sodothioli.  
 Solution Pautauberge.  
 Sornyal.  
 Spasmopurine.  
 Staphylase.  
 Sthénoléine.  
 Sulfarsinol.  
 Sulfarsiode.  
 Sulfoidol Robin.  
 Sulfoléine Rozet.  
 Sulfureux concentré Dax.  
 Sulfureux Pouillet.  
 Sulfuryl Monal.  
 Terkal Monal.  
 Terpene Gonnon.  
 Thiocol Roche.  
 Thiorine.  
 Thiosote Lambiotte.  
 Thio-Terpene Dalin.  
 Thymo menthol Eupnique  
 Belhomme.  
 Tiodine Cognet.  
 Toni-pectoral Adrian.  
 Trinitrine caféinée Dubois.  
 Trinitrine-papavérine La-  
 leuf.  
 Tubercuséine Leisyn.  
 Tubérol.  
 Uricémine.  
 Urisanine.

Uroformine Gobey.  
 Uroiodine.  
 Urométine Lambiotte.  
 Urométhyl.  
 Vaccin anti-asthmatique  
 du professeur Minet.  
 Vaccin anti-pneumonique  
 du professeur Minet.  
 Vaccin de Weill et Dufourt.

Vaccinothérapie atoxique  
 Cépède.  
 Vaccins Ronchèse (ampho-  
 vaccins).  
 Vaclydun.  
 Valthène.  
 Vésicatoire Beslier.  
 Vin et sirop Nourry.  
 Vin Girard.

## IX. — DERMATOSES - PLAIES

Acecolex.  
 Acésine Guillaumin.  
 Albuplast Vigier.  
 Alibourine.  
 Aloplastine.  
 Aloysine.  
 Amiblasine.  
 Amidal.  
 Ampho-vaccins.  
 Anacласine Ranson.  
 Anapeptone Vassal.  
 Anexol.  
 Aniodol.  
 Anthraxone.  
 Antifurunculeux Domergue  
 Antiphlogistine.  
 Antipsorine.  
 Antivirus.  
 Arrhénal Adrian.  
 Arsylène Roche.  
 Aseptoradol.  
 Atoquinol Ciba.  
 Azufrol.  
 Bacté-pyo-phage.  
 Bactériophages Leclerc.  
 Baume Delacour.  
 Baume de la Maternité.  
 Baume du D<sup>r</sup> Baissade.  
 Baume Duret.  
 Baume Saint-Antoine.  
 Baume Sélénia.  
 Belhémine.  
 Boricine Meissonnier.  
 Borostyrol Schlatter.

Boues Radioactives Ema-  
 nia.  
 Bromostronturane.  
 Bulgarine Thépénier.  
 Cacodyle Gonnon.  
 Calcozymase.  
 Camphydryl Robin.  
 Carbolactyl bilie.  
 Carbolactyl simple.  
 Catalyl Mg.  
 Cataplasme du D<sup>r</sup> Le-  
 lièvre.  
 Céthocal.  
 Chlorobyl?  
 Chloro-Magnésion.  
 Chlorosulfol.  
 Chophytol Rosa.  
 Clonazone Daufresne.  
 Coaltar saponiné Le Beuf.  
 Colloides Amicros.  
 Comprimés d'Alibour.  
 Comprimés Guillaumin.  
 Comprimés Salvé.  
 Crème Graziana.  
 Créoline Pearson.  
 Créosoforme Lambiotte.  
 Curatoxine Vendel.  
 Curiode.  
 Delbiase.  
 Dépuriode du D<sup>r</sup> R. Weber.  
 Dermodulcis (pommade et  
 poudre).  
 Dermofagine.  
 Dermo-plastol Dumesnil.

Dermoradol.  
 Dermo-rhinistol.  
 Dermo-stalys du D<sup>r</sup> Wagon.  
 Desitin.  
 Détergine du D<sup>r</sup> Bourdeau.  
 Diadermine.  
 Dialyl.  
 Diathermie.  
 Dicaliode.  
 Dmelcos.  
 Dolophos.  
 Dragées Elkin.  
 Eczéda.  
 Eczosec.  
 Ektogan Bocquillon.  
 Eléodermine.  
 Elixir Hymel.  
 Emgé Lumière.  
 Emplâtres R. Cavaillès.  
 Enésol.  
 Entéro-Antigènes.  
 Eranol.  
 Euphoryl.  
 Evine.  
 Facmine Longuet.  
 Ferment pur de raisins  
 Jacquemin.  
 Fondant iodotannique  
 Dausse.  
 Formadermine.  
 Francoplaste.  
 Furol.  
 Galabactéine.  
 Ganderma.  
 Gaz néolée.  
 Géloïde Stalys du D<sup>r</sup> Wa-  
 gon.  
 Gélo-pansement Byla.  
 Glyco-thymoline.  
 Goménol.  
 Gouttes halogènes du  
 D<sup>r</sup> Bern.  
 Gouttes païdophiles.  
 Granulé minéral sulfu-  
 reux Crosnier.  
 Hamamélis Gmet.  
 Héparbiline Optima.  
 Hépatismine.  
 Hermophényl Lumière.  
 Hypochlorine.  
 Infra-Rouges.  
 Inolène.  
 Inotyol du D<sup>r</sup> Debat  
 Inosepta.  
 Inoxemol.  
 Insulanol.  
 Insuline.

Ioda.  
 Iodarsenic Guiraud  
 (gouttes païdophiles).  
 Iodasclérine.  
 Iodex.  
 Iodine Médol.  
 Iodo-Maisine (pommade).  
 Iodo-thyroidine Catillon.  
 Iodure d'amidon Lumière.  
 Iosorbine.  
 Kerlactine.  
 Kerlol.  
 Laccodermes.  
 Lactochol.  
 Levure B 17.  
 Levure de bière Adrian.  
 Levure fraîche Myceta.  
 Levurine extractive.  
 Linadéline.  
 Magiodyl.  
 Magnésium Hardy.  
 Métacuprol.  
 Méta-Titane.  
 Méta-Vaccin.  
 Micelliode.  
 Néo-Collargol.  
 Néol.  
 Néopancarpine.  
 Néotrophène.  
 Nestosyl.  
 Neutralisine Bureau.  
 Nisaméline Trouette-Per-  
 ret.  
 Nitium Buisson.  
 Noviode.  
 Nutrobiase.  
 Onction Angelini guérigale.  
 Onction Leisyn.  
 Opodermyl.  
 Ormatol.  
 Orthogénol.  
 Osmo vaccin P.-L. sta-  
 phylococcique.  
 Ouataplasme.  
 Pancréastase Defresne gra-  
 nulée.  
 Paralactine Byla.  
 Pâte Neyret.  
 Pélevinc.  
 Peptalmine.  
 Peptalmine magnésinée.  
 Peptogil A et L.  
 Peptonal.  
 Phosoforme.  
 Phylactone Byla.  
 Pipérazine Midy.  
 Plagéine Soulas.

Plasma de Quinton.  
 Polypeptonal.  
 Pommade au Nestosyl.  
 Pommade V.-E. Doumer.  
 Pommade Fornet à l'insuline Fornet.  
 Pommade Lenoir.  
 Pommade Noëlline.  
 Pommade Radine.  
 Pommade Raimoa.  
 Poudre Cytisia.  
 Poudre Noëlline.  
 Poudre et pommade d'insuline Phyloze.  
 Poudre Satine.  
 Prézymase.  
 Propidex.  
 Propidon.  
 Propidon pansement.  
 Protéobiol.  
 Protiodyne.  
 Psorimangane.  
 Psothanol.  
 Pulvéol.  
 Pyo-amphogel Ronchèse.  
 Pyrélaine Collas.  
 Pyroléol Edet.  
 Radiobaume Adrian.  
 Rhagadine Bacquemond.  
 Rozoderme.  
 Salantale.  
 Salicéral.  
 Salubrine Plénix.  
 Sapolan.  
 Sarcoptol.  
 Savon A. Mollard.  
 Savon Pérusol.  
 Scuroforme.  
 Sénophile.  
 Séphydine.  
 Silicyl.  
 Sirop minéral sulfureux Crosnier.  
 Sodothioli.  
 Soluprotine Roche.  
 Solution huileuse au Nestosyl.  
 Sparaplast Fournier.  
 Splenocrisine.  
 Stalysine.  
 Stanion.

Stannoxyli.  
 Staphylase.  
 Staphylocide Audras.  
 Staphylo-coccine Fraquet.  
 Staphylothanol.  
 Stéramine.  
 Sulfarsinol.  
 Sulfarsiode.  
 Sulfobyl.  
 Sulfocrème Liless.  
 Sulfoïdol Robin.  
 Sulfureux concentré Dax.  
 Sulfureux Pouillet.  
 Sulfurine du Dr Langlebert.  
 Sulfurion.  
 Sulfuryl Monal.  
 Tergyl.  
 Thalassotonine Vadam.  
 Thigénol Roche.  
 Thiophyl.  
 Tiodine Cognet.  
 Tubes Chauvin.  
 Tulle gras Lumière.  
 Tulle rose Beslier.  
 Ulcéobalnéine.  
 Ulcéobande.  
 Ulcéoplaque.  
 Ulcéo-pommade.  
 Ulcéo (Poudre).  
 Ulcéosine.  
 Ulcéosol (Pommade).  
 Ulcéosol (Poudre).  
 Ulcérophile Nosan.  
 Ultra Levure.  
 Ultra-Violets.  
 Uricémine.  
 Uvéoline.  
 Vaccinothérapie atoxique Cépède.  
 Vaccins Ronchèse (ampho-vaccins).  
 Végétol externe.  
 Veinotrope (poudre).  
 Vénécine.  
 Verrulyse.  
 Vioforme Ciba.  
 Vitamyl.  
 Vitastérol.  
 Vulcase.  
 Vulnérine du Dr Bergen.

## X. — GYNÉCOLOGIE - OBSTÉTRIQUE - ALLAITEMENT

Agomensine Ciba.  
 Airoglyce.  
 Algocratine.  
 Ampho-vaccins.  
 Ampoules de Sécacornine Roche.  
 Ampoules de Spasmalgine Roche.  
 Androstine Ciba.  
 Anexol.  
 Aniodol.  
 Antélobine.  
 Antiphlogistine.  
 Antivirus.  
 Apioline Chapoteaut.  
 Aseptone.  
 Bacté-Coli-Phage.  
 Baume Delacour.  
 Baume de la Maternité.  
 Baume Saint-Antoine.  
 Baumolacpinine.  
 Beef Lavoix.  
 Belhémine.  
 Benzylocalcium.  
 Benzylol.  
 Biotrigon.  
 Boricine Meissonnier.  
 Borostyrol.  
 Boues radio-actives Emania.  
 Bursol.  
 Cachets du Dr Boveil.  
 Cachets réparateurs.  
 Calcoléol.  
 Calmosuppos sédatifs.  
 Cantéine Bouteille.  
 Capsules Joret et Homolle.  
 Catéményl.  
 Céréossine.  
 Cérébrine Fournier.  
 Céthocal.  
 Chloral bromuré Dubois.  
 Chloraseptine Optima.  
 Clisémine Longuet.  
 Clonazone Daufresne.  
 Coaltar saponiné Le Beuf.  
 Complexes colloïdaux du Dr Riquoir.  
 Complextrait G. P. V.  
 Composé Gmet.  
 Compressif Beslier.  
 Comprimés d'Alibour.

Comprimés Guillaumin.  
 Comprimés gynécologiques Merminod.  
 Crédone Dehaussy.  
 Créosoforme Lambiotte.  
 Crésyl Jeyes.  
 Cryptargol Lumière.  
 Curatine Brunet.  
 Curiosan.  
 Cynurol Rosa.  
 Delcaïne Roques.  
 Désitin.  
 Diathermie.  
 Dioséine Prunier.  
 Dragées ferro-ergotées Mannet.  
 Ektogan Bocquillon.  
 Elastoplaste.  
 Eléodermine.  
 Elixir de Virginie Nyrdaht.  
 Elixir ferro-ergoté Mannet.  
 Entéro-antigènes.  
 Eranol.  
 Ergotine Lamante.  
 Eucalyptine Lebrun.  
 Eugaline.  
 Eugynol.  
 Evine.  
 Extrait Hamyd.  
 Extrait de malt français Déjardin.  
 Fango Fisch et C<sup>ie</sup>.  
 Farine lactée Salvy.  
 Feminadène.  
 Fer Bravais.  
 Férovarine Vitalis.  
 Florhépatine.  
 Fluxine (gouttes).  
 Folestrine.  
 Folliculine Crinex.  
 Folliculomone buccale Hinglais.  
 Fortossan Ciba.  
 Fortossan irradié Ciba.  
 Fosyls Carron.  
 Galabactéine.  
 Galactésia.  
 Galactogil.  
 Gaurol.  
 Génoscopolamine.  
 Gobérol.  
 Goménol.



Glycérophosphate Robin.  
 Glyco M.  
 Glyco-thymoline.  
 Gouttes antispasmodiques  
   Dausse.  
 Gouttes de Séru  
 Grassyl.  
 Gui Gmet.  
 Gynalthine.  
 Gynergène Sandoz.  
 Gynocalcion.  
 Gynopausine.  
 Hamamélis Gmet.  
 Hamamélis Grandval  
 Hamaméline Roya.  
 Hémagène Tailleur.  
 Hémaxol.  
 Hémodrome.  
 Hémoductyl.  
 Hémoduol.  
 Hémopausine.  
 Hémophiline Planche.  
 Hémypnal.  
 Hermophényl.  
 Hirudinase.  
 Holovarine.  
 Hormotone.  
 Hormovarine Byla.  
 Hydralin.  
 Hypochlorine.  
 Indhaméline Lejeune  
   simple.  
 Indhaméline Lejeune plu-  
   riglandulaire.  
 Inolène.  
 Iodamélis.  
 Iodex liquide.  
 Ivula.  
 Ixogyne.  
 Kerlactine.  
 Kymosine Rogier.  
 Lachésine.  
 Lacpinine.  
 Lactobacilline.  
 Lait Ment-Blanc.  
 Laurénol médicinal.  
 Leucagine.  
 Levure B 17.  
 Lipiodol Lafay.  
 Lipoides Iscovesco.  
 Maltea Moser.  
 Malt français Déjardin  
   (Extrait de).  
 Malt pailleté Progil.  
 Manganophosphat.  
 Menatol.  
 Ménosédine.

Ménovarine.  
 Mensuosédyl.  
 Mésoforme.  
 Métacuprol.  
 Méta vaccin.  
 Métritols.  
 Mictasol.  
 Natrosyl.  
 Néo-collargol.  
 Néol.  
 Néothorium Millot.  
 Nestosyl.  
 Névosan.  
 Noviode.  
 Ocréine Grémy.  
 Oléo-mel laxatif.  
 Onction Leisyn.  
 Opothérapie Choay (folli-  
   culine, Post-hypophyse.  
 Opothérapie Henning.  
 Opozones Lumière,  
 Ostéline.  
 Ovarine Optima.  
 Ovarine Tisy.  
 Ovarnon.  
 Ovaro-thyroïdine Optima.  
 Ovules halogènes du  
   Dr Bern (voir Gouttes  
   Halogènes).  
 Ovules Ivula Pearson.  
 Ovules Roche.  
 Oxydothyridine Pâris.  
 Oxydovarine Pâris.  
 Panbiline.  
 Panglandine.  
 Papavéryl.  
 Papavhydrine.  
 Paradoline  
 Pelévine.  
 Pelvisédol.  
 Péricols du Dr Legros.  
 Percaine Ciba.  
 Phytine Ciba.  
 Pilules de Blancard.  
 Pilules héléniennes Naud.  
 Pilules V.-E. Doumer.  
 Pituilobine Byla.  
 Placentodose (voir Opothé-  
   rapie du Dr Fraysse).  
 Plagéine Soulas.  
 Plasma de Quinton.  
 Pommade Noëline.  
 Pommade Radine.  
 Poudre Gynule.  
 Poudre Paterson.  
 Pulsamone.  
 Pyo-amphogel Ronchèse.

Pyréthane.  
 Quina Baron.  
 Quinovarine Optima.  
 Quinquina Gmet.  
 Réthragine.  
 Rhagadine Bracquemond.  
 Rhodazil.  
 Salantale.  
 Salubrine Phénix.  
 Sanédrine.  
 Sanoformine.  
 Savon Pérusol.  
 Sécacornine Roche  
 Sédol.  
 Sels du Jura.  
 Sénophile.  
 Séphydine.  
 Sérodausse ovarien.  
 Siccogyne.  
 Sirop de Blancard.  
 Sistomensine Ciba.  
 Solution huileuse au Nestosyl.  
 Sornyal.  
 Spasmalgine Roche.  
 Spyrolides.  
 Staphylocide Audras.  
 Stéramine  
 Sulfocrème.  
 Suppo-Gynals.  
 Suppositoires au Nestosyl.  
 Sympathyl Chantereau.  
 Tablettes Zéva.  
 Tampol Roche.  
 Tergyl Lamo.

Théinol.  
 Thigénol Roche.  
 Thyrodose (voir Opothérapie du D<sup>r</sup> Frayssé).  
 Tonyol F.  
 Tot-Hamelis.  
 Tricalcine.  
 Ultra-Levure.  
 Uraseptine Rogier.  
 Urométhyl.  
 Urométine Lambiotte.  
 Urosalyl.  
 Utéramine.  
 Uvargol.  
 Vaccin Démonchy antigonococcique.  
 Vaccinothérapie atoxique Cépède.  
 Vaccins Ronchèse (amphovaccins).  
 Vaccins Sténé (Ovules).  
 Vascurol.  
 Véganine.  
 Végétol externe.  
 Veinhormones.  
 Veinofluine.  
 Veinoposine.  
 Veinosine.  
 Veinotrope.  
 Vin Raimoa Tonic.  
 Vioforme Ciba (Ovules att.).  
 Vin et sirop Nourry  
 Vitamyl.  
 Vitargyl.  
 Vitergomine.

## XI. — HÉMOSTATIQUES

Acésine Guillaumin.  
 Amibiasine.  
 Ampoules Boissy.  
 Ampoules de Sécacornine Roche.  
 Anthéma.  
 Arhémapectine Gallier.  
 Belhémine.  
 Biotrigon C.

Boricine Meissonnier.  
 Calcional.  
 Calcium Sandoz.  
 Capsellase.  
 Chloral Géranié.  
 Chloro-Calcion.  
 Clisémine Longuet.  
 Complexes colloïdaux du D<sup>r</sup> Riquoir.

Ergotine Lamante.  
 Extrait Hamyd.  
 Fluxines (gouttes.)  
 Glucalcium R. X.  
 Gui Gmet.  
 Gynergène Sandoz.  
 Hamaméline Roya.  
 Hamamélis Gmet.  
 Hémocalciopectine.  
 Hémogénol Dausse.  
 Hémoluol.  
 Hémopectal.  
 Hémoplase.

Hémostyl du D<sup>r</sup> Roussel.  
 Kerlol.  
 Sécacornine Roche.  
 Séroma.  
 Séro-Sérum Rivier.  
 Sérum Normet.  
 Sirop phéniqué Vial.  
 Solucalcine.  
 Spectrol.  
 Tonicalcine.  
 Tot-Hamélis.  
 Utéramine.

## XII. — MALADIES INFECTIEUSES

Agamétol.  
 Alcamfétol.  
 Allochrysine.  
 Amibiasine.  
 Amidal.  
 Ampho-vaccins.  
 Ampoules suractivantes  
 Leisyn.  
 Aniodol.  
 Antalgol Dalloz.  
 Antigrippine Midy.  
 Antiphlogistine.  
 Arcanan.  
 Arsylène Roche.  
 Artoradine.  
 Bacté-phages.  
 Bacté-rhino-phage.  
 Bactériophages Leclerc.  
 Baumolacpinine.  
 Biocholine.  
 Bioentérase.  
 Biopulmol.  
 Bismuth Desleaux.  
 Bucmine.  
 Cachets du D<sup>r</sup> Bovell.  
 Cachets Kapytan.  
 Cacodyle Gonnon.  
 Caféine Invar.  
 Calcoléol.  
 Calmosuppos antither-  
 miques.

Camphydryl Robin.  
 Carbolactyl bilié.  
 Carbolactyl simple.  
 Carbonate de bismuth.  
 Centrosérum Grosjean.  
 Cétémol.  
 Chénanthol.  
 Chloramine Freyssinge.  
 Cholécystine.  
 Chophytol Rosa.  
 Collo-iode Dubois.  
 Complexes colloïdaux du  
 D<sup>r</sup> Riquoir.  
 Comprimés Salvé.  
 Crédoïne Dehaussy.  
 Créosote soluble Vache-  
 ron.  
 Crésyl Jeyès.  
 Cryogénine Lumière.  
 Cryptargol Lumière.  
 Curatine Brunet.  
 Curatoxine  
 Dermo-rhinhistol.  
 Diastogène.  
 Diastogène F.  
 Diéménal.  
 Diénol.  
 Digitaline Nativelle.  
 Dismine Favrot.  
 Disolurane.  
 Electrargol.

Electrocuprol.  
 Elgine Julien.  
 Elixir Ducro.  
 Entérobyl.  
 Entérovaccin Lumière.  
 Entérozone.  
 Eranol.  
 Erythra.  
 Eucalyptine Le Brun.  
 Fer Bravais.  
 Ferricodile.  
 Ferrocodile.  
 Formint.  
 Formocarbine.  
 Formocitrine.  
 Fosyls Carron.  
 Galform Lambiotte.  
 Gambéol.  
 Gastricine du D<sup>r</sup> Duhour-  
 sau.  
 Germoclasine Ch. Gautier  
 Gonacrine.  
 Granions d'or et d'argent.  
 Granules des Vosges.  
 Griponal.  
 Grippol.  
 Hépatismine.  
 Hermophényl Lumière.  
 Hyrganol.  
 Iodasclérine.  
 Iodaseptine Cortial.  
 Iodassium.  
 Iode organique Boissy.  
 Iodinjectol Jammes.  
 Iodo-Malsine.  
 Iodométine.  
 Kerlactine.  
 Kola granulée Astier.  
 Kola Monavon.  
 Kolatinés.  
 Lantol.  
 Leuco-septyl.  
 Levure B 17.  
 Lipodéterpenol.  
 Liposeptine.  
 Magnésium Hardy.  
 Marcynase.  
 Marinol.  
 Mésothorium Buisson.  
 Micelliode.  
 Mictoseptol.  
 Mycolysine.  
 Naïodine.  
 Natibaïne.  
 Néo-collargol.  
 Néo-Physiosthénine.  
 Névorol Rafey.

Névralgol Brossard.  
 Névrosol.  
 Nopirine Vicario.  
 Nucléatol Robin.  
 Odynal Chevalier.  
 Orargol Amicros.  
 Osmo vaccin P.-L. « Coli-  
 bacilles ».  
 Ouabaine Arnaud.  
 Oxy-injecteur du D<sup>r</sup> Fialip.  
 Panbiline.  
 Panfébrine.  
 Phosote Lambiotte  
 Physiosthénine.  
 Phytinate de quinine Cyba.  
 Pneumo-Lipase.  
 Poudre Paterson.  
 Protiodyne.  
 Pyoformine.  
 Pyrélaine Collas.  
 Pyréthane.  
 Quinby.  
 Quinéine.  
 Quinoïdine Duriez.  
 Quinquina Gmet.  
 Radiotropine.  
 Résurrex.  
 Rhéothymine Ch. Gauthier.  
 Rhinhistol.  
 Rhoféine.  
 Septicémine Cortial.  
 Sirop de créosote Vacheron.  
 Sirop de glycérophosphates  
 Vacheron.  
 Sirop Vacheron au gaiacol.  
 Sérifer Laurençon.  
 Solucamphre.  
 Soluprotine Roche.  
 Solution Bardet.  
 Staphylase.  
 Staphylocide Audras.  
 Staphylo-coccine Fraquet.  
 Stérinase.  
 Sthénoléine.  
 Strychnal Longuet.  
 Sulfarsénol.  
 Sulfuryl Monal.  
 Suppositoires Pyrax.  
 Tablettes Perroud.  
 Thalassotonine Vadam.  
 Théisine Dubat.  
 Themsaline.  
 Théosalvose.  
 Tiodine Cognet.  
 Tricalcine irradiée.  
 Triseptine.  
 Tubérol.

Ultra-Levure.  
 Uraseptine Rögler.  
 Uricémine.  
 Urisanine.  
 Uroformine Gobey.  
 Urométhyl.  
 Urométine Lambiotte.  
 Urosalyl.  
 Urosan Dufayard.

Uvargor.  
 Vaccinothérapie atoxique  
 Cépède.  
 Vaccin anti-grippal du  
 professeur Minet.  
 Vaccins buccaux Fornet.  
 Vaccins Ronchèse (amphe  
 vaccins).  
 Véralgine

### XIII. — MALADIES DE LA NUTRITION (ARTHRITISME - GOUTTE - OBÉSITÉ - DIABÈTE - RHUMATISME, ETC.)

Absuric.  
 Acimyl.  
 Adipolysine.  
 Alcalinose.  
 Alcamfétol.  
 Algatan.  
 Algocratine.  
 Algophagine.  
 Allophaquina.  
 Ampho-vaccins.  
 Ampoules Reipar.  
 Anac拉斯ine Ranson.  
 Anapeptone Vassal.  
 Androstine Ciba.  
 Anégrine.  
 Antalgot Danoz.  
 Antialgos Christiaens.  
 Antidiabétique Monavon.  
 Antiphlogistine.  
 Antisciatique Chambon.  
 Antonal.  
 Anxiol.  
 Arrhéнал Adrian.  
 Arrhénuclène.  
 Arséniode Buriat.  
 Asciatine.  
 Ascéine.  
 Atolysan.  
 Atophan Cruet.  
 Atophanyl.  
 Atoquinol Ciba.  
 Azufrol.

Bain Carré.  
 Bain Salvia.  
 Baume Aroma.  
 Baume Bengué.  
 Baume Rhodia.  
 Baumolacpinine.  
 Béryline du Dr Fayes.  
 Bétul-Ol-Midy.  
 Biarsol.  
 Bi-Citrol Marinier.  
 Biotrignon dragées.  
 Boldo Gmet.  
 Bouchon Bouteille Emania.  
 Boues radioactives Emania.  
 Brides-les-Bains (Tablettes  
 Pilules, Thé, Sel de —,  
 Fructia).  
 Bulgarine Thepenier.  
 Cachets du Dr Bovell.  
 Calcoléol.  
 Calcozymase.  
 Calmosuppos sédatifs.  
 Camphro-Salyl Fraisse.  
 Capsules Bardet.  
 Capsules de Morrhuine Puy.  
 Carbolactyl bilié.  
 Carbolactyl simple.  
 Catalyl Mg.  
 Cataplasme du Dr Lelièvre.  
 Cérébrine Fournier.  
 Chéloidine.  
 Chloral bromuré Dubois.

Chloréthyle Bengué.  
 Cholécystine.  
 Chophytol Rosa.  
 Choléine lactique.  
 Cibalgine.  
 Citrofluyl.  
 Colchi Sal Midy.  
 Collo-Iode Dubois.  
 Complexes colloïdaux du  
 Dr Riquoir.  
 Complexttrait Kola.  
 Crédone Dehaussy.  
 Crésopirine.  
 Cryogénine Lumière.  
 Cryptargol.  
 Crypthiol.  
 Curatine Brunct.  
 Curatoxine.  
 Curiode.  
 Curogène.  
 Cynuril Rosa.  
 Dépuriode du Dr R. Weber.  
 Dermo-Rhinhistol.  
 Désitin.  
 Diabétifuge.  
 Diabétuline.  
 Dialacétine Ciba.  
 Diasclérol.  
 Diasés Progil.  
 Diathermie.  
 Dicaliode.  
 Disolurane.  
 Doloma.  
 Dolysine.  
 Elgine Julien.  
 Elixir Ducro.  
 Emerson's Bromo-Seltzer.  
 Emgé Lumière.  
 Eniode Lefebvre.  
 Endopancrine.  
 Entéro-Antigènes.  
 Eranol.  
 Evine.  
 Extrait de malt français  
 Déjardin.  
 Fango Fisch et C<sup>ie</sup>.  
 Farines de régime Bloch.  
 Ferment pur de raisins  
 Jacquemin.  
 Fondant iodotannique  
 Dausse.  
 Formocarbène.  
 Fosfoxyll Carron.  
 Fosyls Carron.  
 Fucus Gmet.  
 Genacide.

Gouttes halogènes du  
 Dr Bern.  
 Grains céphalgifuges.  
 Grains d'Evian.  
 Granions d'iode et de soufre.  
 Guipsine..  
 Hépatismine.  
 Hopogan Bocquillon.  
 Hydroxydase.  
 Immuno-vaccin antirhu-  
 matisal.  
 Infra-Rouges.  
 Insuline Fornet.  
 Ioda.  
 Iodalose Galbrun.  
 Iodaseptine Cortial.  
 Iodamélis.  
 Iodasclérine.  
 Iodassium.  
 Iode organique Boissy.  
 Iodex au salicylate de  
 méthyle.  
 Iodhema.  
 Iodinjectol Jammes.  
 Iodogénol Pépin.  
 Iodo-Maisine.  
 Iodométine.  
 Iodone Robin.  
 Iodonucléol.  
 Iodostarine Roche.  
 Iodo-Thyroidine Catillon.  
 Iodo-Vitasine.  
 Iodurase.  
 Iodure Philippe.  
 Iodures Pachaut.  
 Iodures Souffron.  
 Ionyl.  
 Irénine Gonnon.  
 Ixium.  
 Juglane.  
 Juraisin Mâcon.  
 Lactobacilline.  
 Laminiodé.  
 Laxadonal.  
 Levure B 17.  
 Levure fraîche Myceta.  
 Lipiodol Lafay.  
 Lipoiodine Ciba.  
 Liqueur Laville.  
 Liqueur peptophosphorique  
 Adrian.  
 Lobuline.  
 Magnésium Hardv.  
 Magsalyl Mg.  
 Malt français Déjardin  
 (extrait de).  
 Manganésia.

Marcynase.  
 Mésothorium Buisson.  
 Micelliode.  
 Morrhualène.  
 Myoden.  
 Myothermine.  
 Naïodine Logeais.  
 Néoriodine.  
 Neubryne.  
 Neurotrol.  
 Névorat Rafey.  
 Névralgyl Brossard.  
 Névrosol.  
 Nisaméline Trouette-Perret.  
 Nitroyl Leisyn injectable.  
 Novacétine Prunier.  
 Nutrobiase.  
 Odynal Chevalier.  
 Oléomel laxatif.  
 Onction Leisyn.  
 Opotouine.  
 Opothérapie Henning.  
 Opozones Lumière.  
 Optalidon Sandoz.  
 Orthogénol.  
 Ovarothyroïdine Optima.  
 Oxy-injecteur du Dr Fialip.  
 Ozobiase opothérapie.  
 Pampryl (jus de raisin).  
 Panbiline.  
 Pangestyl Narty.  
 Papier iodogène Eymonet.  
 Paradoline.  
 Peptalmine.  
 Peptalmine magnésiée.  
 Pepticol.  
 Peptogil A et L.  
 Peptonal.  
 Percaïne Ciba.  
 Phosoforme.  
 Phylactone Byla.  
 Pilules de Moussette.  
 Pilules lithuranees du Dr Boveil.  
 Pilules Philippe.  
 Pipérazine Midy.  
 Plasma de Quinton.  
 Polyiodure Gonnon.  
 Polypeptonal.  
 Précikase.  
 Prézymase.  
 Prises Delqué.  
 Pyrélaine Collas.  
 Pyréthane.  
 Quina Baron.

Quinquina Gmet.  
 Quinsal.  
 Quinuryl.  
 Radiotropine.  
 Rectopanbiline.  
 Réfistine.  
 Résurrex.  
 Révulsif Boudin.  
 Révulsif Procipha.  
 Rhocya.  
 Rhoféine.  
 Riordine.  
 Salène Ciba.  
 Salicéral.  
 Salsanos.  
 Salysérum.  
 Sambul.  
 Santhéose.  
 Sédatine Christiaens.  
 Sels de lithine effervescents Le Perdriel.  
 Sel hépatique U.-N. Arquevaux.  
 Sélunic.  
 Seti.  
 Sinaplasme.  
 Sirop minéral sulfureux Crosnier.  
 Sodothioli.  
 Soluprotine Roche.  
 Solurol.  
 Solutions du Dr Clin.  
 Solvuric.  
 Spécifique Bejean.  
 Sthénoléine.  
 Stopral.  
 Stovaine.  
 Sucre Edulcor.  
 Sulfarsinol.  
 Sulfarsiode.  
 Sulfobyl.  
 Sulfoidol Robin.  
 Sulfureux concentré Dax.  
 Sulfureux Pouillet.  
 Sulfurine du Dr Langlebert.  
 Sulfurion.  
 Sulfuryl Monal.  
 Thébaïl.  
 Théosalvose.  
 Théinol.  
 Thigénol Roche.  
 Thiorine.  
 Thorium X Rhemda.  
 Thyroïdine et radiophorine Gory.  
 Thyroxine Roche.



Tiodine Cognet.  
 Tricalcine.  
 Tridynol.  
 Trynol.  
 Ulcéosine.  
 Ulmarène Gigon.  
 Ultra Levure.  
 Uralysol.  
 Uraseptine Rogier.  
 Urazine.  
 Uricémine.  
 Urifluine.  
 Urisanine.  
 Urobuccol.  
 Uroclase.  
 Uroformine Gobey.

Uroïodine.  
 Urométhyl.  
 Urométine Lambiotte.  
 Uromil.  
 Urophile.  
 Urosan Dufayard.  
 Vaccinothérapie atoxique  
 Cépède.  
 Vaccins Ronchèse (ampho-  
 vaccins).  
 Valérianose Gigon.  
 Vasoneurine.  
 Vénécine.  
 Véralgine.  
 Vitamyl.

#### XIV. — MALADIES PARASITAIRES

Agamétol.  
 Amibiasine.  
 Amidal.  
 Arsaminol.  
 Arsylène Roche.  
 Bioentérase.  
 Bismuth Desleaux.  
 Bismuth (Crème de) du  
 Dr Quesneville.  
 Calomel Vicario.  
 Carbonate de bismuth.  
 Comprimés Salvé.  
 Centrosérum Grosjean.  
 Chenanthol.  
 Créoline Pearson.  
 Chrysémine.  
 Créstyl Jeyès.  
 Crésentyl.  
 Cryogénine.  
 Cryptargol.  
 Curoxyure.  
 Dermo-Rhinhistol.  
 Diéménal.  
 Dysthène.  
 Elixir Hymel.  
 Eranol.  
 Gambéol.  
 Géranine.

Glyco-Thymoline.  
 Granions d'argent.  
 Hermophényl.  
 Iodasclérine.  
 Iodassium.  
 Kola Astier.  
 Levure B. 17.  
 Lipiodol Lafay.  
 Malarsan.  
 Micelliode.  
 Moranyl.  
 Myothermine.  
 Néo-arsycodyle.  
 Novarsénobenzol Billon.  
 Oxytoires Sorin (voir Ver-  
 mifuges Sorin).  
 Panfébrine.  
 Phytinate de quinine Ciba.  
 Pilules V.-E. Doumer.  
 Protolysine Ch. Gautier.  
 Pyrélaine Colas.  
 Quergémol.  
 Quinéine.  
 Quinarsol Fébrifuge.  
 Quinéine.  
 Quinoforme Lacroix.  
 Quino-Thorium.  
 Quinio stovarsol.

Quinolidine Duriez.  
 Quinobrome.  
 Quinquina Gmet.  
 Rhéothymine Ch. Gautier.  
 Rhodarsan.  
 Sanluol.  
 Sarcoptol.  
 Séroquinol.  
 Solution Bardet.  
 Staphylococcine.  
 Sthénoxal.  
 Stovarsol.  
 Sueroquinine Ch. Gautier.  
 Sulfarsénol.  
 Sulfoidol Robin.  
 Sulfureux Pouillet.

Sulfuryl Monal.  
 Suppositoires Corbière.  
 Tablettes Perroud.  
 Taenifuge Bardet.  
 Taenifuge français du  
 Dr Duhourcau.  
 Taenifuge du Dr Jacquème.  
 Taenifuge Kirn.  
 Tiodine Cognet.  
 Tréparsol.  
 Triseptine.  
 Tryparsamide.  
 Ultra- Levure.  
 Vermifuge Cornet.  
 Vermifuge Sorin.  
 Vermirène Audibert.

## XV. -- OPHTALMOLOGIE

Acécoline.  
 Ampho-vaccins.  
 Aniodol.  
 Antiphlogistine.  
 Antivirus.  
 Bismuthoidol Robin.  
 Boricine Meissonnier.  
 Collyres Chibret.  
 Comprimés d'Alibour  
 Conjonctol.  
 Cryptargol Lumière.  
 Delcaïne Roques.  
 Diathermie.  
 Génostychnine.  
 Glycocarpine.  
 Hypotan.  
 Iodogénol Pépin.  
 Névralgol Brossard.  
 Glyco-Thymoline.  
 Onction Leisyn.  
 Ophtalmine.  
 Orargol.  
 Percaïne Ciba.  
 Pommades ophtalmiques  
 Chibret optima.  
 Pragmoline.

Psiothanol.  
 Pyo-amphogel Ronchèse.  
 Rhinofluine.  
 Salantale.  
 Sanédrine.  
 Scurocaïne.  
 Silicyl.  
 Staphylocide Audras.  
 Sulfoïdol Robin.  
 Thigénol Roche.  
 Tiodine Cognet.  
 Toritane Lamo.  
 Toritanol Lamo.  
 Tubes Blache.  
 Tubes du Dr Guiraud.  
 Tubes Dulcis.  
 Tubesophtalmiques Ferlux.  
 Vaccinothérapie atoxique  
 Cépède.  
 Vaccins Renard n° 1 et  
 n° 2.  
 Vaccins Ronchèse (ampho-  
 vaccins).  
 Végétol externe.  
 Vitargyl.

## XVI. — OPOTHÉRAPIE

Adipolysine.	Néospasmine.
Agomensine Ciba.	Ocréine Grémy.
Ampolases et opolases,	Opochol.
Androcalcion.	Opodermyl.
Androstine Ciba.	Oponuclyl.
Antélobine.	Opothérapie Bouty.
Bilivaccin anticolibacillaire.	Opothérapie Byla.
Boléase Monal.	Opothérapie Choay (Ex-
Calcoléol.	traits opothérapeutiques-
Calcozymase.	syncrines).
Carbolactyl bilié.	Opothérapie du D <sup>r</sup> Fraysse.
Carbolactyl simple.	Opothérapie Fournier.
Catalyl Mg.	Opothérapie Henning.
Choléine Camus.	Opothérapie Moncour.
Cholergine.	Opothérapeutiques Meurice.
Choléoboldine Thévenot.	Opothérapeutiques Pélissier.
Colloïdine Laleuf.	Opozones Lumière.
Colloïdogénine du D <sup>r</sup> Bayle.	Orchlidine Optima.
Dermo-rhinhistol.	Orthogénol.
Entérohépatine.	Ovarine Optima.
Eufosyl.	Ovarine Tisy.
Eutensyl Grémy.	Ovaro-thyroïdine Optima.
Féminadène.	Ovarnon.
Follicormone buccale Hin-	Oxydothyryne Pâris.
glais.	Oxydovarine Pâris.
Folliculine Choay.	Panbiline.
Folliculine Crinex.	Pancrépatine Laleuf.
Galactogil.	Panfèbrine.
Gastricine du D <sup>r</sup> Duhour-	Panglandine.
cau.	Phylactone Byla.
Globules Romon.	Physocrisine.
Grains d'Evian.	Phytosplénol Plé.
Gynocalcion.	Pilules du D <sup>r</sup> Debouzy.
Hématoethyroïdine.	Prézymase.
Hémo-Hépatext.	Proxystases.
Hémopanbiline.	Quinovarine Optima.
Hépatismine.	Rectopanbiline.
Hépatobyl.	Salvénase du D <sup>r</sup> Duhour-
Hépatrol.	cau.
Hirudinase.	Sistomensine Ciba.
Holovarine.	Tablettes Zéva.
Hormobiline.	Taburol Monal.
Indhaméline Lejeune plu-	Thyroxine Roche.
riglandulaire.	Thyroidine Gory.
Iodothyroïdine Catillon.	Tricalcine opothérapeutique.
Irovarine Tisy.	Tri-digestine.
Lipocérébrine Chevretin.	Yo-Androl.
Lipoides Iscovesco.	Yo-gynine.
Micelliodé.	

## XVII. — PRODUITS DIVERS - INSTRUMENTATION

Albuplast Vigier.		Gouttes Dausse.
Bains médicamenteux	du	Granions de Fouard.
D <sup>r</sup> Fayès.		Infra-rouges.
Complexes colloïdaux	du	Inhalo-Bol.
D <sup>r</sup> Riquoir.		Intraits Dausse.
Complexextraits.		Iodures Souffron.
Compressif Beslier.		Oxy-injecteur du D <sup>r</sup> Fialip.
Diathermie.		Quinuryl.
Elastoplaste.		Radiotétrane.
Fondants Dausse.		Sparaplast Fournier.
Fosyls Carron.		Trousses Dosurine.
Francoplaste.		Ultra-violets.

---

## XVIII. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

Acécoline.	Boréol.
Acodros.	Boricine Meissonnier.
Acoégénol.	Bulgarine Thepenier.
Adrénoleine inhalant.	Camphydryl Robin.
Allocaïne Lumière.	Cataplasme du D <sup>r</sup> Lelièvre.
Althine.	Centrosérum Grosjean.
Amborhinol.	Chlorinol inhalant.
Ampho-Tablettes.	Cibalgine.
Ampho-vaccins.	Cimatryl.
Ampoules de spasmalgine	Citrolargol.
Roche.	Clonazone Daufresne.
Anexol.	Cocaine Midy.
Aniodol.	Colluborine Dupuy.
Antiphlogistine.	Collutoire V.-E. Doumer.
Antivirus.	Complexes colloïdaux du
Anxiol.	D <sup>r</sup> Riquoir.
Apsophol.	Créosoforme Lambiotte.
Avanazol Couturieux.	Crésyl Jeyès.
Argybil.	Crédone.
Arhine Lambiotte.	Curatine Brunet.
Bacté-rhino-phage.	Cryptargol Lumière.
Balmiga.	Delcaine Roques.
Baume Saint-Antoine.	Dermo-rhinhistol.
Boules Quies.	Diathermie.

Dragées Bengué au menthol.  
 Edistol.  
 Ektogan Bocquillon.  
 Eléodermine.  
 Epholéine.  
 Eranol.  
 Ercérhinol.  
 Eucalyptine Lebrun.  
 Euphon.  
 Formyl.  
 Fornose.  
 Freinix.  
 Galfarm Lambiotte.  
 Galliodine.  
 Glottyl.  
 Glyco M.  
 Glyco-Thymoline.  
 Goménol.  
 Gosiérine Dalloz.  
 Gouttes Nican.  
 Gouttes Malone.  
 Granions d'argent.  
 Granules des Vosges.  
 Granulé minéral-sulfureux Crosnier.  
 Hémopectal.  
 Hydrorrhéol.  
 Hyol.  
 Hypochlorine.  
 Hypotan.  
 Inhalol.  
 Inhale-bol.  
 Inhalone.  
 Inhale-sel.  
 Inhaloxyl.  
 Inhalation Lancosme.  
 Inolène.  
 Iodarsénic Guiraud (gouttes païdophiles).  
 Iodassium.  
 Iodex liquide.  
 Iosorbine.  
 Iodo-Maisine (pommade).  
 Kidoline.  
 Kinectine.  
 Kipsol.  
 Kluchol Remeaux.  
 Lacpinine.  
 Léniforme.  
 Lipiodol Lafay.  
 Marinol.  
 Mésiforme.  
 Micelliode.  
 Mucosodine.  
 Naïodine.  
 Naso-sulfolarsan.

Nazinette.  
 Nazophyl Darva.  
 Néfitol (voir Topique nasal A. B. C.).  
 Néo-collargol.  
 Néol.  
 Néopancarpine.  
 Nestosyl.  
 Noviode.  
 Ordarsol.  
 Orargol Amicros.  
 Osmo vaccin P. L. Rhino.  
 Otalgol.  
 Oxymenthol Perraudin (tablettes).  
 Pastilles Fayes.  
 Percaine Ciba.  
 Pérubore.  
 Phosoforme.  
 Phosorine.  
 Physiosthénine.  
 Pragmoline.  
 Protiodyne.  
 Pulvéol.  
 Pyq-amphogel.  
 Révalsif Milko.  
 Rhinadrol.  
 Rhinaspir.  
 Rhinofluine.  
 Rhino-Liposeptine.  
 Rhinistol.  
 Salantale.  
 Sanédrine.  
 Sanex inhalant.  
 Sclérosérum.  
 Scurocaine.  
 Scuroforme.  
 Sédorhinol.  
 Séphydine.  
 Septicémine Cortial.  
 Séro-comprimés Méricux.  
 Silicyl.  
 Sinusyl.  
 Sirop minéral sulfureux Crosnier.  
 Sirop phénique Vial.  
 Solution huileuse au Nestosyl.  
 Spasalgine Roche.  
 Staphylococcine Fraquet.  
 Staphylocide Audras.  
 Sulfoïdol Robin.  
 Sulfoléine Rozet.  
 Sulfo-Rhinol du Dr Fayes.  
 Sulfureux Pouillet.  
 Sulfuryl Monal.  
 Suppositoires Corbière.

Topique nasal A. B. C. (néfitol).	Vaccinothérapie atoxique
Thigénol Roche.	Cépède.
Thiorine.	Vaccins Ronchèse (ampho- vaccins.)
Thymo menthol Eupnique	Valthène.
Belhomme.	Véganine.
Tiodine Cognet.	Végétol externe.
Tubérol.	Verticurine.
Tubes Chauvin.	Vioforme Ciba.
Ultra-Violets.	Vitargyl.
Vaccin antigrippal du pro- fesseur Minet.	Vocaldop.

## XIX. — RECONSTITUANTS - RECALCI- FIANTS - TONIQUES

Actine.	Biocalcose Chevreton.
Adral.	Biocholine.
Adrénaline Invar.	Biodynamine.
Alexime.	Biogénol Demasles.
Aliment Tinardon.	Bionergyl.
Ampoules Churchill.	Biophorine Girard.
Ampoules névrosthéniques	Bioplasmyl.
Dausse.	Biophytol.
Ampoules suractivantes	Biosine Le Perdriel.
Leisyn.	Biotrignon.
Amunine.	Blédine Jacquemaître.
Amylodiaséase Thépénier.	Bouchon Bouteille Emania.
Antasthène.	Boues radioactives Emania.
Antiphi.	Cachets Roche de Thioçol.
Ardogène.	Cacodyle Gonnon.
Arrhéna! Adrian.	Cacodyline Jammes.
Arrhénomartiol.	Cacodylo-phosphate vital de Jacquemaître.
Arrhénuclène Bergevin.	Calciflxine irradiée Bureau.
Arséniode Buriat.	Calciflxine simple Bureau.
Arsi-strychnal Longuet.	Calcional.
Asycodyle.	Calcium Sandoz.
Arsylène Roche.	Calcoléol.
Ascoléine Rivier.	Capsules de Morrhaine Puy.
Bain Carré.	Capsules Taetz à l'ext. de foie de morue lécithiné.
Baumolacpine.	Catalyl Mg.
Beef Lavoix.	Cérealose.
Belhémine.	Cérébroil Leisyn.
Bemax.	Céréossine Dehaussy.
Benzylocalcium.	
Béryline du Dr Fayes.	
Biarsol.	

Cérinil.  
 Cériomine.  
 Céthocal.  
 Chloro-calcion.  
 Chloro-magnésion.  
 Cholergine.  
 Cinalose.  
 Clupeyl.  
 Colloïdes Amicros.  
 Colloïdogénine du Dr  
 Bayle.  
 Composé Gmet.  
 Complextrait Kola.  
 Comprimés Roche de Thio-  
 col.  
 Créagénol.  
 Créosal Dubois.  
 Crescol.  
 Cytobiase.  
 Cyto-manganol Corbière.  
 Cytosérum Corbière.  
 Dialyl.  
 Diasés Progil.  
 Diastogène Dehaussy.  
 Diastogène F.  
 Ditagel.  
 Doloma.  
 Dolophos.  
 Dragées ferro - ergotées  
 Mannet.  
 Dragées Gmet.  
 Dragées Hecquet.  
 Dragées névrosthéniques  
 Yse.  
 Dryco.  
 Dysthène.  
 Electromartiol.  
 Elixir Duchamp.  
 Elixir Ducro.  
 Elixir Dussaud.  
 Elixir ferro-ergoté Mannet.  
 Energine iodée de Berck.  
 Energine phosphorée de  
 Berck.  
 Entérozone.  
 Eranol.  
 Ergorone.  
 Eubiol.  
 Eucytol.  
 Eudynol.  
 Eufosyl.  
 Euplasmiol.  
 Extrait de céréales Adrian.  
 Extrait de Malt français  
 Déjardin.  
 Farines de régime Bloch.  
 Féminadène.

Fenugrène.  
 Fer Bravais.  
 Fer Larcade.  
 Féroxal Buisson.  
 Ferricodile.  
 Ferro codile.  
 Ferro phytine Ciba.  
 Fixas e.  
 Fixase irradiée.  
 Fludiose.  
 Fluodyl.  
 Fondant de Cola Dausse.  
 Fondant iodotannique  
 Dausse.  
 Fondant mangano-ferreux  
 Dausse.  
 Fortossan Ciba.  
 Fortossan irradié.  
 Forxol.  
 Fosfoxyl Carron.  
 Fosyls Carron.  
 Fucoglycine du Dr Gressy  
 Gaduamine.  
 Gaduase.  
 Galliodine.  
 Gaurol.  
 Gélocalcine.  
 Générgosine.  
 Génosthéniques.  
 Glandocalcyl.  
 Globules Romon.  
 Glycérophosphate Dalloz.  
 Glycérophosphate Jacque-  
 maire.  
 Glycérophosphate Robin.  
 Glycolaine Robin.  
 Glycoline phosphatée Char-  
 rière.  
 Glyphospher.  
 Gouttes arsénosthéniques  
 Dausse.  
 Gouttes halogènes du  
 Dr Bern.  
 Gouttes Magalo.  
 Gouttes païdophiles.  
 Gouttes phosphosthéniques  
 Dausse.  
 Granions d'arsénic.  
 Granulés Caremel.  
 Granules de Pantofort du  
 Dr Boveil.  
 Granulé minéral sulfu-  
 reux Crosnier.  
 Hémagénine Giraud.  
 Hémato-iodine.  
 Hématoquina Trantoul.  
 Hémooantitoxine Sofos.

Hémo-Cyto-Sérum bière.	Cor-	Malt français Déjardin (Extrait de).
Hémofer.		Malt pailleté Progil.
Hémofixine Branchu.		Malt Wander ou gloma.
Hémogénol Dausse.		Mangaine.
Hémoglobine Deschiens.		Manganéol.
Hémoglyne Thuau.		Mangano-phosphat. Julien.
Hémo-hépatext.		Mangarsenic.
Hémopanbiline.		Mangratine.
Hémophagosthyl.		Marimine.
Hémoplasé Lumière.		Marinol.
Hémostyl du Dr Roussel.		Maté Douglas.
Hémostra.		Mésothorium Buisson.
Hémotal.		Méthylarsinates Bouty.
Hémotonine.		Micelliode.
Hépanème.		Minergil.
Hépaphos.		Morisland irradié.
Héparmone.		Morrhualène Gautier.
Hépathémo.		Morrhuéline Jungken.
Hépatrol.		Morrhuéline Jungken vita- minée.
Héracléol.		Morrhuel.
Hipposarcine Roy		Morrhuxine.
Histogénol.		Morubiase.
Holos.		Moruxase.
Hormocline.		Musculosine Byla.
Hyperstyl.		Néoarsite.
I. A. M.		Néo-Arsycodile.
Injection et gouttes Clin.		Néo Mg Fèvre.
Insuline Fornet.		Néo-Rhomnol.
Iodalose Galbrun.		Nergine Heudebert.
Iodarsenic Guiraud		Nervocithine Tissot.
Iodasclérine.		Neuro-Pax.
Iodassium.		Neuroplasma Fort.
Iodoalcium.		Neuroplasma Massif.
Ionyl.		Neuroplasmine Fort.
Irrastérine.		Neuropol.
Ixium.		Neurosine Prunier.
Jémalt Wander.		Neurotrol.
Kola granulée Astier		Neurotrophol Byla.
Kola Monavon.		Névrosthénine Freyssinget.
Kolatinés.		Nucléarsitol Robin.
Kreptol.		Nucléasine.
Laminiode.		Nucléatol Robin.
Laxadonal.		Nucléigène.
Lécithine Vacheron.		Nucléophorine.
Levure de bière Adrian.		Nuclhémose.
Limol Churchill.		Nutrobiase.
Lipiodol Lafay.		Opophos.
Lipoides Iscovesco.		Opocalcium.
Liposplénine du Dr Groc.		Opocalcium irradié.
Liqueur pepto-phospho- rique Adrian.		Oponuclyl.
Magol Churchill.		Opothérapie Henning.
Magnécytine.		Opotonine.
Magnésium Hardy.		Orthogénol.
Magnéso-tubes Robinet.		Ortho-zomine.
Maltea Moser.		Ostéline.



Ostréine.  
 Ovo-Lécithine-Billon.  
 Ovomaltine.  
 Ozobiase.  
 Pampryl (jus de raisin).  
 Pancrinol du Dr Debat.  
 Pangaduine.  
 Panglandine.  
 Panhémol.  
 Panostyl.  
 Parathyrocalcine Moncour.  
 Pennès (produits).  
 Pepto fer du Dr Jaillet.  
 Peptokola Robin.  
 Peptonate de fer Robin.  
 Peptone Vassal.  
 Persodine Lumière.  
 Phagosthyl.  
 Phiamine.  
 Phosoforme.  
 Phosol Quinet.  
 Phospharsol.  
 Phospharsyl.  
 Phosphates du Dr Pinard.  
 Phosphate Vital de Jacquemaire.  
 Phosphatol vitaminé irradié.  
 Phospho-Fluor Beynet.  
 Phosphogaiacol Mary.  
 Phospholéose Demasles.  
 Phosphomagnésium.  
 Phosphopinal Juin.  
 Phostyl.  
 Phylla.  
 Phytine Ciba.  
 Phytogénine Byla.  
 Phytolécithine.  
 Phytosplénol Plé.  
 Pliules de Blancard.  
 Plasma de Quinton.  
 Plurion Couturieux.  
 Pneumo-Lipase.  
 Poliol Churchill.  
 Polyminéral Fort.  
 Polyminéral irradié.  
 Préalexol.  
 Prosthénase Galbrun.  
 Quassia-Kina Rabot.  
 Quassine Houdé.  
 Quergémol.  
 Quina Baron.  
 Quinarsol antianémique.  
 Quinéine.  
 Quinoldine Duriez.  
 Quinquina Gmet.  
 Réalphène.

Reconstituant Mary.  
 Réfistine.  
 Réparateur Thuau.  
 Résurrex.  
 Rhomnol.  
 Saras.  
 Sanguil.  
 Sanguine irradiée.  
 Santhéose.  
 Sels du Jura.  
 Sérodausse antitoxisényl.  
 Sérodausse infant/le.  
 Sérodausse ovarien.  
 Séroma.  
 Séro-sérum Rivier.  
 Sérum ferrugineux Fraisse.  
 Sérum névrosthénique Fraisse.  
 Sérum névrotone.  
 Sérum Normet.  
 Siderarsan.  
 Silieyl.  
 Sirop aux Hypophosphites Fellows.  
 Sirop de Blancard.  
 Sirop de glycérophosphates Vacheron.  
 Sirop de Lovel.  
 Sirop Famel.  
 Sirop minéral sulfureux Crosnier.  
 Sirop Roche au Thiocol.  
 Sirop Tinardon.  
 Solucalcine.  
 Solucamphre Delalande.  
 Solution Bardet.  
 Solution Coirre.  
 Spectrol.  
 Splénarmone.  
 Splénomagnésium.  
 Splénomanganol.  
 Stérinase Vincent.  
 Stérogyl.  
 Sthénoléine.  
 Sthénoxal.  
 Strychnal Longuet.  
 Sulfarsiode.  
 Sulfureux Pouillet.  
 Sulfurine du Dr Langlebert.  
 Supernucléine Legrand.  
 Suppotonic.  
 Sylcase.  
 Synergyl Vadam.  
 Taburol Monal.  
 Thiocol Roche.  
 Thyroxine Roche.  
 Tonicalcine.

Tonikéine Chevretin.	Vin de Bugeaud.
Toni pectoral Adrian.	Vin de Lavoix (voir : Beef
Tonique Gonnon.	Lavoix.
Tonique Roche.	Vin et sirop Nourry.
Tonudol.	Vin Girard.
Total Tonic.	Vin de Carnéose.
Tréphonyl du Dr Roussel.	Vin Raimoa Tonic.
Tricalcine.	Viosten.
Triganol Vigier.	Vioxyl.
Ultracao Laurençon.	Visco-sérum.
Ultra-violets.	Vitacalcine Moncour.
Ultra vitamine 4.	Vitadone.
Uvé.	Vitaminol.
Uvéphorine.	Vitamorrhueine.
Uvéstérol.	Vitamyl.
Vanadarsine Guillaumin.	Vitastérol.
Vanadine Chevrier.	Vitergomine.
Vanucléol.	Vivoléol.
Végéphos.	Zohol.
Veguva.	Zomine du professeur Ch.
Vénécine.	Richet.
Vigostérol irradié.	Zomo-Musculosine Byla.
Vin de Baudon.	

## XX. — STOMATOLOGIE

Algocratine.	Galliodine.
Allocaïne Lumière.	Glyco M.
Althine.	Glyco-Thymoline.
Ampho-tablettes.	Gosierine Dalloz.
Antiphlogistine.	Inolène.
Antivirus.	Iodex liquide.
Atoquinol Ciba.	Lait de magnésie Phillips.
Bacté-Pyo-Phage.	Lipiodol Lafay.
Boricine Meissonnier.	Marinol.
Borostyrol.	Mésosome.
Chloral Géranié.	Mucosodine.
Cachets du Dr Boveil.	Nestosyl.
Céréossine.	Névoral Rafay.
Chloraseptine Optima.	Névralgol Brossard.
Clonazone.	Névrosol.
Collutoire V.-E. Doumer.	Noviode.
Crédone.	Odarsol.
Créosoforme Lambiotte.	Oxymenthol Perraudin.
Curatine Brunet.	Parathyrocalcine Moncour.
Cynuril Rosa.	Poudre Paterson.
Delcaine Roques.	Pulvéol.
Diathermie.	Pyréthane.
Elzévir dentition.	Salubrine Phénix.
Fluosalyl Beaugourdon.	Sanogyl.
Galform Lambiotte.	Scurocaine.

Sélunio.  
Séphydine.  
Sirop Teyssèdre.  
Scuroformé.  
Solution huileuse au Nes-  
tosyl.  
Stovarsol.

Tablette oxymenthos Per-  
raudin.  
Tiodine Cognet.  
Ultra-violets.  
Véganine.  
Vélargine.

## XXI. — SYPHILIS

Acétylarsan.  
Alcamfétol.  
Algatan.  
Arquéritol Lesure.  
Arsaminol.  
Benzo bismuth Millot.  
Biazan.  
Biodermyl Monal.  
Biodural Novat.  
Bismhydral.  
Bismutartrol.  
Bismuthion Couturieux.  
Bismuthoidol Robin.  
Bissol Ch. Gautier.  
Bivatol.  
Boldo Gmet.  
Cacodyline Jammes.  
Calomel Vicario.  
Cardyl.  
Céthocal.  
Collo-iode Dubois.  
Comprimés Neyret.  
Comprimés Salvé.  
Curaluès.  
Curiode.  
Cyanhermine.  
Dépuriode du Dr R. Weber.  
Dermo-rhinhistol.  
Elixir Déret.  
Elixir Hymel.  
Elixir iodépuratif Pépin.  
Elixir Spes.  
Enésol.  
Epicral.  
Éranol.  
Erythroluès.  
Galyl.  
Gambéol.  
Globules Fumouze.  
Granions de bismuth et de  
mercure.

Granulés minéral sulfu-  
reux Crosnier.  
Hectargyre.  
Hectine.  
Hermophényl Lumière.  
Huile grise Ercé.  
Ioda.  
Iodalose Galbrun.  
Iodasclérine.  
Iodassium.  
Iode organique Boissy.  
Iodo-bismuthate de qui-  
nine Fraisse.  
Iodo-bismuth Ercé.  
Iodogénol Pépin.  
Iodo-Maïsine.  
Iodométhine.  
Iodone Robin.  
Iodural Novat.  
Iodurase.  
Iodure Philippe.  
Iodures Pachaut.  
Iodures Souffron.  
Laminiode.  
Lipiodol Lafay.  
Lipogyre Ciba.  
Lipoiode Ciba.  
Lual.  
Luarsyl.  
Ludin.  
Métarsénobenzol Saca (voir  
Uclarsyl).  
Micelliode.  
Musculargyre.  
Muthanol.  
Naïodine.  
Néoiacol.  
Néo Mésarca Roche.  
Néc-Riodine.  
Néo-Tréparsénan.  
Néo-Trépol.

Novargyre.  
 Novarsénobenzol Billon.  
 Oxymuth Saca.  
 Pilules de Blancard.  
 Pilules Lémery  
 Pilules Philippe.  
 Préventyl.  
 Protolysine Ch. Gautier.  
 Quinby.  
 Quinby soluble.  
 Quinimuthol Saca.  
 Rhocya.  
 Rhodarsan.  
 Riodine.  
 Rob Oberlin.  
 Rubyl.  
 Salvatyl.  
 Sirop de Blancard.  
 Sirop iodermol Vigier.  
 Sirop minéral sulfureux  
 Crosnier.  
 Sirop Nevra.  
 Solmuth.

Stovarsol.  
 Sulfarsénol.  
 Sulfarsiode.  
 Sulfoidol Robin.  
 Sulfo-Mésarca Roche.  
 Sulfo-Tréparsénan.  
 Sulfureux Pouillet.  
 Sulfuryl Monal.  
 Supparyres du Dr Fau-  
 cher.  
 Suppositoires Corbière.  
 Suppositoires Hymel.  
 Suppositoires Rocav.  
 Tiodine Cognet.  
 Toritane Lamo.  
 Tréparsénans.  
 Tréparsol.  
 Trépol.  
 Trépoquinol.  
 Tryparsamide.  
 Uclarsyl.  
 Uroïdine.  
 Veinargyre.

## XXII. — SYSTÈME NERVEUX (SÉDATIFS, HYPNOTIQUES, ANESTHÉSQUES)

Acécoline.  
 Adonal Vicario.  
 Aérophagyl.  
 Alepsal Génévrier.  
 Algocratine.  
 Allocaine Lumière.  
 Allonal Roche.  
 Amphotonyl.  
 Ampoules Boissy.  
 Ampoules de Pantopon  
 Roche.  
 Ampoules de Spasmalgine  
 Roche.  
 Ampoules névrosthéniques  
 Dausse.  
 Anaural.  
 Angiosédine.  
 Angioxyl du Dr Roussel.  
 Antalgal.  
 Anti-épileptique de Liège.  
 Aphosal.  
 Apsophol.  
 Artérioveïne.

Azygol Thévenot.  
 Bain Carré.  
 Bains médicamenteux du  
 Dr Fayes.  
 Ballotyl.  
 Balsoforme.  
 Béatol.  
 Belladénal Sandoz.  
 Bellafoline Sandoz.  
 Benzoflorine Julien.  
 Benzylol.  
 Borocalcyl Thévenot.  
 Brosodine Lumière.  
 Boules Quies.  
 Bromadyl Vicario.  
 Broméine Montagu.  
 Bromiase.  
 Bromogénol Pépin.  
 Bromo-Maisine.  
 Bromone Robin.  
 Bromovose.  
 Bromures Souffron.  
 Cachets du Dr Boveil.

Calmésuppos sédatifs.  
 Cantéine Bouteille  
 Centrosérum Grosjean.  
 Cérébrine Fournier.  
 Chloral bromuré Dubois.  
 Chloralosane.  
 Chloroforme anesthésique  
 Lambiotte.  
 Cibalgine.  
 Comitiol.  
 Complextrait valériane.  
 Crataegus Gmet.  
 Crédone Dehaussy.  
 Cryogénine Lumière.  
 Curatine Brunet.  
 Dialacétine Ciba.  
 Dial Ciba.  
 Didial Ciba.  
 Dragées du Dr Gelineau.  
 Dragées Hecquet.  
 Dragées Lumeval.  
 Erythra.  
 Eupaveryl Pachaut.  
 Euphytose.  
 Euronol.  
 Eusomnine Bélières.  
 Feminadène.  
 Florhépatine.  
 Fondant de cola Dausse.  
 Freinix.  
 Gardénal.  
 Génésérine  
 Génoscoporamine.  
 Gouttes Malone.  
 Grains céphalgifuges.  
 Granules 3 cachets au  
 phosphore de zinc.  
 Grassyl.  
 Hémoluol.  
 Hématoéthéroïdine.  
 Hémypnal.  
 Histogénol.  
 Hyosciamine Houdé.  
 Hypalène.  
 Hypnosédine.  
 Hypnovel Vély.  
 Intrait de valériane Dausse.  
 Kalmobrol.  
 Kluchol Remeaud.  
 Lacpinine.  
 Magbromyl.  
 Naïodine.  
 Néospasmine.  
 Neubryne.  
 Neurène.  
 Neuréol.  
 Neurinase.

Neurobore.  
 Neurocalcium.  
 Neuro-moka.  
 Névralgol Brossard.  
 Nevrosan.  
 Noctisédy.  
 Novobrol.  
 Orthogénol.  
 Panthésine.  
 Pantopon Roche.  
 Papavéryl.  
 Papavhydrine.  
 Passiflorine.  
 Passival.  
 Pavéron Dausse.  
 Paxène.  
 Percaïne Ciba.  
 Phosphobrom.  
 Pilules V.-E. Doumer.  
 Plexorine Vély.  
 Polybromure Gonnon.  
 Poudre anti-épileptique  
 « Cassarini ».  
 Pragmoline.  
 Pulsamone.  
 Pyrèthane.  
 Quina Baron.  
 Quinoïdine Duriez.  
 Rhoféine.  
 Rutonal.  
 Sandoptal.  
 Scurocaïne.  
 Sédatose.  
 Sédarsan.  
 Sédatine Christiaens.  
 Sédatuline.  
 Sédobrol Roche.  
 Sédol.  
 Sédoneurol Dehaussy.  
 Sédormid Roche.  
 Sédosine.  
 Sérum neuropsychique.  
 Sirop du Dr Gelineau.  
 Sirop Myrianis.  
 Sirop Teyssèdre.  
 Solution Laroyenne.  
 Somnacétine.  
 Somnifène Roche.  
 Somnothyrl.  
 Sonéryl.  
 Soporalose.  
 Soporigène Delqué.  
 Sornyal.  
 Spasmalgine Roche.  
 Spasmine Jolly.  
 Spasmosédine.  
 Stovaine.

Sympathyl Chantereau.  
 Syncaïne.  
 Tablettes Hova (Hova-  
 lettes).  
 Tartrate Borico-potassique  
 Pachaut.  
 Terpène Gonnon.  
 Thébaïl.  
 Thyroïdine Gory.  
 Tiodine Cognet.  
 Tribromure Gigon.  
 Vagosédyl.  
 Valbornine Rogier.  
 Valbrol.  
 Valédyl.  
 Valéral Puy.  
 Valériane Byla.

Valériane Gmet.  
 Valérianate Grignon.  
 Valérianate Pierlot.  
 Valériane Pachaut.  
 Valérianose Gigon.  
 Valérinodor.  
 Valérium Paul Thibault.  
 Valérobromine Legrand.  
 Valéromenthol.  
 Valéronal.  
 Véganine.  
 Véralgine.  
 Vériane Buriat.  
 Véronidia Buisson.  
 Viscum Zyma.  
 Vitastérol.

### XXIII. — SYSTÈME NERVEUX (STIMULANTS)

Actine.  
 Alexime.  
 Antasthène.  
 Ardogène.  
 Arrhénomartiol.  
 Arrhénuclène Bergevin.  
 Arsylène Roche.  
 Azotyl.  
 Bain Carré.  
 Bemax.  
 Benzylocalcium.  
 Biarsol.  
 Biocalcose Chevretin.  
 Biodynamine.  
 Biogénol Demasles.  
 Bionergy.  
 Biophorine Girard.  
 Biophytol.  
 Bioplasmyl.  
 Biosine Le Perdriel.  
 Boues radio-actives Ema-  
 nia.  
 Bouchon Bouteille Emania.  
 Cacodyline Jammes.  
 Camphydryl Robin.  
 Cérébroil Leisyn.  
 Chloro-Magnésion.  
 Chlormagnésium Fisch.  
 Composé Gmet.

Coramine Ciba.  
 Créagénol.  
 Cytosérum Corbière.  
 Delbiase.  
 Diathermie.  
 Doloma injectable.  
 Dolophos.  
 Dragées Gmet.  
 Dragées névrosthéniques  
 Yse.  
 Dysthène.  
 Élixir Duchamp.  
 Élixir Ducro.  
 Emgé Lumière.  
 Eudynol.  
 Eufosyl.  
 Extrait de céréales Adrian.  
 Féminadène.  
 Fer ovarine Vitalis.  
 Fluodyle.  
 Forxol.  
 Fosfoxy Carron.  
 Fosyl Carron.  
 Freinix.  
 Gaurol.  
 Générgosine.  
 Génosthéniques.  
 Génostrychnine.  
 Glycérophosphate Dalloz.

Glycérophosphates Jacquemaire.	Nucléophorine.
Glykolaine Robin.	Cénophos.
Glyphospher.	OPOCHOL.
Gouttes arsénosthéniques Dausse.	Oponuclyl.
Gouttes halogènes du Dr Bern.	Orthogénol.
Gouttes Magalo.	Ovolécithine Billon.
Gouttes phosphosthéniques Dausse.	Panglandine.
Granulé Caresmel.	Pepto-Kola Robin.
Granules de Pantofort du Dr Boveil.	Phagocytine Bureau.
Hémofixine Branchu.	Phosoforme.
Hémotal.	Phosol Quinet.
Hémotonine.	Phospharsol.
Hémypnal.	Phosphates du Dr Pinard.
Histogénol.	Phosphate vital de Jacquemaire.
Hormotone.	Phosphobrom.
Injection et gouttes Clin.	Phospho-fluor Beynet.
Ionyl.	Phosphomagnésium.
Kolatinés.	Phosphopinal Juin.
Kola Monavon.	Phostyl.
Kola granulée Astier.	Phylla.
Kreptol.	Phytine Ciba.
Laxadonal.	Phytolécithine.
Limol Churchill.	Plasma de Quinton.
Lipocérébrine Chevreton.	Plexorine Vély.
Lipoides Iscovesco.	Poliol Churchill.
Liqueur peptophosphorique Adrian.	Polyminéral Fort.
Magnésium Hardy.	Polyminéral irradié Fort.
Magol Churchill.	Quassia Kina Rabot.
Mangano-Phosphal Julien.	Quergémol.
Marinol.	Quinéine.
Maté Douglas.	Réfistine.
Micelliode.	Résurrex.
Morisland irradié.	Rhomnol.
Morrhualène.	Sérum névrosthénique Fraysse.
Musculosine Byla.	Sidérarsan.
Néo Mg Fèvre.	Sirop aux hypophosphites Fellows.
Néospasmine.	Sirop de glycérophosphates Vacheron.
Néo Rhomnol.	Spléno-magnésium.
Néotrophène.	Sténergine.
Nervocithine.	Sthénoxal.
Neurodose (voir Opothérapie du Dr Fraysse).	Strychnal Longuet.
Neuroplasma Fort.	Strychnarsitol Robin.
Neuroplasma massif Fort.	Taburol Monal.
Neuroplasmine Fort.	Thalassotonine Vadam.
Neuropol.	Tonicalcine.
Neurosine Prunier.	Tonikéine Chevreton.
Neurotrol.	Tonique Gonnon.
Neurotrophol Byla.	Tonique Roche.
Névrosthénine Freyssinge.	Total Tonic.
Nucléigène.	Uvéphorine.
	Vanadarsine Guillaumin.
	Vanadine Chevrier.
	Vaso-Neurine.

Végéphos.  
Vioxyl.  
Viscosérum.  
Vitacalcine Moncour.

Yo-Androl.  
Yo-Gynine.  
Zohol.  
Zomo-musculosine Byla.

## XXIV. — TUBERCULOSE

Actine.  
Adral.  
Alcamfétol.  
Alexime.  
Algatan.  
Allochrysine Lumière.  
Aloysine.  
Amibiasine.  
Ampoules de Spasalgine Roche.  
Amylodiastase Thépenier.  
Angiolympe du D<sup>r</sup> Roussel.  
Aniodol.  
Antiphlogistine.  
Antiphi.  
Antiphymique Vadam.  
Arrhénal Adrian.  
Arrhénuclène.  
Arséniode Buriat.  
Arsylène Roche.  
Ascoléine Rivier.  
Azotyl.  
Bactioxyne.  
Balsamol Lescène.  
Beef Lavoix.  
Belhemine.  
Benzylocalcium,  
Biarsol.  
Biocalcose Chevreton  
Biocoline.  
Bionergyl.  
Biophytol.  
Biopulmol.  
Biotrignon.  
Cachets du D<sup>r</sup> Boveil.  
Cachets Roche de Thiocol.  
Cacodyle Gonnon.  
Cacodyline Jammes.  
Calcéfixine irradiée Bureau.  
Calcéfixine simple Bureau.  
Calcional.  
Calcium Sandoz.  
Calcéolol.

Capsules Dartois.  
Capsules de Morrhuine Puy.  
Centrosérum Grosjean.  
Céréossine Dehaussy.  
Cérinil.  
Cériomine.  
Chloro-calcion.  
Cholergine.  
Choline « Roche ».  
Cinalose.  
Cinéyl Grysa.  
Cinnozyl.  
Clisémine Longuet  
Clupeyl.  
Codocol.  
Codoforme.  
Colloïdogénine du D<sup>r</sup> Bayle  
Collo-iode Dubois.  
Complexes colloïdaux du D<sup>r</sup> Riquoir.  
Comprimés Roche de Thio-col.  
Créagénol.  
Créosal Dubois.  
Créosote soluble Vacheron.  
Crescol.  
Crisalbine.  
Cryogénine Lumière.  
Crysidol du D<sup>r</sup> E. Maigre.  
Curiode.  
Cyto Choline Corbière.  
Cytobiase.  
Cyto-Sérum Corbière.  
Diasés Progil.  
Dicaliode.  
Dioradin.  
Doloma injectable.  
Dolophos.  
Dysthène.  
Elbon-Ciba.  
Electrocuprol.  
Élixir Duchamp.  
Élixir Ducro.



Élixir Dussaud.  
 Élixir thiogalaicolé Arque-  
 vaux.  
 Eniode Lefèvre.  
 Eranol.  
 Eubiol.  
 Eucalyptine Le Brun.  
 Eucytol.  
 Féroxal Buisson.  
 Ferrophytine Ciba.  
 Fixase.  
 Fixase irradiée.  
 Fludiose.  
 Fluodyle.  
 Fondant iodotannique  
 Dausse.  
 Fortossan Ciba.  
 Fortossan irradié.  
 Fosfoxy Carron.  
 Fosyls Carron.  
 Fucoglycine du D<sup>r</sup> Gressy.  
 Galform Lambiotte.  
 Gaurol.  
 Gaduamine.  
 Génatropine.  
 Glandocalcyl.  
 Gloma.  
 Glycérophosphate Dalloz.  
 Glyctone phosphatée Char-  
 rière.  
 Gomenol.  
 Gouttes livoniennes de  
 Trouette-Perret.  
 Gouttes Nican.  
 Gouttes païdophiles.  
 Gouttes phospho-calciques.  
 Gouttes scandinaves.  
 Granions d'arsenic et d'or.  
 Granulé Caresmel.  
 Granules de Pantofort du  
 D<sup>r</sup> Boveil.  
 Hémooantitoxine Sofos.  
 Hémofixine Branchu.  
 Hémooglobine Deschiens.  
 Hémopectal.  
 Hémoplase Lumière.  
 Hémostyl du D<sup>r</sup> Roussel.  
 Hépatismine.  
 Hépatrol.  
 Héracléol.  
 Hipposarcine Roy.  
 Histogénol.  
 Hormocline.  
 Huile Gallina.  
 Holos.  
 Ioda.  
 Iodarsenic Guiraud (gouttes

païdopniles).  
 Iodaseptine Cortial  
 Iodassium.  
 Iodenterol.  
 Iodocalcium.  
 Iodo-Maisine.  
 Iodométine.  
 Iodonucléol.  
 Jemalt Wander.  
 Kluchol Remeaud.  
 Koch-I-Cide Leisyn.  
 Kolatinés.  
 Lait Mont-Blanc.  
 Laminiodé.  
 Lipodéterpénol.  
 Lipoides Iscovesco.  
 Liposplénine du D<sup>r</sup> Groc.  
 Lita.  
 Lucodal.  
 Malt Wander.  
 Maltea Moser.  
 Mangano Phosphal.  
 Mangarsenic.  
 Marinol.  
 Marrubène.  
 Méthylarsinates Bouty.  
 Micelliodé.  
 Minergil.  
 Miroxyl gouttes.  
 Miroxyl sirop.  
 Molène.  
 Moréthyl Dausse.  
 Morisland irradié.  
 Morrhuallène Gautier.  
 Morrhuétine Jungken.  
 Morrhuol.  
 Morrhexine.  
 Morubiase.  
 Musculosine Byla.  
 Narcyl Grémy.  
 Neuroplasma Fort.  
 Neuroplasma Massif.  
 Neuroplasmine Fort.  
 Neurotrol.  
 Nucléatol Robin.  
 Nucléophorine.  
 Nuclhématoze.  
 Oléo-mel laxatif.  
 Opocalcium.  
 Opocalcium irradié.  
 Ostréine.  
 Oxy-injecteur du D<sup>r</sup> Fialip.  
 Ozobiase opothérapique.  
 Panbiase.  
 Panbiline.  
 Pancrinol du D<sup>r</sup> Debat.  
 Pangaduine.

Panhémol.  
 Parathyrocalcine Moncour.  
 Pélospanines.  
 Perles taphosote Lambiotte.  
 Persodine Lumière.  
 Phagocytine Bureau.  
 Phagosthyl.  
 Phiamine.  
 Phosol Quinet.  
 Phospharsol.  
 Phospharsyl.  
 Phosphates du D<sup>r</sup> Pinard.  
 Phosphate vital de Jacquemaire.  
 Phospho-fluor Beynet.  
 Phospho-gaïacol Mary.  
 Phosphopinal Juin.  
 Phosoforme.  
 Phosol Quinet.  
 Phosote Lambiotte.  
 Phylla.  
 Physocrisine.  
 Phytine Ciba.  
 Phytogénine Byla.  
 Phytolécithine.  
 Plasma de Quinton.  
 Pneumo-Lipase.  
 Pneumostyl Daguin.  
 Polyminéral Fort.  
 Poudre Paterson.  
 Prévalidine.  
 Pulmocardine.  
 Pulmosérum.  
 Quina Baron.  
 Quinoïdine Duriez.  
 Rézyl.  
 Rhizotanin Chapotot.  
 Salypsol Narty.  
 Sanas.  
 Sérifer Laurençon.  
 Séroléine granulée Baron.  
 Séroma.  
 Sérum de Jousset.  
 Sérum névrotone.  
 Sérum végétal du D<sup>r</sup> Cu-guillière.  
 Sérum ferrugineux de Fraisse.  
 Sidérarsan.  
 Silicyl.  
 Sirop Brahma.  
 Sirop de créosote Vacheron.  
 Sirop de glycérophosphates Vacheron.  
 Sirop de Lovel.  
 Sirop Famel.

Sirop phéniqué Vial.  
 Sirop Roche au Thiocol.  
 Sirop Vacheron au gaïacol.  
 Solucalcine.  
 Solution Coirre.  
 Solution Pautauberge.  
 Soluprotine Roche.  
 Spasalgine Roche.  
 Spectrol.  
 Splénarmone.  
 Splénodose (voir Opothérapie du D<sup>r</sup> Frayssé).  
 Spléno-magnésium.  
 Stérinase Vincent.  
 Sthénoléine.  
 Sthénoxal.  
 Strychnal Longuet.  
 Stupho.  
 Sulfoléine Rozet.  
 Sylcase.  
 Tablettes oxymenthol Perraudin.  
 Tébéphaguine Fornet.  
 Thalassotonine Vadam.  
 Thiocol Roche.  
 Thiorine.  
 Thiosote Lambiotte.  
 Thio-Terpine Dalin.  
 Thymo-menthol eupnique Belhomme.  
 Tiodine Cognet.  
 Tonicalcine.  
 Tonikéine Chevreton.  
 Tonique Roche.  
 Tonudol.  
 Total Tonic.  
 Tricalcine.  
 Tridynol.  
 Triganol Vigier.  
 Tiradol.  
 Tubercuséine Leisyn.  
 Tubérol.  
 Tymocalcine.  
 Ultra-violets.  
 Ultravitamine 4.  
 Uroïdine.  
 Uvé.  
 Uvéphorine.  
 Uvéstérol.  
 Valthène.  
 Vanadarsine Guillaumin.  
 Vanadine Chevrier.  
 Vanucléol.  
 Végéphos.  
 Vésicatoire Beslier.  
 Vin de Baudon.

Vin de Lavoix (voir Beef  
Lavein.  
Vin Girard.  
Viosten.  
Vioxyl.  
Vitacalcine Moncour.  
Vitadone.

Vitamyl.  
Vitastérol.  
Vitamorrhaine.  
Zomine du professeur Ch.  
Richet.  
Zomo-musculosine Byla.

---

## XXV. — TUMEURS - CANCER

Algocratine.  
Anaclasine Ranson.  
Anéo Leisyn.  
Aniodol.  
Backérine.  
Borostyrol.  
C. 40.  
Cachets du Dr Boveil.  
Calcoléol.  
Calmosuppos sédatifs.  
Catalyl Mg.  
Chéloidine.  
Chloral bromuré Dubois.  
Chloro-Magnésion.  
Chlormagnésium Fisch.  
Clisémine Longuet.  
Complexes colloïdaux du  
Dr Riquoir (néoplasy-  
sines).  
Delbiase.  
Delcaine Roques.  
Diathermie.  
Doloma.  
Doloma injectable.  
Dolophos.  
Dragées Adrian au chlo-  
rure de magnésium.  
Electrocuprol.  
Electrosélénium.  
Élixir Ducro.  
Emgé Lumière.  
Fosyls Carron.  
Gouttes halogènes du  
Dr Bérn.  
Gouttes Magalo.  
Granions de cuivre d'ura-  
nium et de sélénium.  
Ionyl.  
Ixiun.  
Laxadonal.  
Lipiodol Lafay.

Magnésium Hardy.  
Magnécythine.  
Magnéso-tubes Robinet.  
Mésothorium Buisson.  
Micelliode.  
Néolyse.  
Néolyse radioactive.  
Néo Mg Fèvre.  
Néo-neurosine Prunier.  
Néophage.  
Néotrophène.  
Nestosyl.  
Cenophos.  
Opothérapiques Pélissier.  
Orthogénol.  
Pangastrol.  
Patholysine.  
Phosphomagnésium.  
Plurion Couturieux.  
Polyiodure Gonnon.  
Pommade au Nestosyl.  
Pyréthane.  
Radiolysine.  
Résurrex.  
Sédol.  
Sélénol.  
Séphydine.  
Spléno-magnésium.  
Solution huileuse au  
nestosyl.  
Supernucléine Legrand.  
Suppositoires au Nestosyl.  
Tonicalcine.  
Tricalcine.  
Véganine.  
Véralgine.  
Vernis à la Diachusine  
arsénicale.  
Verrulyse.  
Vin Raimoa Tonic.

## XXVI. — VACCINOTHÉRAPIE — SÉROTHÉRAPIE — BACTÉRIOPHAGES

Ampho-Tablettes	Ron-	Néo-Dmétys.
chèse.		Osmo-vaccins P. L.
Ampho-vaccins de	Ron-	Probios.
chèse.		Propidex.
Anthraxone.		Propidon.
Antigénines.		Propidon pansement.
Antivirus.		Pyo-amphogel Ronchèse.
Bacté-coli-Phage.		Pyoformine.
Bacté dysentérie-Phage.		Rhéantine Lumière.
Bacté-intesti-Phage.		Salantale.
Bacté-Phages.		Sphérulines synergétiques
Bacté-pyo-Phage.		Moncour.
Bacté-rhino-phage.		Stalysine.
Bactériophages Leclerc.		Staphylagone.
Bacté-staphy-Phage.		Tébéphaguine Fornet.
Bilivaccin anticolibacillaire.		Vaccin anti-asthmatique
Blennosine.		du professeur Minet.
Colitique.		Vaccin anti-grippal du
Dmelcos.		professeur Minet.
Entéro-antigènes Danysz.		Vaccin anti-pneumonique
Entéroxin Leclerc.		du professeur Minet.
Entéro-vaccin Lumière.		Vaccin Demonchy anti-
Eutensyl Grémy.		gonococcique.
Gonagone.		Vaccin de Weill et Dufourt.
Grippol.		Vaccinothérapie atoxique
Hémopanbiline.		Cépède.
Immuniphages Gremy.		Vaccins atoxiques stabi-
Immunizols Grémy.		lisés.
Immunos-antivirus.		Vaccins bactériens I. O. D.
Immuno-vaccins.		Vaccins Bruschetti.
Institut Pasteur.		Vaccins buccaux Fornet
Lysaxyn L. M. L. abdo-		Vaccins Clin.
minal.		Vaccins de Ronchèse
Lysaxin L. M. L. antigo-		(ampho-vaccins).
nococcique.		Vaccins Renard n° 1 et
Lysaxin L. M. L. antipyo-		n° 2.
gène.		Vaccins « Sténé ».
Méta vaccin.		Vaclydun.
Néo-Dmégon.		

*Deuxième Partie*

---



# DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

---



**A**

## **ABSURIC**

Le meilleur solvant de l'acide urique,  
Le plus puissant antiseptique urinaire.

**Composition.** — Citro-lactate de lithine,  
Pipérazine, urotropine, sulfosalicylate de  
quinoléine.

**Indications.** — Affections des reins et  
de la vessie (néphrites, pyélo-néphrites,  
cystites, urétrites, etc.). Gouttes, arthri-  
tisme, gravelle, rhumatismes, artério-  
sclérose, dysenterie amibienne.

**Posologie.** — 4 à 6 cuillerées à café par  
jour dans un demi-verre d'eau sucrée.  
Le flacon : 16 fr.

**Laboratoire de l'ABSURIC**  
17, rue de Provence — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## ACÉCOLINE

Seule solution anhydre et stable de chlorure d'acétylcholine, directement injectable par la voie intra-musculaire.

Substance dilatatrice des artérioles de la périphérie et des membres, sédative des spasmes artériels.

Excitante de la musculature lisse.

### Indications et posologie :

*Hypertension artérielle :* Accidents, manifestations et troubles fonctionnels, dose quotidienne : 1 ou 2 injections de 10 centigr.

*Troubles vasculaires :* a) Par spasmes artériels ou artériolaires (Ictus hémiplegique, syndrome de Raynaud, spasmes des artères rétiniennes et labyrinthiques, angine de poitrine, acrocyanoses, migraines ophtalmiques).

Dose quotidienne : 10 à 20 centigr.

b) Par lésions anatomiques (Artérites avec ou sans troubles trophiques, gangrènes, claudication intermittente).

Dose quotidienne : 1 ou 2 injections de 20 centigr.

c) Avec troubles trophiques (Ulcères des moignons, ulcères variqueux, sclérodermie).

Dose quotidienne : 10 ou 20 centigr.

*Déséquilibre vago-sympathique :* Dose : 10 centigr.

*Coliques de plomb :* 10 à 20 centigr. toutes les 10 minutes en évitant la bradycardie.

*Sueurs des tuberculeux :* Dose quotidienne : 2 à 4 centigr.

### Présentation et mode d'emploi :

Boîtes de 6 ampoules dosées à 2, 5, 10 ou 20 centigr. de chlorure d'acétylcholine en solution anhydre, pour injections intra-musculaires.

Ni intolérance, ni contre-indications.

## ACÉCOLEX

Pâte trophique à l'Acécoline.

**Traitement des Ulcères Variqueux  
des plaies atones et des dermatoses.**

(Chlorure d'acétylcholine ; fenchone ; oxydes de zinc, de titane ; ichtyol, etc...).

Cicatrisation rapide et sédation des douleurs.

**Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT**

52, rue La Bruyère — PARIS.

Adresse Tél. : Chevrematte 90 — PARIS.

## ACÉSINE GUILLAUMIN

**Composition.** — Pommade à base d'extrait de capsules surrénales de chlorétone et de stovaine.

**Propriétés.** — Agent analgésique et vasoconstricteur de grande efficacité, dont les propriétés peuvent être utilement mises à profit, en particulier dans le cas d'hémorroïdes externes ou internes.

**Indications.** — Hémorroïdes, fissures et prurit de l'anus, démangeaisons de la même région, engelures, gerçures.

**Mode d'emploi.** — L'Acésine se présente en tubes d'étain. On applique gros comme un pois de la pommade sur les hémorroïdes externes ; quand les hémorroïdes sont internes, visser, sur le tube, la canule qui l'accompagne et introduire la pommade dans le rectum. Renouveler les applications 3 ou 4 fois par jour.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN**  
13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

## ACÉTYLARSAN

Oxyacétylaminophénylarsinate  
de diéthylamine.

Solution stérile, non irritante, injectable dans le muscle ou le tissu cellulaire sous-cutané. Bien toléré. Toxicité réduite.

**Indications.** — Arsénothérapie de la Syphilis et des Spirilloses par les voies sous-cutanées ou intramusculaires.

**Présentation et posologie.** — *Acétylarsan pour adultes* : solution à 23,6 p. 100, 1 cc. = 0 gr. 05 d'Arsenic. Ampoules de 3 cc.

*Acétylarsan infantile* : solution à 9,4 p. 100, 1 cc. = 0 gr. 02 d'Arsenic. Ampoules de 2 cc.

Injectations hebdomadaires ou bi-hebdomadaires (consulter les Notices spéciales).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).



## ACIMYL

Traitement des affections du Tube digestif.

### ACIMYL GRANULÉ

**Composition.** — Citrate trisodique, Pepsine, Essences stimulantes.

**Indications.** — Hypopepsies, Estomacs paresseux.

**Doses.** — Une à 3 cuillers à café après les repas.

Prix pour la France : 12 francs.

### ACIMYL-POUDRE

**Composition.** — Anti-acides, Citrate trisodique, Kaolin, Pancréatine, Phosphates.

**Indications.** — Hyperchlorhydrie, Estomacs suractivés.

**Doses.** — Par cuillers à café après les repas.

**Propriétés.** — Analgésie instantanée, Rééducation rapide.

Prix pour la France : 15 francs.

Laboratoires **RENÉ MONIMART**

Docteur en pharmacie.

23, rue du Grand-Cerf — MEAUX (S.-et-M.).

## ACOBELLA

Le médicament sédatif de la Toux.

**Forme.** — Comprimés très assimilables, très actifs et ne provoquant pas de dyspepsie. Présenté en boîte de 30 comprimés.

Prix : 19 francs.

**Formule.** — Bromoforme, 0,02 ; Codéine, 0,01 ; extrait de racines d'Aconit, 0,0025 ; Extrait de Belladone, 0,0025 ; Extrait de Jusquiame, 0,0025 ; Extrait de Drosera 0,003 ; Extrait de Grindelia, 0,002 ; Extrait de lobelis, 0,01 ; Benzoate de soude, 0,10 ; Poudre de Dower, 0,06 pour 1 comprimé.

**Posologie.** — 2 à 8 comprimés par 24 heures à avaler sans croquer, avec un peu d'eau.

**Indications.** — Traitement de toutes les toux rebelles et fréquentes, des laryngites, trachéites, trachéo-bronchites aiguës, de la coqueluche et de la bacillose pulmonaire.

Laboratoire **HOCQUETTE**

191, faubourg Saint-Antoine — PARIS.

Téléphone : Diderot 04-71.

## ACODROS

**Composition.** — Préparation à base d'aconitine stabilisée, XX gouttes contiennent 1/10<sup>e</sup> de milligramme d'Alcaloïde.

**Action thérapeutique.** — Décongestif, sédatif, analgésique, diaphorétique.

**Indications.** — Grippe, coryza, inflammations et infections de l'appareil respiratoire.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : XV à XX gouttes 2 à 3 fois par jour dans un liquide quelconque.

*Enfants* (au-dessous de 5 ans) ; 2 gouttes par année d'âge.

Prix : 10 francs.

**Laboratoires BOUVELOT**

62, rue d'Antibes — CANNES (A.-M.).

---

## ACOEGENOL

**Principes actifs.** — Iodures de rubidium, de cæsium, de potassium, de sodium, iode, mimotannin (tannin extrait du mimosa) ; teintures d'aconit, de gelsemium, de cimicifuga et de ballote.

**Action.** — Action principale sur la nutrition, action secondaire sur la circulation et enfin action antispasmodique et sédative.

**Indications.** — Bourdonnements, vertiges, surdité.

**Mode d'emploi.** — Se prend avec de l'eau vineuse ou avec de la tisane.

**Posologie.** — *Dose moyenne* : 2 cuillerées à café par jour, 20 jours par mois (les 10 autres jours du mois, 2 mois sur 3, il est bon, surtout s'il y a de l'oto-sclérose, de prendre des gouttes Chauvin à l'Audisclérocure).

**Prescription.** — Il est bon de faire suivre le produit du nom patronymique et de prescrire ainsi : un Acoégénol Chauvin.

**Établissements Alfred CHAUVIN**

AUBENAS (Ardèche).

## ACOLITOL

Topique intestinal.

**Composition.** — Charbon organique pur à pouvoir d'adsorption élevé. Carbonate de calcium pur amorphe, salicylate de Bismuth, Peroxyde de magnésium, Belladone pulvérisée titrée.

**Présentation.** — Poudre et granulé.

**Propriétés.** — Topique intestinal de choix, neutralisant et sédatif. Régularise les réactions chimiques du milieu intestinal, entrave les fermentations anormales et les putréfactions, modifie la flore microbienne, adsorbe les toxines.

**Indications.** — Colites, entérocolites, typhocolites, stases colitiques, fermentations acides, dysenteries, entérite des tuberculeux.

**Doses.** — 1 cuillerée à entremets délayée dans 1/2 verre d'eau le matin à jeun et 1/2 heure avant les repas de midi et du soir.

**LANCOSME**

**71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII<sup>e</sup>).**

---

## ACTINE

(Produits irradiés)

**Forme.** — Boîte poudre.

**Indications.** — *Reconstituant physiologique général* : Rachitisme, Troubles de croissance, Déminéralisation, Dentition, Ostéomalacie, Allaitement, Anémie, Chlorose, Asthénie, Tuberculose, Convalescence, Surmenage.

**Composition.** — Vitamines A.B.C.D. Ergostérine et phytostérine irradiées, Farines diverses irradiées, Saccharomices irradiées, jus de citron stabilisé, phosphate tricalcique et bibasique de K, Chlorure de calcium.

**Mode d'emploi.** — Se prend mélangé avec n'importe quel aliment, potage, purée, sauce, lait.

**Posologie.** — 1 cuillerée à café de poudre à chacun des principaux repas, une demi-dose pour bébés.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires de L'ACTINE**

A. VELPRY

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

60, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres  
BILLANCOURT (Seine).

# ADIPOLYSINE

**POUDRE**  
**CHOLAGOGUE ET OPOTHÉRAPIQUE**  
**POLYVALENTE**  
**RÉGULATRICE DE LA NUTRITION**  
 par  
**modification physiologique de l'assimilation.**

## PRODUIT MÉDICINAL FRANÇAIS

**rendu inaltérable par un enrobage approprié**  
**complètement soluble dans l'eau et le suc gastrique .**

### COMPOSITION

#### 1° Poudres salines :

Phosphate de soude desséché .....	0 gr. 04
Sulfate de soude desséché.....	0 gr. 05
— de magnésium desséché .....	0 gr. 06
Bicarbonate de soude.....	0 gr. 05
Citrate monosodique desséché.....	0 gr. 06
Bromure de calcium.....	0 gr. 05
Hyposulfite de magnésium desséché .....	0 gr. 02

#### 2° Extraits totaux glandulaires en poudre :

Estomac .....	0 gr. 02
Duodénum .....	0 gr. 01
Intestin.....	0 gr. 02
Foie .....	0 gr. 05
Pancréas .....	0 gr. 04
Rate.....	0 gr. 03
Surrénale.....	0 gr. 002
Thyroïde.....	0 gr. 001
Hypophyse .....	0 gr. 001
Excipient.....	Q. S.

**pour une dragée de 0 gr. 504 de produits actifs.**

**N. B. — Les préparations opothérapiques employées sont faites à partir d'organes frais rigoureusement sélectionnés et contrôlés, puis desséchés dans le vide et à froid avant d'être pulvérisés. Ces préparations sont garanties pures et sans odeur. Leur conservation est indéfinie.**

**Chaque produit salin desséché, chimiquement pur, correspond approximativement à un poids double du même produit non deshydraté.**

**Le sulfate de magnésium introduit dans l'estomac avec les autres éléments constitutifs de l'« Adipolysine » donne forcément naissance à du chlorure de magnésium sous l'influence des chlorures alimentaires et des chlorures du liquide gastrique. Or, chacun sait la valeur thérapeutique du chlorure de magnésium.**

### PRÉSENTATION

#### DRAGÉES

**en flacons de 60 dragées mauves**  
**(modèle unique).**

## **EFFETS PHYSIOLOGIQUES**

Les effets physiologiques de l'« Adipolysine » dépendent essentiellement des moments où se produisent les décharges biliaires après l'absorption de quantités déterminées de ce produit médicinal cholagogue par rapport aux heures des repas. C'est que, suivant la valeur de l'intervalle de temps qui sépare le moment de l'ingestion d'un repas de l'instant où se produit le déclenchement d'une importante évacuation de bile dans l'intestin sous l'influence de l'« Adipolysine », après ou avant ce repas, il y a naturellement **augmentation ou diminution du pouvoir digestif** de l'ensemble des sucs intestinaux et, par suite, **modification physiologique de l'assimilation**, phase ultime de la **nutrition** ainsi **avantagee ou désavantagée**.

De plus, de par l'action de ses **composants opothérapiques**, l'« Adipolysine » **favorise toujours la digestion** au niveau de l'estomac, **facilite** constamment l'**élimination des fèces** et **stimule** la plupart des **glandes à sécrétion interne**, tout en assurant, dans une certaine mesure, une **médication hyposulfiteuse magnésienne** anti-choc et anticancéreuse, complétée par celle contre l'**aérophagie** et ses conséquences.

## **PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES**

Trois actions thérapeutiques essentielles :  
Cholagogue — Laxative — Digestive.

## **INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES**

Obésité sous toutes ses formes.  
Constipation opiniâtre — Digestions lentes.  
Aérophagie — Insuffisance du foie — Entérite.

## **MODE D'EMPLOI ET DOSES**

*Les dragées s'avalent et ne se croquent pas.*

**Obésité** : 2 dragées 1/2 heure avant chacun des 2 ou 3 repas.

**Constipation** : 2 à 3 dragées au lever et autant au coucher.

**Troubles digestifs** : 2 dragées après chacun des 2 ou 3 repas.

**tous les jours pendant 2 à 3 mois consécutifs.**

**Deux fois l'an : printemps et automne.**

## **PRIX DE VENTE IMPOSÉ**

**Le flacon de 60 dragées : 20 francs.**

## **LABORATOIRE DU MICELLIODE**

**Produits médicaux spécialisés.**

*Fabrication française.*

A. ROLLAND, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
31, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (IV<sup>e</sup>).

**DÉPÔT GÉNÉRAL**

**Service commercial**

**Service médical**

88, rue de la Villette — PARIS (XIX<sup>e</sup>).

Tél. : Botzaris 34-32.

**ADONAL VICARIO**

**Phényl — éthyl — malonyl — urée**

Comprimés à 10 centigrammes,

Sédatif énergique.

Médicament de choix, applicable en cas d'excitation anormale, quelle qu'en soit la cause.

*Dose*: de 1 à 5 comprimés par jour.

Le flacon de 15 comprimés : 8 francs.

**Laboratoire VICARIO**

17, boulevard Haussmann  
PARIS (IX<sup>e</sup>).

---

## **ADOVERNE « ROCHE »**

Glucosides cardiotoniques de l'*Adonis vernalis*.

**Action thérapeutique.** — Cardiotonique, diurétique, eupnéique, neuro-sédative. — Complète, remplace ou continue l'action de la digitale.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les insuffisances cardiaques et rénales. — Asthénies cardiaques, dyspnée, arythmies, œdème pulmonaire. œdèmes périphériques, hydropisies, etc.

**Avantages.** — Étalonnage physiologique. — Activité optima toujours identique. — Toute l'action utile de la plante elle-même. — Pas d'accumulation. — Pas d'accoutumance. — Pas de toxicité aux doses thérapeutiques. — Emploi facile. — Tolérance remarquable.

**Posologie.** — XXX gouttes ou 4 granules = 1 cc. d'une solution à 5 p. 1 000 des glucosides cardiotoniques de l'*Adonis vernalis*.

**Modes d'emploi.** — Par voie buccale = XV à XXX gouttes ou 2 à 4 granules, 1 à 2 fois par jour et plus dans un peu de tisane ou de liquide.

### **Adoverne « Roche »**

*Gouttes* (flacon de 15 cc.).

*Granules* (flacon de 60).

### **Produits**

**F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**  
21, place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).



## ADRAL

**Constitution.** — Poudre d'Algues sélectionnées, stabilisées, et privées de leurs sels minéraux.

**Principes actifs.** — 1° *Iode combiné organique* : modificateur le plus puissant de l'assimilation générale ;

2° *Eléments organiques de choix* : Protéines, Graisses, Hydrates de Carbone.

**Indications.** — *Suraliment spécifique* pour bacillaires, convalescents et amaigris.

**Avantages.** — *Augmentation* rapide du poids des malades.

**Formes.** — *Cachets pour adultes* : 2 à 5 par jour.

*Granulé pour enfants* : 2 cuillerées à café par jour.

**Laboratoires ROBERT et CARRIERE**  
37, rue de Bourgogne — PARIS.

## ADRÉNALINE CLIN

Principe actif vaso-constricteur des glandes surrénales.

**Formes.** — Solution d'Adrénaline Clin au 1000°, flacon de 5, 10 et 30 cm<sup>3</sup>.

2° Collyre d'Adrénaline Clin au 1/5000° et au 1/1000°, en ampoules compte-gouttes de 10 cm<sup>3</sup>. Associations : Collyres Clin, Adrénaline-Esérine, Adrénaline-Cocaïne en ampoules compte-gouttes de 10 cm<sup>3</sup>.

3° Granules d'Adrénaline Clin, dosés à 1/4 de mgr.

4° Suppositoires d'Adrénaline Clin 1/2 mgr.

5° Tubes stérilisés d'Adrénaline Clin, en boîtes de 6 tubes ; en solution titrée à 1/10 de mgr. par cm<sup>3</sup> en solution, titrée à 1/4 de mgr., en solution titrée à 1/2 mgr., en solution titrée à 1 mgr. Associations : Tubes stérilisés Clin à l'Adrénaline-Cocaïne, Adrénaline-Stovaine et Adrénaline-Syncaïne, en boîtes de 6 et 12 ampoules.

**Doses.** — Localement selon les nécessités. Voies stomacale ou rectale : V à XX gouttes par dose (solution à 1/1000°), XXX gouttes en 24 heures. Voie hypodermique 1 mgr. d'Adrénaline par jour en 2 fois.

**Laboratoires CLIN**  
PARIS.

## ADRÉNALINE INVAR

Produit soumis au contrôle physiologique le plus rigoureux, donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

**Action.** — Vaso-constricteur, hémostatique, stimulant circulatoire, coexcitant du sympathique, fixateur du calcium.

**Indications.** — Rachitisme, coqueluche, tuberculose, dyspepsies atoniques, hyposthénies, asthme, hémoptysie, etc.

**Formes.** — Ampoules de 1 cc. boîtes de 6 et 12 au 1/4 de millig. au 1/2 millig. au millig. Solution au millièrme, flacons de 5, 10 et 30 gr.

Le flacon de 10 grammes au Public : 9 fr.

**Pharmacie Centrale de France**

21, rue des Nonnains-d'Hyères  
PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## ADRÉNINE

**Action.** — L'ADRÉNINE possède une action :

- 1<sup>o</sup> Sur la pression sanguine ;
- 2<sup>o</sup> Sur le cœur ;
- 3<sup>o</sup> Sur les fibres musculaires lisses et plus électivement sur celles des petits vaisseaux ;
- 4<sup>o</sup> Sur la nutrition.

**Posologie :**

*Per os*, Cent gouttes à doses fractionnées (toutes les heures, par exemple).

Injectons sous-cutanées, 1 à 10 mmgr. par séries d'injections dans les 24 heures.

**Laboratoire du Dr MIALHE**

8, rue Favart — PARIS.

## ADRÉNOLEÏNE

### INHALANT

**Forme pharmaceutique et composition.** — Huile adrénalinée au millième, avec addition de chlorétone, orthoformé et essences antiseptiques.

**Propriétés.** — Produit employé en otho-rhino-laryngologie : vaso-constricteur, sédatif, antiseptique.

**Avantages.** — Tandis que l'adrénaline en solution aqueuse a une action *passagère*, l'adrénaline en solution *huileuse* étant absorbée plus lentement, sa *durée* d'action est considérablement *augmentée*; le pouvoir vaso-constricteur étant aussi élevé.

**Indications thérapeutiques.** — Sinusites, hémorragies nasales, catarrhe nasal. Troubles respiratoires et coryza de l'enfance, adénoïdites aiguës.

L'adrénoléïne ne présente aucune contre-indication.

**Mode d'emploi.** — En instillations (III à V gouttes dans chaque narine) 2 à 3 fois par jour, et en pulvérisations nasales avec un appareil à huile non métallique *avant* les inhalations.

**Prescription.** — Un flacon *Adrénoléïne Falvy*.

**Les Laboratoires A. FALVY**

Licencié ès sciences,

Ex-interne. Lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>)

## ADREPATINE

### POMMADE-SUPPOSITOIRES

Association pluriglandulaire.

**Composition.** — *Extraits d'Organes* : Foie, Surrénale, Thyroïde, Hypophyse, Prostate.

*Extraits Végétaux* : Marron d'Inde frais stabilisé, Cupressus, Hamamélis.

*Excipient antiseptique et Calmant.*

**Propriétés et Indications thérapeutiques.** — L'*Adrépatine* est une préparation pharmaceutique qui :

1<sup>o</sup> Par les extraits polyglandulaires englobés ;

2<sup>o</sup> Par les propriétés hypertensives de certains de ses composants ;

3<sup>o</sup> Par son action vaso-constrictive locale ;

4<sup>o</sup> Par son excipient à la fois anesthésique et antiseptique est destinée à combattre non seulement l'expression anatomique et les complications de l'affection primitive, mais encore à remédier aux troubles organiques et fonctionnels qui président à la formation des hémorroïdes. Son emploi est tout spécialement indiqué dans le traitement des *Hémorroïdes internes et externes, des Rectites et Prostatites, du Prurit anal, des Fistules.*

**Mode d'emploi.** — De 1 à 3 suppositoires (ou applications de pommade) par 24 heures. Le tube de Pommade est muni d'une canule rectale.

Boîte de 15 suppositoires..... 12 fr. 50

Tube de pommade avec canule rectale..... 12 fr. 50

**Laboratoires LALEUF**

20, rue du Laos — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## AÉROPHAGYL

Boîte de 45 comprimés : 14 fr.

**Indications.** — Spécifique de l'*Aérophagie* et de ses conséquences : insomnies, troubles cardiaques, nerveux et pulmonaires.

**Posologie.** — 1 comprimé délayé dans un demi-verre d'eau, au milieu des repas. En cas de crise 2 comprimés à la fois. Enfants, 1/2 doses.

**Composition.** — Combinaison complexe constituée par l'association, à une faible dose d'uroformine, du citrate de sodium et des ions Br. et Ca.

Echantillons gratuits :

**Laboratoires G. BEYTOUT**

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X<sup>e</sup>).

## ÆTHONE

*Antispasmodique, sédatif de la Coqueluche et de la Toux.*

**Doses.** — Pour les enfants, administrer :

5 à 6 fois par jour	{	de 1 mois à 1 an : I goutte par mois d'âge. De 1 à 2 ans : XII à XX gouttes. De 2 à 5 ans : XX à XXV gouttes. De 5 à 10 ans : XXV à XXX gouttes. De 10 à 15 ans : XXX à XXXV gouttes. et plus s'il est nécessaire.
------------------------	---	---

2<sup>o</sup> Pour les adultes, administrer : 5 à 6 fois par jour : L à LX gouttes dans une quantité suffisante d'eau sucrée ou de sirop de tolu additionné d'eau. La dose totale pour les adultes peut être portée à 400 gouttes par 24 heures, s'il est nécessaire. L'Æthone doit être administré 1/2 heure avant, ou 2 heures après le repas.

**FALCOZ et C<sup>ie</sup>**

9, rue Boissonade — PARIS.

## AGAMÉTOL

Traitement rationnel du paludisme.

Solution aqueuse à base de formiate de quinine dont la teneur en quinine (87,56 p. 100) **en fait le plus actif de tous les sels de cet alcaloïde.**

L'*Agamétol* étant une solution rigoureusement neutre et stérile, *ne précipite pas* en présence du sérum sanguin. Il est totalement indolore et ne provoque jamais ni réactions inflammatoires ni abcès.

Deux modèles :

Boîte de 12 ampoules 0,25, 2 cc.

Boîte de 12 ampoules 0,50, 2 cc.

Echantillon gratuit et notice au Corps Médical sur demande.

**Laboratoires des Établissements  
H. SALLE**

4, rue Elzévir — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## **AGARASE**

### **Composition :**

Comprimés à base d'agar-agar, de ferments lactiques et d'extraits végétaux.

### **Action :**

Réveille la tonicité de l'intestin, lubrifie la muqueuse, dissocie le bol fécal, supprime les fermentations.

### **Avantages :**

Petits comprimés très faciles à avaler ; enrobage soluble dans l'intestin évitant les réactions gastriques ; répartition de la dose active en plusieurs comprimés, ce qui évite une action brutale sur un segment isolé du tube digestif.

Pas d'accoutumance, pas de coliques.

### **Indications :**

La constipation sous toutes ses formes, colites, entérocolites, entérite muco-membraneuse, appendicite chronique.

Céphalées, obésité, artériosclérose, affections du foie.

Dermatoses.

### **Mode d'emploi :**

Trois comprimés à chacun des principaux repas à prendre avec une gorgée d'eau sans croquer.

Pour les enfants, deux comprimés à chacun des repas.

**Laboratoire G. REAUBOURG**

1, rue Raynouard — PARIS.

## AGESULF

**Composition.** — Complexe colloïdal d'acide sulfosalicylique et d'albuminate d'argent, contenant 6, 6 % Ag.

**Formes.** — Poudre, bougies urétrales et utérines, suppositoires, ovules.

**Indications.** — Toutes celles de la blennorragie et de ses complications ou suites.

**Avantages.** — Tolérance parfaite, pas d'agglomération des gonocoques et des sécrétions morbides sur les conduits des organes génitaux, non plus que sur les glandes mêmes. Ne salit pas.

Renseignements et échantillons.

**Laboratoires des D<sup>rs</sup> R. et O. WEIL**

**Établ. MERMINOD et C<sup>o</sup>, Concession.**

49, rue de Paradis — PARIS (X<sup>e</sup>).

Tél. : Provence 30-32.

---

## AGOCHOLINE

**Stimulant hépato-biliaire.**

### Forme.

Granulé soluble agréablement aromatisé.

### Composition.

Sulfate de Magnésie desséché.

Peptone sèche purifiée.

### Propriétés thérapeutiques.

Excite la sécrétion et l'excrétion biliaires.

Réalise le drainage des voies biliaires *per os*, et le rend facile en clientèle.

### Indications.

Congestion du foie et de la vésicule biliaire.

Lithiase biliaire.

Ictère et Cholémie.

Cholécystites chroniques.

Certains troubles digestifs	{	Gastropathies réflexes, Inappétence, Nausées, Constipation	} d'origine hépato-biliaire.
Certains troubles généraux	{	Céphalée, Migraines, Asthénie, Vertiges, Urticaire et Prurit, Certaines dermatoses	

### Contre-Indications. (Temporaires.)

Cholécystites aiguës.

Diarrhées aiguës.

### Posologie.

Une à trois cuillerées à café dans un demi-verre d'eau chaude le matin à jeun. Faire coucher ensuite le malade un quart d'heure sur le côté droit.

Commencer par les doses faibles surtout chez les malades présentant une grande sensibilité vésiculaire, les diarrhéiques, les lithiasiques; et augmenter graduellement jusqu'à trois cuillerées à café, suivant la tolérance du malade.

Prix : 17 fr. 50

### Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine, Docteur en Pharmacie.

Ex-interne en Pharmacie, Lauréat des Hôpitaux

Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux.

24 et 26, Rue de Fécamp — PARIS (XII°)

Tél. : Diderot 28-96.



## AGOMENSINE CIBA

Substance protéidique extraite de l'ovaire, soluble dans l'eau.

**Action physiologique.** — Favorise le flux menstruel, accélère le développement des organes et l'apparition des caractères sexuels secondaires.

**Indications :**

- I. — Aménorrhée, flux menstruel trop peu abondant, règles trop espacées. Malaises qui précèdent ou qui accompagnent la menstruation.
- II. — Troubles de la ménopause, naturelle ou chirurgicale.
- III. — Douleurs viscérales et malaises généraux liés à un flux peu abondant.

*Comprimés. — Ampoules.*

**Doses.** — 3 à 9 comprimés par 24 heures, 1 ampoule par jour ou tous les 2 jours.

Le flacon de 20 comprimés : 13 francs.

— de 40 — : 22 francs.

— de 100 — : 50 francs.

La boîte de 4 ampoules : 20 francs.

*(Voir Sistomensine.)*

**Laboratoire CIBA, O. ROLLAND**

109-113, boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## AIROGLYCE

**Composition.** — Préparation bismuthée (oxyiodogallate de bismuth spécialement porphyrisée).

**Mode d'action.** — Réalise le pansement et l'antisepsie de la muqueuse urétrale.

**Indications.** — Blennorrhagie aiguë (période du déclin). Blennorrhagie chronique, en association avec dilatation, massages, etc.

**Mode d'emploi.** — Après avoir uriné, agiter le flacon et injecter, à l'aide d'une seringue urétrale, 5 cc. de liquide, conserver l'injection 2 minutes, puis progressivement jusqu'à 5 minutes. Eviter d'uriner autant que possible après l'injection.

**Ovules:** Agent thérapeutique de choix dans le traitement des métrites, vaginites, ulcérations du col, etc.

**Suppositaires :** Prostatites. Hémorroïdes.

**Laboratoires PIALOUX**

55, rue de Chabrol — PARIS (X°).

## AIROL « ROCHE »

Combinaison basique de bismuth oxyiodé donnant, au contact des plaies, de l'iode à l'état naissant.

**AIROL « Roche »**, en poudre,

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique puissant, désinfectant, cicatrisant, kératoplastique, sans odeur, inaltérable à la lumière ; toxicité moindre que celle de l'iodoforme (dont l'*Airol « Roche »* est le seul succédané pratique).

**Indications thérapeutiques.** — Toutes celles de l'iodoforme. Bien spécifier la marque « Roche ».

### Produits

**F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**

21, place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## ALBUPLAST VIGIER

### Composition :

Sparadrap adhésif caoutchouté à l'oxyde de zinc.

### Avantages :

Suppression des bandes de pansement. — Préparé avec des substances adhésives de première qualité. — Ne se décolle jamais. — Supporté par des épidermes des plus délicats. — Se conserve très longtemps.

### Indications :

Contention des pansements. — Traitement des dermatoses (urticaire, érythème polymorphe, ichtyose, furonculose).

**Laboratoires VIGIER et Cie**

9, rue de la Gare — LEVALLOIS-PERRET.

## ALCACYL

**Composition.** — Acétylsalicylate de chaux 0,5, alucel 0,4 pour un comprimé.

Sans action sur l'estomac, le cœur et les reins.

**Forme.** — Comprimés.

**Indications.** — Analgésique, antithermique, anti-infectieux, sudorifique.

Est utilisé dans : rhumatismes, névralgies, migraines, sciatiques, lumbagos, courbatures, gripes, maux de tête, de gorge et de dents.

**Doses.** — *Adultes* : 1 à 2 comprimés désagregés dans un peu d'eau sucrée, avaler ensuite un demi-verre d'eau pour activer l'effet.

A répéter si nécessaire 3 à 4 fois dans les 24 heures.

*Enfants* : 1/4 ou 1/2 comprimé, suivant l'âge, 3 à 4 fois par jour.

*Le tube* : 7 fr. 50.

**Laboratoires WANDER**  
CHAMPIGNY-SUR-MARNE.

## ALCALINOSE

Deux présentations :

1° Alcalinose granulée. 2° Alcalinose en poudre.

**Composition.** — Citrate, Phosphate, Sulfate de sodium desséchés et chimiquement purs. — Bicarbonate de sodium saturé.

**Action.** — L'Alcalinose fait diminuer le taux de l'acidité gastrique sans le faire disparaître ; régularise les sécrétions digestives ; excite la motricité de l'estomac et diminue la durée du transit gastrique.

**Mode d'emploi.** — Alcalinose granulée : 1 à 3 cuillerées à café avant les repas dans un demi-verre d'eau.

Alcalinose en poudre : 1 à 3 cuillerées mesure avant les repas.

**Indications.** — Dyspepsies hypersthéniques et maladies de Reichmann, Ulcères digestifs, Sténoses pyloriques, Suites de gastro-entérostomie et de pyloréctomie, Aérophagie et dilatation gastrique, Gastropathies nerveuses, Entérites et colites chroniques, Acidose.

**Laboratoires CORBIERE**  
27, rue Desrenaudes — PARIS.

## ALCAMFÉTOL

### Composition :

Iodométhylate d'hexaméthylènetétramine (Iode réel 45 %).	0 gr. 10
Camphosulfonate de sodium (camphre soluble).	0 gr. 05
Glycéryl Gaïacol.	0 gr. 01
Eau bi-distillée q. s. pour.	2 cc.

**Avantages thérapeutiques.** — 4 médications essentielles : de l'Iode, de l'Urotropine, du Camphre et du Gaïacol.

En une seule formule : *Solution aqueuse, stérilisée, à Ph constant.*

**Indications.** — Toutes infections chroniques ou aiguës (septicémies) Défaillance circulatoire. Troubles respiratoires. Maladies de la nutrition.

**Forme.** — Boîte de 10 ampoules de 2 cc. 25 francs au public.

**Posologie.** — Injections hypodermiques ou intramusculaires indolores. La voie intraveineuse n'est indiquée que pour les cas urgents. Elle n'apparaît pas nécessaire pour les traitements courants.

**Adultes :** 1 à 3 ampoules de 2 cc. par jour.

**Enfants :** 1/2 à 1 ampoule de 2 cc. par jour.

L'Alcamfétol étant d'une innocuité absolue, ces doses peuvent être augmentées, dans les cas particulièrement graves, *mais sous la surveillance du médecin.*

Laboratoires DOR

DORANTOWICZ, Pharmacien.

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI<sup>e</sup>).

## ALEPSAL GENEVRIER

Calmant non déprimant.

Spécifique de l'Epilepsie, des Insomnies, des Convulsions. On l'emploie également avec succès comme Hypnotique et Antispasmodique dans : Angines de Poitrine, Asthme, Spasmes du Larynx, cardiaques, vasculaires, etc.

Chaque comprimé renferme 0,10 de Phényléthyl-malonylurée très pure associée à la Belladone stabilisée et à la Triméthylxanthine.

**Posologie.** — 2 comprimés par jour, matin et soir, absorbés purs ou dans une boisson chaude. AUCUN RÉGIME SPECIAL.

« Avec l'ALEPSAL, les convulsions disparaissent sans observer de troubles psychiques ; l'intelligence de l'EPILEPTIQUE s'éveille et son activité s'accroît normalement. » (Dr Ducoste, médecin chef des Asiles de la Seine.)

**Contre-indications.** — Néant.

Prix : Le tube : 9 francs.

Laboratoire GENEVRIER

45, rue du Marché — NEUILLY-PARIS.

## ALEXIME

**Anclonnement « ALEXINE »**

**Composition.** — Préparé par le procédé de Joulie est de l'acide phosphorique solidifié, assimilable, hyperactif.

Les résultats de L'ALEXIME sont remarquables et constants dans tous les états de déchéance organique.

**Indications.** — Anémies, Phosphaturie, Déminéralisation, Prétuberculose, Neurasthénie, Fatigue, Faiblesse, Impuissance.

**Posologie.** — 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 14 francs.

**Échantillons et littérature au**

**Laboratoire A. LEBLOND**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
Ex-interne des hôpitaux de Paris,  
51, rue Gay-Lussac — PARIS (V<sup>e</sup>).  
R. C. Seine 56 049.

---

## ALGATAN

**Composition.** — Hyposulfi-iodotannate de soude en milieu sulfocalcique fluoré. (Iode entièrement assimilable sans iodisme.)

**Formes.** — Cachets dosés à 1 gramme.  
Comprimés dosés à 0 gr. 50.

**Indications thérapeutiques.** — *Tuberculose pulmonaire, intestinale et osseuse, Artério-sclérose, Emphysème, Asthme, Catarrhe bronchique, Affections cardio-vasculaires, Rachitisme, Tertiarisme, Déchéance physique.*

**Dose et mode d'emploi :**

*Enfants* de 3 à 5 ans : 1/2 cachet ou 1 comprimé.  
*Enfants* de 5 à 10 ans : 1 cachet ou 2 comprimés.  
*Enfants* de 10 à 15 ans : 2 cachets ou 4 comprimés.  
*Adultes* : 2 à 6 cachets ou 4 à 12 comprimés.  
Par jour au moment des principaux repas.

**Laboratoires de L'ANIODOL**

3 à 9, rue des Alouettes — NANTERRE (SEINE).

## ALGOOCRATINE

(Citrato de phénylamidoxanthine.)

**Présentation.** — Cachets de 0 gr. 75 (assimilation plus rapide que la forme comprimés).

**Indications thérapeutiques.** — Migraines, névralgies, sciaticques, grippe, algies cancéreuses. En général, toute douleur d'origine nerveuse. Recommandée particulièrement dans les *règles douloureuses*.

Aucune action hypnotique. Pas d'accoutumance. Elimination extrêmement rapide sans fatigue des reins. Tolérée parfaitement par l'estomac.

**Posologie.** — Un cachet dès les premiers symptômes de douleurs, un second une heure après si nécessaire.

Trois cachets par 24 heures.

Littérature et échantillons :

**LANCOSME**

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## ALGOPHAGINE

Capsules glutinisées contenant 1/10 de milligramme de colchicine dissous dans l'essence de Gaulthéria pure, iodure de lithium et formine.

**Indications :**

Médication intensive pour le traitement raisonné des Affections rhumatismales de toute nature. Névralgie faciale.

**Posologie :**

Trois capsules, le matin avant le premier déjeuner et deux le soir avant le dîner, accompagnées d'un verre d'eau bicarbonatée (Vals, Vichy) ou hypominéralisée (Vittel, Evian).

**Laboratoires UNIS-SPES**

14, rue Demarquay — PARIS.

## ALIBOURINE

### Formes :

1° Pommade en tube de 50 grammes environ.

### Composition :

Sulfates de zinc et de cuivre chimiquement purs,  
Camphre, Oxyde de zinc, Essence de Niaouli,  
Extrait d'Hamamélis et de Millepertuis, Lano-  
vaseline.

### Indications :

Eczémas suintants, Impétigo, Teigne, Plaies,  
Ulcères variqueux, Erysipèle.

2° Solution concentrée : Flacon de 60 cc.

### Composition :

A base de sulfates de cuivre et de zinc purs, donne,  
diluée dans un litre d'eau, une solution se rap-  
prochant d'une Eau d'Alibour un tiers et chi-  
miquement pure. Ces deux préparations n'irri-  
tent jamais.

### Laboratoires B. E. A

Ch. BEHA, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe. — Belfort.

## ALIMENT TINARDON

Nutrition. — Recalcification. — Reminéralisation.

**Forme.** — Poudre dosée pour la préparation, soit au  
lait, soit à l'eau, d'un entremets agréable.

### Composition :

Carbonate de chaux...	0,30	Lactose .....	2,50
Phosphate de chaux...	0,20	Caséine purifiée...	0,50
Glycéroph. de chaux ..	0,05	Arrow-Root.....	4 "
Magnésie calcinée ....	0,05	Sucre .....	12 "
Eléments céréalo-légu- mineux.....	5 "	Cacao vanillé ....	8,50

Pour 2 mesures.

**Posologie.** — *Enfants* : 1 à 2 mesures par jour.

*Adultes* : 2, 3 ou 4 mesures par jour.

**Indications.** — Dégénérescence infantile, Scrofule, Con-  
valescence chez l'enfant et l'adulte.

Prix : 15 francs.

### Laboratoire OBERLIN

**J. Tinardon**, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
de l'Ecole Supérieure de Paris.

17, rue Cadet — PARIS.

## ALLISATINE « SANDOZ »

**Composition.** — Tous les principes actifs de l'*Allium Sativum* fixés sur du charbon activé et présentés en dragées, inodores, insipides.

**Propriétés.** — Stimulant des fonctions gastriques, puissant anti-diarrhéique. Hypotenseur. Tolérance parfaite.

**Posologie.** — 2 à 4 dragées d'Allisatine, trois fois par jour à la fin des repas.

### Produits SANDOZ

3 et 5, rue de Metz — PARIS (X<sup>e</sup>).

*Dépôt général et vente :*

Usine des Pharmaciens de France,  
129, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## ALLIUM COIRRE

(Marque Stasima).

**Composition.** — Préparation stabilisée, contenant tous les principes de l'ail cru.

Deux formes : alcoolature et pilules.

**Action.** — Outre son action antiseptique sur les voies respiratoires, l'ail stabilisé possède des propriétés hypotensives. Il diminue la tension maxima et la minima, augmente l'indice oscillométrique, ralentit le pouls.

**Indications.** — Antiseptique pulmonaire (bronchites fétides, gangrène pulmonaire), Hypertension essentielle, Hypertension paroxysmique, Hypertension des cardiaques et rénaux.

### Posologie et mode d'emploi.

#### *Alcoolature*

Voies respiratoires : XXX à L gouttes par jour en deux fois  
Hypertension : XX à XXX gouttes par jour en deux fois.

#### *Pilules*

Voies respiratoires : 4 à 6 pilules par jour en deux fois.  
Hypertension : 2 à 4 pilules par jour en deux fois.  
Dans l'hypertension, 2 jours de traitement, 2 jours de repos et ainsi de suite pendant 15 jours.

**Laboratoire du Docteur COIRRE**

5, boulevard du Montparnasse — PARIS.



# ALLOCAINE LUMIÈRE

Anesthésie locale, régionale et rachidienne.

**Constitution.** — (Chlorhydrate de paramino, benzoyl, diéthyl, amino, éthanol).

Les solutions allocaïne-adrénaline sont d'une conservation parfaite et rigoureusement inaltérable. Elles présentent des garanties exceptionnelles d'efficacité et d'asepsie.

**Propriétés.** — Pouvoir anesthésique équivalent à celui de la cocaïne. Toxicité 7 fois moindre. Durée de l'anesthésie nettement supérieure. Nullement irritante pour les tissus, son administration laisse intacts les centres bulbaires. Aucune modification de la nutrition générale et des tissus.

L'anesthésie rachidienne obtenue est caractérisée par l'intégrité qu'elle laisse aux centres nerveux supérieurs (excitabilité réflexe cérébrale, fonctions intellectuelles).

**Indications.** — Les mêmes que pour la cocaïne. L'Allocaïne Lumière est mise dans le commerce sous la forme d'ampoules prêtes à l'emploi, aux titrages suivantes :

Solution A à 1/2 p. 100, pour anesthésie locale 1 a. 25 cc.  
 Solution AA à 1 p. 100, pour anesthésie locale 3 a. 10 cc.  
 Solution B à 2 p. 100, pour anesthésie régionale 6 a. 2 cc.  
 Solution BB ; 2 p. 100, pour art dentaire 100 a. à 1 cc.  
 Solution C. à 5 p. 100, pour rachianesthésie 6 a. à 3 cc.  
 Solution J. à 10 p. 100, pour badigeonnage usage externe et divers 5 a. à 2 cc.

**LABORATOIRES LUMIÈRE**

23, Cours de la Liberté — LYON.

# ALLOCHRYSSINE LUMIÈRE

Chrysothérapie par voie-intramusculaire.

Traitement de choix des Tuberculoses et des Rhumatismes chroniques infectieux.

**Constitution.** — Thiopropanol sulfonate double d'or et de sodium.

**Propriétés.** — Injectée sous la peau ou dans les muscles, s'absorbe facilement ; sa toxicité est très faible.

Cette préparation donne la possibilité d'appliquer la méthode chrysothérapique sans avoir recours à la voie intraveineuse, d'une utilisation toujours délicate et souvent dangereuse, ni sans avoir à redouter les graves accidents si fréquents avec les sels d'or même administrés à doses modérées.

**Indications.** — Sa parfaite innocuité facilite un emploi large de la chrysothérapie, et la facilité remarquable avec laquelle elle est absorbée permet d'étendre cette méthode, sans arrière-pensée, aux cas bénins où il est normal de ne vouloir faire courir aucun risque au malade. Une indication toute particulière : le rhumatisme chronique infectieux où les résultats dépassent toutes les espérances. Pas de contre-indications formelles, cependant agir avec prudence dans les insuffisances hépatiques profondes, les lésions rénales (albuminurie), les lésions intestinales.

Dans les cas très rares de troubles anaphylactoïdes, la substitution au solvant spécial d'une ampoule EMGE LUMIÈRE en évite le retour.

**Présentation.** — Boîte contenant deux ampoules pour une préparation extemporanée de la solution : une de 2 cc. d'Allochryssine ; une de 8 cc. de sérum artificiel.

3 dosages : 0 gr. 05, 0 gr. 10, 0 gr. 20.

**LABORATOIRES LUMIÈRE**

23, Cours de la Liberté — LYON.

# ALLONAL « ROCHE »

## ANALGÉSIQUE RENFORCÉ

**Action thérapeutique.** — L'Allonal Roche est l'isopropylallylbarbiturate de diméthylamino-antipyrine, il représente les propriétés calmantes bien connues de la diméthylamino-antipyrine augmentées des propriétés sédatives et hypnogènes de l'acide isopropylallylbarbiturique ( $C^{10} H^{14} O^3 Az^2$ ).

**Indications thérapeutiques.** — Douleurs, abcès, névralgies empêchant le sommeil; insomnies légères ou tenaces associées à des phénomènes douloureux ou infectieux ou causées par le surmenage, la fatigue, la neurasthénie; agitation, excitation, délires, etc.

**Avantages.** — L'Allonal Roche ne contient ni opium, ni morphine, ni scopolamine, ni hyoscine, ni aucune substance du tableau B. Il peut être utilisé avec succès dans un grand nombre de cas où l'opium et la morphine sont indiqués. Il n'est pas toxique aux doses thérapeutiques qui peuvent être d'ailleurs largement dépassées; il ne donne pas lieu à des phénomènes d'accoutumance et il est toujours bien supporté; il calme la douleur, apaise l'excitation, donne un sommeil calme, physiologique, suivi d'un réveil normal; il n'a aucune action nocive ni sur le cœur, ni sur les reins, ni sur les poumons.

### Comprimés.

Chaque flacon contient 12 comprimés. Chaque compr. = 0,16 isopropylallylbarbiturate de diméthylamino-antipyrine.

**Doses et mode d'emploi.** — 1 à 3 compr. p. 24 h. et plus selon les cas. Avaler les comprimés sans les croquer, av. un peu d'eau ou de tisane, 1/2 h. av. ou 2 h. après les prises d'aliments.

### Produits

**F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**

21, place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

## ALLOPHAQUINA

(le cachet analgésique rationnel).

Allophanate de benzyle.....	10 egr.
Pyramidon .....	30 —
Poudre de quinquina.....	10 —

**Mécanisme d'action.** — L'Allophanate de benzyle donne par hydrolyse, *in vivo*, de l'alcool benzylique antispasmodique agissant comme un véritable mordanceur du pyramidon, et de l'urée diurétique entretenant la perméabilité rénale.

**Toutes les Algies.** — Articulaires, musculaires, nerveuses : 1 à 3 cachets par jour,

**Laboratoire du Jécol**

3, rue Watteau — COURBEVOIE (Seine).

---

## ALOÏNE HOUDÉ

Granulés titrés à 4 centigrammes.

### Aloïne Houdé

Principe actif cristallisé de l'aloès des Barbades.

### Doses et mode d'emploi :

Comme laxatif :

1 à 2 granules le soir en mangeant.

Comme purgatif :

3 à 4 granules le soir en se couchant.

**Laboratoires HOUDÉ**

9, rue Dieu — PARIS.

## ALOPLASTINE

### PÂTE À L'EAU ASEPTIQUE

**Indications.** — Toutes les dermatoses aiguës et subaiguës et toutes les maladies des peaux fragiles. **Ne présente pas les inconvénients des pommades à base de corps gras**, évite les méfaits de ceux-ci dans les eczémas aigus et les dermites artificielles. Spécialement indiquée dans les érythèmes des nouveau-nés et les eczémas des nourrissons.

**Mode d'emploi.** — S'applique avec le doigt ou une spatule. À recouvrir de gaze ou à saupoudrer de talc stérilisé ou mieux, de poudre d'Aloplastine. S'enlève avec de l'eau bouillie ou de l'huile d'amandes douces.

**Présentation.** — Tube de 100 grammes environ.

**Laboratoires Biologiques de l'Île-de-France**  
3, rue Laugier — ARGENTEUIL (Seine-et-Oise).

---

## ALOYSINE

Pilules à base de suc d'ail.

Sans saveur, sans odeur, ne communiquant à l'haleine aucune odeur alliagée.

**Indications.** — Entérites, Hypertension artérielle, Tuberculose, Bronchites chroniques, Catarrhes, Gangrène pulmonaire, Urticaire.

**Posologie.** — 6 à 8 pilules par jour (dans le traitement de l'hypertension interrompre 48 heures tous les 2 jours).

**Pommade Aloysine.** — Tuberculoses externes, Plaies suppurées, Dermatoses, etc.

**Prix de vente** { pilules : 10 fr. la boîte ;  
                          { pommade : 7 fr. le tube.

**Laboratoire GOUZÈNE,**  
139, rue de Paris à PANTIN (Seine).

## ALSODINE

Poudre composée de sels alcalins et de lactose.

En faisant dissoudre 1 cuillerée à café de cette poudre dans une tasse à thé d'infusion tiède non sucrée, ce qui représente 125 centimètres cubes de liquide, on obtient une solution de degré cryoscopique  $\Delta = 0,38$ .

Prescrire cette dose après le repas de midi et du soir, ou au moment des crises douloureuses, chaque fois que les troubles observés pourront être rapportés à une évacuation incomplète ou retardée de l'estomac.

Dyspepsie, hyperchlorhydrie, affections du pylore, atonie, aéroplagie, vomissements de la grossesse.

Dépôt O. C. P.

71, rue du Temple — PARIS.

**Laboratoire B. C. L.**

M. BERGER

29, faubourg Bourgogne — ORLÉANS.

---

## ALTHINE (Comprimés)

Nouvelle et unique préparation à base de racine de guimauve (Althea) et d'essences antiseptiques calmantes et non irritantes.

Action émolliente et antiseptique.

**Indications.** — Gargarismes et bains de bouche émollients et antiseptiques.

**Forme.** — Comprimés immédiatement solubles dans l'eau chaude.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 comprimés dans un verre d'eau chaude.

Echantillons et littérature :

**Laboratoires FORTEAL**

**J. CHAKI**, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
3, rue Barbette — PARIS (III<sup>e</sup>).

## ALUCOL WANDER

(Hydrate d'alumine colloïdal)

Réducteur d'HCl.

*Nouvelle thérapeutique gastro-intestinale* parce que : l'Alucol *n'est pas* une formule complexe mais un corps chimiquement défini obtenu selon un procédé spécial : (synthèse colloïdale par désagrégation des cristaux).

1° Protection de la muqueuse stomacale par le mucilage colloïdal que forme l'ALUCOL, au contact du suc gastrique hyperacide.

2° Fixation par cette masse mucilagineuse des principes fermentescibles et entéro-toxines.

**Formes.** — Cachets, comprimés et paquets.

Les paquets (dose spéciale 3 gr., pour pansement gastrique et traitement des états aigus).

**Doses.** — Un à deux cachets ou comprimés une heure avant et une ou deux heures après chacun des principaux repas. Le contenu d'un paquet délayé dans un peu d'eau sucrée, le matin à jeun, une demi-heure avant le petit déjeuner et environ deux heures après le repas. midi et soir.

Le traitement peut être renforcé sans inconvénient suivant l'avis du médecin.

La boîte cachets : 8 fr.

La boîte comprimés : 12 fr.

La boîte paquets : 15 fr.

Etablissements WANDER

151 bis, route de Joinville — CHAMPIGNY (Seine).

## ALUNOZAL

Salicylate aluminique basique.

Associe aux effets antiseptiques de l'acide salicylique l'action astringente et absorbante de l'alumine sous état gélatineux. Tolérance parfaite.

*Indications :*

**Diarrhées aiguës et chroniques de toute nature, Diarrhée des nourrissons :**

*Posologie et mode d'emploi :*

Prescrire par 24 heures, chez l'adulte :  
2 à 10 comprimés à 50 centigr. ou 2 à 10 cuillerées à café de granulé à 25 p. 100.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## AMBORHINOL

Double ampoule (compte-gouttes) nasale à l'Ephédrine et à l'argent colloïdal chimique en solutions séparées. Médication plus spécialement réservée aux enfants.

**Décongestif** et calmant, sans contre-coup dilatateur, par la sol. d'Ephédrine végétale à 1 p. 100.

**Bactéricide** puissant par la sol. d'argent colloïdal albuminée à 1 p. 100.

Les deux médicaments faciles à employer par instillations nasales successives.

**Indications.** — Inflammations et infections nasopharyngiennes, adénoïdites, otites, grippe, rhino-bronchites, asthme infantile et de l'adulte, coryza spasmodique.

**Mode d'emploi.** — Instiller 2 à 3 fois par jour dans chaque narine IV à V gouttes de la solution I (Ephédrine), et quelques minutes après IV à V gouttes de la solution 2 (ag. colloïdal).

**Laboratoires A. REGAGNON et C<sup>o</sup>**

276, rue Lecourbe — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Tél. Vaugirard 26-30.

## AMIBIASINE

(Extrait de garcinia composé.) (*Accepté par le Service de Santé.*)

Non toxique — Sans contre-indications.

Solution brune stabilisée, de saveur amère.

**Action.** — Antiparasitaire et bactéricide puissant. Agit sur l'amibe et ses kystes. Calmant des douleurs abdominales, du ténésme. Antihémorragique et antidiarrhéique énergique sans action constipante.

**Indications.** — Diarrhées de toutes natures et origines. — Dysentérie amibienne, bacillaire. Cholagogue. Entérites chroniques, muco-membraneuse, tuberculeuse — Diarrhée infantile, cholériforme. (*Voir Bioentérase*). Pyélite. Colibacillurie.

**Doses.** — Formes aiguës : 6 à 12 cuillers à café par jour.

Formes chroniques : 3 à 6 cuillers à café par jour.

Administrar le médicament jusqu'à sédation des symptômes intestinaux.

Cure d'entretien : 2 cuillerées à café par jour, 8 jours par mois, pendant 1 à 3 mois.

Régime : Régime habituel des entéritiques en notant de s'abstenir totalement du lait, des œufs, du bouillon de légumes. Comme boisson : Thé léger sucré ou eau.

Diarrhée infantile. Formuler : Amibiasine B. B. 1 à 3 cuillers à café par jour.

Remplacer le lait par l'eau bouillie ou eau de riz sucrée.

Prix : 16 francs.

Littérature et échantillons:

**Laboratoires AMIBIASINE** — 58, rue de Miromesnil — PARIS.

## AMIDAL

Amidon paraffiné. — Ferments lactiques.

**Forme.** — Poudre, comprimés, cachets, dragées.

**Indications.** — Fermentations intestinales, constipation, entérite muco-membraneuse, selles fétides, diarrhées, dysenterie, entérites symptomatiques des maladies aiguës, choléra infantile, entérite tuberculeuse, putréfactions intestinales, source d'artériosclérose, appendicite chronique.

**Mode d'emploi.** — Deux à 3 cuillerées à soupe ou 6 à 8 comprimés, cachets ou dragées par jour.

Prix au public :

La boîte de Poudre, Comprimés, Cachets : 16 francs.

Le flacon de Dragées : 15 francs.

Le tube de Comprimés : 8 francs.

**Laboratoire AMIDO**

A. BEAUGONIN, pharmacien,

4, place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## AMINO-SEL BYLA

(En flacons-salières.)

**Composition.** — Renferme des corps chimiquement définis, *extraits des féculents et des fruits* : glutamates et tartrates alcalins.

**Propriétés.** — *Condiment haulement sapide*, absolument inoffensif, de conservation indéfinie. Communique aux aliments *la véritable saveur* du SEL, en même temps que l'arome de la viande.

**Indications.** — Tous régimes achlorurés et déchlorurés, albuminurie, affections circulatoires, hépatiques, néphrites aiguës, scarlatine, etc.

**Mode d'emploi.** — Saupoudrer les aliments avant de les consommer, au goût de chaque malade (ne jamais faire cuire avec les aliments).

**Les Établissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire, PARIS.



## AMIPHÈNE CARRON

Le plus puissant antiseptique intestinal.

**Nouvel Antidiarrhéique iodé.**

Présenté en cachets de 25 centigrammes de : Dioxyphène iodo-sulfonate de potasse  $C_6H_4O_5SKI + 3 aq.$

Création du Laboratoire Carron, l'*Amiphène* contient 31 p. 100 de son poids en iode dissimulé et possède les qualités suivantes :

- 1° *Ne fatigue pas l'estomac*, parce que inattaquable par le suc gastrique.
- 2° *Toxicité nulle. Pas d'iodisme.* Chez l'animal, le chat supporte par kilo et sans aucun trouble *per os* 5 grammes d'Amiphène ; en injection sous-cutanée : 2 gr. 50. Tolérance absolue chez l'homme avec de hautes doses et un traitement prolongé (observations multiples).
- 3° *Antisepsie intestinale parfaite.* Combat les fermentations et les putréfactions intestinales (nombreuses analyses coprologiques).
- 4° *Rapidité de l'action curative.* Remarquable.

**Indications.** — Toutes les diarrhées quelle qu'en soit l'étiologie, aiguës ou chroniques, Diarrhées banales, Fermentations ou putréfactions intestinales, Entérocolites muco-membraneuses, Diarrhées tuberculeuses, Diarrhées colibacillaires, Diarrhées des pays chauds, suites de Dysenterie.

**Mode d'emploi et posologie.** — 2 à 4 cachets par jour à prendre au début de chaque repas.

Boîte de 12 cachets : 20 francs.

2. R. Académie de médecine, 19 novembre 1929 ;  
Société de gastro-entérologie, décembre 1929 ;  
Société de pathologie exotique, décembre 1929 ;  
Société de pathologie exotique, janvier 1931.)

Echantillons et littérature sur demande aux

**Laboratoires CARRON**

69, rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine).

## AMPHO-TABLETTES RONCHÈSE

Comprimés à base d'Ampho-vaccin rhino-pharyngien.

**Composition.** — Chaque comprimé de 0 gr. 30 contient le résidu sec de son poids de bouillon-vaccin à base de : *pneumocoques*, *pneumobacilles de Friedlander*, *streptocoques*, *micrococcus catarrhalis*, *coccobacilles de Pfeiffer*, *entérocoques*, *staphylocoques* et 40 millions de chacun de ces germes stérilisés et stabilisés par le brome qui est ensuite neutralisé.

**Indications.** — Véritable gargarisme sec aux antiviruses, immunisant et curatif.

*Traitement des angines, irritations de la gorge, toutes les infections buccales : gingivo-stomatites, pyorrhée alvéolaire, accidents de dents de sagesse, etc...*

Leur rôle prophylactique en période de grippe est des plus importants.

**Doses. Mode d'emploi.** — La dose moyenne est de 10 à 15 comprimés par jour, à sucer lentement.

Pour les enfants en bas âge, broyer le comprimé dans une cuiller à café et faire sucer la poudre obtenue d'un goût agréable.

Le flacon de 70 comprimés : 14 francs.

Laboratoires des Ampho-Vaccins

A.-D. RONCHÈSE, Docteur en Pharmacie

6, rue Rothschild — NICE.

## AMPHOTONYL

Sédatif spécifique du système vago-sympathique.

### Composition :

Phényl-éthyl-malonyl-urée.....	0 gr. 02
Extrait stabilisé <i>Atropa-Belladonna</i> .....	0 gr. 002
Phénacétine.....	0 gr. 10
Extrait stabilisé <i>Crataegus Oxyacantha</i> .....	0 gr. 05

Pour un comprimé.

**Forme pharmaceutique.** — Comprimés dragéifiés.

**Indications thérapeutiques.** — Analgésique, Sédatif général. *S'emploie dans tous les états anxieux, névrosiques.* Spasmes douloureux. Palpitations, insomnies, dyspepsies nerveuses, douleurs de l'abdomen, troubles de la ménopause, névralgies, etc...

**Doses.** — 2 à 6 comprimés ou plus par jour, entre les repas.

**Prix.** — Le tube de 40 comprimés : 16 francs.

Laboratoires de l'AMPHOTONYL

20, rue du Bourg — LAON (Aisne).

Dépôt Général pour toute la France et Colonies:

Office Commercial Pharmaceutique

71, rue du Temple — PARIS.

## AMPHO-VACCINS RONCHÈSE

Lysat bactérien, ou filtrat de cultures, et bactéries entières.

**Vaccins injectables** : anti-infectieux, anti-staphylococcique, intestinal, pulmonaire, urinaire.

**Vaccins à ingérer** : anti-infectieux, anti-staphylococcique, antityphoïdique T. A. B. (curatif), intestinal, pulmonaire, urinaire.

**Vaccins pansements** : antipyogène, rhino-pharyngien. *Pyo-amphogel* (gelée molle à base d'Ampho-Vaccin pansement antipyogène). *Ampho-Tablettes* (comprimés à base d'ampho-vaccin rhino-pharyngien).

**Composition, avantages, indications, posologie** :

Voir page 38, **Ampho-Tablettes**.  
page 1109, **Vaccins Ronchèse**.  
page 840, **Pyo-Amphogel**.

## AMPOLASES

**Composition.** — Extraits totaux ovariens et orchitiques préparés à froid et maintenus en suspension isotonique avec toutes leurs propriétés physiologiques. Ampolases O et Ampolases G.

**Indications.** — Troubles des fonctions génitales. Dépression.

**Doses.** — Absorption par voie buccale d'une ou deux ampoules par jour, contenant 0,20 de produit actif.

**Durée du traitement** : 12 jours au moins par mois.

La boîte de 6 ampoules : 18 francs.

## OPOLASES

**Composition.** — Dragées contenant à l'abri de l'air les différents produits opothérapiques prélevés aseptiquement dès l'abat et desséchés par froid et l'air sec.

**Avantages.** — Ces produits sont dosés de telle sorte qu'ils permettent aisément les combinaisons individuelles les plus variées.

**Principaux produits.** — *Opolases* : Ovaires « O », Ovaires et Thyroïdine « O. T. », Thyroïde « T. », Surrénale totale « S. », Ovaires-Surrénales-Hypophyse-Thyroïdine « P. », Testicules Surrénales-Hypophyse-Cérébrine « P. M. », Mammaire « M. », Hypophyse « H. ».

La boîte : 18 et 16 francs.

Laboratoire E. VERGELOT

163, rue de Flandre — PARIS (XIX<sup>e</sup>).

## AMPOULES BOISSY

pour INHALATIONS

Ampoules Boissy de nitrite d'amyle.

**Indications.** — *Angines de poitrine, Hémoptysies, Syncopes, Crises gastriques du Tabes, Mal de mer, Migraines, etc.*

Ampoules Boissy d'iodure d'éthyle.

**Indications.** — *Asthme, Emphysème, Coqueluche, Dyspnées de toute nature.*

**Mode d'emploi.** — Chaque ampoule est renfermée dans un étui en papier absorbant, qu'il ne faut pas retirer. Briser les deux pointes de l'ampoule en pliant l'étui vers les deux bouts, et respirer le liquide qui s'évapore, en plaçant l'étui dans le creux de la main.

Prix : 15 fr. la boîte de 12 ampoules.

**Laboratoire BOISSY**

49, rue Hoche, COURBEVOIE, près Paris

## AMPOULES DE DIGALÈNE « ROCHE »

(Digitale injectable.)

Tous les principes actifs de la macération de feuilles fraîches de digitale solubilisés et injectables.

**Dose moyenne.** — 1 à 4 ampoules et plus par 24 heures.

**Propriétés thérapeutiques.** — Solubilité parfaite, dosage rigoureux. — Action très rapide, tolérance absolue, effets constants aux mêmes doses, pas d'accumulation (Voir *Digalène « Roche »*).

**Injectations.** — Hypodermiques, *intraveineuses*, intra-musculaires (indolores).

**Produits**

**F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**  
21, place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

## AMPOULES DE PANTOPON « ROCHE »

(Opium total injectable.)

1 amp. de 1 cc. = 0,02 ctg. de Pantopon « Roche ».

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : 1 à 3 amp. par 24 heures et plus. *Enfants* : 1/4 à 1/2 amp. par année d'âge et par 24 heures.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes celles de l'opium, de la morphine et de leurs dérivés.

Le PANTOPON « ROCHE » représente tous les alcaloïdes de l'opium sous forme de chlorhydrates solubles et injectables.

0,01 ctg. de Pantopon « Roche ».

= 0,50 ctg. de teinture d'opium.

= 0,025 mgr. d'extrait d'opium.

= 0,005 mgr. de morphine.

Boîtes de 3, 6 et 12 ampoules.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**  
21, place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>)

---

## AMPOULES DE SÉCACORNINE « ROCHE »

(Tous les principes actifs de l'ergot de seigle.)  
(Voir page spéciale Sécacornine « Roche ».)

**Indications thérapeutiques.** — Hémorragies de toute nature, myocardites, congestion des poumons et de l'encéphale, atonie utérine avant, pendant et après les accouchements.

**Doses et mode d'emploi.** — 1 ampoule de 1 cc. de Sécacornine « Roche » agit comme 4 grammes de seigle ergoté.

Dose moyenne : 1/2 à 1 ampoule par jour.

Dose d'urgence : 2 ampoules et plus par 24 h.  
(Voie hypodermique ou intramusculaire.)

**Produits**

**F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**  
21, place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

## AMPOULES DE SPASMALGINE « ROCHE »

(Antispasmodique vrai.)

**Composition.** — Chaque ampoule contient :

Un centigramme Pantopon « Roche ».

Deux centigrammes Papavérine « Roche ».

Un milligramme Atrinal « Roche ».

(Voir page spéciale Spasmalgine « Roche ».)

**Indications thérapeutiques.** — *Tous les états spasmodiques et notamment coliques hépatiques et néphrétiques, spasmes du larynx, de l'estomac, de l'intestin, coliques, sueurs, diarrhées des tuberculeux, dysménorrhée, angine de poitrine, hoquet épidémique, excitation ante et post-opératoire, accouchements difficiles, tous états d'hyperexcitabilité, etc.*

**Doses et mode d'emploi.** — Dose moyenne : 1 à 2 ampoules par jour. Dose forte : 2 à 4 ampoules par jour (par voie hypodermique et intramusculaire).

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**  
21, place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

## AMPOULES DE THÉOBRYL « ROCHE »

**Indications.** — Toutes les fois que la Théobromine n'a rien donné, qu'il y a intolérance gastrique ou susceptibilité des malades ou chaque fois qu'il faut agir vite et imposer un traitement intensif.

**Doses et mode d'emploi.** — Chaque ampoule = 2 cc.  
Dose moyenne utile : *Adultes* : 1 à 2 ampoules 2 à 4 fois par jour.

*Enfants* : 1/4 ou 1/2 dose.

Dose d'urgence : *Adultes* : 3 à 4 amp. par j. en 1 ou 2 fois

*Enfants* : 1 à 2 amp. par j. en 1 ou 2 fois.

(Par voie endoveineuse ou intramusculaire.)

**Nota.** — Les injections intramusculaires sont indolores, il faut les faire à la face externe de la partie fessière de la cuisse. — (Voir thèse du D<sup>r</sup> Jouisse, Paris 1920 et les travaux des Prof. Pouchet, Rémond, Duhot des D<sup>ns</sup> Richard-St-Yves, Vigouroux, Ségard, Benech, etc.)

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**  
21, place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

## AMPOULES NÉVROSTHÉNIQUES DAUSSE

Administration indolore de la Strychnine par voie sous-cutanée, en association avec divers recorporants et toninervins.

**Indications.** — Asthénie, neurasthénie, surmenage physique et intellectuel, dépression nerveuse, adynamie.

### I. — Névrosthéniques simples.

La dose de strychnine est constante : 1, 2, 3, ou 4 milligr. par ampoule selon la demande. Le type en est la série suivante :

Série A : { Cacodylate de soude 0 gr. 05 par cc.  
Strychnine (Sulfate) 1, 2, 3 ou 4 milligr.  
suivant la demande.

### II. — Névrosthéniques progressives.

Administration de la strychnine à doses progressivement croissantes. Chaque série comprend 24 ampoules et renferme 16 dosages de strychnine allant de 1 à 10 mill. Le type en est la formule suivante :

Série A : { Cacodylate de soude 0 gr. 05 par cc.  
Sulfate de strychnine.

**Laboratoires DAUSSE**

4, rue Abriot — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## AMPOULES REIPAR

**Composition.** — Acide salicylique d'origine végétale et stabilisé par des procédés spéciaux.

**Indications.** — Tous les rhumatismes vrais, toutes les algies rhumatismales, Sciatiques.

**Action.** — Curative certaine, sédative très rapide.

**Mode d'emploi.** — En injections sous-cutanées, suivant les indications de la notice.

Prix : 15 fr. la boîte de 10 ampoules de 2 cc.

Echantillon gratuit à réception d'une simple carte de visite adressée au

**Laboratoire du REIPAR**

LUCQUY — (Ardennes).

## AMPOULES SURACTIVANTES LEISYN

Agissant sur l'état cellulaire.

Ressource thérapeutique nouvelle.

Innocuité absolue.

**Médication d'urgence** *in extremis* galvanisant le **Tonus** et la résistance à la maladie.

Complètement exempte d'excitants et d'alcaloïdes.

Aucun danger. Aucun inconvénient. Aucune contre-indication.

**Action.** — Donne à l'organisme des forces vitales puissantes permettant d'abréger considérablement les maladies et les convalescences. Anti-infectieux très efficace. Emphysème pulmonaire.

**Présentation.** — Ampoules de 2 cc. environ pour injection hypodermique. Seringue de verre et aiguille de platine indispensables.

**Posologie.** — 1 ampoule entière tous les jours ou tous les 2 ou 3 jours.

**Les Laboratoires LEISYN**

1 bis, rue Molitor — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## AMUNINE

Vitamine A.

**Composition.** — Solution huileuse de *Vitamine A* de croissance et anti-infectieuses concentrée et physiologiquement titrée en unités (1 cc. = 1.500 unités Javillier).

**Propriétés thérapeutiques.** — L'Amunine a pour effet de compléter les rations alimentaires, toujours déficientes en Vitamine A.

**Indications.** — L'Amunine est indiquée : chez l'enfant, dans tous les cas où l'on constate une *insuffisance du développement, un arrêt de la croissance, ou des irrégularités dans la courbe du poids.* — Chez l'adulte, dans les *diarrhées, la fatigue générale, l'amaigrissement, la perte de l'appétit* et, en général, pour mettre un organisme affaibli à l'abri des infections. — Elle est également indiquée dans la *grossesse.*

**Posologie.** — En flacon de 24 cc., solution dans l'huile d'olives. — Jusqu'à un an : XX gouttes ; de 1 à 10 ans, XL gouttes. — *Adultes et adolescents* : LX gouttes par jour, à mélanger à l'alimentation ordinaire, et dans du lait tiède pour les tout petits.

**Les Établissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.



## AMYLODIASTASE THÉPÉNIER

Phosphates, Diastases et vitamines de croissance  
des Céréales germées.

**Formes.** — Comprimés et Sirop.

**Indications thérapeutiques.** — Entérite et Dyspepsie (salivaire et pancréatique), Tuberculose, Rachitisme, Palpitations (d'origine digestive). Maladies par carence, digestion des féculents.

**Mode d'emploi.** — Deux comprimés ou deux cuill. à café de sirop 3 fois par jour après les repas. Préparation des bouillies : Délayer un ou deux comprimés écrasés d'amylodiastase ou une cuillerée à café de sirop dans une bouillie ne dépassant pas 60°.

Prix : le flacon sirop : 17 fr. 50 ;

la boîte de comprimés : 13 fr. 75.

**Laboratoire des Ferments  
du Docteur A. THÉPÉNIER**

10 et 12, rue Clapeyron — PARIS.

R. C. 150.854

---

## ANACLASINE RANSON

**Antianaphylaxie, Cytophylaxie, Prophylaxie anti-cancéreuse.**

L'**Anaclasine Ranson** (ανά = contre, χλάσις = choc) est une préparation *anti-anaphylactique polyvalente et cytophylactique*.

**Forme.** — Comprimés et granulé.

**Action.** — Elle évite le choc anaphylactique, désensibilise l'organisme, stimule la fonction cellulaire, améliore l'état hépatobiliaire, rétablit l'équilibre sympathique, régularise la tension, entrave l'apparition et l'évolution du cancer.

**Composition.** — L'*Anaclasine* comprend, d'une part, de l'hyposulfite de magnésium et des composés halogénés du Magnésium associés à l'Hyposulfite de soude, et d'autre part, de multiples Polypeptides spécifiques de bœuf, de cheval, de mouton, de porc, de gibier, de cabillaud, de merlan, de rouget, de crustacés, d'œuf total, de lait, de pois, de haricots, de lentilles, de céréales, de gélatine animale (*vingt peptones différentes*).

**Indications.** — Anaphylaxie alimentaire, intolérance digestive, déficience hépatique, intoxication alimentaire, migraines, insomnies, vertiges, eczéma, urticaire, maladie de Quincke, asthme, dyspnée, rhume des foins, coryzas spasmodiques, tachycardies, arythmies, arthritisme, tumeurs bénignes, cancer.

**Doses journalières.** — *Adultes* : 3 à 5 comprimés par jour, 1/2 heure avant les repas, ou 4 à 6 cuillerées à café de granulé.

*Enfants* : de 1 à 3 comprimés par jour, ou 1 à 2 cuillerées à café de granulé.

**Laboratoires de l'OPOCALCIUM**

**A. RANSON**, Docteur en Pharmacie

121, av. Gambetta, Paris. Tél. : Ménil. 62-80, 62-81.

## ANAPEPTONE VASSAL

**Forme.** — Comprimés de Peptone, remplaçant les cachets (conservation parfaite).

**Propriétés thérapeutiques.** — Anti-anaphylactique par excellence. Traitement rationnel des migraines, asthme, urticaires, troubles intestinaux.

La boîte : 18 francs (4 tubes).

Échantillon gratuit sur demande.

**Établissements Léon DANJOU**  
LILLE

## ANAQUINTINE LESCÈNE

**Composition.** — Aldéhydes benzylocinnamiques, Thymol, Eucalyptol.  
**Formes.** — 1° *Solution aqueuse.* Liquide légèrement rosé, entièrement miscible à l'eau.

2° *Solution huileuse* pour instillations nasales (flacons stilligouttes).

**Propriétés.** — Puissant antiseptique diffusible. En applications sur la gorge et la poitrine et en gouttes dans le nez ; elle calme la toux et réalise l'antisepsie des voies respiratoires.

**Indications.** — Toux, grippe, coqueluche, rhumes, sinusites, adénoïdites.

Associée au *Balsamol*, elle constitue le traitement conjugué des toux spasmodiques donnant des résultats remarquables particulièrement dans la *Coqueluche*.

*Phyloglaxie des maladies contagieuses en aspersion sur les vêtements, linge, draps, etc., en gouttes dans les narines (solution huileuse), en inhalations froides* (Méthode de Milne).

**Mode d'emploi.** — 1° *Solution.* La diluer de 4 à 5 parties d'eau chaude pour compresses sur la gorge et la poitrine, recouvrir de taffetas gommé et d'une bonne couche d'ouate, laisser en place toute la nuit.

En inhalations froides et en aspersions, l'employer pure.

2° *Gouttes nasales.* 3 à 5 gouttes dans chaque narine 3 à 5 fois par jour.

Prix : 12 fr. sans compresse. — 15 fr. avec compresse.

14 fr. gouttes nasales.

**Laboratoires LESCÈNE**

PARIS, 58, rue de Vouillé — LIVAROT (Calvados).

Téléph. : Vaugirard 08-19.

**ANAUURAL**

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Composition.** — Gardénal, rutonal, borotartrate de calcium.

**Indications.** — Épilepsie essentielle, épilepsie jacksonienne, Prurits.

**Doses.** — 2 à 3 comprimés par jour.

**Prix :** 20 francs (10 jours de traitement).

**Laboratoires LAMAR**

1, place Forbin

AIX-EN-PROVENCE

---

## ANDROCALCION

### Forme H

**Composition.** — Association de Calcium, de Magnésium, de Phosphore, de Théobromine et d'Iodaseptine, Extrait orchitique.

**Indications.** — Accidents de la Ménopause masculine, *Préventif* des troubles de la Cinquantaine, *traitement* de ses accidents : adjuvant indispensable de toute intervention génitale ou paragénitale chez l'homme (Prostatectomie, Castration, etc.).

**Propriétés.** — Agit à la fois sur le système nerveux sympathique, sur l'état général, sur la tension artérielle, sur les fonctions cardiaques. Par son extrait orchitique, apporte à l'organisme le stimulant qui lui manque.

**Préparation. Doses.** — Se présente sous forme de dragées : Prendre trois fois par jour quatre dragées (soit 12 par 24 heures) douze jours par mois.

### Forme E

**Composition.** — Lactate de Calcium, Glycérophosphate de Magnésium, Iodaseptine, Lobe antérieur d'hypophyse, Extrait orchitique.

**Indications.** — Accidents de la Puberté masculine : troubles de croissance et de développement chez l'adolescent. S'adresse surtout aux enfants de petite taille, entre 14 et 18 ans, dont le développement général et le développement génital sont insuffisants.

**Présentations et Doses.** — Dragées à avaler sans croquer. Prendre 3 fois par jour 3 à 4 dragées par 24 heures, 12 jours par mois.

**Laboratoires CORTIAL**

15, boulevard Pasteur — PARIS.

## ANDROSTINE CIBA

Hormone issue de la lignée spermatogénétique de la glande génitale mâle.

**Action physiologique.** — *Chez la femme* : Equilibrante de la sécrétion ovarienne et du système nerveux. Peut se formuler en association avec Agomensine ou Sistomensine suivant le cas. *Chez l'homme* : Activatrice de la spermatogénèse. *Dans les deux sexes* : Active le métabolisme basal, la combustion des graisses et des sucres.

**Indications.** — *Chez la femme* : Ménopause chirurgicale. Hypersthénie génitale, érotomanie, onanisme, troubles liés à la continence. Aménorrhée rebelle. *Chez l'homme* : Infantilisme, impuissance. *Dans les deux sexes* : Obésité, diabète.

Comprimés, ampoules.

**Doses.** — 2 à 6 comprimés par jour, 1 ampoule par jour ou tous les 2 jours.

Le flacon de 40 comprimés : 15 francs.

La boîte de 4 ampoules : 20 francs.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**

109-113, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## ANÉGRINE

### Composition :

Composé de la série quinoléique, associé à l'Arbutine.

### Action :

Élimination rapide de l'acide urique. — Augmentation du pouvoir de sécrétion et d'excrétion du rein. — Excitation de la fonction cholagogue du foie.

### Indications :

Goutte. — Rhumatisme articulaire aigu et chronique. — Sciatique. — Lumbago, etc.

### Mode d'emploi :

Cas aigus, 6 à 10 comprimés par jour, en deux ou trois fois, dans un peu d'eau, pendant 3 ou 4 jours, diminuer progressivement les doses jusqu'à 4 comprimés par jour. — Cas chroniques : 3 à 4 comprimés par jour, pendant 8 à 15 jours. Cesser 8 jours et reprendre.

**Laboratoires RIVIER**

26 et 28, rue Saint-Claude — PARIS.

## ANÉO LEISYN

**Médication modificatrice et antiproliférante. Régulatrice de l'équilibre cellulaire.**

**Innocuité absolue. Aucun inconvénient. Aucune contre-indication.**

**Indications.** — Cancers, Cancroïdes, Carcinomes, Epithéliomas, Epulis, États pré-cancéreux, Néoformations, Sarcomes, Tumeurs malignes, etc.

**Action.** — Agit avec une rapidité extrême. Amélioration considérable en quelques semaines, souvent en quelques jours de l'état général. Nettoyage très rapide des lésions. Cicatrisation également rapide des ulcérations. Assèchement des suppurations. Modification des territoires cancéreux et de leur voisinage. Évolution nette vers la guérison clinique.

**Présentation.** — Ampoules de 2 cc. environ.

**Technique.** — Pour les lésions visibles : les entourer tous les 2 ou 3 jours d'une couronne de 3 à 6 injections d'un demi ou d'un cc. chacune ou en pleine lésion. Dans les autres cas : 1 ampoule soit toutes les 12 heures, soit tous les jours ou tous les 2 ou 3 jours. — Seringue de verre et aiguille de platine indispensables.

**Les Laboratoires LEISYN**

1 bis, rue Molitor. — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## ANEXOL

**Antiseptique chloré, parfumé, non irritant.**

**Formes.** — Double boîte de 80 comprimés.

Boîte de 40 —

**Principe actif.** — Sel sod. acid. sulfam.  
Toluène monoch. (chloramine T.)

**Doses.** — Pour 1 litre d'eau chaude :

Gargarismes ..... 1 à 2 comprimés.

Urologie et gynécologie.. 2 à 4 —

Pansements des plaies... 4 à 6 —

La dissolution des comprimés d'Anexol se fait immédiatement, même à froid.

**Prix :** 14 fr. la double boîte. La boîte : 8 fr.

**LABORATOIRES DROUET ET PLET**  
RUEIL-MALMAISON (S.-et-O.).

## ANGIOLYMPHE DU D<sup>r</sup> ROUS

**Prétuberculose — Tuberculose.**

Dans toutes ses manifestations : Pulmonaire, Ganglionnaire, Osseuse, Péritonéale, Rénale, Intestinale.

**Indications :**

*Dans les formes pulmonaires.*

**DIMINUTION** et **DISPARITION** de la Dyspnée, de la Toux, de l'Expectoration, des Sueurs, de la Fièvre et de tous les Symptômes.

**AUGMENTATION** de l'appétit, du poids, des forces, du sommeil, amélioration rapide de l'état général.

**DIMINUTION, DEGENERESCENCE** et **DISPARITION** des **BACILLES DE KOCH** et autres micro-organismes pathogènes.

*Dans les formes ganglionnaires, osseuses, rénales, etc.*

Amélioration rapide de tous les symptômes. Une boîte suffit d'ordinaire pour donner un commencement d'amélioration sensible.

**Posologie.** — De 2 à 5 cc. en une injection dans la fesse, faite quotidiennement, par série de 8 à 12, et reprise après 10 à 12 jours d'interruption.

**Laboratoire de l'ANGIOLYMPHE**

4 bis, rue Hébert — COURBEVOIE.

MORO, ph. de 1<sup>re</sup> cl., 15, av. de la Défense, Puteaux.

## ANGIOSEDINE

**Comprimés.**

**Propriétés thérapeutiques.** — Antispasmodique, sédatif du système nerveux.

**Formule.** — Ext. mou de passiflore, de cratoegus, de jusquiame, gardénal, nitrite de soude, extrait de muguet, de gui, d'hama-mélis, marron d'Inde, d'hydrastis et hypophyse.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés de 0,50.

**Posologie.** — 2 à 6 comprimés par jour.

Prix de la boîte au public : 20 francs.

**Pharmacie BEAU**

36, rue des Archives — PARIS (IV<sup>e</sup>).



## ANGIOXYL DU D<sup>r</sup> ROUSSEL

**Nature.** — Extrait pancréatique hypotenseur à action trophique sur les vaisseaux, titré physiologiquement.

**Indications.** — Angine de poitrine, Hypertension artérielle, artériosclérose, artérites de toute nature. Ulcères gastriques, ulcères variqueux. Maladie de Basedow, Anxiétés. Troubles de la Ménopause.

**Formes.** — 1° Angioxyl-Ampoules, en boîtes de 10 ampoules ; 2° Angioxyl-Sirop, en flacons de 100 cc. environ.

**Doses.** — De 1 à 3 ampoules par jour en injection intramusculaire pendant 18 jours.

Ou 3 à 4 cuillerées à café de sirop par jour.

*Aucune contre-indication.*

**Laboratoire des PROXYTASES**

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).

---

## ANIODOL

Le plus puissant antiseptique interne et externe, diffère de tous les antiseptiques par son absence de toxicité et de causticité.

*Combinaison de triformal glycérine  
et d'oxyméthylène sulfocarbimide.*

### ANIODOL INTERNE

**Forme.** — Gouttes.

**Indications.** — Fermentations gastro-intestinales, diarrhée verte des nourrissons, entérites, dysenterie amibienne, gripes, catarrhe des voies aériennes, tuberculose, fièvres infectieuses, fièvre typhoïde.

**Mode d'emploi et doses :**

*Nourrissons :* III à V gouttes à chaque tétée.

*Enfants :* XX à L gouttes.

*Adultes :* XXX à CC gouttes.

Par jour dans une tasse de lait ou de tisane, soit au moment, soit dans l'intervalle des repas.

### ANIODOL EXTERNE

**Formes.** — Solution normale ; solution concentrée ; comprimés ; poudre ; savons, ovules ; vaseline.

**Indications.** — Obstétrique, gynécologie, chirurgie générale, maladies vénériennes et des voies urinaires, dermatoses, cancer, ophtalmologie, rhinologie.

**Mode d'emploi et doses.** — Normale : 1 cuillerée à bouche pour 1 litre d'eau. Concentrée : XXX gouttes ou 1 division pour 1 litre. Comprimés (injections vaginales) 1/2 comprimé pour 1 litre d'eau. Poudre : (remplace les poudres dérivées de l'iode et du phénol). Savon : aseptie et désinfection des mains et des plaies. Ovules (gynécologie) : un ovule le soir. Vaseline : plaies, accouchements, rhinologie.

**Laboratoires de l'ANIODOL**

3 à 9, rue des Alouettes. — NANTERRE (Seine).

Envoi d'échantillons gratuits à MM. les Docteurs.

## ANOÏDE

Traitement des hémorroïdes.  
Suppositoires, Pommade.

**Formule simple.** — Carbonate de bismuth, Oxychlorure de bismuth, Oxyde de zinc, Silicate de magnésie (associés à un excipient spécial de consistance adhésive).

**Formule composée.** — Carbonate de bismuth, Oxychlorure de bismuth, Oxyde de zinc, Silicate de magnésie (associés à un excipient spécial de consistance adhésive), Adrénaline, Eucaïne, Menthol.

**Administration.** — *Crises aiguës* : Suppositoires Anoïde formule simple. *Cas habituels* : Suppositoires Anoïde, formule composée. Pommade Anoïde.

La caractéristique des suppositoires Anoïde est de réaliser un véritable pansement isolant qui entoure l'hémorroïde d'une enveloppe souple et adhésive dont la viscosité empêche tout frottement irritant contre les tissus voisins.

**Mode d'emploi.** — *Suppositoires* : Un le soir en se couchant. *Crises aiguës* : Un matin et soir.

Prix : 16 francs.

*Pommades* : Applications locales, matin et soir.

Prix : 13 francs.

Pharmacie ROGÉ-CAVAILLÈS.

M. LACHARTRE, Docteur en Pharmacie, Successeur,  
116, boulevard Haussmann — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## ANTALGOL DALLOZ

**Composition.** — Quino-Salicylate de pyramidon.

**Forme.** — Granulé.

**Propriétés.** — Analgésique par le pyramidon. Antiseptique par l'acide salicylique. Dissolvant de l'acide urique par l'acide quinique.

**Indications.** — Rhumatisme aigu ou chronique, Goutte, Lumbago, Sciatique, Migraines, Névralgies, Grippe, Contre l'élément Douleur en général.

**Dose.** — 2 à 4 cuill. à café par jour, à croquer ou à faire dissoudre dans de l'eau.

Le flacon : 15 francs.

Laboratoire DALLOZ

13, boulevard de la Chapelle — PARIS (X<sup>e</sup>).

## ANTASTHÈNE

**Composition.** — Reconstituant du système nerveux, à base de glycérophosphates associés à un extrait cérébral et spinal.

**Forme.** — Comprimés, Ampoules de 2 cc.

**Indications.** — Reconstituant du système nerveux ; particulièrement indiqué dans l'asthénie et tous les états dépressifs quelle qu'en soit l'origine.

### MODE D'EMPLOI.

*Enfants* : 1 injection tous les 2 jours.  
2 comprimés par jour aux repas.

*Adultes* : 1 injection par jour.  
4 comprimés par jour aux repas.

Prix : 20 francs la boîte (12 amp. ou 50 compr.).

Laboratoire de Biologie Appliquée

H. CARRION et C<sup>ie</sup>

54, faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

V. BORRIEN, Docteur en pharmacie.

---

## ANTASTHME CIBRAND

**Forme.** — Pilules dragéifiées.

**Composition.** — Association adrénaline, Hypophysine, Iodure, Caféine, Grindélia, Lobélie, etc.

**Indications.** — Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques, Catarrhes bronchiques, Dyspnées.

Prix au public : 14 francs.

Laboratoire de l'Antasthme

199, av. Victor-Hugo

AUBERVILLIERS (Seine).

## ANTÉLOBINE

(Lobe antérieur d'hypophyse.)

**Composition.** — Hormone sexuelle du lobe antérieur d'hypophyse, physiologiquement titrée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant excitant de l'ovaire, l'Antélobine est la clef du fonctionnement ovarien. Elle agit, par l'intermédiaire de l'ovaire, sur l'ensemble du tractus génital.

**Indications.** — Tous les cas d'hypofonctionnement ovarien, d'agénésie et d'hypogénésie sexuelle ; aménorrhée, hypoménorrhée, retards de la puberté, troubles de la ménopause naturelle. N'agissant que par l'intermédiaire de l'ovaire, l'Antélobine est sans action chez les ovariectomisées totales.

**Posologie.** — En boîtes de 6 ampoules de 2 cc. (solution aqueuse) titrées à 20 unités par ampoule. Une injection intra-musculaire ou sous-cutanée profonde tous les jours, pendant la semaine qui précède la date présumée de la prochaine menstruation.

**Les Établissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

---

## ANTHÉMA

Sérum sérique antihémorragique  
des D<sup>rs</sup> Dufour et Le Hello.

Médication basée sur les propriétés coagulantes du sérum d'animaux en état d'anaphylaxie.

Aucun inconvénient pour le malade.

**Indications.** — **Hémorragies et Etats hémorragipares. Hémoptysies. Hémostase pré-opératoire.**

**Posologie et mode d'emploi.** — Injection du contenu d'une ampoule de 10 cc., à renouveler au besoin après quelques heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPÉCIA** »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## ANTHRAXONE-FORNET

**Vaccin buccal contre la Furonculose.**

**Principe actif.** — Staphylocoques de différentes souches, spécialement préparés.

**Indications.** — Remplace avantageusement tout autre traitement de la Furonculose.

**Posologie.** — 1 à 3 pilules, 3 fois par jour, 1/2 heure avant les repas.

**Propriétés thérapeutiques.** — Fait disparaître les Furoncles naissants, fait mûrir les autres.

Prix : 29 francs.

Service de vente et échantillonnage :

**Laboratoires**

23, rue du Caire — PARIS (II<sup>e</sup>).

Service d'étude et de fabrication :

**Institut de Microbiologie**

SARREBRUCK (Sarre).

## ANTIALGOS CHRISTAENS

Spécifique de la Goutte et du Rhumatisme.

**Solution diiodo-salicylate de colchicine en solution salicylée** donnant à l'analyse élémentaire :

Acide salicylique .....	3 gr. 50
Colchicine.....	0 gr. 005
Iode (ce qui peut se combiner).....	1 gr. environ.
Excipient. Q. s. pour 100 cc.	

**Dose et mode d'emploi.** — Accès : Par 24 heures, 6 cuill. à soupe pleines (100 gr. environ), puis à doses décroissantes. — *Forme chronique* : Une à trois cuill. à soupe, suivant les cas.

**Indications thérapeutiques.** — Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Lumbago, Sciatique, Névralgie rhumatismale, etc.

Expérimenté à l'Institut Physiologique de Nancy et reconnu sans action secondaire sur le cœur, le rein, le foie et l'estomac. *Calme l'accès en 24 heures.*

**LABORATOIRES DE LA PHARMACIE  
DE LA PLACE ROYALE**

2, rue du Champ-de-Mars — REIMS

Compte Postal Paris 234-33. R. C. Reims 4478.

## **ANTIASTHMATIQUE DOMERGUE**

**Principes actifs.** — Valérianates de Diméthyl et Triéthylxanthine.

**Indications.** — Asthme, Emphysème, Toux spasmodiques.

**Présentation.** — Capsules.

**Doses médicamenteuses.** — 2 à 6 par jour, par deux à la fois de préférence, matin ou soir ou matin et soir.

**Laboratoires DOMERGUE**  
AGEN (Lot-et-Garonne).

---

## **ANTIASTHME BENGALAIS**

Poudre fumigatoire à base de Solanées nitrées, digitale et menthol.

**Rétablit l'eupnée. Facilite l'expectoration.**  
**Calme la toux.**

**Mode d'emploi.** — Faire brûler une pincée de poudre sur une soucoupe et aspirer doucement la fumée par les narines.

**Indications.** — Crises d'asthme, Emphysème, Oppressions des bronchites chroniques, Catarrhes, Coryza spasmodique, etc.

**Cigarettes Schulzé-Bengalais**  
aux mêmes principes.

**Laboratoires FAGARD..**

44, rue d'Aguesseau — BOULOGNE-SUR-SEINE.  
Tél. : Molitor 07-05.

**DERNEVILLE**

7, rue de Joncker — BRUXELLES (Tél. 111-73).

## ANTI-ASTHME DEHAUSSY

A tout asthme, quelle que soit sa forme, il faut une même médication de fond visant le déséquilibre vago-sympathique commun à tous ces malades.

### Médication de Fond

Hypophyse, Surrénale, Euphorbe, Lobelie, Belladone, Arrhénal.

A chaque forme d'asthme il faut en outre sa **médication complémentaire** spéciale.

— Asthme pur sans expectoration ou avec expectoration difficile: **Anti-Asthmine A.**

— Adjonction: *iodure*.

— Asthme vieilli avec bronchite chronique et emphysème: **Anti-Asthmine B.**

— Adjonction: *benzoate de soude, essence de pin sylvestre*.

— Asthme vieilli avec tendance à l'insuffisance cardiaque: **Anti-Asthmine C.**

— Adjonction: *iodure-caféine*.

Les états asthmatiformes des vieux tousseurs avec dyspnées survenant par paroxysmes sont justiciables de l'anti-asthmine.

### Posologie :

*Comprimés* : 2 à 3 par 24 heures.

*Sirop* : 2 à 3 cuillerées à soupe par 24 heures.

*Pilules* : 4 à 6 par 24 heures.

*Enfants, 10 ans* : demi-dose.

Prix : 16 francs.

**Laboratoire DEHAUSSY**

66, rue Nationale — LILLE.



# ANTIDIABÉTIQUE MONAVON

A base de kola et sans sucre.

**Indications thérapeutiques.** — Dans le traitement du diabète, la Kola agit comme un adjuvant qui s'attaque à certains symptômes et qui développe la résistance de l'organisme :

Elle diminue la glycosurie ;

Comme aliment d'épargne, elle agit sur les tissus musculaires en diminuant l'urée, elle agit sur les éléments nerveux en diminuant les phosphates ;

Elle est tonique, reconstituante, et lutte contre l'amaigrissement causé par l'excès de désassimilation.

## Composition et Mode d'emploi :

*Elixir* contenant : 0 gr. 30 extrait de kola par verre à liqueur.

— — 0 gr. 021 saccharine par verre à liqueur.

Un à 2 verres à liqueur après chaque repas.

Prix : 18 francs.

**Produits GONNON**

**J. et C. GONNON, Pharmaciens.**

14, rue Victor-Hugo — LYON.

---

# ANTI-ÉPILEPTIQUE DE LIÈGE

Elixir bromuré d'une action puissante évitant les inconvénients du bromisme. En 4 numéros  
Epilepsie, crises nerveuses, neurasthénie.

## EPILEPSIE. POSOLOGIE

1° *Enfants au-dessous de 7 ans.* — Seulement le n° 1 :

Moins de 5 mois : 1/4 mes. par j.

5 mois à 1 an : 1/2 —

1 à 3 ans : 1 à 2 mes. par j. } en augment.

3 à 7 ans : 2 à 3 — } graduellement.

2° *De 7 à 10 ans.* — Seulement le n° 1.

3° *De 10 à 14 ans.*

N° 1. 1<sup>re</sup> bouteille ..... 2 1/2 mesures par jour.

— 2<sup>e</sup> — ..... 3 — —

— 3<sup>e</sup> — ..... 3 1/2 — —

N° 2. 1<sup>re</sup> bouteille ..... 3 — —

— 2<sup>e</sup> — ..... 3 1/2 — —

— 3<sup>e</sup> — ..... 4 — —

4° *Adultes.* — Le choix du numéro de début dépend de l'intensité de la maladie et de la constitution du malade. Les personnes faibles et celles qui n'ont d'accès qu'à un mois d'intervalle commenceront par le n° 1. Les bonnes constitutions victimes d'accès fréquents commenceront par le n° 2.

N° 1. 1<sup>re</sup> bouteille ..... 3 mesures par jour.

— 2<sup>e</sup> — ..... 3 1/2 — —

N° 2. 1<sup>re</sup> — ..... 3 — —

— 2<sup>e</sup> — ..... 3 1/2 — —

N° 3. 1<sup>re</sup> — ..... 3 — —

— 2<sup>e</sup> — ..... 3 1/2 — —

N° 4. 1<sup>re</sup> — ..... 3 — —

— 2<sup>e</sup> — ..... 3 1/2 — —

La mesure dont nous nous servons jauge 15 cc. (soit une cuillère à soupe).

Les doses indiquées plus haut sont toujours prises en trois fois diluées dans une infusion de thé diurétique de Liège.

Le flacon : 25 francs, impôt compris.

**Laboratoire FANYAU**

48, rue Claude-Lorrain — LILLE.

## **ANTIFURONCULEUX DOMERGUE**

**Principes actifs.** — Juglandine. Méthylpyrazolone. Alcalins.

**Propriétés.** — S'oppose au développement du Staphylocoque. (Réussit même alors que les autres moyens ont échoué.)

**Présentation.** — Cachets (boîtes de 24).

**Durée du traitement.** — Minimum 21 jours.

**Emploi.** — 2 cachets par jour, demi-heure avant chacun des 2 principaux repas.

**Laboratoires DOMERGUE**  
AGEN (Lot-et-Garonne).

---

## ANTIGÉNINES

### Vaccins par voie buccale.

500 milliards de microbes par ampoule de 20 centimètres cubes.

Boîte de 6 ampoules de 10 centimètres cubes.

Prix : 25 francs.

### Antigénine C. E.

*Colibacilles-Entérocoques* : Entérite, Appendicite, Syndrome entéro-rénal, Diarrhée infantile.

### Antigénine C.

*Colibacilles polyvalents* : Colibacillose, Pyélonéphrites gravidiques.

### Antigénine S.

*Staphylocoques polyvalents* : Anthrax, Furonculose, Staphylococcies.

### Antigénine E. P. S.

*Entéro-Pneumo-Streptocoques* : Grippe et ses complications, Fièvres puerpérales, Angines.

### Antigénine T. A. B.

*Bacilles typhiques, Para A. et Para B.* : Fièvres typhoïde et paratyphoïdes.

**Posologie.** — Donner le contenu d'un flacon-ampoule dans de l'eau sucrée ou dans une infusion aromatisée au gré du malade, matin et soir bien à jeun, une demi-heure au moins avant toute alimentation.

*Aux nouveau-nés et enfants* : Donner de un demi à un flacon-ampoule, suivant l'âge.

### Vaccins par voie hypodermique.

Même série que les Antigénines, vaccins par voie buccale.

Boîte de 6 ampoules. Prix : 25 francs.

Faire une injection hypodermique, tous les jours ou tous les 2 ou 3 jours, suivant le cas, en commençant par 1/2 centimètre cube, augmenter de 1/2 centimètre cube chaque jour, jusqu'à 2 centimètres cubes.

### Bouillon-Antigénine pour pansements.

Boîte de 6 ampoules. Prix : 25 francs.

### Rhino-Antigénine pour instillation nasale ou otique.

Boîte de 4 ampoules. Prix : 15 francs.

### Ovules-Antigénines : métrites et toutes leucorrhées.

Boîte de 6 ovules. Prix : 15 francs.

### Laboratoire des ANTIGÉNINES

1 place Lucien-Herr — PARIS (V°).

(Anciennement 43, rue Tournefort.)

Gobelins 26-21.

## ANTIGRIPPINE MIDY

Cachets dosés à 0 gr. 65.

Poudres d'Aconit, de Belladone, de Gelsemium et de Dover, Caféine, Phénacétine et Pyramidon, Codéine (1 cgr. par cachet).

Ni quinine ni antipyrine.

**Doses et mode d'emploi.** — Pour les adultes, dès le début de la grippe, prescrire 1 cachet dans un grog chaud, de préférence à distance du repas et au moment de se coucher. Renouveler au besoin 2 heures après. Le lendemain et jusqu'à la fin de l'attaque, un cachet matin et soir.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antithermique, Analgésique, Bactéricide.

**Indications.** — Grippe, Influenza, Rhume, Coryza, Maux de tête, Courbatures, Névralgies.

**Laboratoires MIDY**

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

---

## ANTIPHI

Le plus rapide reconstituant. Médication Arsénio-Phosphorée par sensibilisation.

**Deux formes.** — Elixir. Solution.

**Indications.** — Etats prétuberculeux. Tuberculoses apyrétiques. Surmenage. Toutes les anémies. Convalescences. Neurasthénies. Enfants chétifs.

**Posologie.** — *Elixir* : Un petit verre après les deux repas.

*Solution* : Une cuillerée au milieu des deux repas.

**Laboratoires de l'ANTIPHI**

**JEAN CAPIN, Docteur en Pharmacie**  
ROQUEFORT (Landes).

## ANTIPHLOGISTINE

**Composition.** — Glycérine, kaolin, petite proportion d'iode, d'acides borique et salicylique, huiles essentielles (menthe, gaulthéria, eucalyptus).

**Propriétés.** — Chaleur constante pendant 12 à 24 heures. Cataplasme idéal. Action osmotique et exosmotique de la glycérine agissant à travers la peau sur les liquides organiques chargés de microorganismes qu'elle attire et engloutit.

**Indications.** — Toutes affections nécessitant l'action d'une chaleur constante ou une lutte contre l'infection interne ou externe: Pneumonies, Pleurésies, Bronchites, Rhumatismes, Gouttes, Phlegmons, Furoncles, Orchites, Mastites, Conjonctivites, Plaies infectées, Gynécologie, etc.

**Particularités.** — Pâte molle, se délivre en boîtes fer-blanc embouties de 150 gr., 325 gr., 500 gr., 1 kil., 2 kil. 500. Se chauffe au bain-marie, s'applique directement sur la peau; on recouvre d'ouate. Action manifeste et soins rendus faciles.

**Laboratoires de l'Antiphlogistine**

**B. TILLIER, Pharmacien, 11, rue du Petit-Parc.**  
**SAINT-MAUR, près Paris. R. C. Seine 56-956.**

## ANTIPHYSIQUE VADAM

Chimiothérapie anti-tuberculeuse et anti-infectieuse pulmonaire. Cinnamate de benzyle, cholestérine, Iode combiné, Gaïacol, Eucalyptol, Goménol, Huile d'arachide stérilisée, q. s. p. 1 cc. 1/2.

**Résultats** certains chez les malades curables (Antisepsie, Cicatrisation et Histogenèse, Reprise de poids), 1 ampoule tous les deux jours, ou chaque jour (réchauffer l'amp. au B-M avant l'emploi). Injection indolore, résorption aisée.

**Prix au public, boîte de 12 ampoules:**  
 22 francs.

Echantillons littérature aux

**Laboratoires J. PLÉ**

**Docteur en pharmacie,**

111 bis, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

## ANTIRRHOÏDE

Huile indienne : Balaninum, Lentiscum,  
Myagrium, Laurium, Spirea, etc.

**Indications.** — Traitement des hémorroïdes.

**Mode d'emploi.** — On nettoie à l'eau tiède les parties à soigner et on sèche avec du coton hydrophile ou un linge fin, puis on imbibe largement avec l'huile ANTIRRHOÏDE la pulpe de l'index et l'on promène ce doigt ainsi mouillé sur les ampoules et bourrelets extérieurs, d'abord, puis à l'intérieur du rectum, en exerçant un léger massage, lentement. L'opération doit durer de cinq à six minutes.

Les applications doivent être faites sans oubli, avant et après chaque garde-robe.

Pour les hémorroïdes internes, employer des SUPPOSITOES ANTIRRHOÏDES qui plongés dans l'huile antirrhoïde doivent être introduits lentement, le malade couché sur le côté et les jambes repliées.

Le grand flacon : 26 fr. — Le demi-flacon : 14 fr. 85.

La boîte de supposi-cônes : 12 fr.

**Laboratoires BELIERES**

19, rue Drouot — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## ANTISCIATIQUE

**P. Chambon.**

**Indications.** — Traitement étiologique et rapide de la *Sciatique*, du *Lumbago* et des *douleurs rhumatoïdes*. Aucune contre-indication.

**Composition.** — Association de métaux ionisés catalyseurs d'oxydation (Mn, Mg, Ca, Ni, Fe et excipient lactosé). Forme : paquets.

**Mode d'emploi très important.** — 7 paquets par jour, d'heure en heure, sans discontinuer malgré les repas, chaque paquet dissous dans une cuillerée à soupe d'eau.

Boîte de 30 paquets : 10 francs.

**Laboratoire P. CHAMBON**

Place Francheville — PERIGUEUX  
(Dordogne).

## ANTIVIRUS

Bouillons-Vaccins filtrés, pour pansements spécifiques microbiens.

**Antivirus colibacillaire.**

**Antivirus staphylococcique.**

**Antivirus streptococcique.**

**Antivirus mixte (strepto-staphylococcique).**

**Antivirus polyvalent (pneumo-strepto-staphylo).**

En boîtes de 3 ampoules 10 cc. Prix : 12 fr.

— de 12 — 4 cc. — : 20 fr.

— de 6 — 4 cc. — : 10 fr.

**Antivirus puerpéral (streptococcique)** en boîtes de 2 ampoules 50 cc. Prix : 20 fr.

Atoxicité absolue.

Conservation indéfinie en ampoules scellées.

**Antivirus mixte en pommade (Arapal) : 10 fr.**

**H. VILLETTE, Pharmacien**

**Produits de « La BIOTHÉRAPIE ».**

131, rue Cambronne — PARIS (XV°).

Téléphone : Vaugirard 11-23.

## ANTONAL

Traitement rationnel et polyvalent de l'hypertension vasculaire. — Spécifique des scléroses artérielles et viscérales. A base de principes dynamogénétiques du gui. — Diméthylquinoxanthine. — Extrait total hépatique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médicament d'une grande efficacité par son action à la fois diurétique, antitoxique et hypotensive, d'où son indication dans l'hypertension vasculaire et les maladies qu'elle accompagne : Artériosclérose, Cardiopathies artérielles, Angine de poitrine, Ménopause, Congestions hémorragiques, Néphrites, etc.

Deux formes :

**Cachets : 1 à 3 par jour. — Comprimés : 2 à 6 par jour.**

**Prix :** { 12 fr. la boîte de cachets  
12 fr. la boîte de comprimés } sans impôt.

Littérature et échantillons :

**Laboratoires CARESMEL**

2, quai Paul-Bert — TOURS.

Téléphone : 19-42.



## ANUSOL MIALHE

Iodo-résorcino-sulfite de bismuth.

### Forme :

Suppositoires ; pommade.

### Indications :

Hémorroïdes.

Agit également bien contre la constipation, prostatites, etc.

### Dose :

Un suppositoire matin et soir.

**Laboratoire du D<sup>r</sup> MIALHE**

8, rue Favart — PARIS.

## ANXIOL (comprimés)

### Forme pharmaceutique et composition.

Ephédrine naturelle (chlorh.).	0,01	Extrait d'Euphorbia.	0,02
Hypophyse .....	0,02	— de Cratægus.	0,02
Belladone stabilisée .....	0,01	— de Scille ....	0,005
Phényléthylmalonylurée.....			0,01
pour 1 comprimé.			

**Propriétés et avantages.** — Synergie médicamenteuse permettant de rétablir l'*Equilibre humoral* par une action simultanée, légèrement *Excitante* sur le *Sympathique* et *Inhibitrice* sur le *Pneumo-gastrique*. L'association éphédrine hypophyse a l'avantage d'une action *rapide* et *durable* par la voie *buccale*.

**Indications thérapeutiques.** — *Asthme bronchique*, *Emphysème*. Dyspnées asthmatiformes. *Rhume des foins*. Vertiges. Migraine, *Hypotension* avec état dépressif. Spasmes viscéraux, *Dysménorrhée*, Petit mal des rayons X, Allergies diverses.

**Prescription** (strictement médicale). — 1 flacon *Anxiol Falvy*.

**Mode d'emploi.** — 4 à 8 compr. par jour chez l'adulte ; 1 à 2 compr. par jour chez l'enfant au-dessus de 5 ans ; 1 à 4 compr. par jour chez l'adolescent. Chez l'asthmatique, 2 compr. à jeun la matin et 2 le soir en cas de menace de crise. Débuter par des doses faibles chez les individus à tension un peu élevée. Les myocardites, les grandes hypertensions, l'albumine, le diabète sont des contre-indications.

**Les Laboratoires A. FALVY**

Licencié ès sciences, ex-interne, lauréat des hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## **APHLOÏNE TROUETTE-PERRET**

**Elixir** contenant en totalité les principes extractifs des plantes tropicales : **Aphloïa, Pisciadia, Hamamelis, Hydrastis et Viburnum.**

**Indications.** — Spécifique des troubles de la Ménopause, de la Puberté et du Système veineux (varices et hémorroïdes).

Sédatif utéro-ovarien.

**Posologie.** — Une à deux cuillerées à café par jour aux principaux repas.

Prix au public : 16 fr.

**Laboratoires TROUETTE-PERRET**  
15, rue des Immeubles-Industriels PARIS  
(XI<sup>e</sup>)

---

## **APHOSAL**

Spécifique de l'insomnie.

Chez les cardiaques, les dyspeptiques, les surmenés.

**Composition.** — Chloralose chimiquement pur, préparé d'après les travaux des professeurs Ch.-Richet et Hanriot.

**Présentation.** — Tube de 12 cachets de 20 centigr.

**Propriétés thérapeutiques.** — Procure un sommeil réparateur, sans cauchemar, avec réveil agréable. Non toxique, sans action sur le rein, ni l'estomac. Tonique du cœur.

**Posologie.** — Un cachet dans un verre d'eau ou d'infusion avant le coucher.

Prix : 9 fr. 75.

**Laboratoires de l'APHOSAL**  
48 bis, avenue Mozart → PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
Usine à Nanterre.

## **APIOLINE CHAPOTEAUT**

**Composition.** — Principes actifs de l'apium petroselinum.

**Indications.** — Troubles de la menstruation, Douleurs cataméniales, Ménorragies, Aménorrhée.

**Action.** — L'**APIOLINE** régularise les règles et calme les douleurs qu'elles provoquent. Son action est supérieure à celle des autres emménagogues. Complètement inoffensive, reste sans action sur la grossesse.

**Mode d'emploi.** — 4 à 5 jours avant l'apparition des règles et pendant toute leur durée, prendre 2 à 3 capsules par jour au moment des repas.

**LABORATOIRE  
DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE  
D<sup>r</sup> PH. CHAPELLE, 8, rue Vivienne, PARIS.**

---

## **APPETYL**

Gouttes apéritives à base d'extraits fluides stabilisés de : Gentiane, Simarouba, Condurango, Colombo et Camomille.

**Donne de l'appétit. — Aide la digestion. — Favorise l'assimilation des médicaments.**

Apéritif exclusivement végétal.

Ne contient ni AS ni P.

**Posologie.** — Aucune contre-indication, XV à XX gouttes un quart d'heure avant les repas dans un liquide sucré ou mieux encore sur un morceau de sucre. Enfants : 1/2 dose.

**Prix :** 15 francs pour 25 à 30 jours de traitement.

**Laboratoires biologiques de l'Île-de-France**  
3, rue Laugier — ARGENTEUIL (Seine-et-Oise).

## APSOPHOL

**Composition.** — Agents nervins, antispasmodiques et sédatifs, à l'exclusion des iodures et de tout alcaloïde stupéfiant.

**Indications.** — Spécifique contre les bourdonnements d'oreilles, sifflements, battements et tous bruits subjectifs d'oreilles, avec ou sans vertiges.

**Mode d'emploi.** — Uniquement chez l'adulte. XXX gouttes matin et soir dans un peu d'eau ou de tisane 1/4 d'heure avant les repas. Après 8 jours de traitement, prendre XL gouttes matin et soir. Cure de 15 jours environ.

Echantillon sur demande.

Prix : 16 francs, exempt d'impôt.

**Laboratoire R. O. L.**

(Spécialités Oto-Rhino-Laryngologiques)

**H. DUFOUR, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**

Ancien Interne des hôpitaux de Paris.

40, rue des Carmes — ORLÉANS (Loiret).

## AQUINTOL PETIT-MIALHE

*COQUELUCHE*

Chloro. — Bromo. — Fluor.

Modifie, dès les premiers jours, la toux. Le malade n'éprouve plus de suffocation ni de vomissements, il retrouve l'appétit et le sommeil.

**Doses :**

Au-dessous de 6 mois :	2 à 4 cuill. à café.
Moins de 5 ans :	3 à 8 — à café.
Moins 15 ans :	4 à 8 — à dessert.
Adultes :	5 à 8 — à soupe.

Deux flacons sont en général nécessaires pour éviter la rechute.

**Laboratoire du Docteur MIALHE**

8, rue Favart — PARIS.

## ARACHISE

Alimentation rationnelle du D<sup>r</sup> Boigey.

**Forme.** — Farine alimentaire.

**Indications.** — Troubles de croissance chez l'enfant, anémie, anorexie, convalescence, surmenage.

**Propriétés.** — L'Arachise est un aliment d'assimilation très facile, à base de farine d'arachides. Sa teneur exceptionnellement élevée en sucre et en principes azotés, propres à renouveler nos tissus, lui assure le premier rang parmi les aliments reconstituants. C'est un produit très nourrissant et un aliment complet.

Sous un poids faible, cette farine introduit dans l'économie le maximum d'énergie latente et fournit, par son absorption, les moyens de produire un travail soutenu et intense.

Elle représente un aliment hyperazoté excellent, très goûté même des anémiés, des convalescents et des anorexiques.

Il n'y a aucune contre-indication à son emploi régulier.

Prix : La boîte, 7 fr. 50.

**Laboratoires L. BELIERES**

19, rue Drouot — PARIS.

## ARCANAN

Marque déposée.

Atophan quininique . . . .	0 gr. 141
Atophan.....	0 gr. 134
Urotropine.....	0 gr. 225

**Forme :**

Boîte de 10 cachets à 0 gr. 50.

**Propriétés thérapeutiques :**

Traitement et prophylaxie de la *grippe* et des affections des voies respiratoires supérieures.

**Mode d'emploi :**

**3** à 4 fois par 24 heures. 1 cachet pendant le repas, accompagner l'emploi de l'Arcanan d'un verre de Vichy ou autre boisson alcaline.

**Laboratoires CRUET**

13, rue Miollis — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## ARDOGÈNE

Elixir fortifiant, Reconstituant physiologique, Stimulant énergétique Hyperleucocytaire, Antichlorotique.

**Indications.** — Convalescence, Faiblesse générale, Chlorose, sous toutes ses formes, Grippe, Neurasthénie.

Une cuillerée à soupe contient :

Arrhénal .....	15 milligr.
Phosphate de soude .....	15 centigr.
Quinium.....	45 milligr.
T <sup>re</sup> de Noix vomique :	III gouttes.
Extrait fluide de kola :	XX gouttes.

### Doses :

*Adultes* : Une cuillerée à soupe ou un verre à liqueur midi et soir avant les repas.

*Enfants* : A partir de 10 ans une cuillerée à café midi et soir avant les repas.

Flacon : 20 francs.

**Laboratoire LEPORCQ**

9, rue du Temple, ENGHIEEN-LES-BAINS (S.-et-O.).

## ARGYBIL

**Composition.** — Complexe de Vitellinate d'argent (Argyrol de BARNES) et de bile.

**Présentation.** — Liquide.

**Indications.** — Traitement de l'ozène, infections aiguës ou chroniques des fosses nasales et du rhino-pharynx. Donne d'excellents résultats en association avec le vaccin local.

**Mode d'emploi.** — Par le médecin traitant : Badigeonnages. Pour le malade : prescrire en pulvérisations : 2 à 3 coups de poire dans chaque narine, 2 ou 3 fois par jour.

**LANCOSME**

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS.

## ARGYCUPROL

Traitement intégral et polyvalent  
de la BLENNORRAGIE.

**Injection urétrale** non caustique, absolument indolore et ne provoquant jamais de rétrécissement.

**Composition.** — Argent colloïdal (10 p. 100), détruit le gonocoque. Cuivre colloïdal (0,1 p. 100), attaque les microbes associés.

**Forme.** — Boîte de 6 ampoules-injections.

**Indications.** — Activité remarquable et tolérance parfaite aussi bien dans les urétrites les plus aiguës que dans les urétrites chroniques.

S'emploie en injections urétrales dans les cas aigus, en grands lavages dans les cas chroniques ; en compresses sur les bourses dans les orchites blennorragiques ; en instillations dans les conjonctivités blennorragiques.

Chez la femme, la blennorragie, les métrites, les vulvites et vulvo-vaginites sont justiciables du traitement par l'Argycuprol.

**Laboratoire de l'ANGIOLYMPHE**

4 bis, rue Hébert — COURBEVOIE (Seine).

MORO, ph. de 1<sup>re</sup> cl., 15, av. de la Défense, Puteaux.

---

# ARHÉMAPECTINE GALLIER

## Antihémorragique

Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Adopté par les Services de Santé de la Guerre et de la Marine.

Solution isotonique, stérile, non toxique, non anaphylactisante de *Pectine*, associée à son coferment minéral (Calcium).

La **Pectine**, agent hémostatique vrai, augmente le pouvoir coagulant du sang, sans provoquer de modification de la tension, sans action sur les fibres musculaires (H. Violle et L. de Saint-Rat, C. R. Ac. Médec., 4 nov. 1924).

### Formes pharmaceutiques :

Boîte de 4 ampoules de 20 cc. Prix : 20 fr.

Boîte de 2 ampoules de 20 cc. — 12 fr.

**Indications et Posologie.** — *A titre thérapeutique* : Toutes Hémorragies, Epistaxis, Hémoptysies, Métrorragies, etc., Hémorragies post-opératoires, etc.

*Faire boire*, dans un peu d'eau sucrée, 1 à 4 ampoules en 2 heures, selon la gravité de l'hémorragie.

*A titre préventif* : Chirurgie générale et spéciale, oto-rhino-laryngologie, odontologie, obstétrique, etc.

Une à quatre ampoules durant les dix heures qui précèdent l'opération.

Dans les cas d'hémorragies massives ou persistantes on se trouvera très bien d'injecter (sous-cutanée) 20 cc. d'*arhémapectine* une ou deux fois dans la journée (Ne pas agiter l'ampoule).

Ne présente aucune contre-indication.

### Laboratoire R. GALLIER

Pharm., Ex-interne des Hôpitaux de Paris, 38, bd du Montparnasse — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Téléph. : Littré 98-89.



## ARHÉOL

**Formule.** —  $C^{16} H^{24} O$ .

**Composition.** — Principe actif de l'essence de santal.

**Forme.** — Fl. de 40 capsules contenant chacune 0 gr. 20 environ de produit.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique et analgésique puissant dans toutes les affections des voies urinaires. Produit chimiquement pur n'occasionnant aucune des douleurs provoquées par l'essence de Santal, supérieure elle-même aux essences de Cèdre.

**Indications.** — Blennorragie et blennorrhée, cystites, urétrites, pyélites, pyélo-néphrites.

**Dose.** — 10, 12 capsules par jour, en 3 fois : le matin, à midi et le soir avant les repas.

Prix : 20 francs.

**Laboratoires P. ASTIER**

41, 42, 43 à 47, rue du Docteur-Blanche  
PARIS (XVI<sup>e</sup>)

---

## ARHINE LAMBIOTTE FRÈRES

Composé formaldéhydo-gaïacolo-tannique chimiquement défini, ni toxique, ni caustique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant antiseptique, modificateur et désodorisant.

**Indications.** — Réalise la véritable thérapeutique causale de l'Ozène, en fait disparaître la fétidité et les croûtes, tonifie la muqueuse. Excellent agent curatif du *coryza*, des *rhinites* et *rhinopharyngites*.

**Mode d'emploi.** — On l'utilise soit en *insufflations*, soit en prises : matin et soir dans l'ozène, après lavage à l'eau bouillie ou boriquée tiède ; 2 ou 3 fois par jour et le soir au coucher dans les *coryzas*, *rhinites*, *maux de gorge*.

Littérature et Echantillons :

**Produits LAMBIOTTE FRÈRES**

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

## ARMOSINE

(Capsules.)

**Régulatrice de la circulation du sang.**

**Formule.** — Extraits : Hamamélis 0,025, Condurango 0,0125, Viburnum 0,002, Sénéçon 0,0025, Marron d'Inde 0,0025, Bourdaine 0,005, Valériane 0,015, Piscidia 0,00125, Capsicum 0,002, Surrénale 0,001, Acide Phosphorique 0,0025 (pour une capsule).

**Indications.** — Troubles de Ménopause, Retour d'âge, Règles douloureuses, Retards, Nervosisme, Hémorroïdes, Varices.

**Doses.** — Suivant avis du Docteur : 3 capsules par jour, une au début des trois repas (sauf au moment des règles chez la femme).

Prix : 14 francs (traitement pour un mois).

Laboratoire Central Maubeuge

A. ROUX, Pharmacien

58, rue de Maubeuge — PARIS.

Tél. Trudaine 54-69.

## ARQUERITOL LESURE

Huile injectable d'amalgame d'argent  
à 40 p. 100 de mercure.

**Mode d'emploi.** — Identique à celui de l'huile grise : une injection intramusculaire par semaine, correspondant à 8 ou 9 centigrammes Hg.

**Indications.** — Toutes manifestations syphilitiques.

**Avantages.** — Injection non douloureuse, absence de nodosités, tolérance parfaite grâce à l'action propre de l'argent, et à son effet favorable sur l'assimilation du mercure.

Flacon de 5 gr. : 22 fr.

Se fait aussi sous la forme suppositoires.

Pharmacie VIGIER-LESURE

70, rue du Bac — PARIS.

## ARRHENAL ADRIAN

### Composition :

Méthylarsinate de soude chimiquement pur.

### Action :

Réalise le traitement arsénical par voie buccale avec tolérance parfaite même chez les personnes les plus délicates. Remplace avantageusement le cacodylate de soude.

### Indications :

Dermatoses, tuberculoses pulmonaire et viscérale, broncho-pneumonie, grippe, lymphatisme, scrofule, états de débilité, vomissements de la grossesse, arthritisme, asthme, intoxication palustre.

### Formes et mode d'emploi :

Gouttes : 10 à 20 gouttes par jour, dosées à 2 milligr. en 2 fois. Ampoules : à 50 milligr. et à 100 milligr. 1 à 2 par jour. Granulés à 1 et 2 cgr. : 2 à 6 par jour. Comprimés à 0,025 : 1 à 3 par jour.

### ADRIAN et C<sup>ie</sup>

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## ARRHÉNOMARTIOL

**Composition.** — Complexe de fer colloïdal électrique (Électromartiol) et de cacodylate de soude ou métharsinate de soude.

**Propriétés.** — Hématopoiétique, régulateur de la nutrition, analeptique.

**Applications.** — Anémie essentielle ou symptomatique, Asthénie nerveuse, Convalescences, Anorexie.

### Formes :

*Ampoules d'Arrhénomartiol :* Boîte de douze ampoules.

*Gouttes d'Arrhénomartiol :* Flacon de 25 cc.

Laboratoires **CLIN**  
PARIS

## ARRHÉNUCLÈNE BERGEVIN

**Composition.** — Complexe de Ferro-manganèse codiastasique, Arrhénaï, Sulfate de Strychnine et Fluorure de Calcium.

**Propriétés.** — Hématopoïétique, phagocytogène et névrosthénique.

**Indications.** — Toutes les **anémies** et les **asthénies**, le **surmenage**, l'**épuisement** et les **convalescences**.

**Mode d'emploi.** — De 7 à 11 ans, 1 pilule midi et soir ; 12 à 18 ans, 1 pilule matin, midi et soir ; à partir de 18 ans, 2 pilules midi et soir avant les repas.

Après 8 ou 15 jours de traitement, interrompre pendant une semaine, pour reprendre ensuite jusqu'à guérison.

Prix : 15 francs la boîte de 60 pilules.

**G. BERGEVIN**

Docteur en pharmacie  
CHATEAUDUN (Eure-et-Loir).

---

## ARSAMINOL

**Composition.** — 3 acétylamino 4 oxyphénylar-sinate de diéthylaminoéthanol, arsenical penta-valent (concentration : 26,13 p. 100).

**Propriétés.** — La toxicité de l'Arsaminol est environ six fois moindre que celle du 606 ou du 914. Élimination complète par l'urine au bout de quarante-huit heures.

**Applications.** — *Syphilis* (traitement d'assaut ou de consolidation), *Hérédo-Syphilis*, *Spiro-chétoses*, *Pian*, *Amibiases*, *Trypanosomiases*, *Paludisme*, *Diarrhées*, *Dysenteries à flagellés*.

**Formes.** — Ampoules de 3 ou de 5 centimètres cubes titrées à 5 centigr. d'arsenic par centimètre cube. Boîte de 4 ampoules.

*L'Arsaminol infantile* est délivré en boîte de 10 ampoules de 1 cm<sup>3</sup> 5, titrées à 25 milligr. d'arsenic par centimètre cube.

**Laboratoires CLIN — PARIS.**

## ARSÉNIODE BURIAT

**Forme Gouttes.** — Solution inaltérable de tri-iodure d'arsenic méthylarsinée à 1 p. 100.

**Indications.** — Tuberculoses torpides à manifestations lymphatiques, chlorose, symptomatique de tuberculose, anémies, convalescences (fixation d'oxygène).

Emphysème pulmonaire et manifestations du syndrome asthmatico-arthritique.

**Mode d'emploi.** — Doses moyennes.

Enfant : II gouttes par 24 heures et par année d'âge.

Adultes : XV à XXX gouttes, 2 fois par jour.

Prix : 14 fr.

**Laboratoire BURIAT**

25, rue Copernic — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

---

## ARSÉNOS-SOLVANT

**Adopté par les hôpitaux**

Serum glucosé avec addition de Gaïacol et de Chlorétone pour injections sous-cutanées ou intramusculaires d'arsénobenzènes

— Indolores —

**Présentation.** — Boîtes de 1, 6, 12 ampoules.

Voir *Sulfarsénol*.

**Laboratoires de Biochimie Médicale**

**Ch. Desgrez**, Docteur en Pharmacie.

19-21, rue Van Loo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Téléphone : Auteuil 26-62, 04-30.

## ARSI-STRYCHNAL LONGUET

Association « Strychnal-Cacodylate de Na »  
des dérivés non-toxiques de la strychnine  
et de l'arsenic.

Strychnal ..... 0 gr. 01

Cacodylate de Na..... 0 gr. 25

Sérum isotonique Q. S..... 3 cm<sup>3</sup>

par ampoule.

Injection rigoureusement indolore.

**Doses.** — 1 à 2 ampoules par jour.

**Indications.** — Anémie, Convalescence.  
(Voir Strychnal Longuet).

La boîte de 12 ampoules de 3 cc. : 18 fr.

**Laboratoires LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS.

## ARSYCODILE

Cacodylate de Soude pur.

**Formes.** — Ampoules dosées à 0,05, 0,10,  
0,20 et 0,50 pour applications progressives  
(*bien spécifier*).

**Indications thérapeutiques.** — Accéléra-  
teur de la nutrition générale, ramenant  
l'appétit, etc.

Tout spécialement désigné pour l'usage  
sous-cutané.

**Doses et mode d'emploi.** — Une injection  
par jour pendant huit jours, repos un  
temps égal, reprise en alternant jusqu'à  
guérison.

La première spécialité à base d'arsenic  
organique (1900).

Prix de vente au public : 12 fr. 50.

**Laboratoires du Dr M. LEPRINCE**  
62, rue de la Tour — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## ARSYLÈNE « ROCHE »

Acide allylarsinique.

L'Arsylène « Roche » est un arsenic organique nouveau qui, sur les préparations inorganiques, arséniates, arsénites, liqueur de Fowler, etc., etc., possède l'avantage d'une *toxicité pratiquement nulle*, laquelle permet son emploi à doses élevées, sans craindre la brusque apparition de phénomènes d'arsénicisme tels que sécheresse de la gorge et de la bouche, troubles digestifs et nerveux, symptômes cutanés, bouffées congestives, essoufflement, hyperthermie, etc. ; il est en outre *très bien toléré* par les voies digestives, ne provoque pas de dégagement d'oxyde de cacodyle (odeur alliagée de l'haleine) et il est *utilisé presque complètement* dans l'économie ; peut être substitué en toute sécurité, par le médecin traitant, aux cacodylates généralement employés, dans toutes leurs indications et à toutes doses.

### Indications thérapeutiques.

Affections nerveuses et mentales, *sclérose en plaques, Parkinson, contractures, chorée, mélancolie, anxiété, maladies de la peau, psoriasis, affections parasitaires, tuberculose au début, anémie grave, période de dépression du traitement Bi ou Hg*, toutes les *Anémies* et toutes les *Asthénies*.

### Posologie et mode d'emploi.

*Thérapeutique intensive.* — 1 à 4 ampoules de 5 cc. à 0,20 tous les 2 ou 3 jours en injections intramusculaires ou endoveineuses *absolument indolores*.

*Thérapeutique toni-stimulante.* — 1 ampoule de 2 cc. à 0,05 par jour et plus par voie hypodermique ou intramusculaire (injections *absolument indolores*). — *Enfants* : 1/4 ou 1/2 dose.

*Thérapeutique d'entretien.* — *Granules* à 0,01 : 1 à 3 granules. — *Enfants* : 1/4 à 1/2 doses selon l'âge, avant chaque principal repas.

### ARSYLÈNE « ROCHE »

*Granules* : Flacon de 60.

*Ampoules de 2 cc.* : Boîte de 12.

*Ampoules de 5 cc.* : Boîte de 12.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Co**  
21, place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

## ARTERASE

**Composition.** — Ail, gui, silice, citrate et formiate de soude, marron d'Inde, cupressus, prêle.

**Propriétés.** — Abaisse la tension artérielle. Diminue la viscosité sanguine. Active la circulation dans les capillaires et les veines. Arrête les hémorragies.

**Indications.** — Cœur, artères, veines. Présclérose, artériosclérose, hypertension, hémorragies (nasales, oculaires, cérébrales, etc.), hémiplegies, œdèmes. Etats congestifs, vertiges, bourdonnements, troubles visuels. Troubles de la ménopause.

**Posologie et mode d'emploi.** — 1 à 2 pilules le matin, à midi et le soir, soit 3 à 6 pilules par jour. Continuer 5 jours, cesser 2 jours et recommencer. Au début du traitement la dose de 6 pilules par jour sera préférée pour être ramenée à 3 par la suite. Pas de contre-indications.

**Laboratoires Biologiques**

**E. GILBERT, Docteur en Pharmacie**

6, rue du Laos — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## ARTÉRION VINCARDI

**Principes actifs.** — Complexes vitaminés et stabilisés extraits du *Viscum album*, de l'*Allium sativum*, du *fucus vesiculosus*, du *citrus limonum*.

**Forme.** — Capsules enrobées de gluten, ne se dissolvant qu'au contact des sucres intestinaux. **Innocuité absolue**, tolérance parfaite. Pas de contre-indication.

**Indications.** — Hypotenseur, sclérolysant, diminue la viscosité du sang. — **Action élective** au niveau des capillaires qu'il dégrasse et assouplit. — Artériosclérose. — Hypertension, scléronéphroses, présclérose.

**Doses.** — 5 à 6 capsules par jour aux principaux repas.

Littérature et échantillons sur demande.

**Laboratoire de l'Artérion VINCARDI.**

**Ph. VIQUIER, pharmacien**

2, avenue Borriglione — NICE (Alpes-Maritimes).

Chèques postaux : Marseille 105-38.

R. C. Nice 9046.



## ARTERIO-VEININE.

**Composition.** — Crataegus, passiflora, gui, marrons d'Inde, hamamélis (Extraits stabilisés), iode peptonisé.

**Indications.** — Troubles de la Ménopause, artério-sclérose, troubles nerveux, états congestifs quels qu'ils soient.

**Forme.** — Gouttes.

**Doses.** — De XX à LX gouttes avant chaque repas.

Prix : 14 francs.

**Laboratoires J. KRIEGER**

121, avenue de Saint-Ouen  
PARIS (XVII<sup>e</sup>)

---

## ARTORADINE

**Hypotenseur radioactif.**

**Composition.** — Iodure de Potassium et Arséniate de soude associés au Bromure de Radium soluble.

**Avantages.** — Suppression par la radioactivité induite des doses massives et, partant, du iodisme. Vitalisation des cellules artérielles par l'action directe du Radium. Innocuité absolue. Conservation indéfinie.

**Indications.** — Artériosclérose, présclérose, aortite, asthme, angine de poitrine, œdème, arthritisme.

**Polsoogie.** — 4 à 6 pilules (kératinisées) par jour en deux fois au milieu des repas.

**Laboratoire de Radiumthérapie**  
25, rue Vaneau — PARIS.

## ASCÉINE

Acet-salicyl-para-acet-phénétidine-caféine.

Analgésique sédatif, antirhumatismal. Par l'association synergique de ses composants, l'Ascéine réalise une médication efficace et inoffensive dont l'action principale et immédiate se traduit par l'atténuation ou la disparition de l'élément douleur.

**Indications.** — Toutes les algies : Névralgies, sciatique, migraine, etc., Grippe, Arthrites aiguës et toutes manifestations rhumatismales.

**Doses.** — Adultes : 2 à 4 comprimés par jour ; enfants : 1/2 à 2 comprimés.

**Prix.** — Le tube de 20 comprimés : 4 fr. 50.  
La pochette de 4 comprimés : 1 franc.

**LABORATOIRE O. ROLLAND**  
109-113, boulevard de la Part-Dieu — LYON.

---

## ASCIATINE

Diméthylamido-phényl-diméthyl-pyrazolone-butylchoral.

Analgésique et hypnotique.

*Action élective dans le domaine du trijumeau.*

**Indications.** — Douleurs dues aux diverses affections dentaires, douleurs consécutives aux interventions dentaires, névralgies à localisations diverses et particulièrement les névralgies faciales. Lumbago, dysménorrhée, insomnies.

**Présentation et posologie.** — Comprimés à 0 gr. 25 (boîtes de 3, 12, 24). 1 à 3 comprimés par dose. 4 à 5 par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## ASCLÉROSOL

Traitement de la sclérose et de l'artério-sclérose

### Composition :

Combinaison organique des principes actifs du *drosera rotundifolia* et de la silice.

En isolant du *drosera* les principes actifs, il a été obtenu une véritable combinaison chimique de ces principes avec la silice, combinaison dénommée *acide droserosilicique* et dans laquelle ce dernier acide n'existe plus sous sa forme minérale, mais sous une forme organique. En effet, les réactifs habituels de l'acide silicique ne révèlent plus cette substance dans l'acide droserosilicique qui est une véritable combinaison de la silice, analogue à celle de l'acide phosphorique dans la phytine.

C'est cet acide drosero-silicique qui constitue la base de l'asclérosol.

Sa formule a été établie de telle façon qu'une cuillerée à bouche contient 0 gr. 30 cgr d'acide drosero-silicique, correspondant à 0 gr. 07 cgr de silice assimilable.

Le médecin peut donc doser exactement la quantité de silice qu'il désire introduire dans un organisme où l'acide silicique est déficitaire.

**Prix :** 20 francs le flacon (2 flacons pour un traitement).

Préparé par de GENCY, pharmacien.

François CARTIER, 1, rue de la Martinière — LYON.

Agent général pour la France.

## ASCOLEINE RIVIER

L'ASCOLEINE est à base de lipoïde phosphoré iodé de foie de morue. Elle renferme les vitamines A et C, la vitamine D à l'état naturel, toutes les vitastérines des cellules hépatiques.

**Indications.** — Inappétence, anémie, convalescences, bronchite, prétuberculose.

**Quatre formes.** — *Solution huileuse* : Une cuillerée à café 1/4 d'heure avant chaque repas.

*Comprimés* (véritables bonbons) : 1 à 5 comprimés suivant l'âge avant chaque repas.

*Granulés* : De quelques grains à une cuillerée à café avant chaque repas suivant l'âge et depuis un an.

*Ampoules* : Une injection intramusculaire tous les jours ou tous les deux jours.

Toutes pharmacies ou à défaut chez :

**Henri RIVIER**, Pharmacien,

26-28, rue Saint-Claude — PARIS.

## ASEPTONE

L'antiseptique idéal en gynécologie.

**Formule.** — Menthol, trioxyméthylène, essence thym, sulfate de cuivre, acide borique, alun (deux formes), poudre et comprimés.

**Indications.** — Antisepsie des organes génito-urinaires de la femme, métrites, vaginites, salpingites, flueurs blanches, ulcération du col de la matrice, toilette intime.

**Avantages.** — Odeur agréable, solubilité parfaite, ne tachant pas le linge, ni toxique, ni caustique, décongestive, microbicide, laissant après l'emploi une agréable sensation de fraîcheur et calmant immédiatement les démangeaisons.

**Emploi.** — *Poudre* : 1 cuillerée à café par litre d'eau bouillie chaude en injections et lavages, matin et soir. *Comprimés* : 1 comprimé pour 2 litres, même emploi.

**Prescrire** : Une aseptone, poudre ou comprimés.  
Littérature et échantillons.

Prix au public : 10 francs.

Laboratoires **MOULIN**

50, rue de la République — PUTEAUX (Seine).

## ASEPTORADOL

Complexe à radioactivité stabilisée.

**Composition.** — Hyposulfite de soude associé au bromure de Radium en solution stable, rigoureusement dosée, d'absorption agréable.

**Propriétés.** — Action du bromure de Radium sur les échanges biochimiques. Action réductrice et désensibilisatrice de l'hyposulfite de soude sensiblement accrue par radioactivité induite (Ravaut, *Presse médicale*, 1920, Missirliu, *Thèse* 1922).

**Indications.** — Tous les Eczémas, Psoriasis présentant des poussées aiguës, Dermatoses évoluant par poussées récidivantes, Urticaires, Prurits, Dermites artificielles, Furonculose (Werner, Action du Bromure de Radium sur le staphylocoque).

**Posologie.** — XX à XXX gouttes avant chaque repas dans un liquide très sucré.

**Aucun des inconvénients des doses massives d'hyposulfite de Na** : ni diarrhée, ni éructations soufrées.

Établissements **LABORADIUM**

33, rue Saint-Jacques — PARIS.

## ASTHMYLOSE

**Forme.** — Sirop.

**Composition.** — Chaque cuillerée à bouche renferme :

Sirop thébaïque .....	10 gr.
KI pur et desséché.....	0 gr. 50
Sirop aromatique .....	Q. S.

**Indications.** — Asthme, Emphysème, Bronchite chronique.

**Avantages.** — Goût agréable. Dosage très rigoureux. Action rapide et durable. Pas d'intolérance ; *jamais d'iodisme.*

**Posologie.** — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe le soir au coucher *loin du repas.*

Dépôt général et échantillons :

**France.** — Laboratoires **TAETZ**  
2, rue Lesdiguières — PARIS (IV°).

**Belgique.** — **M. F. RAMLOT**  
72, rue de l'Escaut — BRUXELLES.

## ATHEROLYSINE

Spécifique de l'Artériosclérose et de ses conséquences. Silicate de Soude chimiquement pur et Extrait Aqueux de Viscum Album (extrait de Gui avec ses indosés organiques).

**Propriétés thérapeutiques.** — L'ATHEROLYSINE est le traitement *étiologique et symptomatique* de l'Athérome et des troubles concomitants propres à la cinquantaine (Silicate de Soude, antiscléreux, Viscum Album hypotenseur).

**Indications.** — Présclérose-Artériosclérose et Hypertension. Toutes Scléroses, Vertiges, Obnubilation intellectuelle, Céphalées, Bourdonnements d'oreilles, Troubles oculaires, Perte de la mémoire, etc.

**Forme.** — Granulés, comprimés-pastilles.

**Posologie.** — *Granulés* : 1 à 3 cuillerées à café.  
*Comprimés* : 2 à 6 par jour.

Laboratoires **JONIDS**  
DIJON.

## ATOLYSAN

**Forme.** — Granulé effervescent.

**Composition.** — Lactate de pipérazine, Bitartrate de lysidine, Quinate de lithine, Anhydrométhylènegitrate d'hexaméthylène tétramine, Théobromine sodique, Succinate de lithine, Citrate de soude, Phosphate de soude, Hexaméthylène tétramine.

**Indications.** — Manifestations arthritiques et rhumatismales.

**Posologie.** — 3 cuillerées à café par jour, chacune dans un verre d'eau.

*Etats aigus* : 3 cuillerées à soupe.

**Laboratoires MARONNEAU-MOREL**

156, rue des Fauvelles,

COURBEVOIE (Seine).

## ATOPHAN-CRUET

Marques déposées.

Acide phénylquinoléiné 2 — carbonique 4.  
Produit chimique pur. N'est pas un mélange de médicament.

**Formes.** — Boîtes de 20 cachets ou comprimés à 40 centigrammes.

**Propriétés thérapeutiques.** — Rhumatismes, goutte, névralgies.

**Mode d'emploi.** — Trois fois par jour un cachet ou comprimé pendant le repas. Accompagner l'emploi du médicament de boissons abondantes et alcalines.

Prix : 16 francs net (exempt d'impôt).

**Laboratoires CRUET**

13, rue Miollis — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## ATOPHANYL

Marque déposée.

**Atophan sodique.** — Salicylate de soude.  
Eau stérilisée.

**Forme.** — Boîtes à 5 ampoules pour injections intraveineuses ou intramusculaires.

**Indications.** — Formes graves et rebelles du rhumatisme musculaire ou articulaire, goutte, névralgies.

**Prix :** 36 francs net (exempt d'impôt).

---

**Laboratoires CRUET**

13, rue Miollis — PARIS (XV<sup>e</sup>)

---

## ATOQUINOL CIBA

Solvant uratique

Phénylcinchoninate d'allyle. Solvant de l'acide urique, favorise puissamment son élimination par voie rénale.

**Indications.** — Diathèse urique en général, goutte, rhumatisme, dermatoses d'origine arthritique et toutes manifestations uricémiques.

**Doses.** — Etats aigus : 2 à 4 cachets ou cuillerées à café de granulé par 24 heures.

Etats chroniques : 1 cachet ou cuillerée à café de granulé, 8 ou 10 jours par mois.

La boîte de 20 cachets : 15 francs.

Le flacon de granulé : 18 francs.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**

109-113, boulevard de la Part-Dieu. — LYON.

## **ATURAL**

### **Composition**

Poudre à base d'antilab-ferment et de citrate de soude.

### **Action :**

Produit physiologique, absolument inoffensif, dépourvu de goût, extrait du sérum du jeune veau.

Empêche la coagulation du lait dans l'estomac et en assure la digestion intégrale.

### **Indications :**

Intolérance lactée chez l'enfant et chez l'adulte.

Mauvaise digestion du lait et ses conséquences : vomissements, diarrhée verte des nourrissons, gastro-entérite, troubles digestifs divers.

### **Mode d'emploi :**

Une mesure (environ 1 gr.) pour 100 gr. de lait.

(Ne jamais porter à haute température.)

Prix : 14 francs.

### **Laboratoires RENARD**

35, rue de Paris — CLICHY (Seine).

Anciennement :

142, avenue de Clichy — PARIS.



## AVANAZOL COUTURIEUX

*Traitement du coryza.*

**Description.** — Comprimés composés de Levurine Extractive, extrait de gui et acore, pour le traitement du coryza : à employer dès l'apparition des premiers symptômes.

En flacons de 50 comprimés.

**Action thérapeutique.** — Les comprimés d'AVANAZOL provoquent une réaction de la muqueuse nasale et une phagocytose énergique (Levurine Extractive), avec disparition de la congestion (gui) et de l'irritation (acore).

**Indication.** — L'AVANAZOL constitue le traitement le plus efficace du coryza, à condition d'absorber, dès les premiers symptômes, 18 comprimés par jour en trois fois. Continuer à la dose de 12 à 20 comprimés par jour. On obtient ainsi l'avortement du coryza.

**Laboratoires COUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS.

---

## AZIGOL THEVENOT

**Crises convulsives. États nerveux.**

**Composition.** — Tartrate Borico-Calcique, Phényl-éthylmalonylurée. Extrait de Gelsémium et de Piscidia.

**Forme.** — Dragées.

**Indications.** — Toutes crises nerveuses, Epilepsie, Convulsions. Tous états nerveux : Asthme, Prurit, Eczémas, Urticaire.

A l'action suspensive des crises par le Phényl-éthylmalonylurée s'ajoute l'action du borotartrate de chaux, modificateur du tissu nerveux et celle des extraits végétaux qui diminuent la sensibilité périphérique et de certains organes, origine des réflexes déclanchant les crises.

**Dose.** — 2 à 6 comprimés par jour. On peut continuer le traitement par le Borocalcyl.

**Enfants :** 1/2 à 1 comprimé par jour.

Prix du flacon de dragées : 18 francs.

**Laboratoires THEVENOT — DIJON.**

## AZOTYL

**Composition.** — Lipoïdes spléniques et biliaires, cholestérine, goménol, camphre, Irradiés aux rayons ultra-violet.

**Forme.** — Ampoules et pilules.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication antibacillaire (tuberculoses).

### Doses et mode d'emploi.

A. (Ampoules) injections sous-cutanées ou intramusculaires (tous les jours ou tous les deux jours).

B. Pilules glutinisées, six par jour aux repas et dans l'intervalle des piqûres.

Prix de vente au public. Ampoules : 20 fr. :  
Pilules : 14 fr.

### LABORATOIRES « LOBICA »

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

---

## AZUFROL

*Soufre colloïdal.*

**Description.** — 1° Capsules kératinisées contenant 0 gr. 10 de soufre colloïdal sec, en flacons de 60 capsules ; 2° Pommade à 1/15 avec, comme excipients, vaseline et lanoline, en tubes d'étain de 45 grammes (usage externe).

**Action thérapeutique.** — Permet l'absorption du soufre colloïdal sous forme agréable, en évitant l'altération du soufre par le milieu acide de l'estomac, à des doses exactes et de conservation indéfinie.

**Indications.** — 1° Capsules : 4 à 12 par jour contre le rhumatisme chronique, les arthrites, l'acné, la séborrhée, la bronchite chronique, le saturnisme. Pour le traitement intensif y adjoindre les injections de sulfuration (voir plus loin).

2° Pommade : Toutes affections cutanées justiciables du soufre.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS.

**AZYM**

**S'oppose à la lenteur des digestions.**

**Présentation.** — Poudre.

**Composition.** — Bicarbonate, Phosphate, Sulfate de Soude, Hydrate de Magnésie, Carbonate de Chaux, Carbonate de Bismuth.

**Posologie.** — 1 cuillerée à café après le repas : 1 nouvelle cuillerée à café au cours de la digestion si l'on se sent incommode. *Très jeunes enfants et bébés* : 1/2 ou 1/4 de cuillerée à café.

**Indications.** — **Hyper et Hypochlorhydrie.** Affections gastro-intestinales de l'enfance. Intoxications alimentaires. Dermatoses d'origine gastrique. Vomissements.

Prix : 14 francs.

**Laboratoire PARET**

22, rue Guibal — MARSEILLE.

---

## BABEURRE « LA FAYE »

Préparé avec du lait frais à la Ferme de « La Faye » à Marllhes (Loire).

### Présentation :

- 1° Babeurre ordinaire (étiquette blanche) aux farines, aussi nourrissant que le lait, d'une digestion très facile. Pour les enfants et les adultes.
- 2° Babeurre léger (étiquette bleue) sans farine, alimentation transitoire, d'une digestion extrêmement facile, convient tout particulièrement aux enfants débiles, aux prématurés, aux vomisseurs. Est tout indiqué également pour les hépatiques.
- 3° Babeurre gras (étiquette rouge) suralimentation. Dans la convalescence, la croissance, peut remplacer le Yoghourt. Plus nourrissant et plus digestible que le lait.

Fournisseur des Hôpitaux, des municipalités de Lyon et de Saint-Etienne depuis 25 ans.

Echantillons et littérature sur simple demande :

**JEAN COURBON LA FAYE**

Ferme de « La Faye »

MARLHES (Loire).

## BABEURRE NUTRICIA

**Composition.** — Lait écréméensemencé de ferments lactiques sucré au saccharose.

**Présentation.** — Variétés : babeurre au froment sucré et non sucré. Babeurre au riz sucré et non sucré, en boîtes hermétiquement fermées assurant une conservation du produit pratiquement indéfinie.

**Indications thérapeutiques.** — Aliment de remplacement dans toutes les gastro-entérites de l'enfance. Le Babeurre simple ne peut être utilisé qu'un jour ou deux. Le Babeurre Nutricia, par son froment ou son riz, est un aliment complet dont l'emploi peut être prolongé.

Gastro-entérites avec vomissements : Babeurre froment.

Gastro-entérites avec diarrhée : Babeurre au riz.

**Mode d'emploi.** — Se conformer exactement aux indications formulées sur les boîtes.

**Léon CLAEYS**

65, bd Sébastopol — PARIS (I<sup>er</sup>).

## BACKERINE

### ACTIVÉE

Ferments du Docteur de BACKER et sels de magnésie.  
Modifiant l'organisme par développement des agents  
de fermentation.

**Forme.** — Ampoules, cachets, dragées.

**Indication.** — Traitement de toutes les hyperplasies  
(tumeurs, néoplasmes, fibromes, épithéliomas, carcinomes, sarcomes, etc.).

**Mode d'emploi.** — Injecter une ampoule SOUS LA  
PEAU, tous les quatre à six jours. On prescrira en  
même temps l'usage des dragées ou des cachets de  
ferments et de sels magnésiens, qui augmentent l'effi-  
cacité des injections. Prendre avant les repas, quatre  
cachets ou huit dragées par jour en moyenne, plus dans  
les cas d'urgence.

La boîte de 8 ampoules : 25 francs.

La boîte de cachets ou de dragées : 16 francs.

### LABORATOIRE AMIDO

**A. BEAUGONIN, Pharmacien**  
4, place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## **BACTÉ-PHAGES**

du Professeur d'Hérelle.

**Préparations de Bactériophages mono ou polymicrobiens.**

**Mode d'action.** — Le Bactériophage de d'Hérelle est un principe :

- 1° Qui détruit et dissout les bactéries.
- 2° Qui se régénère au cours de la lyse.
- 3° Dont l'action lytique se transmet indéfiniment.

**Avantages :**

- 1° Action puissante et rapide.
- 2° Innocuité absolue.
- 3° Pas de contre-indication.

### **I. — BACTÉ-INTESTI-PHAGE**

**Composition.** — Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes des voies intestinales (Entérocoques, Coli, Staphylocoques, Streptocoques, etc.).

**Indications.** — Entérites, Colites, Diarrhées infantiles.

**Mode d'emploi** — Ingestion buccale : Une ampoule matin et soir dans 20 cent. cubes d'eau alcaline.

### **II. — BACTÉ-COLI-PHAGE**

**Composition.** — Mélange de bactériophages adaptés à de nombreuses variétés de bacilles Coli ou paracoli.

**Indications.** — Colibacilluries, Pyélites, Pyélonéphrites, Cystites, Métrites, Prostatites, etc.

**Mode d'emploi.** — Ingestion buccale : une ampoule matin et soir dans 20 cent. cubes d'eau alcaline. Instillation vésicale. (Voir notice explicative.)

**Très important.** — L'action du Bacté-Coli-Phage est nulle en milieu acide. Il est donc nécessaire d'obtenir l'alcalinisation des urines.

### III. — BACTÉ-PYO-PHAGE

**Composition.** — Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes des infections purulentes (Staphylocoques, Streptocoques, Coli, etc.).

**Indications.** — Furoncles, Anthrax, Panaris, Phlegmons, Ostéites, Plaies infectées.

**Mode d'emploi.** — Injection « in situ » (méthode RAIGA) dans le foyer même de l'infection ou dans la région enflammée pouvant passer rapidement à l'état aigu.

### IV. — BACTÉ-STAPHY-PHAGE

**Composition :**

Mélange de bactériophages adaptés aux diverses variétés de Staphylocoques (*Aureus-Citreus-Albus*).

**Indications :**

Furunculoses aiguës et chroniques, Anthrax, Infections urinaires à staphylocoques.

**Mode d'emploi :**

Injectons « in situ » (méthode RAIGA). Applications locales en cas d'ulcération.

## V. — BACTÉ-RHINO-PHAGE

**Composition.** — Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes du rhino-pharynx (Staphylocoques, Streptocoques, Pneumocoques, Entérocoques, etc.).

**Indications.** — Grippe, Coryza, Rhino-pharyngites, Otites, Sinusites.

**Mode d'emploi.** — Pulvériser suivant la gravité des cas la valeur d'une ou plusieurs ampoules au moyen du pulvérisateur spécial : Pulvolyseur Ercé.

## VI. — BACTÉ-DYSENTÉRI-PHAGE

**Composition.** — Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes de la dysenterie bacillaire (Flexner, Shiga, Fliss).

**Indication.** — Dysenteries bacillaires sous toutes les formes.

**Mode d'emploi.** — Ingestion : Une ampoule dans un demi-verre d'eau ordinaire froide ; répéter la dose de quatre en quatre heures.

Agents Généraux :

Laboratoires **ROBERT** et **CARRIÈRE**

37, rue de Bourgogne — PARIS.



## BACTÉRIOPHAGES LECLERC

**STAPHYLOPHAGE :** Bactériophage anti-staphylococcique.

**ENTEROPHAGE :** Bactériophage anticoli.

### Composition :

Tous deux sont des bactériophages préparés selon d'Hérelle. Ils sont polyvalents, c'est-à-dire lysent plusieurs types soit de Coli, soit de staphylocoques.

### Présentation :

Ampoules de 2 cc. (boîtes de 10 ampoules).

### Indications :

**ENTEROPHAGE :** Manifestations aiguës de l'infection intestinale.

**STAPHYLOPHAGE :** Toutes les staphylococcies localisées ou généralisées.

### Mode d'emploi :

*En ingestion :* Sans aucun inconvénient, on peut à tout âge ingérer une ou plusieurs ampoules par jour, à distance des repas, dans un peu d'eau froide.

*En injection :* Dans les infections aiguës, à la dose de 1 cent. cube par piqûre, sans jamais dépasser 3 piqûres s'échelonnant sur une durée de 3 jours.

*En pansement :* Le Staphylophage peut, en outre, s'employer en pansement en appliquant sur la région infectée une compresse stérile imbibée du contenu d'une ampoule.  
Littérature, Echantillon sur demande.

Prix : 25 fr. la boîte de 10 ampoules.

### Etablissements T. LECLERC

Docteur P. Lemeland, pharmacien,  
10, rue Vignon — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## BACTIOXYNE

**Formes.** — Gouttes.

Ampoules pour instillations rectales.

Ampoules pour injections intraveineuses.

**Propriétés thérapeutiques.** — Manganate calcico-sodico-potassique. Médication antibacillaire, hyperoxydante et recalcifiente.

**Indications.** — Prétuberculose ganglionnaire et osseuse.

**Posologie.** — LX à C gouttes 2 fois par jour, de X à XXX gouttes pour les enfants ; en augmentant progressivement de 1 à 2 par jour.

Prix de vente au public : 25 francs.

**Laboratoires CARTERET**

15, rue d'Argenteuil — PARIS (1<sup>er</sup>).

## BAIN CARBOGAZEUX WOLO

**Forme :**

Poudres qui, dissoutes, produisent assez d'acide carbonique pour saturer l'eau du bain, sans attaquer les baignoires.

**Indications :**

Maladies du cœur et de l'appareil circulatoire : hypertension, artériosclérose, etc.

Prix : 8 fr. 45 le bain.

**Laboratoires FISCH et C<sup>ie</sup>**

4, rue d'Illzach — MULHOUSE.

Dépôt à Paris : 49, rue de Paradis.

Tél. : Provence 30-32.

## BAIN CARRÉ

Bain marin complet.

**Composition.** — Bain iodo-bromo-chloruré, renfermant intacts tous les sels marins naturels.

**Indications.** — *Adultes* : nervosisme, asthénie, surmenage, convalescences, rhumatisme, arthritisme.

*Enfants* : Débilité, lymphatisme, troubles de la croissance, rachitisme.

**Gynécologie** : Traitement des affections gynécologiques, irrigations vaginales hygiéniques.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 1 boîte par bain.

*Enfants* : 1/2 ou 1/4 de boîte suivant la capacité de la baignoire.

Bains toniques et stimulants : 28° à 34°, 15 minutes.

Bains sédatifs : 34 à 39°, 25 à 40 minutes.

Injectons vaginales : une cuillerée à soupe par litre d'eau chaude.

### LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## BAIN SALVIA

(Bagnoles-de-l'Orne chez soi.)

**Composition.** — Silicate de magnésie hydraté, perborate de sodium, nitrate d'uranium.

**Présentation.** — Poudre en étui, chaque étui pour un bain.

**Indications.** — Varices, phlébites, arthritisme, rhumatismes et toutes affections de la circulation sanguine.

**Posologie.** — Un bain à la température d'environ 37°, pendant 20 minutes, traitement de 21 jours.

Prix de la cure de 21 bains Salvia au public : 136 fr. 50 ; au corps Médical, 91 fr. 50.

Les personnes qui ne peuvent se rendre à Bagnoles peuvent faire leur saison chez elles par une série de 21 « Bains Salvia » pendant 21 jours consécutifs.

Cette série peut être encore ordonnée de temps à autre, entre deux cures à Bagnoles.

Après chaque bain, faire un léger massage à l'aide d'un peu de poudre mise en réserve. Ensuite, repos allongé d'une demi-heure environ.

**Laboratoires VENOT**

101, avenue Mozart — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## BAINS MÉDICAMENTEUX

du D<sup>r</sup> Fayès.

- A. Sulfamidine** (Bain de Barèges, sans odeur et sans émanations salissantes), affections rhumatismales, sciatique, névralgie intercostale, arthrite chronique, hydarthrose, rhumatisme déformant des extrémités. — Une boîte pour un grand bain ; une cuillerée à soupe pour un bain de mains ou de pieds.
- B. Bain alcalin aromatique** (carbonate de soude purifié, amidon, essences de lavande, de thym, etc.), bain hygiénique par excellence, déterge et fortifie la peau ; complément efficace de la médication alcaline, dans les affections gastro-hépatiques et chez les arthritiques goutteux. — Une boîte pour un grand bain, un quart de boîte pour un bain d'enfant.
- C. Bain sédatif anti-nerveux** (formule de Nérís complétée par un parfum très doux). Tous les syndromes névropathiques, même ceux qui sont l'expression d'une lésion organique du système nerveux. — Une boîte pour un bain.

**Laboratoires des Produits Fayès.**

199, rue Saint-Denis — PARIS (II<sup>e</sup>).

---

## BALDISEDAN

(BALsamique, DIurétique, SÉdatif, ANti-septique.)

### Composition.

Salol .....	0.02
Benzo-Naphtol .....	0.02
Extrait mou d'uva ursi....	0.05
Hexaméthylénetétramine...	0.05
Térébenthine de Venise....	0.05
Acide camphorique.....	0.10
Excipient q. s. pour une pilule glutinisée.	

### Indications.

Cystites.

Colibacilluries et toutes Pyuries.

Pyélo-néphrites. Cholécystites.

Gonorrhées et complications.

### Propriétés thérapeutiques.

Antiseptique et Sédatif génito-urinaire.

Aseptise et clarifie les urines

dont il modifie le p. H.

Tolérance parfaite, sans aucune contre-indication.

### Doses.

4 à 5 pilules avant chacun des deux principaux repas.

Littérature et échantillons :

**Laboratoires du BALDISEDAN**

133, rue Lecourbe — PARIS.

Téléphone : Vaugirard 48-10.

## BALLOTYL

Agent le plus efficace  
de la Phytothérapie Antispasmodique.  
Sédatif du grand sympathique.

### Composition :

Alcoolature stabilisée de Ballote aromatisée.

### Posologie :

*Irritabilité nerveuse.* L à C gouttes au  
coucher.

*Etats sympathicotoniques ou vagotoniques.*  
5 prises de XXX gouttes par 24 heures.

Prix au public : 15 francs.

**Laboratoire de PHYTOTHÉRAPIE de  
PARIS**

**M. GUILLON, Pharmacien.**

113, boulevard Voltaire — PARIS (XI<sup>e</sup>).

## BALMIGA

Tablettes fumigatoires.

### Forme pharmaceutique :

Tablettes comprimées effervescentes.

### Composition :

Baume du Pérou, Huile de pin sylvestre, Essence  
d'eucalyptus, Essence de thym, Essence de  
menthe, Menthol.

### Action :

Antisepsie des voies respiratoires par inhalation.

### Indications :

Grippe, Bronchite, Extinction de voix, Coryza,  
Rhinite, Sinusite, Laryngo-trachéites.

### Mode d'emploi :

Mettre successivement deux ou trois tablettes  
*Balmiga* dans un verre d'eau bouillante et prendre  
deux ou trois fumigations par jour.

Prix : 6 francs.

**Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND**  
18, rue Pierre-Curie — PARIS (V<sup>e</sup>).

## BALSAMOL LESCÈNE

**Composition.** — Drosera, Scille, Chlorocinnamates, Benzoate de Benzyle.

**Formes.** — Sirop, Comprimés.

**Caractéristiques.** — Produit non toxique plus calmant que le bromoforme, les composés forméniques et les narcotiques. *Chez les enfants*, il peut être administré à partir de 5 à 6 mois.

Antiseptique des voies respiratoires.

**Indications.** — TOUX, COQUELUCHE, toux émétisante des tuberculeux, asthme, *toux des vieillards*. GRIPPE.

**Doses.** — *Enfants* de plus de 6 mois : 3 à 10 cuillerées à café par jour suivant l'âge, ou 3 à 10 comprimés.

*Adultes* : 3 à 5 cuillerées à soupe par jour ou 6 à 15 comprimés par jour.

Prix : Sirop, 12 francs. Comprimés, 11 fr. 90.

Laboratoires L. LESCENE

PARIS, 58, rue de Vouillé. — LIVAROT (Calvados)

Téléph. : Vaugirard 08-19.

## BALSOFORME

Mélange de Schleich

additionné de Gomenol Prevet

(formule du docteur Siauve-Evaussy).

Le Balsoforme associe les propriétés du mélange de Schleich à l'action balsamique du Gomenol.

**Indications.** — Anesthésie générale, exempte de complications pulmonaires post-anesthésiques.

**Posologie et mode d'emploi.** — Verser dans l'appareil d'Ombredanne le contenu d'une ampoule de 60 grammes.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III).

## BAUME ADOL

**Composition.** — Préparation à base de : Acide salicylique, Salicylate d'Amyle, Gaïacol, Menthol, Chloroforme.

**Action thérapeutique.** — Analgésique puissant anti-rhumatismal. Suppression de l'odeur désagréable du salicylate de méthyle.

**Indications.** — Rhumatismes aigus ou chroniques, goutte, lumbago, *torticolis*, zona, sciatique, névralgies, migraines, coliques hépatiques et néphrétiques, orchites, etc...

**Mode d'emploi.** — Faire une friction légère et une onction et recouvrir d'ouate et de tissu imperméable. Une à deux applications par jour.

Prix : 8 fr. 50.

### Laboratoire ADOL

L. GIROUD, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
78, Cours de la Liberté — LYON.

## BAUME AROMA

Spécifique des rhumatismes et des douleurs en général.

**Composition et forme.** — Baume à base d'essence de plantes aromatiques et des constituants du liniment de Rosen.

Essences aromatiques.....	6	Salicylate d'amyle .....	4
Beurre de muscades .....	2	Acide salicylique.....	3
Vaseline.....	60		

**Propriétés thérapeutiques.** — Analgésique et résolutif puissant. Odeur agréable.

**Indications thérapeutiques.** — Rhumatisme aigu et chronique, goutte, lumbago, *torticolis*, efforts et toutes douleurs musculaires, courbatures, névrites, sciatiques crurale et brachiale, pleurésie sèche, points de côté, foulures, varices.

**Mode d'emploi.** — Frictionner doucement et longtemps avec le baume pour en faciliter la pénétration. Etendre ensuite sur toute la région douloureuse une légère couche de Baume et recouvrir avec une feuille de coton ordinaire que l'on maintiendra par une bande ou une ceinture, suivant qu'il s'agit d'un membre ou du thorax et des reins. Faire cette friction suivie du pansement une à deux fois par jour.

### Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

A Bruxelles: LE MARINEL, pharmacien, 273, rue Victor-Rauter.



## BAUME BENGUÉ

Analgésique.

**Composition.** — Menthol, salicylate de méthyle, lanoline.

**Indications.** — Rhumatisme, goutte, névralgies, points de côté, douleurs abdominales, douleurs de la gorge.

**Mode d'emploi.** — En onctions deux fois par jour en recouvrant d'une serviette ou flanelle.

**Docteur BENGUÉ**

Pharmacien

16, rue Ballu — PARIS (IX<sup>e</sup>).

---

## BAUME DELACOUR

*Gerçures et Crevasses des Seins*

*Gerçures en général.*

**Baume benzo-tannique**

**Mode d'emploi.** — Laver la crevasse avec de l'eau bouillie et un tampon d'ouate, appliquer le baume avec le pinceau qui accompagne le flacon et recouvrir les mamelons avec les bouts de sein en métal afin d'éviter le frottement du linge.

Prix du flacon avec le pinceau et deux bouts de sein :

6 fr. 50.

**Henry ROGIER**, Docteur en Pharmacie  
56, boulevard Péreire — PARIS.

**BAUME DE LA MATERNITÉ****Composition :**

Chlorhydrate d'amyléine.....	0,10
Résorcine.....	0,20
Acide borique.....	2 gr.
Dermatol.....	0,50
Baume du Pérou.....	0,10
Lano-vaseline.....	Q. S.

pour un tube.

**Propriétés thérapeutiques.** — Cicatrisant énergique des crevasses du sein et de toutes les gerçures.

**Indications.** — Erythème fessier, toutes gerçures en général.

Prix, le tube : 5 fr.

**Laboratoires NOGUES**

11, rue Joseph-Bara — PARIS.

---

## BAUME DU D<sup>r</sup> BAISSADE

**Composition.** — Association de camphre, soufre, goudron, huile de chaulmoogra, de consistance semi-fluide, d'odeur agréable.

**Action.** — Anti-prurigineux et analgésique, supprime immédiatement les Démangeaisons et la Douleur. Antiseptique puissant, calme et arrête l'élément inflammatoire des lésions cutanées.

Aucune causticité ; peut être appliqué sur les Eczémas les plus aigus et les plus récents, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte.

**Indications.** — Eczémas suintants, secs, aigus, chroniques. Tous les prurits, avec ou sans lésion cutanée. Lichen, Psoriasis, Acné, Folliculites, Furunculose, Impétigo, Séborrhée de la barbe et du cuir chevelu, Sycosis, Gerçures des seins, Papules et Pustules des fièvres éruptives.

**Mode d'emploi.** — En onction douce (Dermites aiguës), ou énergiques (Dermites chroniques) sur les parties malades, à la main nue ou à l'aide d'un tampon de coton. Recouvrir d'une compresse de gaze.

Un pansement par jour, le soir de préférence.

Ne pas laver la région traitée avant complète guérison ; se contenter d'essuyer et de détacher les squames épidermiques avec un linge.

Prix au public : 9 fr. 50 et 13 fr. 50.

**Laboratoire du Baume du D<sup>r</sup> BAISSADE**

Saint-Loup — MARSEILLE.

## BAUME DURET

Créé et adopté à l'hôpital Saint-Louis  
(Dermatothérapie).

**Composition.** — Combinaison de soufre, goudron de Norvège, camphre, huile de cade, résorcine, borate de soude, gaïacol, dans un mélange d'acétone, huile de ricin, lanoline.

**Propriétés.** — Antiseptique, analgésique, décongestif et cicatrisant. Ni toxique, ni irritant.

**Indications.** — Eczéma, Lichen, Psoriasis, Acné, Prurigo, Dartres, Parakératoses, Prurit.

**Mode d'emploi.** — Onction deux fois par jour, recouvrir ensuite d'une compresse de gaze.

Prix : 15 francs.

**H. ROUTIER, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**  
20, rue Saint-Lazare — PARIS.

---

## BAUME RHODIA

à base de Rheumacylal  
(Salicylate de Glycol)

Succédané inodore de salicylate de méthyle.  
Ne tache pas le linge, n'est pas irritant.

*Indications :*

**Traitement externe des douleurs  
rhumatismales et des névralgies.**

*Présentation et mode d'emploi :*

Deux présentations : Forme liquide et forme crème.

Onctions légères suivies d'enveloppement ouaté.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III)<sup>e</sup>.

## BAUME SAINT-ANTOINE

**Composition.** — Baume à base d'essences antiseptiques, décongestives et antiprurigineuses.

**Avantages.** — Inodore, non toxique, ne tache pas le linge.

**Indications.** — Plaies atones, Ulcères variqueux, Fistules, Hémorroïdes, Dermatoses, Furoncles, Acné, Eczéma, Sycosis, Affections des muqueuses, Coryza, Métrites, Brûlures, etc.

**Mode d'emploi.** — En applications locales.

Prix :

En France : 11 fr. 20. — A l'Etranger : 20 fr.

**Laboratoires de L'ADOUR**  
38, rue Soult — TARBES (H.-P.).

---

## BAUME SÉLÉNIA

AU SÉLÉNIUM COLLOIDAL

**Propriétés thérapeutiques.** — Il en est quatre principales :

Le Baume Sélénia est *décongestif*, calme la *démangeaison*, le *prurit*, décape les *téguments*, est *cicatrisant*.

**Indications.** — Il est le médicament de choix dans le traitement des *Eczémas*, *Pyodermites*, *Ulcérations de la peau*, *Bouton d'Orient* (Clou de Biskra).

**Mode d'emploi.** — S'applique à froid, mais de *préférence à chaud*, l'action étant ainsi plus immédiatement calmante et plus grande. Dans ce cas, liquéfier le Baume complètement au bain-marie.

Prix du pot : 13 francs.

Echantillon envoyé sur demande.

Préparé par **C. DAVID et ses fils**

Pharmaciens, 49, rue de Bitché — COURBEVOIE  
(Seine).

## BAUME SUELTA

### Composition :

Extrait de Marrons d'Inde stabilisé. Di-Iodosulforsorcinate de Bismuth, Stovaïne, Adrenaline 0,001 p. 100, Baume du Pérou.

### Indications et propriétés :

Traitement local des Hémorroïdes externes et internes, fissures, prurit anal. **Sédation immédiate de la douleur, décongestion et vasoconstriction**, antiseptie, suppression des hémorragies.

### Mode d'emploi :

Onction le matin et après chaque garde-robe. Pansement pour la nuit. Une canule s'adapte au tube pour permettre l'application de la Pommade sur les Hémorroïdes internes.

Prix : 13 francs.

**MICHEL DELALANDE**

16, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE (Seine).

## BAUMOLACPININE

pour bains à l'essence de pin.

**Forme.** — Liquide de fluorescence verte.

**Composition.** — Essence de pin soluble dans l'eau, ne salissant pas les baignoires.

**Indications.** — Convalescence, Faiblesse, Débilité, Anémie, Maladies nerveuses, Rhumatismes, Arthritisme.

**Posologie.** — Une à deux cuillerées à soupe par bain.

Prix :	{	Flacon de	30 gr ...	5 fr. 80
		— de	150 gr....	23 fr. 80
		— de	500 gr....	60 fr. »
		— de	1 000 gr....	110 fr. »

**Laboratoires FISCH et C<sup>ie</sup>**

4, rue d'Illzach, MULHOUSE

Dépôt à Paris : 49, rue de Paradis.

Tél. : Provence 30-32.

## BEATOL

**Propriétés thérapeutiques.** — Sédatif nerveux, Hypnotique.

**Indications.** — Insomnies, Affections aiguës et chroniques, Intoxications, Maladies nerveuses ou mentales.

1<sup>o</sup> Forme : Ampoules.

**Composition :**

Diéthylmalonylurée .....	0 gr. 25
Bromhydate de scopolamine.	1/4 de mgr.
Soluté de valériane.....	2 cm <sup>3</sup>

**Mode d'emploi.** — Le contenu d'une ampoule en injection sous-cutanée.

2<sup>o</sup> Forme : Liquide.

**Composition :**

Diéthylmalonylurée .....	0 gr. 18
Valériane stabilisé Q. P.....	5 cm <sup>3</sup>
Extrait de jusquiame .....	0 gr. 015

**Mode d'emploi.** — 1 à 4 cuill. à café par jour, par doses progressives prises dans de l'eau sucrée, avant le repas du soir, ou au coucher.

3<sup>o</sup> Forme : Comprimés.

**Composition :**

Diéthylmalonylurée .....	0 gr. 18
Intrait de valériane .....	0 gr. 10
Extrait de jusquiame.....	0 gr. 02

**Mode d'emploi.** — 2 à 6 comprimés pris avec de l'eau ou une infusion chaude une heure après le repas.

**Prix de vente au public :** Comprimés : 12 fr. ;  
Liquide : 12 fr. ; Ampoules : 15 fr.

**LABORATOIRES LOBICA**

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## **BEEF LAVOIX**

### **ou Vin de Lavoix.**

**Composition.** — A base de vieux vin de Banyuls, le Beef Lavoix contient les principes nutritifs de la viande, les principes actifs du quinquina et des phosphates.

**Indications.** — Convalescence.  
Tuberculose.  
Epuisement.  
Inappétence.  
Anémie.  
Grossesse.  
Allaitement.

**Posologie.** — Un verre à madère avant ou après chaque repas.

Prix : le flacon, 20 fr. 75 ; le 1/2 flacon, 12 fr. 50

**Maison du Docteur PILLET**  
5, avenue Victoria — PARIS.

---

## **BELHÉMINE**

Ampoules de Sérum pur de Sang de Cheval, Sérum hématopoiétique.

**Indications.** — Toutes les anémies, hémorragies, fausses-couches. En pansements locaux : plaies, ulcères variqueux, brûlures.

**Mode d'emploi.** — Par voie buccale : 1 à 2 ampoules par jour.

Prix public : 18 francs la boîte de 6 ampoules.  
Compléter le traitement par l'usage de la

## **SANGUIPLASMINE.**

Granulé préparé avec le Caillot sanguin : 2 cuillerées à café par jour.

Prix au public : 12 fr. le flacon.

Littérature et échantillons sur demande.

## **Laboratoire de Sérothérapie**

**H. AMMANN, Pharmacien, Licencié ès sciences.**  
**BOULOGNE-BILLANCOURT, 76, rue Escudier.**  
Tél. : Molitor 01-90.



## **BELLADENAL « SANDOZ »**

Association de Phényl-éthyl-malonylurée et de Bellafoline.

Sédatif nervin général et des cas résistants.

**Indications spéciales.** — Epilepsie, angine de poitrine, tremblements, asthme, tous états de crise, anxiété, vomissements de la grossesse.

**Posologie.** — 2 à 4 comprimés par jour.

Epilepsie : 3 à 5 comprimés.

*Enfants.* — 2 à 4 demi-comprimés.

**Produits SANDOZ,**

3 et 5, rue de Metz, Paris (X<sup>e</sup>).

*Dépôt général et vente :*

**Usine des Pharmaciens de France,**

129, rue de Turenne, Paris (III<sup>e</sup>).

---

## **BELLAFOLINE SANDOZ**

**Alcaloïdes totaux de la belladone.**

Antispasmodique à effets constants. Modérateur des sécrétions.

**Posologie :**

*Comprimés :* 1 à 2, trois fois par jour.

*Gouttes :* X à XX, trois fois par jour.

*Ampoules :* 1/2 à 2 par jour.

*Sirop :* 2 à 6 cuillerées à café par jour.

**Naupathie :**

**Bellafoline :** 4 comprimés par jour, un de 2 heures en 2 heures, et en plus :

**Belladénal :** 2 comprimés pris à la fois le soir au coucher.

**Produits SANDOZ,**

3 et 5, rue de Metz — PARIS (X<sup>e</sup>).

*Dépôt général et Vente :*

**Usine des Pharmaciens de France**

129, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

## BEMAX

Aliment vitaminé préparé avec les embryons détoxiqués des céréales (orge, froment, seigle). Une cuillère à soupe de Bemax est plus riche en vitamines que quatre livres de pain complet.

**Préparation.** — Est faite sous la surveillance constante d'un service médical. Par des procédés spéciaux on arrive à conserver et même à concentrer toutes les vitamines (A, B et E) des céréales, surtout les vitamines B.

**Propriétés thérapeutiques.** — Le plus précieux des compléments de notre alimentation actuelle.

**Indications.** — Tous les troubles, provenant d'une alimentation insuffisante en vitamines.

**Doses.** — Une cuillerée à soupe par jour pour les *adultes* ; pour les *enfants* : une cuillère à café. — D'un goût agréable se prend mélangé à n'importe quel aliment au repas du matin et du soir.

Prix : 22 fr. 50 (boîte pour un mois).

**ROBERTS et C<sup>ie</sup>, Pharmaciens**

5, rue de la Paix — PARIS (II<sup>e</sup>).

Tél. : Central 69-86.

---

## BENZO-BISMUTH MILLOT

(Ampoules, Antisypilitique énergique.)

*Adopté par le Ministère de la Santé et les Hôpitaux.*

**Indolores. — Ni abcès. — Ni enkystement.**

Le **Benzo-Bismuth**, sel soluble, contient 4 centigrammes de Bismuth métal par injection (soit 0 gr. 20 de sel), quantité nécessaire pour obtenir l'effet thérapeutique maximum avec une absence complète de toxicité, car il s'agit ici de 4 centigrammes de métal intégralement actif puisque intégralement absorbé. Ce qu'on ne peut obtenir avec un sel insoluble.

Le **Benzo-Bismuth**, présenté sous forme de poudre, extemporanément soluble, s'injecte dans les muscles de la région fessière haute avec autant de commodité qu'une banale injection de caco-dylate.

Le traitement se fait par séries de 10, 15 ou 20 injections bi-hebdomadaires ou tri-hebdomadaires en cas d'urgence.

Les résultats thérapeutiques sont tout à fait comparables à ceux qu'on est accoutumé d'attendre des arsénobenzols, sans aucun des dangers ni inconvénients de ces derniers.

Les accidents primaires et secondaires disparaissent rapidement. Les syphilis viscérales et nerveuses sont profondément et durablement influencées.

La réaction de Bordet-Wassermann devient négative dans des délais très courts et reste négative sous l'influence du traitement benzobismuthé.

Vendu en boîtes contenant poudre et solvant pour 5 injections. Prix médical : 12 francs.

*Nota.* — Le prix médical ne peut être accordé qu'aux commandes adressées directement à nos Laboratoires.

**Laboratoires MILLOT**

54, rue de la Bienfaisance — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

Tél. : Laborde 0-69.

## BENZOFLORINE JULIEN

Gouttes.

### Composition :

Extr. fluide valériane fraîche stabil...	1000
Alcoolature de Passiflora Incarn.....	1000
Teinture de Cratoëgus oxyacantha...	1000
Benzoate de benzyle et dériv. benzylés.	10

**Indications.** — Tous les états spasmodiques, Insomnies, Angoisses, Vertiges, Eréthisme cardio-vasculaire, Tachycardies, Arythmies, Palpitations.

**Posologie.** — Insomnies : L à LX gouttes le soir dans une infusion.

Spasmes : XXV gouttes 3 à 4 fois par jour.

Prix : 13 fr. — Flacon gratuit sur demande.

**Louis JULIEN**

Docteur en Pharmacie

105, rue de Rennes — PARIS.

## BENZO-IODHYDRINE

(Capsules de)

La Benzo-Iodhydrine n'est pas seulement la première réalisation de la cure iodée, sans iodisme (Thèse du D<sup>r</sup> Chenal, F. M. Paris, novembre 1896), elle est aussi un corps iodé qui présente une activité thérapeutique très puissante, très étendue, et rare parmi les corps iodés.

C'est un médicament **iodé hypotenseur diurétique, éliminateur puissant d'acide urique**. Ces diverses qualités en font le médicament par excellence des cardio et des artério-scléreux, des gouteux, des emphysémateux. Chaque capsule de gluten correspond à 30 cgr. de KI.

**Doses.** — 3 à 10 capsules par jour, aux heures des repas.

Le flacon : 14 francs. Brochures et échantillons.

**G. BRUEL**

36, rue de Paris — COLOMBES (Seine).

## BENZOPHOSPHINE CHRISTIAENS

(Antiseptique des Voies urinaires et de l'intestin.)

**Seul solubilisant de l'Oxalate de Chaux.**

**Indications.** — Coliques néphrétiques. Lithiase rénale. Diathèses urique et *Oxalurique*, Fermentations du tube digestif.

**Composition.** — Phosphines, benzoate, magnésie.

**Doses.** — Moyenne de 3 cuillerées à café par jour, empêche la précipitation de l'Oxalate de Chaux et par suite, la formation de calculs oxaluriques.

**Dose** de 6 cuillerées à café, comme dissolvant des Calculs.

N'irrite pas le rein comme le fait l'Urotropine  
et a au contraire une action nettement séda-  
tive.

2, rue du Champ-de-Mars — REIMS.

---

## BENZOQUINOL

**Composition.** — Benzoate de quinoléine, pyridine, thymol, benjoin mentholé eucalyptolé, aconit, créosote iodée.

**Propriétés.** — Antiseptique et anesthésique des voies respiratoires. Sédatif et antispasmodique certain.

**Indications.** — *Coqueluche, asthme, emphysème, toux nerveuses, dyspnée, bronchites aiguës et chroniques.*

**Caractéristiques.** — Effet rapide et continu, pas de contre-indication.

**Mode d'emploi.** — En inhalations, quinze gouttes dans un quart de litre d'eau bouillante, deux à trois inhalations par jour.

Pour les enfants en bas-âge, faire les inhalations au pied du lit dans une chambre bien fermée.

**Remarque.** — Que le médecin traite la coqueluche par des vaccins, des injections d'éther, de sérum, il est nécessaire de compléter le traitement par des inhalations au benzoquinol.

Prix : 12 francs.

**Laboratoires KERFYSER**  
DUNKERQUE.

## BENZYANYL

Valérianate de benzyle.

**Forme.** — Capsules glutinisées dosées à 0 gr. 10 de valérianate de benzyle.

**Propriétés.** — 1° Vasodilatateur et hypotenseur grâce au radical benzyle ;

2° Antispasmodique grâce à l'acide valérianique.

**Indications.** — Hypertension artérielle sous toutes ses formes, Angine de poitrine, Asthme, Coqueluche.

**Avantages.** — Abaissement simultané de Mx. et de Mn. Suppression rapide des troubles subjectifs. Toxicité nulle, action durable.

**Mode d'emploi.** — *Hypertension* : 6 capsules par 24 heures à distance des repas.

**Autres indications.** — *Adultes* : 2 à 6 capsules.

*Enfants* : 1 à 2 capsules.

**Laboratoires ROBERT et CARRIERE**

37, rue de Bourgogne — PARIS

---



## BENZYLOCALCIUM

**Recalcification** (Vitaminée Phosphorée) intensive.

**Renforcée par le Fénugrec** (parfaitement désodorisé)

**Assimilation.** — Assurée par les actions combinées :  
1° Antispasmodique et hypnotique du *noyau Benzylrique*.

2° Antitoxique de la substance *génératrice de Vitamine B*.

### Formule :

Benzylolhypophosphite de calcium .....	7 gr. 50
Fenugrec désodorisé .....	4 gr.
Substance véhicule de Vitamine B (Extraite de Levures) .....	} 2 gr.
0 gr. 01 = { 100 Unités Physiologiques curatives. Unité Pigeon ou,.....	
200 Unités Physiologiques préventives. Unité Pigeon.....	

**Benzylolhypophosphite de calcium :** Nouveau composé introduit par nous dans la thérapeutique, obtenu en traitant des corps de la série benzoïque par l'acide hypophosphoreux. Donne un acide cristallisé en fines aiguilles fondant à 224° dont le sel de calcium contient 10,4 % de phosphore, 6,7 % de calcium, purs, et deux groupes benzyliques ( $C^o H^o - CHO H$ ), groupes

qui ont été employés en thérapeutique comme antispasmodiques et hypnotiques (*benzoate, succinate et cinnamate de benzyle*).

Ce composé a été choisi de préférence aux glycérophosphates qui ne contiennent pas de noyaux benzyliques et dont l'absorption calcique est très défectueuse.

**Indications.** — Tous les états de décalcification et de carence minérale ou organique.

Surmenage, convalescence, rachitisme, anémie. Toutes les affections du tissu osseux. Les troubles douloureux de la ménopause et enfin, tout spécialement, pendant les périodes de grossesse et d'allaitement.

**Avantages thérapeutiques.** — La plupart des insuccès dans les traitements à base d'excellentes médications phosphorées calciques, sont dus à une assimilation imparfaite ou nulle des éléments reconstituants d'apport.

En général, chez les sujets où cette médication est indiquée, l'organisme, déprimé par un mauvais état du système nerveux, appauvri et affaibli par une intoxication (localisée ou généralisée), se défend mal, réagit mollement et n'assimile que difficilement.

De par sa composition, le **Benzyllocalcium** permet :

1° De rétablir l'équilibre du système nerveux. Rôle dévolu au noyau benzylique.

2° De désintoxiquer l'organisme. Action indiscutable de la substance génératrice de Vitamine B.



Fonctions en apparence secondaires, mais, en réalité, primordiales et qui, avec le **Benzylocalcium** s'opèrent sans réaction physique déprimante pour les malades ni modification chimique des principaux éléments constitutifs du produit. (Les essais physiologiques en font foi). En est-il toujours de même lorsque le médecin doit associer différentes médications ?

Une bonne assimilation des composants phosphorés calciques du **Benzylocalcium** est donc assurée.

Elle sera plus ou moins rapide et complète, suivant les sujets, mais, en définitive, toujours certaine. Ce ne sera plus qu'une question de durée du traitement.

Enfin le Fenugrec, incorporé à la formule du **Benzylocalcium** non seulement renforce un sel déjà suffisamment riche en Phosphore et Calcium, mais il agit indéniablement comme catalyseur. Cette action lui est reconnue par des éminents auteurs d'une bibliographie à laquelle le praticien pourra se reporter.

**Formes.** — Le **Benzylocalcium** se présente sous 2 formes :

*Granulé*, de goût agréable (90 grammes de produit par boîte). 18 francs au public.

*Cachets* (30 cachets par boîte). 20 francs au public.

**Posologie.** — Pour produire le maximum d'effets, le **Benzylocalcium** doit être pris un quart d'heure avant les repas.

Le granulé peut être croqué ou pris dans un peu d'eau. Dans ce dernier cas, avoir bien soin d'agiter le liquide avant l'absorption.

Chaque boîte contient une petite mesure qui correspond à la valeur d'une cuiller à café.

Cette mesure *bien pleine* représente 1 dose.

**Adultes** : 1 dose de granulé ou 1 cachet, 3 fois par jour avant chacun des repas.

**Enfants de 10 ans et au dessus** : 1/2 dose de granulé, 3 fois par jour avant chacun des 3 repas ou 1 cachet, 2 fois par jour avant chacun des 2 principaux repas.

**Enfants de moins de 10 ans** : 1/2 dose de granulé, 2 fois par jour avant chacun des 2 principaux repas.

Ces doses, généralement suffisantes, peuvent être largement dépassées, le **Benzylocalcium** étant absolument inoffensif.

Dans les traitements de longue durée, suspendre la médication une semaine par mois.

**Laboratoires DOR**

**DORANTOWICZ, Pharmacien**

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI<sup>e</sup>).

## BENZYLOL

Spécifique des affections spasmodiques des organes à musculature lisse, à base de Benzoate de Benzyle et de Benzaldéhyde.

*Deux présentations : 1<sup>o</sup> Gouttes; 2<sup>o</sup> Perles.*

**GOUTTES.** — Action antispasmodique sur tous les muscles lisses de l'organisme.

Spécifique de l'Hypertension. Asthme vrai. Coliques hépatiques ou néphrétiques. Constipation et diarrhée spasmodiques. Hoquet persistant. Coqueluche. Mal de mer.

**Posologie.** — *Adultes* : XXX à XL gouttes toutes les 3 ou 4 heures.

*Enfants* : 2 à 4 gouttes par année, toutes les 3 ou 4 heures.

**PERLES.** — Spécifique de la Dysménorrhée (règles douloureuses).

**Posologie.** — Deux perles à un quart d'heure d'intervalle ; 6 à 12 par jour.

Prix : 10 francs.

**Laboratoire E. HAUTDIDIER**

37, rue Galilée — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## BÉRYLINE DU D<sup>r</sup> FAYÈS

Forme : poudre impalpable.

**Composition.** — Mélange titré de sels calcaires et alcalins avec les principaux éléments minéraux (fer, manganèse, soufre, magnésie, etc.), qui entrent dans la composition des tissus vivants.

**Propriétés.** — Supplée à l'insuffisance minérale, combat l'hyperacidité organique, prévient l'acidose, exerce une action tonique puissante.

**Indications.** — Tous les états de déminéralisation, la diarrhée et l'athrepsie infantiles, la convalescence des maladies graves, les rhumatismes, la goutte et le diabète.

**Doses et mode d'administration.** — 1 à 3 cuillères à café par jour (selon l'âge) aux repas, en suspension dans un demi-verre d'eau.

**Laboratoires des Produits Fayès,**

199, rue Saint-Denis — PARIS (II<sup>e</sup>).

## BETUL-OL MIDY

(Méthyl oléo-salicylate comp.)

**Liniment** pour l'usage externe, parfaitement absorbé par la peau.

**Composition.** — Menthol et chloral en solution dans le salicylate de méthyle.

**Mode d'emploi.** — Imprégner largement un morceau de flanelle, l'appliquer sur la partie douloureuse, recouvrir de taffetas gommé, puis de coton. Renouveler l'application plusieurs fois par jour.

L'absorption du *Betul-Ol* se fait si rapidement par la peau, que dix minutes après on peut déceler dans l'urine la présence de l'acide salicylique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Calme rapidement les douleurs aiguës de la goutte et du rhumatisme.

**Indications.** — Lumbago, sciatiques, douleurs des articulations, névralgies.

**Laboratoires MIDY**

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## BEXININE

Spécifique idéal de la Coqueluche, des grippes, toux convulsives, catarrhe bronchique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Seul médicament inaltérable et non toxique. Jugule la Coqueluche en moins de huit jours.

**Doses et mode d'emploi.** — Toujours à jeun dans du lait bouilli et très chaud ou, à défaut, dans infusion de tilleul ou feuilles d'oranger.

**Doses pour 24 heures :**

**Enfants** de 2 mois : X à XXX gouttes en trois fois.  
(Augmenter de X gouttes par mois.)

**1 an :** 2 cuil. à café ; **2 ans :** 2 à 4 cuil. à café ; **3 ans :** 3 à 6 cuil. à café ; **4 et 5 ans :** 2 à 3 cuil. à soupe ; **6 et 7 ans :** 3 à 4 cuil. à soupe ; **8 à 10 ans :** 3 à 6 cuil. à soupe, **Adultes :** 6 à 10 cuil. à soupe.

**Observations et attestations médicales à l'appui.**  
En 1925, les épidémies de Vichy et de Nancy ont été jugulées par la Bexinine ainsi que celle de Pau en 1927.

Prix au public : 15 fr. 95. Impôt compris.

**Laboratoire AMBLARD**, à Cunlhat (Puy-de-Dôme).

## BIARSOL

Reconstituant d'action exaltée par l'action synergique des composants.

**Composition.** — Vanadium, Noix vomique, Arsenic, Phosphates combinés, Acide phosphorique.

Ses avantages : Action puissante et sûre toujours identique à elle-même, Administration facile.

**Indications.** — Tous les états de déficience organique. Toutes les convalescences, les adénopathies.

*Résultats remarquables chez les enfants dans les adénopathies trachéo-bronchiques, les végétations adénoïdes, les troubles de croissance, etc...*

**Posologie.** — Adultes : 15 à 20 gouttes au milieu des deux principaux repas.

Enfants, à partir de 3 ans : *une goutte par jour et par année d'âge* dans un peu d'eau sucrée ou non au milieu du repas.

**Présentation.** — Flacon compte-goutte de 30 cc.

**Laboratoires ORRILLARD**

245, rue de Vaugirard — PARIS

Tél. : Ségur 41-59.

---

## BIAZAN

Solution huileuse parfaitement limpide et incolore permettant de faire proprement une injection intramusculaire non douloureuse d'une quantité de bismuth bien déterminée.

**Présentation.** — Boîtes de 12 ampoules de 2 cent cubes rigoureusement titrées à 0 gr. 04 de bismuth métal par cent cubes.

**Propriétés thérapeutiques.** — Le Biazan a été étudié et mis au point dans le service de M. le Dr L. Fournier à l'hôpital Cochin. Réunissant les effets rapides des composés hydro-solubles à l'action profonde et prolongée des bismuths insolubles, le Biazan est actuellement la meilleure préparation pour le traitement de la syphilis à toutes ses périodes.

**Posologie.** — Faire deux fois par semaine une injection intramusculaire de 2 cc. de Biazan. Continuer la série jusqu'à 12 injections. Les 4 à 6 dernières piqûres pourront être faites à 5 et 6 jours d'intervalle. Les doses et le rythme des injections, donnés à titre d'indications générales, sont susceptibles d'être modifiés par le médecin traitant, en particulier chez les vieillards, les débilités et les sujets dont l'état général est mauvais.

Prix : 32 francs.

**Laboratoire des ANTIGÉNINES**

1, place Lucien-Herr — PARIS (V<sup>e</sup>).

(anciennement, 43, rue Tournefort.) — Gobelins 26-24.

## **BI-CITROL MARINIER**

Citrates monosodique et trisodique en granulé soluble, de goût agréable.

**Eupeptique, Cholagogue,  
Antivisqueux, Décongestif.**

**DOSES :**

2 à 4 cuillerées à café par jour.

Prix du flacon : 16 fr.

**Laboratoires MARINIER**

159, rue de Flandre — PARIS.

---

## **BI-IODURAL NOVAT**

**Formule.** — Comprimés contenant chacun 25 centigr. d'iodure de potassium et 5 milligrammes de bi-iodure de mercure.

**Remarque.** — Les comprimés (comme ceux d'iodural) renferment un alcalin chargé de neutraliser, au moment où ceux-ci se forment dans l'estomac, les acides iodique et iodhydrique. Le Bi-iodural est de cette façon parfaitement toléré.

Ces comprimés doivent être absorbés avec un liquide sans y être dissous.

**Laboratoires BOMEL**

ANNONAY (Ardèche) — France.

## BILEXABOL

**Forme.** — Pilules.

**Composition.** — Fiel de porc dépigmenté, Oléate de soude, Hexaméthylène tétramine, Boldo, Combretum raimbaultii, Evonymus atropurpureus.

**Indications.** — Affections du foie, maladies de l'intestin d'origine hépatique

**Posologie.** — 4 à 6 pilules par jour avant chaque repas.

**Laboratoires MARONNEAU-MOREL**  
156, rue des Fauvelles — COURBEVOIE  
(Seine).

---

## BILEYL FOURNIER

Sels biliaires

(Extraits de la bile de bœuf.)

**Forme.** — Globules glutinisés (digestion intestinale).

**Dose.** — 4 à 8 globules par jour, à prendre vers la fin du repas, par 2 ou 3.

**Indications.** — 1° Les causes d'arrêt d'excrétion : lithiase, compressions, ictères subaigus et chroniques par rétention ;  
2° Les cas d'insuffisance biliaire : cholémie familiale, entérocolite muco-membraneuse.

L'étui de 60 globules : 14 fr.

**Laboratoires FOURNIER Frères**  
7, rue Biscornet — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## BILIASÉ RABY

Globules d'extrait de fiel de bœuf renfermant tous les principes actifs de la bile.

**Mode d'action.** — Cholagogue énergique. Le plus constant de tous les agents opothérapiques biliaires.

**Indications.** — Coliques hépatiques. Ictère. Lithiasé biliaire. Entérocolite et constipation par **insuffisance biliaire**.

**Doses.** — 4 à 12 globules par jour (aux repas).

**R. RABY, pharmacien.**

ASNIÈRES (Seine).

(Échantillons sur demande.)

---

## BILIBOLDO

**Forme.** — Pilules glutinisées.

**Composition.** — Ext. de bile dépigmentée, ext. total de feuilles de Boldo, podophyllin, ext. de belladone.

**Indications.** — Insuffisance hépatique et biliaire, Lithiasé biliaire, Ictères, Constipation.

**Doses.** — 4 à 6 pilules par jour pour les hépatiques ; 1 à 2 pilules pour les constipés.

Prix : 12 francs les 50 pilules.

(12 jours de traitement.)

**Laboratoires LAMAR**

1, place Forbin — AIX-EN-PROVENCE.

## BILIFLUINE

du Dr L. BIGNON, de Vichy.  
Traitement de la Lithiasse Biliaire  
et des Ictères.

**Composition.** — A base d'oléate de soude et de bile dépigmentée et décholestérinée.

**Indications.** — Lithiasse biliaire. Ictère catarrhal, Ictère par rétention. Constipation. Colite muco-membraneuse. Congestion du foie et cirrhoses sous toutes leurs formes.

**Posologie.** — 4 pilules ou dragées par jour, au moment des repas : le matin, à midi, à 4 heures et au souper ; ou encore en deux fois à midi et le soir (pilules et sirop).

La boîte de 45 pilules ou dragées. Le flacon de sirop. Prix au public : 16 fr.

**Laboratoires « STÉNÉ »**  
2, Place des Vosges — PARIS.

---

## BILIOGASTRINE CHEVILLON

**Composition.** — Sulfate, Phosphate, Citrate, Bicarbonate de Soude, Pipérazine, Helmitol.

**Indications.** — Draine les Voies biliaires, augmente la Diurèse, nettoie le Rein et l'Intestin.

**Posologie.** — 2 à 3 cuillerées par jour dans un peu d'eau tiède.

Prix : 16 francs.

**Laboratoire CHEVILLON**

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-Oise).



## **BILIRHÉINE**

Principes extractifs végétaux sélectionnés, renforcés par un catalyseur : le Manganèse.

### **Indication.**

Insuffisance hépatique.

### **Posologie.**

Deux pilules glutinisées à la fin de chaque principal repas.

Prix au public : 15 francs pour dix jours de traitement.

### **Laboratoires MONDOLAN**

41, rue Étienne-Marcel — PARIS (1<sup>er</sup>).

---

## **BILIVACCIN**

1<sup>o</sup> Pastilles Antityphiques biliées.

2<sup>o</sup> Pastilles Antidysentériques.

3<sup>o</sup> Pastilles Anticholériques biliées.

Prix : dose pour adultes : 10 fr. ;

dose pour enfants (moins de 7 ans) : 8 fr.

Vaccination préventive, par VOIE BUC-CALE, contre la Typhoïde, les Para A et B, la Dysenterie bacillaire, le Choléra.

Aucune réaction. — Pas de contre-indication.

Aucune limite d'âge.

A prendre à jeun, trois matins de suite.

**H. VILLETTE, Pharmacien**

**Produits de « La Biothérapie »**

131, rue Cambonne — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Téléphone : Vaugirard 11-23.

## BILIVACCIN ANTICOLIBACILLAIRE

Vaccination par voie buccale contre toutes affections colibacillaires du tractus intestinal, constipation, colites, appendicites et annexes. Cholécystites, voies urinaires.

N° 1 Bilivaccin coli pur.

N° 2 — coli-entérocoque.

N° 3 — polyvalent (coli-entérocoque-perfringens-proteus).

A prendre le matin à jeun, pendant 18 jours consécutifs. Renouveler après repos de 6 jours.

Prix : 20 francs la dose.

**H. VILLETTE, Pharmacien**

**Produits de « La Biothérapie »**

131, rue Cambronne — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Téléphone : Vaugirard 11-23.

## BIOCALCOSE

Tonique, Stimulant, Reminéralisant intégral. Granulé soluble, de saveur très agréable.

Hypophosphites ; Manganèse, Fer, Magnésie et Chaux en combinaison organique avec le glucose, Fluor, Silice, etc., dans les proportions où ces corps se trouvent dans l'organisme.

Constitue une véritable synthèse minérale de la matière vivante.

**Propriétés thérapeutiques.** — Tonique, reminéralisant.

**Dose et mode d'emploi.** — 1 à 2 cuillerées à café par jour jusqu'à 8 ans ; 3 à 4 au-dessus de cet âge, à croquer, ou dissoutes dans un peu d'eau, aux repas.

**Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT**

52, rue La Bruyère — PARIS.

Télégrammes : Chevrematte-90-Paris.

## BIOCHOLINE

D'après les travaux du Professeur J. Carles et du Docteur F. Leuret.

**Constitution.** — Chlorhydrate de Choline R. et C. chimiquement pur.  
Seule préparation contrôlée aux points de vue physiologique et clinique par les auteurs.

**Mode d'action.** — Amélioration du terrain par l'augmentation régulière et durable du taux du cholestérol sanguin, principale condition de la résistance à l'infection tuberculeuse.

**Indications.** — *Toutes les formes de Tuberculoses* : externes ou viscérales, mêmes évolutives, à tous les degrés et à tous les âges.

**Avantages.** — Innocuité absolue. Tolérance parfaite, aucune contre-indication.

**Présentations.** — *Ampoules* : (1 cc. = 0 gr. 02). Boîtes de 10 ampoules type normal). Boîte de 25, 50, 100 ampoules (cures prolongées).

*Suppositoires* : (1 suppo = 0 gr. 02). Boîtes de 10 suppositoires.

**Mode d'emploi.** — *Ampoules* : 1 injection sous-cutanée tous les 2 jours *d'une façon continue et sans aucune interruption.*

*Suppositoires* : 1 suppositoire tous les 2 jours, par séries de 20 jours.

**Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE**

37, rue de Bourgogne — PARIS.

## BIODERMYL MONAL

**Formes.** — Ampoules et globules glutinés.

**Composition.** — Chaque *ampoule* de 2 cc. contient : une solution indolore et bien tolérée de Hg I<sup>2</sup> à 1 p. 100, soit 0 gr. 02 par ampoule.

Chaque *globule* contient : Hg I<sup>2</sup> pur 0,0025 ; KI, 0,25.

**Doses.** — Série de 12 injections.  
4 globules par jour, aux repas.

Traitement discret ; pas d'indications sur l'étiquette et le prospectus du flacon de globules.

La boîte de 12 ampoules : 12 fr.

Le flacon de 50 globules : 20 fr.

**Laboratoires MONAL et C<sup>ie</sup>**

6, rue Bridaine — PARIS.

## BIODYNAMINE

**Indications générales.** — Débilité, Neurasthémie, Phosphaturie, Convalescence, Surmenage intellectuel et tous états asthéniques et atoniques.

### 1° Ampoules :

Sulfate de strychnine.....	1 milligr.
Cacodylate de soude.....	0 gr. 05
Nucléinate de soude.....	0 gr. 05
Glycérophosphate de soude.....	0 gr. 05
Sérum isotonique camphré.....	1 cc. 3
par ampoule.	

(1 à 2 ampoules par 24 heures.)

Prix : 13 fr. 75.

**2° Gouttes concentrées** (facilitant l'administration progressive) : de X à XL gouttes, bien diluées, avant chaque repas, suivant le cas et d'après le tableau :

	20 Gouttes cont.	40 Gouttes cont.	60 Gouttes cont.	80 Gouttes cont.	100 Gouttes cont.
Sulfate de Strychnine.....	1 mill.	2 mill.	3 mill.	4 mill.	5 mill.
Méthylarsinate de soude...	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15
Polyglycérophosphates don- nant en Acide phosphorique.	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75

Prix : 11 fr. 75.

**3° Elixir** : Préparation d'un goût très agréable et contenant par cuillerée à soupe de 15 grammes :

Phosphate de soude.....	0 gr. 060
Acide phosphorique officinal .....	0 gr. 053
Méthylarsinate disodique .....	0 gr. 012
Sulfate de strychnine.....	0 gr. 0006

2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 15 fr. 50.

**Laboratoire OBERLIN**

**J. Tinardon**, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
de l'Ecole Supérieure de Paris.

17, rue Cadet — PARIS.

## BIOENTERASE

### Ampoules buvables.

Non Toxique. Sans contre-indications.

Extrait de *Phyllanthus Casticum*, *Scutia Commersoni*, *Psidium Pommerum*, *Garcinia Mangoustana*, *Fraxinus Ornus* en solution stabilisée.

**Indications.** — Diarrhée verte, gastro-entérite des nourrissons. Choléra infantile, Entérites aiguës, entérocologie dysentérique.

**Action.** — Antidiarrhéique et antihémorragique énergique, sans action constipante. Cholagogue. Antiparasitaire et bactéricide puissant. Calmant des douleurs abdominales et du ténésme, sans opiacés.

**Doses.** — Faire prendre le médicament dans de l'eau fortement sucrée.

Enfant au-dessous de 3 mois : 1 à 2 ampoules dans la journée.

Enfant de 2 à 6 mois : 2 à 3 ampoules dans la journée.

Enfant de 6 mois à 2 ans : 3 à 4 ampoules dans la journée.

Proportionner les doses à l'âge et à l'intensité des symptômes et continuer le médicament jusqu'à disparition du syndrome intestinal, ce qui survient rapidement.

Remplacer le lait par de l'eau bouillie ou eau de riz sucrée.

Prix de la boîte de 6 ampoules buvables : 18 francs.

### Littérature et Echantillons :

58, rue Miromesnil — PARIS.

## BIOGÉNOL DEMASLES

Puissant accélérateur de la nutrition.

**Granulé.** — Contenant, par cuillerée à café :

1 centigr. de glycéro-arséniate.

0,50 centigr. de phosphates organiques.

0 gr. 50 chlorure de magnésium.

1 cuillerée à café avant les deux repas.

Prix : 14 francs.

**Liquide.** — Même composition que le granulé, mais contient de la cola en plus. 1 verre à liqueur avant les repas.

Prix : 14 francs.

**Gouttes Arséno Biogénol.** — Strychnine, glycéro-arséniate, extraits de quina, cola, coca.

**Gouttes Phospho Biogénol.** — Strychnine, acide phosphorique, extraits de quina, cola, coca.

Pour XX gouttes, 1 milligr. de strychnine, 5 milligr. de glycéro-arséniate ou 25 cgr. d'acide phosphorique.

Doses moyennes : X à XX gouttes aux 2 repas. Doses progressivement croissantes : jusqu'à CXX gouttes.

Prix : 12 francs.

**Ampoules.** — De 1 cc. Une ampoule contient :

Glycéro-arséniate..... 0,01 centigr.

Sulfate de strychnine..... 0,001 milligr.

Prix : 10 francs.

**LABORATOIRES DEMASLES.** — VIENNE (Isère).

## **BIOLACTYL FOURNIER**

Symbiose de deux ferments lactiques  
orientaux sélectionnés.

### **Usage médical :**

1<sup>o</sup> Culture en bouillon :

En boîtes de 10 fl., pour adultes.

La boîte : 24 fr.

En boîte de 2 fl., pour nourrissons.

La boîte : 8 fr.

En boîte de 6 tubes (pour le caillage du  
lait).

La boîte : 7 fr.

2<sup>o</sup> Culture sèche ; boîte de 60 comprimés  
(4 à 6 par jour).

L'étui : 14 fr.

**Indications.** — Traitement des putréfac-  
tions intestinales et de l'auto-intoxication  
digestive.

### **Usage chirurgical :**

1<sup>o</sup> Culture liquide, en boîtes de 6 tubes.

La boîte : 7 fr.

2<sup>o</sup> Culture sèche en poudre.

La boîte : 7 fr.

**Indications.** — Pansement des plaies in-  
fectées, escarres, vaginites, cystite tuber-  
culeuse, affections nasales et laryngées,  
pyorrhée alvéolo-dentaire.

**Laboratoires FOURNIER Frères**

7, rue Biscornet — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## BIOPHORINE GIRARD

Kola Glycéro-Phosphatée.

*Granulé* à base de Kola, Glycérophosphate de chaux, Quinquina et Cacao vanillé.

**Dose et mode d'emploi.** — 2 à 3 cuillerées à café par jour que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

**Prop. thér.** — *Tonique du système nerveux, facilite l'effort musculaire.*

**Indications.** — Surmenage, Vertiges, Anémie cérébrale, Névralgies rebelles, Névroses.

**Laboratoire A. GIRARD**  
48, rue d'Alésia - - PARIS.

---

## BIOPHYTOL

### Le plus puissant Reconstituant général

Le « **Biophytol** » associe, sous la forme d'un Elixir très agréable au goût, l'*Arsenic*, le *Manganèse* et le *Phosphore organiques* à la *Cola fraîche* et à l'*Opothérapie séro-sanguine totale*.

**Composition.** — Chaque cuillerée à soupe de « **Biophytol** » contient :

Extrait hématique total obtenu par concentration, dans le vide, à froid, de. de Sérum et globules d'animaux sélectionnés	10 cc.
Méthylarsinate de Sodium .....	0 gr. 03
Nucléinate de Manganèse .....	0 gr. 05
Glycérophosphate de Sodium cristallisé.	0 gr. 25
Extrait de cola fraîche.....	0 gr. 75
Sirop à l'Extrait hydro-glycéro-alcoolique d'écorce d'oranges amères et de cannelle vanilliné. Q. s. p.....	15 cc.

**Posologie.** — *Adultes* : Une cuillerée à soupe pure ou mieux diluée dans un peu d'eau gazeuse, immédiatement avant les deux principaux repas.

*Enfants* : Une ou deux cuillerées à café, suivant l'âge, avant les deux principaux repas.

*Ces doses peuvent être doublées dans les cas graves.*

**Indications.** — Toutes les Affections qui réclament une médication réparatrice énergique : Tuberculoses, Anémie, Convalescences des Maladies infectieuses graves, Troubles de la Croissance, Lymphatisme, Scrofule, Rachitisme, Paludisme, Diabète, Névroses, Asthénies physiques et psychiques.

« **Biophytol** » réalise la Synergie reconstituante la plus puissante qui ait jamais été mise à la disposition du médecin.

Prix du flacon : 15 francs.

**Laboratoires R. BOUYSSOU et Cie**

90, avenue des Ternes. — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Tél. : Wagram 61-42.



## BIOPLASMYL

### COMPOSITION

Hémoglobine .....	3 kg. 200
Tartrate ferrico-potassique.....	4 kg.
Arsenate de strychnine.....	0 kg. 003
Tri-iodure d'arsenic.....	0 kg. 003
Hypophosphite de soude.....	0 kg. 800
Véhicule sirupeux aromatisé.....	Q. S. pour 100 litres.

**Indications.** — Reconstituant spécifique du sang, remède contre le rachitisme, l'anémie, le surmenage, les dépressions nerveuses, les pertes de force et de l'appétit, la neurasthénie, facilite les convalescences.

**Forme et Posologie.** — En sirop.

**Adultes.** — Deux cuillerées à soupe par jour.

**Enfants de 7 à 13 ans.** — Deux cuillerées à café par jour.

**Enfants de 3 à 7 ans.** — Deux cuillerées à dessert par jour.

**Particularité.** — Le BIOPLASMYL est moins épais et moins gluant que le plasma musculaire. Il contient le fer sous deux formes. Il ne s'oxyde pas et sa conservation est pratiquement indéfinie.

Prix : 15 fr.

**LE DAVAY, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.**

2, rue Notre-Dame, — GUINGAMP (Côtes-du-Nord).

## BIOPULMOL

**Composition.** — Cholestérine. Lécithine pure de l'œuf. Eucalyptol. Essence de niaouli. Huile camphrée strychninée.

**Propriétés.** — Médicament modificateur du terrain. — Réparateur relevant rapidement l'état général, l'appétit et les forces. — Médicament stimulant, Anti-Infectieux.

**Indications.** — Toutes les maladies des *voies respiratoires* : Tuberculose, Pneumonie, Broncho-Pneumonie, Grippe, Gangrène pulmonaire, etc. Etats de dénutrition. Asthénies. Maladies infectieuses.

**Présentation.** — Boîte de 10 Ampoules de 2 cc.

**Mode d'emploi.** — Une ampoule tous les jours. Deux ampoules dans les cas graves. Une demi-dose pour les enfants. Trois séries de 10 Ampoules, suivies de dix jours de repos. S'abstenir chez les insuffisants hépatiques et les albuminuriques.

**Avantages.** — Injection sous-cutanée absolument indolore

Littérature et échantillon sur demande :

**Laboratoires des Ampoules « POLMA »**

TERMES, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,

MIRAMONT-DE-GUYENNE (Lot-et-Garonne).

## BIOSINE LE PERDRIEL

Glycérophosphate double de chaux  
et de fer.

Ni intolérance, ni constipation, ni coloration  
des dents. Reconstituant énergétique.

**Indications.** — Anémie, Chlorose, Rachitisme, Croissance, Convalescence, Surmenage, Neurasthénie, Suite de fractures, Hémorragies.

**Doses.** — 1 mesure (0,30 de glycérophosphate) à 4 mesures par jour au repas dans eau pure ou sucrée.

**Laboratoires LE PERDRIEL**

11, rue Milton — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## BIOTRIGON

### Composition :

*Elixir.* — Extrait fluide de fênu-grec désodorisé, Arri-nal, Manganèse.

*Dragées.* — Extrait sec de fênu-grec. Phosphate de chaux. Extraits opothérapiques fixateurs.

### Propriétés :

Augmentation du poids, des forces, de l'appétit, Amélioration de l'état général.

### Indications :

*Elixir.* — Insuffisance organique, Asthénie, Prétuberculose, Adénopathie, Débilité.

*Dragées.* — Mêmes indications, mais plus spécialement pour malades en déplacement ou gastro-entéritiques.

### Mode d'emploi :

*Adultes :* 1 cuillerée à bouche au moment des repas.

*Enfants :* 1 cuillerée à café au moment des repas.

Prix du flacon de 1/4 de litre : 20 francs.

**Laboratoires du BIOTRIGON**

8, rue Pierre-Girard — PARIS.

## BIS-KA-MA

**Formes pharmaceutiques.** — Poudre à l'état de division micellaire.

**Composition.** — Bismuth (carbonate), Kao-lin colloïdal, Magnésie, Mucilages végétaux, Sucre vanillé.

**Action.** — Réalise le « poudrage » du tube digestif. Anti-acide, modificateur de la flore intestinale, absorbant des gaz.

**Indications.** — Acidité pré- ou post-prandiale : 1 cuillerée à café aux 3 repas.

Constipation chez les hyperchlorhydriques et les entérocolitiques : 1 cuillerée à soupe le matin à jeun.

Prix : 20 francs.

**Laboratoires DURET et RÉMY  
et du Docteur Pierre ROLLAND  
ASNIERES (Seine).**

---

## BISMHYDRAL

**Composition.** — Définie et stable de chlorure mercureux léger pur, et d'azotate basique de bismuth spécialement préparés.

**Propriétés thérapeutiques.** — Réalise l'association et la synergie médicamenteuse du bismuth et du mercure dans le traitement de la syphilis (Docteur Milian).

**Indications.** — Syphilis à toutes les périodes et sous toutes ses formes. Cure d'entretien discrète par voie buccale. (La boîte-vente ne renferme aucun prospectus et ne porte pas d'indication de maladies.)

Tolérance parfaite, action sûre, aucune toxicité.

**Doses.** — Un à deux comprimés une heure avant les deux principaux repas.

Littérature et Échantillons :

**LANCOSME**

Avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## BISMUSODINE

(Granulée.)

**Composition.** — Une cuillerée à café contient :

0 gr. 50 carbonate de bismuth.

0 gr. 50 citrate de soude état naissant.

1 gr. 50 carbonates de chaux et magnésie.

**Indications.** — Gastropathies. — Hyperacidité. — Sténoses pyloriques. — Colites. — Ulcus. — Antisepsie intestinale.

**Mode d'emploi.** — 2 à 6 cuillerées à café par jour délayées dans un demi-verre d'eau ou même croquées telles, suivant indications du médecin.

**Laboratoires R. NIEL**

60, rue Auguste-Comte — LYON (Rhône).

---

## BISMUTARTROL

**Bismuth soluble.**

Syphilis à tous les degrés.

Cures d'entretien.

Solution huileuse de Campho-Carbonate de Bismuth. *Injectons absolument indolores.* — 0 gr. 08 de Bismuth Métal par Ampoule de 2 cc. 1/2.

**Posologie moyenne.** — Séries de 10 injections à raison d'une tous les 3 ou 4 jours. Laisser un intervalle de 20 à 30 jours entre deux séries consécutives.

La boîte de 10 ampoules : 30 fr.

**Laboratoires RAVAUD<sup>v</sup>**

6, place de Breteuil — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Tél. : Ségur 14-85.

R. C. Seine 269.121.

## BISMUTH (Crème de) du Docteur QUESNEVILLE.

Spécialité créée en 1859 et toujours prescrite après soixante-dix ans d'expérimentation.

**Composition.** — Suspension de l'*Hydrate de Bismuth pur*, obtenu à l'état de *précipité gélatineux* et maintenu dans son eau d'hydratation par le procédé du D<sup>r</sup> Quesneville. Aucune addition de matières étrangères. Aucune trace d'acidité.

**Propriétés.** — Forme réalisant l'extrême division des grains de Bismuth et portant au maximum l'action médicamenteuse utile : (Pouvoir couvrant et protecteur. Propriétés anti-infectieuses. Effets sédatifs sur l'élément douleur.)

**Indications.** — *Tous syndromes hyperchlorhydriques ou douloureux. Tous signes d'inflammation du tractus digestif.* — Gastrites aiguës ou chroniques d'origine infectieuse ou toxique. Diarrhées aiguës ou chroniques consécutives à l'infection de la paroi intestinale par fermentations alimentaires, germes infectieux. Lésions ulcéreuses, hémorragiques.

**Mode d'emploi.** — Une cuill.-mesure en os est jointe à chaque flacon et correspond à 0,25 de Bi. Les doses délayées dans un verre à liqueur d'eau produisent un lait de bismuth finement homogène d'absorption facile sans aucune saveur.

Les quantités à faire ingérer sont très inférieures à celles des poudres bismuthées ou des succédanés.

### Posologie :

**Syndromes gastriques :** 1 à 4 cuill.-mesure dans un verre à liqueur de liquide 1/4 d'heure avant les repas (par périodes de 3-4 jours alternées avec repos de même durée).

**Syndromes colitiques :** 2 à 6 cuill.-mesure, toutes les 4 heures (terminer par doses décroissantes).

**Ulcère gastrique-duodénal :** 5 à 10 cuill.-mesure 1 ou 2 fois par jour.

**Rectites :** 1 cuillerée à café en lavement.

**Médecine infantile :** par 1/2 mesure 3 à 4 fois par jour.

### Laboratoires QUESNEVILLE

12, rue de Buci — PARIS (VI<sup>e</sup>).

1/2 flacon (50 cuill.-mesure). Prix : 15 francs.

Flacon (100 cuill.-mesure). Prix : 25 francs.

Dépôt général :

### Pharmacie COLLESSON

5, rue d'Angoulême — PARIS (XI<sup>e</sup>).

Tél. : Roquette 18-08.

## BISMUTH DESLEAUX

Pansement gastro-intestinal idéal

au Carbonate basique de Bismuth pur, amorphe, obtenu par un procédé de fabrication spécial.

**Propriétés thérapeutiques.** — Pansement gastro-intestinal de choix, assurant un tapissage intégral, homogène, uniforme de la muqueuse, joint à une action sédative, protectrice, cicatrisante et anti-infectieuse. Modifie la flore microbienne, met à l'abri des accidents provoqués par le sous-nitrate, supérieur aux produits de substitution (kaolin, magnésie, talc).

**Indications.** — Ulcères et ulcérations gastriques ou duodénales, gastropathies, hyperchlorhydrie, entéropathies, colites, spasmes, oxyurase.

**Présentation.** — Poudre impalpable, de goût agréable.

**Posologie.** — Chaque flacon porte une mesure dont le contenu correspond à 6 gr. de produit.

**Pansement gastro-intestinal :** 12 à 50 gr. par jour, suivant les cas, soit 1 à 3 mesures prises à jeun, matin, midi et soir 1/2 heure avant les repas, dans 1/2 verre d'eau ou de tisane.

**Oxyures.** — *Adultes :* 30 à 40 gr. (5 à 7 mesures), *enfants :* 15 à 25 gr. (3 à 4 mesures) par jour, en 2 fois, le matin à jeun, 2 à 3 cures de 7 jours (voir brochure).

LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## BISMUTHION COUTURIEUX

**Description.** — Le Bismuthion est une suspension colloïdale isotonique de Bismuth pur dans l'eau distillée, obtenue par procédé électrique et destinée au traitement de la syphilis. En boîtes de 6 ampoules de 3 cc.

**Action thérapeutique.** — Le Bismuthion s'injecte dans les veines ou les muscles sans précautions spéciales. Il est parfaitement toléré, non toxique, ne provoque aucune réaction douloureuse ou autre, diffuse rapidement dans l'organisme et particulièrement dans les lésions syphilitiques et est facilement éliminé sans irriter les reins. Il paraît agir sur les spirochètes comme *catalyseur*.

**Indications.** — Le Bismuthion, grâce à son absence de toxicité, est spécialement indiqué pour le traitement des syphilis anciennes qui exigent un long traitement : syphilis nerveuses, tabes, hérédosyphilis.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

## BISMUTHOÏDOL

Bismuth colloïdal, à grains fins.

### Ampoules.

Titrées à 0 gr. 004 par cc.

Indolores.

Stériles.

Solution aqueuse.

### Indications.

Spirillicide.

Syphilis.

Toutes maladies à protozoaires.

**Mode d'emploi.** — Une ampoule tous les 2 ou 3 jours dans les cas ordinaires. — Une tous les jours dans les cas graves.

**Laboratoires M. ROBIN**  
13, rue de Poissy — PARIS.

## BISMUTH TULASNE

au sous-nitrate de bismuth pur spécialement préparé pour l'emploi à doses élevées.

Innocuité absolue.

**Indications.** — Toutes les indications du sous-nitrate de bismuth en thérapeutique digestive.

*Estomac* : Ulcères - Ulcérations - Gastrites - Spasmes - Aérophagie - Vomissements.

*Intestins* : Colites - Diarrhées - Météorisme - Troubles fonctionnels - Troubles nerveux et circulatoires paradigestifs : extrasystoles, douleurs précordiales, migraines.

*Oxyurose.*

**Présentation.** — En boîtes de 10 paquets de 10 gr. Prix : 25 fr. 1/2 boîte : 14 fr.

**Posologie.** — En général doses massives (10 à 20 gr., 1 à 2 paquets) à prendre en une seule fois le matin, à jeun, dans un verre d'eau pour réaliser le pansement bismuthé de la muqueuse digestive. Les mêmes doses, fractionnées en deux ou trois prises dans la journée, sont indiquées dans certains cas.

*Oxyurose* : Un paquet tous les matins pendant 5 jours. 1/2 paquet pour les enfants au-dessous de 7 ans. Deux à trois cures séparées chacune par 6 jours de repos. Pas de régime spécial.

Innocuité absolue.

**Laboratoires BAUDRY**

R. BOUILLET, Pharmacien, 68, boul. Malesherbes, PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## BISSOL CH. GAUTIER

Camphocarbonate de bismuth lipo-soluble, en solution huileuse stérilisée et stable.

**Propriétés.** — Action à la fois rapide et continue.

**Indications.** — Spirochètoses et syphilis à toutes les périodes.

**Présentation.** — Ampoules de 1 cc. dosées à 4 cgr. de Bi-métal par cc., chaque boîte conçue pour un traitement de 7 semaines par série, renferme une aiguille en nickel pour injections intramusculaires profondes et un tube aspirateur pour puiser aisément le contenu des ampoules. Prix : 25 fr.

**Posologie.** — Une ampoule tous les 4 ou 5 jours en injection intramusculaire profonde. Série de 10 à 14 injections. Rechercher l'albumine dans les urines avant chaque injection.

**Laboratoires Ch. GAUTIER**  
13, rue Dorian — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## BIVATOL

**Formule.** —  $\alpha$ . Carboxéthyle ;  $\beta$ . Méthyle nonoate basique de bismuth.

Produit absolument nouveau, le premier des sels de bismuth français présenté en solution huileuse fluide.

**Présentation.** — Ampoules huileuses fluides de 2 cc. contenant 4 centigrammes de bismuth métal par cc. soit 8 centigrammes au total.

Boîtes de 12 ampoules constituant une cure.

**Indications thérapeutiques.** — Action spirillicide intense. Le plus rapide, le mieux toléré des sels de bismuth. Incolore et rigoureusement indolore, produit des effets au moins comparables à ceux obtenus par l'emploi des doses massives d'arsénobenzol.

**Posologie.** — *Adultes* : 12 injections de 2 cc. faites intramusculaires à raison d'une tous les deux jours pendant la première semaine, puis de deux par semaine ensuite.

*Enfants* : 0 cc. 1 par semaine jusqu'à 3 ans.

0 cc. 5 de 3 à 5 ans.

1 cc. à 10 ans.

Prix au public :

La boîte de 12 ampoules 2 cc. (adultes) : 25 fr.

— de 10 — 1 cc. (enfants) : 20 fr.

**Laboratoire Français de Chimiothérapie.**  
89, rue du Cherche-Midi — PARIS.



## BLÉDINE JACQUEMAIRE

**Composition.** — Aliment rigoureusement complet, tant par sa teneur en albuminoïdes, graisses et hydrates de carbone, que par les éléments minéraux et *facteurs de croissance* (vitamines), extraits de la périphérie du grain de blé (recherches expérimentales effectuées sous la direction de MM. les Prof. Morel et Mouriquand au Lab. de Chimie organique et de tox. de la Faculté de Lyon, de mai 1919 à juillet 1920).

**Propriétés.** — Entièrement digestible et assimilable par les enfants dès le premier âge. Complément nécessaire du lait dans l'allaitement artificiel.

**Indications.** — Facilite la digestion du lait. Favorise la croissance et la dentition. Prépare et facilite le sevrage. Régularise d'une façon remarquable les fonctions digestives (Aliment de régime dans les cas suivants : Diarrhée, Constipation, Gastro-entérites) ; désodorise les selles en modifiant rapidement la flore intestinale.

**Particularités.** — Ni cacaotée, ni lactée, ni maltée, ni torréfiée, ni étuvée et sans addition d'aucun produit pharmaceutique, la Blédine se conserve d'une façon parfaite, en boîtes de fer-blanc hermétiques, sans modification de goût, ni d'odeur, ni de composition.

**Doses.** — Du 1<sup>er</sup> au 4<sup>e</sup> mois : 1 gramme par biberon et par mois d'âge. Du 5<sup>e</sup> au 6<sup>e</sup> mois : 1 1/2 à 2 cuillerées par biberon. A partir du 7<sup>e</sup> mois : 1 cuillerée à soupe par repas ; 1 1/2 à 2 pour les adultes.

**Nota.** — La Blédine peut se préparer à l'eau. Dans ce cas, doubler les quantités ci-dessus.

**Établissements JACQUEMAIRE**

**M. MIQUET**, ✱, Docteur en Pharmacie,  
VILLEFRANCHE (Rhône).

## BLENNOPIAT

**Composition.** — Association de : Copahu, Cubèbe, Santal, Sassafras, Térébenthine  
Ancien opiat complet du Codex sous forme pilulaire, *glutinisée*.

**Action thérapeutique.** — Synergie balsamique efficace, absorption facile, pas de troubles gastriques ni de réaction rénale.

**Indications.** — Blennorragie à toutes ses périodes et toutes complications dues au gonocoque. Cystites. Uretrites.

**Mode d'emploi.** — 6 à 12 pilules par jour, au moment des repas.

Prix : 15 francs la boîte.

Laboratoire ADOL

**L. GIROUD, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.**  
78, Cours de la Liberté — LYON.

---

## BLENNOSINE-FORNET

Vaccin buccal contre la Blennorragie.

**Principe actif.** — Gonocoques de différentes souches, spécialement préparés.

**Indications.** — Blennorragie aiguë ou chronique, ainsi que leurs complications.

**Posologie.** — 1 à 3 pilules, trois fois par jour, une demi-heure avant les repas jusqu'à ce qu'une réaction locale et générale se soit manifestée. Cette réaction, d'ailleurs légère, prouve l'efficacité spécifique de ce vaccin buccal antiblennorragique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Fait diminuer, puis disparaître l'écoulement, évite toute complication, guérit les complications existantes.

Prix : 45 francs.

Service de Vente et Echantillonnage :

Laboratoires, 23, rue du Caire — PARIS (II<sup>e</sup>).

Service d'Etude et de Fabrication :

Institut de Microbiologie  
SARREBRUCK (Sarre).

## **BOLDINE HOUDÉ**

Granules titrés à 1 milligramme.

### **Boldine Houdé**

Principes actifs des feuilles de boldo.

### **Emplois thérapeutiques :**

Maladies du foie, lithiasé biliaire, ictère, hépatites, insuffisance hépatique, etc.

### **Mode d'emploi :**

De 3 à 6 par jour, à prendre le midi et le soir, un quart d'heure avant les repas.

**Laboratoires HOUDÉ**

9, rue Dieu — PARIS.

## **BOLDO GMET**

**Composition.** — Extrait total, liquide, sans alcool ni sucre, renferme *tous* les principes actifs de la feuille de Boldo fragrans : boldine huiles essentielles, matières aromatiques. Correspond à 2 gr. de feuilles fraîches par cuillerée à café.

**Propriétés.** — Diurétique, cholagogue, stimulant et antiseptique du foie et des voies biliaires.

**Indications.** — Tous les troubles fonctionnels du foie. Insuffisance. Congestion. Lithiasé biliaire. Cholécytite. Anorexie. Constipation. A donner au cours d'un traitement opothérapique ou spécifique pour maintenir l'intégrité du foie.

**Posologie.** — 1 cuillerée à café dans une tasse d'eau *chaude* le matin à jeun ou aussitôt après les repas de midi et du soir.

**Laboratoire GMET**

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX).

## BOLDOLACTOL

**Composition.** — Association de ferments lactiques, de ferments biliaires *dépigmentés* et *décholestérinés* et de boldine (1/2 milligramme de boldine par comprimé).

**Propriétés.** — Empêche les fermentations intestinales, excite la sécrétion biliaire, stimule les fonctions hépatiques. Laxatif.

**Avantages.** — Conservation indéfinie, Tolérance digestive parfaite.

**Indications.** — Affections hépatiques, Entérites, Auto-intoxication intestinale, Diarrhées paludéennes. Constipation chronique.

**Mode d'emploi.** — 4 à 8 comprimés par jour, 20 jours par mois.

La boîte de 60 : 12 fr.

**Laboratoires A. SALLES**

11, boulevard de Strasbourg — PARIS (X<sup>e</sup>).

---

## BOLDORHÉINE

**Composition.** — Capsules glutinisées à base d'extrait de boldo, d'extrait biliaire, de podophyllin et de ferment lactique (conservé à l'état sec, mais vivant, dans un milieu approprié).

**Action thérapeutique.** — Combat l'insuffisance biliaire, stimule l'activité de la cellule hépatique, active la sécrétion et l'excrétion biliaires, régularise les fonctions intestinales et aseptise le tube digestif.

**Indications.** — Insuffisances hépatiques et biliaires, ictère, lithiase, etc.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 capsules, au moment des repas, avec une gorgée d'eau.

**LABORATOIRE  
DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE  
D<sup>r</sup> PH. CHAPELLE**

8, rue Vivienne — PARIS.

## **BOLDO VERNE**

Le cholagogue sûr et régulier.

**Composition.** — Extrait total des feuilles de Boldo contenant tous les principes actifs : boldine, essence et matières aromatiques.

**Indications.** — Tous les troubles fonctionnels du Foie et des voies biliaires. Anorexie, Atonie gastrique, Séquelles du Paludisme.

**Posologie.** — L à C gouttes par jour.

**Laboratoire du BOLDO VERNE**  
13, rue Docteur-Mazet — GRENOBLE.

---

## **BOLÉASE MONAL**

**Forme.** — Globules glutinisés.

**Composition.** — Bile et boldo, extraits complets et inaltérables.

**Dose.** — 4 à 6 globules par jour.

**Action.** — Cholagogue, décongestif et antitoxique.

**Indications.** — Troubles biliaires et hépatiques. Affections hépatiques : lithiase, ictères, congestions, cholémie, cirrhose. Affections intestinales : entérites muco-membraneuses, constipation, auto-intoxications.

Le flacon de 50 globules : 12 francs.

**Laboratoires MONAL & C<sup>ie</sup>**  
6, rue Bridaine — PARIS.

## BOREOL

**Comprimés pour gargarismes et inhalations.**

**Composition.** — Perborate de soude, bicarbonate de soude. Essence de Wintergreen. Essences de canelle, badiane, menthe, saccharine, gomme arabique, amidon.

**Propriétés.** — Antiseptique, sédatif et analgésique, déterge et décongestionne les muqueuses.

**Indications.** — Coryzas, sinusites, angines, pharyngites, laryngites, trachéites et trachéo-bronchites.

**Mode d'emploi.** — 1° En gargarismes : 1 comprimé dans un demi-verre d'eau bouillie, assez chaude.

2° En inhalations : 1 à 2 comprimés dans 1/2 litre d'eau bouillante, et l'on peut se gargariser ensuite avec la même solution.

Prix du tube de 20 comprimés : 12 francs.

Dépôt général pour la France :

**Laboratoire ASEPTOR**

21, rue Feydeau — PARIS (II°).

Téléph. : Central 83-15.

## BORICINE MEISSONNIER

Tetraborate de Sodium chimiquement pur en poudre fine. Sel défini, cristallisé en rosettes résultant de la combinaison de l'acide orthoborique et du biborate de sodium.

Infiniment supérieur à ses composants par :

1° *Sa pureté.* — Sel cristallisé neutre, non caustique.

2° *Sa solubilité.* — 16 p. 100 à froid } dans  
75 p. 100 à l'ébullition } l'eau  
parties égales dans la glycérine.

3° *Son pouvoir bactéricide.* — Stérilisante à 6 p. 100.

4° *Sa non-précipitation des alcaloïdes et son inaction sur les métaux.*

**Indications.** — Succédané des borax impurs et de l'acide borique dans tous leurs emplois. Succédané de l'iodoforme. Hémostatique puissant.

Hygiène et antisepsie générale de la peau et des muqueuses, conjonctivites, otites, ozène, stomatites, dermatoses, voies urinaires, gynécologie, plaies, brûlures. Bains.

**Mode d'emploi :**

*En poudre :* Insufflation en gynécologie, ophtalmologie, oto-rhinolaryngologie.

*En solution :* De 2 à 5 cuillerées à soupe par litre d'eau.

1 cuillerée = 8 gr. **Boricine.**

Prix : 7 fr. 50 net.

**Laboratoires J. LOGEAI**

22 bis, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE, près PARIS —

Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.

## BOROCALCYL THEVENOT

**Dragées de Borotartrate de Chaux.**

**Indications.** — Hyperexcitabilité, Spasmes, Prurits nerveux, États convulsifs de l'Enfance.

Remplace avantageusement les bromures et ne présente pas leurs inconvénients. Sédatif puissant.

**Doses.** — 2 à 4 comprimés par jour 3/4 d'heure avant les repas.

*Enfants* : 1/2 dose.

Prix du flacon de dragées : 13 francs.

**Laboratoires THEVENOT  
DIJON.**

## BOROSODINE LUMIÈRE

**Médication calmante et antispasmodique  
des Affections nerveuses de toute nature.**

**Constitution.** — Solution aqueuse de Tartrate boricosodiqué chimiquement pur dosée à 1 gr. par co.

**Propriétés.** — Renfermé, à poids égal, une plus forte proportion de boré actif que le Tartrate borico-potassique, beaucoup moins toxique et plus efficace.

**Indications.** — Agitation, insomnies, délires, hystéries, névroses, chorée et incontinence nocturne d'urine des anormaux instables ou agités. Les améliorations ne sont jamais obtenues aux prix de dépressions nerveuses profondes, elles s'accompagnent, au contraire, d'une amélioration très nette de l'état général, de l'état intellectuel et même du faciès du malade.

**Mode d'emploi.** — Doses progressives qui varient de 2 à 3 gr. par jour chez l'adulte pouvant être notablement dépassées, sans inconvénient.

La BOROSODINE LUMIÈRE peut, sans inconvénient, être administrée dès le plus bas âge sous forme de SIROP DE BOROSODINE LUMIÈRE exactement dosé à 1 gr. de BOROSODINE LUMIÈRE par cuillerée à café.

**Dose.** — 2 à 6 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau sucrée.

**Formuler.** — *Adultes* : Flacon de Solution BOROSODINE.

*Enfants* : Flacon de SIROP DE BOROSODINE LUMIÈRE.

**LABORATOIRES LUMIÈRE  
29, Cours de la Liberté — LYON.**

## BOROSTYROL SCHLATTER

Spécifique cicatrisant des pertes de substances cutanées ou muqueuses.

**Composition et présentation.** — 1° Soluté alcoolique ; 2° Pommade ; les deux à base de dérivés terpéniques et de phénols substitués.

**Propriétés thérapeutiques.** — Régénérateur de la cellule. Anesthésique local. Antiseptique. Non toxique.

**Indications.** — Plaies, Brûlures, Contusions, Boutons, Aphtes, Piqûres, Crevasses du sein, Rougeurs des nourrissons, Ulcères variqueux, Vulvites, Vaginites, Métrites, Prurits.

**Mode d'emploi.** — Badigeonnages, frictions, pansements adhérents au coton, selon les cas. — Prix : Flacon, 8 fr. 50 ; tube, 7 fr. 50.

**Laboratoires MAYOLY-SPINDLER**

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

A Bruxelles : **LE MARINEL**, Pharmacien,  
273, rue Victor-Rauter.

---

## BOUCHON - BOUTEILLE - TUBES RADIOACTIFS " EMANA "

**Composition.** — Armature métallique portant un tube poreux contenant un sel de Radium insoluble spécial donnant un maximum d'émanation radioactive.

**Forme.** — 1° *Bouteille.* — Hexagonale : peut être couchée sans rouler, le bouchon radioactif l'obstrue en assurant l'étanchéité.

2° *Bouchon.* — Peut s'adapter sur n'importe quelle bouteille. Etanche, par bague en caoutchouc que l'on presse dans l'intérieur du goulot, en tournant la tête du bouchon. Un petit chevalet est joint pour reposer le goulot et empêcher la bouteille horizontale de tourner.

3° *Le Tube* simple avec armature porcelaine se suspend par un fil ou se laisse déposer au fond de la bouteille.

**Indications.** — Toutes les indications de la radioactivité : goutte, rhumatisme, arthritisme, artériosclérose, troubles, ménopause, troubles de la circulation, névralgies, sciatique, anémie.

**Mode d'emploi.** — Remplir la bouteille du liquide à radioactiver (eau de source, eau minérale, boisson, etc.), visser le chapeau dans la bouteille EMANA ou introduire le bouchon dans une bouteille d'eau minérale ou autre. Coucher la bouteille et laisser en contact avec le bouchon pendant une durée de temps en rapport avec le degré de radioactivité à obtenir (voir tableau accompagnant la notice).

**Dose.** — La radioactivation peut être poussée aux environs de 500 millicuries et le liquide absorbé par doses fractionnées entre le repas jusqu'à la valeur d'un litre par jour. Une dose double ou triple en émanation ne peut nuire en quoi que ce soit à l'organisme.

**Laboratoires « EMA »** — 14, rue de la Pépinière — PARIS.



## BOUES RADIOACTIVES EMANIA

**Composition.** — Sous-produits de la fabrication du Radium, spécialement traités et contenant : uranium, radium, acinium, polonium, etc... Préparation ne perdant pas pratiquement sa radioactivité et par suite sans limite d'utilisation.

**Forme.** — Poudre sèche, sans véhicule, masse entièrement radioactive, pouvant s'utiliser en bains, cataplasmes, pommades, pansements gynécologiques, etc... Présentées en boîtes de 1 kg. 0 kg. 500, 0 kg. 250. Pour pansements et applications sur plaies : boîtes stérilisées de 0 kg. 250.

**Indications.** — Rhumatismes divers, goutte, arthrite blennorragique, épидидymites, affections nerveuses, névralgies, sciatiques, affections gynécologiques, métrites, salpingo-ovarites, affections cutanées, ulcères variqueux, etc.

**Mode d'emploi.** — Bains généraux avec 250 gr. Boue Emania. Bains locaux avec 10 à 40 gr. par litre d'eau. Cataplasmes avec Boue Emania délayée dans Q.S. d'eau glycinée. Pommade avec, comme excipient : vaseline, lanoline, huile, etc... Pansements gynécologiques.

**LABORATOIRES « EMA »**

14, rue de la Pépinière — PARIS — Tél. : Lab. 14-81.

## BOULES QUIES

Boules plastiques adoptant exactement la forme de l'orifice auditif. Point de fusion plus élevé que la température maximum du corps = 45°: Boules aseptisées ne pouvant, même en cas d'affections de l'oreille, provoquer de complication. Matières premières chimiquement pures. Anti-vibratoires, ne transmettant pas au tympan les vibrations de l'atmosphère qu'elles interceptent. Constituent le seul procédé pratique et sans danger d'isolement des bruits.

**Indications.** — Accessoire précieux de la Thérapeutique, permettant d'assurer le repos de tous les malades sans avoir recours aux hypnotiques et aux soporifiques toujours dangereux.

Contre le mal de mer, les bruits de l'usine et de la rue, du voyage, de l'hôtel, etc.

Indispensable aux nageurs pour éviter les otites dues à l'introduction de l'eau dans l'oreille.

**DORMIR ET TRAVAILLER  
AU MILIEU DES BRUITS**

(Grand Prix Marseille 1922.)

Echantillons sur demande.

**Boules QUIES**

47, boulevard Victor — PARIS (XV°).

## **Sel naturel de BRIDES**

Extrait des Eaux de la Source Hybord  
12 fr. 50 la boîte.

**Foie. Intestin. Obésité.**

**Dose.** — 1 à 2 paquets le matin, à jeun,  
dans un grand verre d'eau.

**Fructia**

Le Sel de Brides effervescent.  
25 francs le flacon.

**Mêmes indications.**

**Dose.** — Une ou deux mesures le matin, à  
jeun, dans un grand verre d'eau.

**Dépôt de la Compagnie  
des Sous-Produits de Brides**

46, rue Pierre-Charron — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

Tél. : Elysées 76-48.

## **Tablettes-Pilules de BRIDES**

**Composition.** — Taurocholate de soude,  
Sels deshydratés des Eaux de Brides,  
Extraits végétaux.

**Indications thérapeutiques.** — Obésité et  
en général toute la gamme des affections  
arthritiques et hépatiques.

**Dose et mode d'emploi.** — De 2 à 4 ta-  
blettes par jour, soit en deux fois matin  
et soir, soit en une seule fois au coucher.

12 fr. 50 la boîte.

**Dépôt de la Compagnie  
des Sous-Produits de Brides**

46, rue Pierre-Charron — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

Tél. : Elysées 76-48.

## **Thé de BRIDES**

A base de plantes à actions réductives et toni-laxatives.

En infusion, une cuillerée à soupe par tasse à prendre, soit le matin comme petit déjeuner, soit après les repas, soit le soir en se couchant.

7 fr. 50 la boîte.

### **Bain de Brides**

Réductifs et amaigrissants.

Un paquet pour un grand bain à 38°-39°.

Un bain tous les jours ou tous les deux jours.

45 francs le Coffret de 12 bains.

### **Dépôt de la Compagnie des Sous-Produits de Brides**

46, rue Pierre-Charron — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

Tél. : Elysées 76-48.

---

## **BROMADYL VICARIO**

**Brom — diéthyl — acétyl —  
carbamide**

Comprimés à 50 centigrammes.

Provoque rapidement le sommeil ; au réveil ne laisse pas au malade l'impression pénible de dépression nerveuse.

Le tube de 10 comprimés : 8 francs.

### **Laboratoire VICARIO**

17, boulevard Haussmann —  
PARIS (IX<sup>e</sup>).

## BROMÉINE MONTAGU

(Bromhydrate de Codéine.)

**Propriétés.** — Action sédative et analgésique, particulièrement puissante, sans brutalité par suite de l'union des qualités calmantes du Brome et de la Codéine.

Très efficace contre l'élément douleur, sans accoutumance et moins toxique que la plupart des sédatifs.

**Indications.** — Insomnies, Névralgies, Névrites, Toux nerveuses, Démorphinisation.

**Formes pharmaceutiques.** — *Ampoules dosées* 0,02 cgr, 15 fr. — *Pilules* : 0,01 cgr. par pilule. Dose : 2 à 8 pilules par jour, 12 fr. 50. *Sirop* : 0,03 par cuillerée à soupe, Dose : 1 à 3 cuill. par jour, 15 fr. — *Gouttes* : X à XXX gouttes, 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée, 15 fr.

**Laboratoire MONTAGU**

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

## BROMIASE

**Description.** — Capsules kératinisées contenant :

Bromure de potassium..... 0 gr. 30

Bromure d'ammonium..... 0 gr. 20

Levurine extractive..... 0 gr. 10

En flacons de 50 capsules.

**Action thérapeutique.** — La même que celle des bromures, mais sans bromisme grâce à l'action spécifique de la levurine et à l'enrobage de kératine qui ne libère les bromures que dans le milieu alcalin de l'intestin. Préparation de dosage rigoureux, de conservation indéfinie, et ne répugnant pas au malade.

**Indications.** — 2 à 12 capsules par jour, dans l'épilepsie, la chorée, l'hystérie, les névroses, les vomissements de la grossesse.

**Laboratoires Gh. COUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS.

## BROMOGÉNOL PÉPIN

Peptone bromée spéciale  
(Voir l'étude sur l'Iodogénol).

**Forme.** — Gouttes.

**Doses et mode d'emploi.** — XX gouttes de Bromogénol Pépin = 0 gr. 50 de Bromures métalliques. A prendre dans un peu d'eau ou d'infusion aromatique. Renouveler plusieurs fois.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication bromurée très énergique avec un faible poids de brome. Goût agréable. Tolérance parfaite. Préférable aux sirops bromurés et polybromurés.

**Indications.** — Toutes celles des Bromures métalliques : affections du système nerveux, insomnie, hystérie, convulsions, épilepsie, névralgies, etc.

**Laboratoires PÉPIN et LEBOUCC**  
à COURBEVOIE (Seine).

## BROMO-MAISINE

Globules.

Combinaison directe du *Brome* et d'une *Albumine* d'origine strictement végétale, sans aucune autre association médicamenteuse.

**Propriétés particulières.** — Absence d'albumoses ou de peptones d'origine animale. Aucune toxicité. Tolérance absolue même à hautes doses. Suppression complète du bromisme. Disparition de tous les inconvénients dus aux bromures dissimulés ou non. Aucune saturation de l'organisme. Absence de toute altération dans l'estomac. Action directe par solubilité uniquement intestinale.

**Indications.** — Médication donnant des résultats certains et permettant, si besoin, d'instituer un traitement intensif dans : tous états névropathiques, psychoses de toute nature, excitabilité, convulsions, épilepsies, insomnies, névralgies, spasmes et toutes affections relevant de la bromothérapie.

**Posologie.** — Chaque globule contient 2 cgr. de brome actif. Quatre globules correspondent comme effet thérapeutique à un gramme de bromure alcalin. *Enfants* : 2 à 6 globules par jour. *Adultes* : 6 à 15 globules et au delà par jour, en 2 fois, au début des repas.

**Laboratoire R.-J. SOUDAN**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe — Ex-interne des Hôpitaux de Paris  
6, rue Rosenwald — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## BROMONE ROBIN

Combinaison physiologique de Brome et de Peptone de viande de bœuf.

Gouttes : 40 gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gr. de bromure de potassium.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : XX à 40 L gouttes. *Enfants* : X à XX gouttes.

**A** prendre en deux fois aux principaux repas dans un peu de boisson.

**Propriétés thérapeutiques.** — Non toxique, très assimilable. Ne fatigue pas le tube digestif. Pas de bromisme. Tolérance parfaite. Aucun mauvais goût.

**Indications.** — Excitabilité nerveuse, troubles de la femme, fatigues cérébrales, insomnie des vieillards, convulsions des enfants, hystérie, épilepsie.

**Laboratoires M. ROBIN**  
13, rue de Poissy — PARIS.

## BROMOSTRONTIURANE

**Composition.** — Bromure de Sodium, Chlorure de Strontium, Urée.

**Formes.** — Boîtes de 1, 3, et 8 ampoules intrav. ou intramusc.

Boîtes de 25 tablettes.

**Indications.** — *Toutes les dermatoses prurigineuses, Eczema aigu et chronique, dermites, prurits consécutifs à la gale et au Psoriasis, etc...*

**Avantages.** — Aucune sensation de cuisson. Effets extrêmement rapides (eczéma aigu notamment).

Littératures et échantillons.

**Laboratoires des Dr R. et O. WEIL**  
**Établ. MERMINOD et Co, Concession.**  
49, rue de Paradis — PARIS (Xe).  
Tél. : Provence 30-32.

## BROMOVOSE

Combinaison organique bromo-albuminoïde stable.

**Propriétés thérapeutiques.** — Grande affinité du brome pour les tissus, élimination beaucoup plus lente qu'avec les bromures alcalins, d'où action thérapeutique plus sûre et plus prolongée par imprégnation des centres nerveux.

Pas de phénomène d'accumulation, ni de bromisme. Tolérance parfaite.

**Indications thérapeutiques.** — Insomnies. Excitabilité nerveuse. Palpitations cardiaques. Convulsions. Névroses. Épilepsie, etc.

**Dosologie.** — XL gouttes à prendre 2 ou 3 fois par jour dans un peu de liquide.

Prix de vente au public : 15 francs.

**Laboratoire MADYL**

14, rue de Miromesnil — PARIS

Téléphone : Anjou 16-55.

---

## BROMURES SOUFFRON

Bromure de Potassium (KBr)

Bromure de Sodium (NaBr).

Chimiquement purs - Titrés et inaltérables.

Pas de bromisme.

Solution à 2/15. Une cuill. à potage contient 2 gr. KBr ou NaBr.

Sirop à 2/20. Une cuill. à potage contient 2 gr. KBr ou NaBr.

**Dose et mode d'emploi.** — De 0 gr. 25 cgr. à 4 gr. par jour et plus.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antinervin.

**Indications.** — Affections nerveuses, insomnie, chorée, épilepsie, hystérie, névroses.

**Société Générale  
d'Applications Thérapeutiques**

**THERAPLIX**

*Pierre BRETEAU, Pharmacien*

Membre de l'Académie de Médecine

157, rue de Sèvres — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## BRONCHITOL

*Sirop de Thiocol pur, procédé français* (Thiocol Elzévir).

Modifie et tarit les sécrétions bronchiques. Aseptise la flore microbienne pulmonaire.

*Spécifique de la tuberculose* et de la bronchite à leurs diverses phases.

Agréable au goût.

Ne donne pas de troubles gastriques.

*Augmente même l'appétit des tuberculeux.*

Le Thiocol Elzévir est *absolument alcalin* (point capital).

**Posologie.** — 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants* : dose moitié. Ces doses peuvent être augmentées après avis du médecin.

Echantillon et littérature au Corps médical.

**Laboratoires H. SALLE**

4, rue Elzévir — PARIS (III<sup>e</sup>).

## BRONCHODERMINE

Laboratoires du Docteur TISSOT.

Sous ce nom (déposé) est présenté un nouveau produit à base de *corps gras, spécial, adhérent à la peau*, pour obtenir l'absorption simple et rapide des éléments les plus connus dans le traitement des voies respiratoires : Gaïacol, Sève de Pin, Terpinol, Eucalyptol et Helenine.

La peau est l'agent *dyaliseur, absorbant à grande surface*, le plus actif.

En respectant les *voies stomacales, intestinales et rénales* (ce qui a son prix) on peut traiter par simple application tous les *rhumes, bronchites, pneumonies, gripes, pleurites, danger de bacillose, coqueluches*, etc., etc...

**Mode d'emploi.** — A tous les âges, étendre une bonne couche de Bronchodermine sur le dos, et au besoin la poitrine, recouvrir d'ouate ou de flanelle toujours la même.

**Laboratoires du Docteur TISSOT**

34, boulevard de Clichy — PARIS.



## BRONCOSOL

Spécifique des affections broncho-pulmonaires.

**Composition.** — Le Broncosol ne se présente que sous la forme de comprimés, chaque comprimé renferme : Codéine, 0 gr. 015 ; Extrait d'aconit, 0 gr. 01 ; Extrait de belladone, 0 gr. 01 ; Terpène, 0 gr. 10 ; Thiocol, 0 gr. 05 ; Ipéca pulvérisé, 0 gr. 02.

**Action thérapeutique.** — Hypnotique puissant, calmant nerveux, modificateur des sécrétions bronchiques, expectorant parfait, régulateur des actes respiratoires.

### Posologie et mode d'emploi :

*Adultes* : 5 ou 6 comprimés par 24 heures.

*Enfants* de plus de 10 ans : 2 ou 3 comprimés par 24 heures.

Avaler les comprimés sans les sucer ni les croquer, de préférence dans l'intervalle des repas et au moment des crises.

Prix : 11 francs la boîte de 20 comprimés.

**Laboratoires CH. BRÉSIL**

12, rue Saint-Gilles — Paris (III<sup>e</sup>).

Téléphone : Archives 67-05.

---

## BUCMINE

### Buchu-formine.

**Composition.** — Formine de pureté absolue, complètement indolore, buchu stabilisé.

**Formes et doses.** — Granulés de saveur agréable, 2 à 4 cuillerées à café. Comprimés à 0,50, 2 à 4 par jour.

**Indications.** — Affections des voies biliaires et urinaires. Uricémie infantile. Irritation de l'épithélium urinaire. Maladies infectieuses. Infections entéro-rénales post-grippales.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires G. WARIN**

4, Chaussée de la Muette — PARIS.

## BULGARINE THÉPENIER

Culture pure de Ferments lactiques bulgares sur milieu végétal.

**Forme.** — Bouillon, comprimés et poudre.

**Indications thérapeutiques.** — Entérite muco-membraneuse, gastro-entérite (des nourrissons et de l'adulte). Diathèse goutteuse, Constipation, Diarrhée, Entérite tuberculeuse, Infections hépatiques (d'origine intestinale), Dysenterie, Dermatose, Furunculoses Prophylaxie de la Fièvre typhoïde et du Choléra.  
**Poudre :** Rhinites, Ozènes, Stomatites, pansement des Plaies.

**Modes d'emploi.** — *Adultes :* Sucrer 2 comprimés ou boire un verre à madère de Bouillon 4 fois par jour 1/2 heure avant le repas.

**Enfants :** Demi-dose.

Saupoudrer, insuffler ou priser la Poudre.

Prix : La boîte ou flacon : 12 fr. 50.

Le 1/2 flacon de bouillon : 8 fr. 75.

Laboratoire des Ferments

du Docteur A. THÉPENIER

10 et 12, rue Clapeyron — PARIS.

R. C. Seine 150.854.

## BURSOL

**Troubles circulatoires. Ménopause. Varices. Hémorroïdes.**

Extrait fluide en solution glycinée de principes actifs de plantes douées de propriétés constrictives du système vasomoteur (Bourse à Pasteur, Cyprès).

**Indications.** — Affections veineuses du Bassin et des membres inférieurs, dues à un relâchement des parois (Varices, Hémorroïdes, Varicocèle) et dans les affections qui sont la conséquence de troubles veineux (Irrégularités et suppression des règles, Coliques Utérines, Hémorragies utérines), Œdème. Sciatiques et névralgies par compression, Aménorrhée.

**Posologie.** — 2 à 3 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau avant les repas.

Laboratoires COUSSINET

20, rue des Martyrs — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## C 40

Traitement des cancers, fibromes et toutes tumeurs malignes.

Savons doubles de Cu et Mg.

### Formes :

1° *C 40 Injectable*, en boîtes de 10 ampoules de 5 cc. et de 2 ampoules de 2 cc. 5.

2° *Comprimés*. — En flacons de 120.

### Doses :

*Ampoules*. — Une tous les deux jours par série de 12 ; faire 3 séries à 4 ou 5 jours de distance.

*Comprimés*. — Deux comprimés le midi. Deux comprimés le soir, pris en mangeant. Faire suivre le traitement pendant un an.

*Prix* : 60 fr. la boîte d'ampoules.

22 fr. le flacon de comprimés.

*Durée* : 20 jours.

**Laboratoires D. DROUET et PLET**  
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

## CACHET DU Dr BOVEIL

à l'Amino-Phéno-Théine.

Calmant infailible de l'élément douleur, quelle qu'en soit l'origine. Tolérance parfaite. Aucune contre-indication.

**Indications.** — Névralgies, Migraines, Crises de Rhumatisme ou de Goutte, Insomnies, Fièvre, Grippe, Influenza, Courbature, Paludisme, Douleurs menstruelles, Maux de dents, Otite. Mastoïdites et toutes douleurs.

**Doses et Mode d'emploi.** — Un cachet au moment où l'on souffre, avec un liquide chaud de préférence.

*Dose moyenne* : 2 à 3 cachets par jour.

Echantillon et littérature sur demande.

*Prix* : 8 fr. l'étui de 12 cachets.

**Marc PARIS, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**  
1, rue Lasalle — LYON (La Boucle).

## CACHETS CY-TROENE

### Composition.

Ichtyol .....	20	cgr.
Cynoglosse .....	10	—
Troène .....	5	—
Anethol .....	15	—

**Action.** — Régularise la digestion, aseptise le tube digestif, permet la suppression des régimes.

**Indications.** — Entérites, diarrhées, dysenterie, troubles intestinaux, embarras gastriques, etc.

Prix : 10 fr. ; franco 11 fr. 50.

**Laboratoires de l'ADOUR**

38, rue Soult — TARBES (Hautes-Pyrénées).

## CACHETS KAPYTAN

*contre la Grippe.*

**Composition.** — Codéine (1 cent. par cachet), Teinture d'aconit (III gouttes par cachet), Benzoate de soude, terpine, benzonaphtol.

**Propriétés thérapeutiques.** — Sédatif de la toux, fluidifiant les sécrétions bronchiques. Antisepsie du tube digestif (Grippe, Influenza).

**Indications.** — Grippe, Bronchites, Asthme pulmonaire, Rhumes et toutes Affections broncho-pulmonaires.

**Posologie.** — 4 cachets dans les 24 heures, pris entre les repas, dans un grog fortement alcoolisé.

L'étui de 12 cachets : 12 francs.

Echantillons et Littérature :

**Laboratoires BARDET**

Fondés en 1860.

76, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

## CACHETS RÉPARATEURS

**Composition A** avec ovaire, oxalate de fer, bioxyde de manganèse, arrhénal, belladone.

**Indications.** — Chlorose, dysménorrhée naturelle ou chirurgicale, ménopause.

**Composition B**, même composition *sans* ovaire.

**Indications.** — Anémie, chlorose, pauvreté du sang, faiblesse générale.

**Mode d'emploi.** — 2 cachets par jour aux repas principaux.

**Laboratoire des Produits Français**  
**L. HERIN, Ex-Interne des Hôpitaux**  
98, rue Jeanne-Maillotte  
LA MADELEINE (Nord).

---

## CACHETS « ROCHE » DE THIOCOL

1 cachet « Roche » de Thiocol = 0,50 cgr. Thiocol « Roche ».

1 gr. Thiocol « Roche » = 0,52 cgr. gaïacol cristallisé.

**Doses et mode d'emploi.** — 2 à 6 par jour et plus.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène, Eupeptique et Orexique.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les affections broncho-pulmonaires, Rhumes, Bronchites, Grippe, Tuberculose, Coqueluche, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites, etc.

**Avis très important.** — Pour éviter toute substitution inactive ou même toxique, bien spécifier toujours :

CACHETS « ROCHE » de Thiocol.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**  
21, place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

## CACODYLE GONNON

Au Cacodylate de soude pur corrigé par le procédé Hélier.

### Présentation et composition :

*Sirop* : Cacodylate de soude (2 cgr. par cuill. à soupe) associé à un sirop iodophosphaté tannique spécial (Sirop de Lovel).

*Vin* : 2 cgr. de Cacodylate de soude et 20 cgr. de phosphoglycérate de chaux, soude et potasse.

*Granules* : 2 cgr. de cacodylate de soude.

*Ampoules* : 5 et 10 cgr. par cc.

*Gouttes* : 1 cgr. par V gouttes.

**Propriétés thérapeutiques.** — Toujours bien toléré, permet d'administrer l'arsenic à haute dose et pendant longtemps, sans craindre les inconvénients des composés minéraux de l'arsenic. Excitant de la nutrition et modérateur nervin.

**Indications.** — Affections pulmonaires, anémie profonde, chlorose, scrofule, impaludisme, psoriasis, et tout état cachectique.

### Posologie :

*Sirop* : 3 à 6 cuill. à soupe par jour.

*Vin* : 3 à 6 cuill. à soupe par jour.

*Granules* : 3 à 6 par jour.

*Gouttes* : V à XV gouttes par jour.

*Ampoules* : 1 par jour.

Sirop et vin : 12 francs.

Granules, Gouttes et ampoules : 7 fr. 50.

### Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

## CACODYLINE JAMMES

Médication cacodylique intensive indolore.

*Enfants* : Cacodyline A. 10 cgr, Cacodylate de soude (1 cc.). Cacodyline B 20 cgr.: Cacodylate de soude (2 cc.).

*Adultes* : Cacodyline C, 30 cgr. (3 cc.). Cacodyline D : 50 cgr. (3 cc.). Cacodyline E : 1 gr. (3 cc.). Magnésio-Cacodyline. Cacodylate de soude : 30 cgr. Chlorure de magnésium : 20 cgr. (3 cc.).

Une injection intramusculaire par jour.

**Indications.** — Anémies, Asthénie, Tuberculose, Prétuberculose, Syphilis.

Prix public : 18 francs.

**Laboratoires JAMMES**

86, rue Michel-Ange — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

---

## CAFÉINE INVAR

Produit soumis au contrôle physiologique le plus rigoureux, donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

**Action** cardiotonique et diurétique, favorise la contractilité musculaire, les efforts de la marche ; augmente l'activité cérébrale, facilite le travail intellectuel.

**Indications :**

Cardiopathie à la période d'asystolie, adynamie cardiaque, maladies infectieuses, syncope, asthme, emphyseme, hydropisie.

**Forme :**

Ampoules à 0,05, 0,10, 0,20, 0,25 cg. par cc.

**Pharmacie Centrale de France**

21, rue des Nonnains-d'Hyères  
PARIS (IV<sup>e</sup>).

## CALCIFIXINE BUREAU SIMPLE

Poudre de reminéralisation de l'Office Antituberculeux.

Formule du Professeur Albert Robin.

### Composition :

Poudre d'os frais de jeunes animaux .....	150 gr.
Levure de Bière (Vitamine B) .....	25 gr.
Thymusine .....	0 gr. 20
Fluorure de calcium .....	0 gr. 40
Silicate de Chaux .....	50 gr.
Carbonate de Magnésie .....	65 gr.
Carbonate de chaux .....	200 gr.
Excipient pour .....	1 000 gr.

**Forme.** — Comprimés de un gramme.

**Indications.** — Tuberculose pulmonaire, osseuse, pré-tuberculose, Phosphaturie, Rachitisme, Scrofuleuse, consolidation des fractures, etc.

### Posologie :

*Adultes* : 2 comprimés matin, midi et soir aux repas.

*Adolescents* : 2 comp. matin, midi et soir aux repas.

*Enfants* : (6 à 12 ans) 2 comp. midi et soir ; (au dessous de 6 ans 1/2 comp. midi et soir.

**Laboratoires des Produits J. BUREAU**

86, boulevard Port-Royal — PARIS.

## CALCIFIXINE IRRADIÉE J. BUREAU

**Granulé** complexe fixateur du calcium et du Phosphore, par addition de vitamine D. Ergostérine irradiée (0 gr. 02 pour 100) à la Poudre de reminéralisation de l'Office antituberculeux (*Calcifixine simple*).

L'Ergostérine Irradiée employée dans ce granulé est contrôlée biologiquement, et spectrographiquement par la méthode de Tixier. (C.A. des Sciences, 7, janvier 29).

Un centigramme d'Ergostérine irradiée correspond à 5 000 unités biologiques antirachitiques.

*Une cuillerée à café = 500 unités biologiques.*

**Indications.** — Toutes les indications de l'huile de foie de morue. Rachitisme, surmenage, fractures, croissance, dentition retardée, etc..

### Mode d'emploi :

*Nourrissons* : 1 à 2 demi-cuillerées à café par jour aux repas.

*Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café par jour aux repas.

*Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour aux repas.

**Laboratoires des Produits J. BUREAU**

**Louis LAURIN**

86, boulevard Port-Royal — PARIS.



# CALCIONAL

**Ion Calcium Stabilisé.**

**Deux formes :**

**Comprimés sans goût. — Ampoules indolores.**

1 comprimé = 25 centigr. de  $\text{CaCl}^2$  naissant libéré au contact de l'eau et des sécrétions digestives.

1 ampoule = 1 milligramme de calcium ionisé, injectable par la voie sous-cutanée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Celles du chlorure de calcium sans aucun de ses inconvénients.

**Indications.** — A titre préventif et curatif (hémorragies et états hémorragipares, albuminuries, réactions sériques tardives, spasmophilies, tétanies, décalcifications, asthénies).

**Doses :**

**Comprimés :** Nourrissons : 1 à 2 par jour. — Enfants : 2 à 4 par jour. — Adultes : 5 à 8 par jour.

A faire dissoudre dans l'eau sucrée.

**Ampoules :** Enfants (2 à 10 ans), 1 tous les 2 jours. — Adultes, 1 tous les jours.

**Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT**

52, rue La Bruyère — PARIS (IX<sup>e</sup>).

Adresse télégr. : Chevrematte 90 — PARIS.

## CALCIUM SANDOZ

**Composition et propriétés.** — Gluconate de chaux pur, sel soluble, assimilable. Teneur en chaux ( $\text{CaO}$ ) 12,6 p. 100, soit 9 p. 100 de Ca élément. Assure toutes les propriétés physiologiques de l'ion calcium. Le seul injectable par la voie intramusculaire et la voie endoveineuse à doses efficaces et sans inconvénients.

**Forme.** — Ampoules à 10 cc., à 5 cc. et à 2 cc. ; poudre granulée (sans sucre) ; comprimés effervescent et tablettes chocolatées.

**Posologie : Ampoules :**

**Adultes :** 1 ampoule de 5 ou 10 cc. tous les jours ou tous les 2 à 3 jours.

**Enfants :** 1 ampoule de 2 ou 5 cc. tous les jours ou tous les 2 à 3 jours.

**Granulé sans sucre :**

**Adultes :** 3 cuillerées à café bien pleines par jour.

**Enfants :** 2 à 3 cuillerées à café plus ou moins pleines selon l'âge.

**Tablettes chocolatées :**

**Adultes :** 2 tablettes 3 fois par jour.

**Enfants :** 1/2 à 1 tablette 3 fois par jour.

**Comprimés effervescent :**

**Adultes :** 1 comprimé 2 fois par jour.

**Enfants :** 1/3 à 1 comprimé 2 fois par jour.

**Produits SANDOZ**

3 et 5, rue de Metz — PARIS (X<sup>e</sup>).

Dépôt général et Vente :

**Usine des Pharmaciens de France**

129, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

## CALCOLÉOL

à base d'huile de foie de morue *concentrée et solidifiée*, contrôlée biologiquement sur sa teneur en vitamines A et D, de vitamine B et de sels de calcium et de fer.

**Propriétés thérapeutiques.** — Avitaminose, assimilation défectueuse du calcium.

**Indications.** — Rachitisme, Troubles de croissance. Spasmophilie, Maladies infectieuses et contagieuses, Gastro-entérites, Déminéralisation (tuberculose, grossesse, allaitement).

**Forme.** — En dragées inaltérables, sans odeur, forme la plus pratique de prise de l'huile de foie de morue et en granulés. (Dragées et granulés glutinisés ne se dissolvant que dans l'intestin.)

**Dose et mode d'emploi.** — *Adultes* : 4 dragées ou 2 cuillères à café de granulés avant ou pendant chacun des trois principaux repas, à avaler.

*Enfants* : Moitié de ces doses.

Prix au public : *Dragées et Granulés* : 15 francs.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

**Laboratoire des Produits SCIENTIA**

Dr E. PERRAUDIN, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
21, rue Chaptal — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## CALCOMAGNÉSIE

Comprimés à croquer sans addition de liquide. Médication antidyspeptique, neutralisant stomacal.

**Indications.** — Gastralgie avec douleurs et brûlures. Spasmes douloureux de la région stomacale. Fermentations et acidités gastriques. Aérophagie et dilatations gazeuses. Troubles digestifs d'origine nerveuse ou émotive.

**Emploi et doses.** — Croquer 3 ou 4 comprimés au moment des crises douloureuses, sans addition d'aucun liquide.

La **Calcomagnésie** ne renferme aucun produit toxique et peut être ordonnée aux enfants.

Prix : 14 francs.

Echantillon *grandeur normale* sur demande.

**Laboratoire d'Hygiène et de Thérapeutique appliquées**

47, rue de Paris — ASNIÈRES (Seine).

## CALCOZYMASE

### Cure de désensibilisation

**Composition.** — Association de ferments digestifs : pancréatine, maltine, lab-ferment, avec un sel de calcium.

**Mode d'action.** — Chez les insuffisants digestifs et hépatiques, la Calcozymase réalise dans l'estomac une digestion artificielle et complète l'action de la Prézymase (voir Prézymase).

**Indications.** — Tous les accidents dus à une sensibilisation quelconque : urticaire, asthme, arthropathies d'origine anaphylactique, accidents de la goutte, du rhumastisme, etc...

**Mode d'emploi.** — Deux à trois dragées au milieu de chaque repas.

**Laboratoires LEBOIME**

32, quai Voltaire — BEZONS (Seine-et-Oise).

## CALMAG-NA

**Forme.** — Poudre impalpable, légèrement aromatisée.

**Composition.** — Sous-gallate et sous-carbonate de Bismuth, carbonate de Magnésium, bicarbonate de Soude, carbonate de Calcium, Kaolin colloïdal.

**Action thérapeutique.** — Neutralisation de l'hyperacidité et sédation des troubles gastriques. Action prompte et prolongée, sans formation d'acidité secondaire. Ne constipe pas. Aucune toxicité.

**Indications.** — Hyperchlorhydrie, dyspepsies, gastralgies, pyrosis, flatulence, etc...

**Mode d'emploi.** — 1 cuillerée à café délayée dans un verre d'eau. Si nécessaire, renouveler la dose toutes les 2 ou 4 heures.

La boîte : 17 fr. 50.

Prière d'adresser toutes demandes de renseignements et d'échantillons aux :

**Laboratoires SUBSTANTIA S. A.**

**F. Guillemoteau, pharmacien**

13, rue Pages — SURESNES (Seine).

## CALMOSUPPOS SÉDATIFS

Seul analgésique et antispasmodique agissant d'une façon constante sans fatiguer l'estomac.

Un seul dosage pour *adultes* seulement :

Ext. de belladone-codex 1908.....	0 gr. 025
Ext. de jusquiame-codex 1908 ....	0 gr. 025
Ext. de piscidia-hydro-alcool .....	0 gr. 025
Analgésime.....	0 gr. 50
CO <sup>3</sup> Na H.....	0 gr. 10
Beurre de cacao, Q. S.....	1 suppositoire.
Livrés { en boîtes de 2 .....	3 fr. 50
— de 6.....	10 fr. »

## CALMOSUPPOS ANTITHERMIQUES

Médication idéale pour combattre la fièvre quelles qu'en soient sa violence et son origine.

Trois dosages permettant de les désigner pour tous les âges :

### Bébés :

Bromhydrosulfate quinine.....	0 fr. 10
Amidopyrine.....	0 gr. 05
Phénédine .....	0 gr. 05
Théine.....	0 gr. 005
CO <sup>3</sup> Na H.....	0 gr. 05
Beurre de cacao, Q.S.....	1 suppositoire
Livrés { en boîtes de 2 .....	2 fr. 75
— de 6 .....	8 fr. »

### Enfants. Adultes

Bromhydrosulfate quinine .	0 gr. 20	0 gr. 30
Amidopyrine .....	0 gr. 10	0 gr. 20
Phénédine.....	0 gr. 10	0 gr. 20
Théine .....	0 gr. 02	0 gr. 05
CO <sup>3</sup> Na H .....	0 gr. 10	0 gr. 10
Beurre de cacao, Q. S.....	1 suppositoire.	
Livrés { en boîtes de 2....	3 fr. 25	3 fr. 75
— de 6 ....	9 fr. 50	11 fr. »

### Echantillons :

#### Laboratoire des CALMOSUPPOS

G.-H. Boivert, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,

La MOTHE-SAINT-HÉRAYE (Deux-Sèvres).  
R. C. Niort 6318.

## CALOMEL VICARIO

Ces petits comprimés se désagrègent réellement avec une très grande rapidité sous l'influence de l'humidité du tube digestif. Ils s'avalent comme des pilules. En mettant un comprimé sur la langue, on peut constater combien, malgré sa dureté apparente, la désagrégation est rapide. Dix secondes suffisent, par exemple, pour un comprimé de calomel à un centigramme.

**Calomel à un milligramme.**

- un quart de centigr.
- un demi-centigr.
- 1 centigr.
- 2 centigr.
- 5 centigr.

Le flacon de 80 comprimés : 6 francs.

**Laboratoire VICARIO**

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## CAMPHODAUSSÉ

(Camphre soluble dans l'eau.)

(Camphosulfonate de soude.)

Ampoules de 1, 2, 5 et 10 cc. titrées à 10 % de camphre en solution aqueuse. Même posologie que l'huile camphrée. Action plus rapide grâce à sa facile résorption. Injection complètement indolore et ne laissant pas de nodosités.

**Indications.** — Stimulant cardiaque dans l'*adynamie* et au cours des *maladies infectieuses*. Son emploi est particulièrement recommandé dans les cas de *collapsus cardiaque imminent*, où il est nécessaire d'agir vite.

**Mode d'emploi.** — 1 à 5 cc. une ou plusieurs fois par jour par voie *hypodermique, intramusculaire, ou intraveineuse*.

**Laboratoires DAUSSE**

4, rue Aubriot — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## CAMPHO-SPARTÉINE DUBOIS

**Composition.** — Une ampoule contient :

Campho-Sulfonate de Spartéine .....	20 centigr.
Sulfate de Strychnine.....	1/2 milligr.
— de Caféine .....	5 centigr.
Sérum physiologique .....	2 cc.

**Action.** — Puissant stimulant cardiaque.

**Indication.** — Le Campho-Spartéine Dubois remplace l'huile camphrée et le Sulfate de Spartéine comme stimulant cardiaque dans les adynamies, les septicémies, etc., chaque fois qu'il faut agir rapidement. *A ce titre, il doit faire partie de la trousse d'urgence du médecin.*

**Mode d'emploi.** — Chaque ampoule de 2 cc, correspond à 10 centigr. de Sulfate de Spartéine neutre et 6 centigr. de camphre associés à 1 milligr. de Sulfate de Strychnine et à 1/4 de milligr. de Sulfate d'Atropine. **Gouttes :** XX à XL gouttes par jour.

Il s'administre par voie hypodermique, intramusculaire (indolore) ou intraveineuse. Les doses sont d'une à trois ampoules suivant les cas chez les adultes et les enfants au-dessus de 10 ans ; une demi à deux ampoules chez les enfants au-dessous de cet âge.

**Laboratoire ROBERT DUBOIS**

52, rue Montesquieu — ASNIÈRES (Seine).

## CAMPHOSTYL LACROIX

**Composition.** — Nouveau dérivé du camphre soluble dans l'eau.

**Avantages.** — 1° Absorption immédiate. 2° Injection indolore ne produisant ni nodosité ni réaction. 3° Elimination sans subir aucune transformation de l'organisme.

**Indications.** — Adynamie, pneumonie, broncho-pneumonie, collapsus.

**Formes pharmaceutiques.** — 1° *Camphostyl simple.*

A. *Ampoules.* — 1° Boîtes de 6 et 12 ampoules à 0 gr. 10 ; 2° boîtes de 6 et 12 ampoules à 0 gr. 20 ; 3° boîtes de 6 ampoules à 0 gr. 50.

Pour le corps médical, en boîtes de 25, 50 et 10 ampoules.

B. *Gouttes.* — XX à CXXX gouttes par jour.

2° *Camphostyl spartéiné.* — Boîtes de 6 et 12 ampoules à 0,20 camphostyl et 0,05 de spartéine.

Echantillon sur demande.

**Laboratoires LACROIX**

(V. MEROBIAIN et fils, Successeurs).

37, rue Pajol — PARIS (XVIII°).

## CAMPHRO-SALYL FRAISSE

### Composition :

Salicylate de Benzyle.....	0 gr. 50
Camphre .....	0 gr. 10
Huile d'olive pure.....	5 cc.

### Indications :

Sciatique. — Névrites aiguës ou chroniques.

### Forme :

En ampoules de 5 cent. cubes.

5 à 6 ampoules suffisent pour guérir une sciatique rebelle.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 20 francs.

**Laboratoires FRAISSE**

8, rue Jasmin — PARIS.

## CAMPHYDRYL ROBIN

Dérivé camphré en solution aqueuse, solution à 5 p. 100.

Ampoules de 1, 2, 5 cc.

**Dose et mode d'emploi.** — Injections sous toutes formes : 1 cc. pour les enfants ; 2 cc. dans les cas ordinaires des adultes ; 5 cc. dans les cas importants et même 10 cc. dans les shocks traumatiques ou opératoires.

**Propriétés thérapeutiques.** — Les mêmes que celles des huiles camphrées et de l'alcool camphré, excitant énergique du cœur et des centres nerveux et respiratoires, analgésique et antiseptique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans les démangeaisons, prurits, brûlures, angines, etc.

**Indications.** — Troubles cardio-vasculaires, états de shock, crises respiratoires, maladies infectieuses, antiseptie des plaies, antiseptie et analgésie des prurits, acnés, démangeaisons.

L'action est plus rapide et plus intense que celle du camphre. L'injection est indolore et n'amène pas de réaction locale.

**Laboratoires M. ROBIN**

13, rue de Poissy — PARIS.

## CANTÉÏNE BOUTEILLE

**Forme.** — Elixir.

### Composition :

Cratœgus.....	XXV gouttes.
Passiflore .....	0 gr. 50
Hamamélis.....	XXX gouttes.
Salix Alba .....	0 gr. 025
Excipient. Q. s.	par cuillerée à café.

**Indications.** — Eréthisme cardiaque. Troubles circulatoires et troubles nerveux consécutifs. Ménopause. Neurasthénie. Mélancolie. Déprimés. Varices. Hémorroïdes.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 cuillerées à café par jour avant les repas.

### Laboratoire E. BOUTEILLE

23, rue des Moines — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Tél. : Marcadet 04-02.

## CAOGLANDS

Caoglands ou Cacao aux glands est **un** aliment réconfortant très digestible, suppléant très avantageusement au café, au thé et au chocolat.

**Indications.** — Toutes les affections catarrhales des organes digestifs, de l'enfant et de l'adulte.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 cuillerées à café délayées à froid dans un peu d'eau ou de lait porté à ébullition. Laisser cuire quelques minutes.

**Nota.** — Eviter les casseroles de fer, qui altèrent le produit.

### Laboratoire du Valeromenthol

10, rue Poncelet — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Téléphone : Wagram 37-58.



## CAPARLEM

Capsules *gélatinisées* d'Huile de Haarlem  
*pure et vraie* à 0 gr. 15.

Cholagogue. Antiseptique biliaire. Lithiase biliaire simple ou infectée. Cholécystites chroniques, lithiasiques ou non.

Toutes variétés de Pyélonéphrites. Lithiase rénale.

### Posologie :

Une à deux capsules au milieu des deux principaux repas, 10 à 15 jours par mois.

### Laboratoire LORRAIN

de Produits Synthétiques Pures

ÉTAIN (Meuse).

---

## CAPSELLASE

Médicament anti-hémorragique.

**Composition.** — Extrait stabilisé de Capsella.

**Indications.** — Métrorragies, Hémoptysies, Hémorragies de toute nature.

**Forme.** — Pilules dosées à 125 milligrammes.

**Propriétés.** — Modère et régularise les périodes menstruelles.

### Posologie :

*Dose moyenne* : 6 à 8 par jour, par prises de deux.

*Hémorragies graves* : jusqu'à 12 à 14 pilules par jour.

Prix de vente : 12 francs.

### Laboratoires GROS

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.

## **CAPSULES BARDET**

à l'Huile de Haarlem vraie.

**Composition.** — Chaque capsule contient VIII gouttes d'Huile de Haarlem vraie, garantie importée de la *seule* maison fabriquant la véritable Huile.

**Indications.** — Insuffisances hépatique et biliaire, Calculs biliaires, Coliques hépatiques, Ictère, Coliques néphrétiques, Pyélo-Néphrite, Cystites, Arthritisme, Asthme, etc.

**Posologie.** — Affections aiguës : 2 à 4 capsules par 24 heures.

Affections chroniques et cures d'entretien : 1 à 2 capsules par 24 heures.

A avaler avec une gorgée de liquide froid.

Formuler :

## **CAPSULES BARDET**

Échantillons et Littérature :

**Laboratoires BARDET**

fondés en 1860.

76, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>),

## CAPSULES BRUEL

à l'Éther Amyl Valérianique.

Sous la forme originale (1881) des capsules Bruel, l'Ether Amyl Valérianique est un médicament antispasmodique puissant dont l'emploi est formel toutes les fois qu'on voudra prescrire un antispasmodique puissant et sans danger.

Dépourvu de toute toxicité, il permet, aux doses thérapeutiques, de calmer sans morphine les spasmes les plus rebelles aux médicaments, depuis l'angoisse des aortiques et des nerveux jusqu'au spasme douloureux des coliques hépatiques et néphrétiques. C'est un précieux hypnogogue.

**Doses.** — 3 à 15 capsules par jour.

Le flacon : 10 francs.

Brochures et échantillons :

**G. BRUEL**

36, rue de Paris — COLOMBES (Seine).

---

## CAPSULES DARTOIS

Composées de créosote de hêtre véritable, titrées en Gaïacol, à la dose de 0,05 cgr. dissoute dans 0,20 cgr. d'huile de foie de morue garantie d'origine.

**Dose.** — Commencer par une ou deux capsules pour arriver progressivement à la dose moyenne et généralement suffisante de 3 à 4 à chaque repas, ou matin et soir avec une tasse de lait ou de tisane.

**Propriétés.** — Elles se dissolvent lentement dans l'intestin, répandent le produit actif sur une grande surface, divisent la créosote à l'infini et multiplient son action antiseptique sans jamais amener de troubles digestifs.

**Indications.** — Toux, Catarrhes, Bronchites chroniques, Tuberculose, etc.

**Laboratoire FREYSSINGE**

6, rue Abel — PARIS.

## CAPSULES DE MORRHUINE PUY

à l'extrait complet d'Huile de Foie de Morue phosphoré et superiodé.

Dosées à 2 milligr. d'iode combiné par capsule.

Elles représentent chacune 15 grammes d'huile de foie de morue débarrassée de l'oléine et margarine indigestes.

L'extrait complet d'huile de foie de morue, obtenu par un procédé spécial breveté, contient réellement toutes les Vitamines, les acides gras, le brome, l'iode, le phosphore, la lécithine, principes actifs de l'huile de foie de morue.

Maladies du système lymphatique, Ralentissement des fonctions lymphoïdes, Scrofule, Engorgements ganglionnaires, Adénopathie, Arthritisme, Scléroses, Cachexie, Rachitisme.

**Doses.** — *Enfants* de 6 à 17 ans : 2 à 4 capsules. *Adultes* 18 ans et au-dessus : 4 à 6 capsules par jour, avant manger.

Envoi de Littérature : **Laboratoire PUY**  
GRENOBLE (Isère).

## CAPSULES ET SIROP PRÉGA

Calmant de la toux et du spasme des bronches.

1° Calme l'irritation et tarit le **catarrhe des muqueuses bronchiques**, grâce à un ensemble d'agents à efficacité connue et éprouvée (codéine, tolu, aconit, benzoate de soude).

2° Combat en outre un autre symptôme pénible, jusque-là négligé, à savoir : le **spasme des muscles lisses de l'arbre bronchique**, par l'adjonction nouvelle d'un dérivé phényl-méthyl-lique, qui calme ces fibres aussi puissamment que la papavérine, sans en avoir la toxicité.

### Posologie :

**Sirop** : 3 à 4 cuill. à soupe par jour ; 10 ans, 5 à 6 cuill. à café ; 5 ans, 2 à 3 cuill. à café.

**Capsules** : 4 à 6 par jour ; 10 ans : 2 à 3.

**Laboratoires DEHAUSSY**  
66, rue Nationale — LILLE.

## CAPSULES JORET ET HOMOLLE

Emménagogue.

**Forme.** — Capsules de gélatine de 0 gr. 20, spécialement étudiées pour être rapidement absorbées par l'organisme.

**Composition.** — Apiol pur et bien défini, préparé et purifié par le procédé des docteurs Joret et Homolle qui découvrirent et isolèrent ce corps.

**Indications.** — Aménorrhée, Dysménorrhée, Ménorrhagie. Innocuité absolue en cas de grossesse.

**Posologie.** — Une capsule matin et soir pendant toute la durée de la menstruation.

Prix : 13 fr. 50

**Pharmacie SEQUIN**

165, rue St-Honoré — PARIS.

---

## CAPSULES NOGUÈS

Codéine 0,002, Aconit (ext.) 0,001, Belladone (extr.) 0,003, Lobélie (ext.) 0,002, Grindelia (ext.) 0,005, Terpène 0,012, Eucalyptol 0,02, Sulfagaïacolate de potasse, 0,04.

**Dose et mode d'emploi.** — 4 à 6 par jour, 2 à chaque repas.

**Propriétés thérapeutiques.** — Calmant de la toux, antiseptique des bronches ; fluidifie les sécrétions bronchiques.

**Indications.** — Toux opiniâtres : bronchites, laryngites.

Prix, le flacon : 10 fr.

**Laboratoires H. NOGUÈS**

11, rue Joseph-Bara — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## CAPSULES RAQUIN

Capsules au *Copahivate de soude*, à enrobage de gluten, insoluble dans l'estomac.

### Avantages :

Tolérance parfaite, ni odeur, ni renvois.

### Doses :

Le *Copahivate de soude*, ou copahu physiologique, est prescrit dans le traitement de la blennorrhagie, d'origine récente ou ancienne, à la dose de 6 à 12 capsules par jour, à prendre en trois fois, le matin, au repas de midi, et le soir en se couchant.

### Établissements FUMOUCHE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

---

## CAPSULES TAETZ

(Elastiques Russes)

à l'**Huile de Ricin vierge**, sous cachet d'origine, garantie rigoureusement pure.

**Forme.** — Capsules molles.

**Propriétés.** — *Purgatif* le plus doux à l'intestin. *Laxatif* idéal.

**Avantages.** — Sans odeur ni saveur, de digestibilité parfaite, permettant l'usage même journalier de l'huile de ricin aux personnes les plus délicates.

**Présentation.** — Boîtes de 4, 6 ou 8 capsules selon la grosseur.

Vente au public : Toutes pharmacies.

Dépôt et Echantillons

**Laboratoires TAETZ**

2, rue Lesdiguières — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## CARBALCALOÏDES

Alcaloïdes (ou principes actifs) adsorbés par un charbon polyvalent (Carbosanis) qui leur sert de véhicule et ne les relâche que dans l'intestin. Les principaux sont :

**La Carbatropine.** — Carbosanis atropiné (*Constipation spasmodique*). 15 francs.

**Le Carbarsèno.** — C + ac. oxyaminophénylarsénique (*Contre parasites intestinaux*). 18 francs.

**La Carbémétine.** — C. + chlorhydrate d'émétine (*Dysenterie amibienne*). 40 francs.

**Le Carbalga.** — C. + iode (*Antiseptique intestinal*).

**La Carbésérine.** — C. + sulfate d'ésérine (*Atonie colique*). 18 francs.

**La Carbocarpine.** — C. + chlorhydrate de pilocarpine (*Constipation atonique*). 18 francs.

**Laboratoires MONTAGU**

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

---

## CARBATROPINE

Charbon organique (Carbosanis) atropiné.

**Composition.** — 1/2 milligr. de sulfate d'atropine pour 10 gr. de carbosanis, soit 1/4 de milligr. d'atropine par cuillerée à café.

**Indications.** — La Carbatropine est utilisée avec succès dans les spasmes du côlon et agit efficacement pour combattre la constipation qu'ils provoquent. L'atropine n'est relâchée par le charbon que là où le bol intestinal est retenu, c'est-à-dire au niveau même du spasme. Le spasme disparaît et la constipation cesse.

**Formes.** — Granulé dosé à 5 milligr. par 100 gr., soit 1/4 de milligr. par 5 gr. (cuillerée à café).

Poudre et cachets.

**Doses.** — 1 à 3 cuillerées à café par jour.

**Dosage spécial pour enfants :**

1/10 de milligr. par cuillerée à café.

Prix : 15 francs.

**Laboratoire MONTAGU**

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

## CARBOCITROL

**Composition.** — A base de citrate trisodique chimiquement pur.

**Indications.** — Gastrite aiguë et chronique. Dilatation de l'estomac. Dyspepsie flatulente. Congestion du foie. Paresse gastrique de toute origine

*Aucune contre-indication.*

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 paquets ou comprimés par jour.

**Laboratoires O. VISCONTI**

64, boul. Barbès — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

Téléphone : Nord 30-21

---



## CARBOLACTYL SIMPLE

Cure de désintoxication intestinale  
hépatique et rénale.

---

**Composition.** — Ferments lactiques sélectionnés, adsorbés par du charbon végétal pulvérisé, extrait pancréatique, algues à mucilage.

**Indications.** — Auto-intoxications gastro-intestinales. Entérites, Diarrhées, Troubles de la nutrition, Troubles fonctionnels du foie, Dermatose.

**Formes.** — 1° Boîte de 30 cachets ;  
2° Poudre avec cuiller-mesure.  
(N'existe pas sous forme de comprimés.)

**Doses.** — Adultes : 3 à 4 cachets ou 6 à 8 mesures *pro die*. — Enfants : 2 à 6 mesures *pro die*.

## CARBOLACTYL BILIÉ

**Composition.** — Identique à celle du Carbolactyl simple avec addition de Bile purifiée et dépigmentée.

**Indications.** — Entérite muco-membraneuse d'origine hépatique, Constipation essentielle, Insuffisances hépatiques et biliaires, Angio-Cholite et Cholécystite, Cholémie, Hépatisme et Cyrrhoses, Diabètes par Dyshépatie, Artériosclérose par intoxication.

**Forme.** — Boîte de 30 cachets.  
(Ni comprimés, ni poudre biliée.)

**Doses.** — 2 à 3 cachets *pro die*, à la fin des repas.

Echantillons et littérature sur demande :  
19, rue de Fleurus — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## CARBOLIN MIDY

*Graines de lin* (sélectionnées et triées) enrobées d'un *mucilage gommeux* et d'un *charbon végétal activé* dit « Acti-Carbone » (maximum de pureté et d'activité).

**Mode d'emploi.** — 4 cuillerées à café par jour, aux repas ou à distance des repas suivant les cas.

### Propriétés thérapeutiques :

- 1° Action mécanique de massage de la graine de lin.
- 2° Action émolliente du mucilage gommeux.
- 3° Action anti-toxique et désinfectante du charbon.

**Indications.** — Toutes les affections gastro-intestinales depuis la constipation chronique jusqu'aux colites aiguës. Aucune contre-indication.

### Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel-Moll — PARIS.

---

## CARBOMÉTINE

**Spécifique des affections de l'estomac, du foie et de l'intestin.**

**Forme.** — Cachets et Granulés.

**Composition.** — Un cachet ou une cuillère à café de granulé renferme : Charbon organique purifié 0 gr. 90, uroformine 0 gr. 10, Condurango 0 gr. 15.

**Actions thérapeutiques et usages.** —

Supprime les gaz produits par les fermentations gastro-intestinales et provoque dans l'intestin des phénomènes d'absorption en fixant sur elle toutes les toxines, analgésique et digestif.

**Indications.** — Fermentations intestinales, dilatation d'estomac, aérophagie, névroses digestives, ptose abdominale, obésité, états pré-ulcéreux, flatulence, glaires, nausées, appendicite chronique, entérite, diarrhées, empoisonnements, dermatoses, auto-intoxication, stase intestinale (cholécystite aiguë, angiocholite aiguë ou subaiguë d'origine lithiasique), cancer, dyspepsie.

**Mode d'emploi.** — Se prend à la fin des principaux repas à la dose de 1, 2 ou 3 cachets ou 1, 2 ou 3 cuillerées à café de granulé.

**Laboratoires LAGOUTTE**

229, Cours Gambetta — LYON (III<sup>e</sup>).

## CARBONATE DE BISMUTH

La forme la plus pratique, la plus agréable, la plus efficace d'administration du Bismuth est certainement la *Tablette Perroud*. A sa pureté, sa division, son adhérence, elle joint l'agrément : le goût n'est pas offusqué, les réflexes fâcheux évités. Par un procédé spécial, de petites quantités de sucre et de cacao diastasé favorisent l'adhérence.

**Composition.** — 50 gr. de corps crépissant par tablette de 10 bâtons contenant chacun 5 gr.

**Doses.** — Plus fortes elles seront, plus rapides les résultats. — *Minimum* : dans l'*Hyperchlorhydrie* 2 bâtons avant chaque repas ; dans l'*Ulcère*, 4 bâtons le matin à jeun ; dans les *Colites*, 1 à 4 bâtons par jour. — Contre les *Oxyures*, médicament puissant (le prospectus indique les doses suivant l'âge). — Dans toutes les gastropathies : *Gastrite*, *gastralgie*, *hypersécrétion* : dans les *fermentations* intestinales, à petites doses, seule ou associée, la *Tablette Perroud* rendra toujours de réels services.

### Laboratoire PERROUD

3, rue Sébastien-Gryphe — LYON  
(anciennement, 7, rue des Archers)

## CARBONÉSIE

Boîte de 30 cachets : 15 francs.

**Composition.** — Charbon activé, charbon animal, charbon végétal, peroxyde de magnésium, carbonate de chaux, magnésie calcinée légère.

**indications.** — Gastro-entérite, entéro-colite, intoxications et auto-intoxications, fermentations gastro-intestinales, etc...

**Posologie.** — Un ou deux cachets après chaque repas. Cure de 15 jours.

Echantillons gratuits :

### Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X<sup>e</sup>)

## CARBOS

**Composition.** — Le premier charbon animal obtenu chimiquement pur sans Sulfures ni Cyanures.

**Forme.** — *Comprimés* de 1 gramme. *Granulé* à 60 p. 100, soit 3 grammes de charbon par cuillerée à café.

**Indications.** — Dyspepsies gastro-intestinales avec flatulences, Fermentations, Putréfactions, Infections intestinales aiguës et chroniques, Empoisonnements, Gastro-entérites des enfants, Diarrhées infantiles, etc.

**Posologie.** — *Comprimés*, 3 à 20 par jour avant ou après les repas. *Granulé*, 1 à 3 cuillerées à café avant ou après les repas.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires E. MILLET**

RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).

---

## CARBOSANIS

### CHARBON ORGANIQUE A POUVOIR D'ADSORPTION CONSTANT

**Propriétés.** — Pouvoir adsorbant considérable, puissant antitoxique dans toutes les infections de l'estomac et de l'intestin ; agit également comme pansement gastro-intestinal beaucoup plus sûr que le bismuth et le kaolin.

**Indications.** — Empoisonnements, Fermentations gastro-intestinales, Hyperchlorhydrie, Ulcus, Entérocolites, Diarrhées intenses.

**Formes.** — Granulé, poudre et cachets.

Prix : 15 francs.

**Laboratoire MONTAGU**

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

## CARDIALGINE DUBOIS

**Composition.** — Une dragée contient :

Bromure de Spartéine .....	3 centigrammes.
Extrait de Strophantus gr.....	1 milligramme.
— d'Aubépine.....	10 centigrammes.
— de Belladone titré.....	5 milligrammes.
Chlorhydrate de Papavérine .....	1 centigramme.

**Action.** — Cardiotonique, régulateur des rythmes du cœur, antispasmodique et sédatif, continue et remplace l'action de la digitale sans crainte d'effets accumulatifs.

**Indication.** — Troubles fonctionnels du cœur et des vaisseaux, insuffisance cardiaque, spasmes vasculaires de l'hypertension, arythmies, tachycardies, érétisme neuro-cardiaque, atonies graves des infections, etc.

### Posologie :

**Adultes :** 3 à 4 dragées par 24 heures.

**Enfants :** 3 à 6 ans : 1 dragée par jour ; 6 à 12 ans : 2 dragées par jour ; 12 à 16 ans : 3 dragées par jour.

**Laboratoire des Produits DUBOIS**

16, boulevard Pereire — PARIS.

## CARDIBAÏNE

Ouabaïne cristallisée chimiquement pure  
Principe actif du *Strophantus gratus*.

**Présentation et posologie.** — 1° *Voie buccale.*  
Solution glycéro-alcoolique à 2 p. 1000 (25 gouttes = 1 mgr. d'ouabaïne).

Petites doses : 25 gouttes par jour en une fois.

Doses moyennes : 50 à 75 gouttes par jour en 2 ou 3 fois. Doses fortes : 100 gouttes par jour en 4 fois.

2° *Voie intraveineuse.* — Ampoules titrées telles que 1 cc. — 1/4 mgr. ouabaïne ; 1/4 mgr. p. injec.

**Indications.** — Toutes les insuffisances cardiaques avec hypotonicité marquée ; en un mot, tous les cas où il y a dilatation cardiaque. Dans toutes les autres variétés d'insuffisance cardiaque, voir **Digibaine**.

Echantillons et littérature :

**Laboratoires DEGLAUDE**

6, rue d'Assas — PARIS (VI<sup>e</sup>). Tél. : Littré 31-85

Belgique : *Agent général* : **L. Prunières**

19, rue Louis-Hap — BRUXELLES.

## CARDIOSTHÉNINE

Médicament du Cœur et des Vaisseaux.

### Définition :

La Cardiosthénine, à base d'extrait de strophantus, de sulfate de spartéine, d'extrait de *crataegus oxyacantha* et d'extrait de valériane, constitue un toni-cardiaque antispasmodique par action vasculaire dilatatrice qui soutient le cœur et diminue les résistances.

### Indications thérapeutiques :

Douleurs précordiales, Dyspnée d'effort, Palpitations, Tachycardie, Angine de poitrine, Goitre exophtalmique, Arythmie, Myocardites, Endocardites, Hypertrophie du cœur, Dilatation des cavités du cœur, Hypertension artérielle, Cardio-artériosclérose, Urémie.

### Posologie :

De 4 à 6 capsules par 24 heures, ou davantage suivant prescription du médecin traitant.

### Laboratoire de Pharmacologie Générale

Dr Ph. CHAPELLE, 8, rue Vivienne — PARIS.

## CARDYL

Camphocarbonate de bismuth  
en solution huileuse.

Injectable par la voie intramusculaire.  
Bien toléré, le Cardyl associe les avantages des sels de bismuth solubles à ceux des suspensions insolubles.

### Indications :

**Syphilis, Spirilloses.**

### Posologie et mode d'emploi :

Injection tous les cinq jours d'une ampoule de 1 cc. (5 centigr. de bismuth métal).  
Série de 15 injections.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

**« SPÉCIA »**

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

**CARMINASE**

du Dr Fayès

(Cachets anti-gazeux.)

**Composition.** — Acétylparaminosalol, craie préparée, hydrate de magnésie, bioxyde de manganèse, poudre d'anis, de jusquiame.

**Propriétés.** — Anti-acide, anti-gazeux, anti-spasmodique.

**Indications.** — Tous les états gastriques caractérisés par des flatulences, des spasmes, de la distension, des éructations gazeuses et les troubles réflexes, cardiaques, respiratoires, céphaliques qui s'ensuivent.

**Forme.** — Cachets médicamenteux.

**Doses.** — Un à chaque repas.

**Laboratoires des Produits Fayès,**  
199, rue Saint-Denis — PARIS (2<sup>e</sup>).

---

**CARNINE LEFRANÇO**

Suc de viande de bœuf crue, concentré à froid, dans le vide, en solution sucro-glycérinée.

**Indications.** — Reconstituant énergétique, prescrit dans : *Anémie, Anorexie, Convalescences, Tuberculose, Affaiblissements, etc.*

**Dose et mode d'emploi.** — Une à quatre cuillerées à soupe par jour, pure ou additionnée d'une boisson froide.

**Établissements FUMOUE**

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.



## CARYPAÏNE

Thérapeutique infantile.

### SIROP

**Papaïne — Extrait de malt — Citro-phosphate de soude.**

**Indications.** — Vomissements. Indigestions. Gastrites. Gastro-entérites. Diarrhées. Diététique mal dirigée. Maltage des bouillies.

**Propriétés.** — La Carypaïne :

*Augmente* la digestibilité de la caséine, de la viande, des œufs.

*Permet* la digestion facile des hydrocarbonés.

*Prévient* et fait cesser les vomissements.

*Tonifie* le système nerveux et augmente le pouvoir excito-moteur des organes digestifs.

*Supprime* l'intoxication intestinale.

Se prend dans de l'eau, du lait, ou dans une infusion.

Pour les bouillies, ajouter la Carypaïne après ébullition au moment

où l'on retire la bouillie du feu. Remuer pour bien mélanger.

Goût agréable. Tolérance parfaite. Doses largement maniables.

### Posologie :

*Jusqu'à 1 an* : Avant les tétées, 2 à 4 cuillerées à café par jour.

*De 1 à 3 ans* : Après les repas, 3 à 4 cuillerées à dessert par jour.

*Au-dessus de 3 ans* : Après les repas, 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

**L. CROC, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,**

SAINT-FONS (Rhône).

## CASCARA MIDY

A base de Cascara Sagrada naturel, complet et épuré, mais non dénaturé par des manipulations chimiques.

**Pilules dosées à :**

1<sup>o</sup> 0,12 cgr. d'extrait hydro-alcoolique de Cascara Sagrada contenant les dérivés oxyméthyl-anthraquinoniques, à l'exclusion des résines drastiques et de l'huile essentielle.

2<sup>o</sup> 0,10 cgr. de poudre sélectionnée de *Rhamnus purshianus*.

**Doses et mode d'emploi.** — 1, 2 ou 3 pilules le soir au dîner. Après 15 jours, espacer les doses.

**Propriétés thérapeutiques.** — Laxatif doux et à effet constant, ni irritant, ni drastique.

**Indications.** — Constipation habituelle et ses troubles, peut être prescrit aux femmes enceintes et aux nourrices.

**Laboratoires MIDY**

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## CASCARINE LEPRINCE



**Indications thérapeutiques.** — Constipation habituelle, Affections du foie, Constipation dans la grossesse, l'allaitement, etc. Cholagogue puis Copragogue de tout premier ordre. (Spécifique des *causes* et des *conséquences* de la *constipation*.)

Véritable traitement et non pas purgatif banal, employé couramment depuis 50 ans.

**Doses et mode d'emploi.** — Pilules à 0,10 : 1 ou 2 pilules le soir au début du repas.

Prix de vente au public : 8 fr. 75.

**Laboratoires du Dr M. LEPRINCE**  
62, rue de la Tour — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

---

## CATALYL Mg.

Solution de Chlorure de Magnésium cristallisé chimiquement pur.

Activité intense — Toxicité nulle — Stabilité.  
*Seule préparation magnésienne au goût vraiment agréable.*

**Indications.** — Asthénies, Surmenage, Hépatisme, Paludisme, Constipation, Senilité prématurée, Dermatoses, Prostatites, Dysfonctionnement des glandes à sécrétion interne, Diabète, *adjuvant puissant des traitements opothérapiques.*

**Mode d'emploi.** — Deux cuillerées à café le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau ou de lait tiède, sucrés ou non. Dose variable.

Une cuillerée à café correspond à 0 gr. 60 de Mg Cl<sup>2</sup>, anhydre.

**Laboratoire DELISS**  
ANTONY (Seine).

# CATAPLASME DU D<sup>r</sup> LELIÈVRE

Antiseptique instantané, émollient, résolutif.  
Approuvé par l'Académie de Médecine de Paris.

**Avantages et indications.** — Il est *instantané et économique*. Plus de manipulations compliquées, plus de linges.

Il est *antiseptique et résolutif*. — Abcès, furoncles, anthrax, panaris.

Il est *anesthésiant*. — Contusions, entorses, brûlures, engelures, eczéma, zona.

Il est *antiphlogistique et émollient*. — Ecchymoses, épanchements, hydarthrose.

Il est *décongestif*. — Laryngites aiguës, faux croup et toutes inflammations.

Il est *inaltérable*, et remplace tous les pansements humides.

**Mode d'emploi.** — Soumettre le cataplasme ou un morceau de cataplasme à une faible quantité d'eau tiède ou chaude jusqu'à parfait gonflement, l'appliquer sur la partie malade et recouvrir d'imperméable.

Comme *véhicule*, ce Cataplasme accepte et retient facilement les substances médicamenteuses les plus variées: laudanum, arnica, etc.

On obtient un *Cataplasme sinapisé* en le saupoudrant de farine de moutarde au moment de l'application.

E. BOULLE, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

Ex-Interne des hôpitaux,

Lauréat de la Faculté de Paris

12, avenue de la Grande-Armée — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## CATEMÉNYL

**Composition.** — Le *Cateményl* est à base : d'*Hamamélis virginica*, décongestif, vaso-constricteur veineux, hémostatique, sédatif ; de marron d'Inde, qui fluidifie le sang et calme spécialement la douleur hémorroïdale ; de *Piscidia erythrina*, sédatif utérin ; de *Viburnum prunifolium*, tonique nerveux, astringent, antiabortif ; d'*Hydrastis canadensis*, vaso-constricteur abdominal, par action élective sur les splanchniques.

**Propriétés et indications.** — Toutes les affections du système veineux : Varices, Hémorroïdes, Etats variqueux, Eczéma variqueux, Phlébites infectieuses et variqueuses, Hyposphyxie des extrémités.

**Mode d'emploi.** — XV à XX gouttes avant chacun des deux principaux repas dans un peu d'eau. Cesser pendant les règles.

Littérature et échantillon sur demande.

Prix : 15 francs.

Laboratoire du docteur LALAURIE

CUXAC-D'AUDE (Aude).

Dépôt général : Office commercial pharmaceutique, 71, rue du Temple — PARIS (III<sup>e</sup>), et ses succursales.

## **CENTROSÉRUM GROSJEAN**

**Composition.** — Sérum renfermant les principes actifs des bulbes frais de chevaux. Obtenu en milieu camphré. Suractivité par hypnisation.

**Forme.** — Délivré en boîtes, 12 ampoules 3 cc. avec dispositif permettant les projections nasales.

**Indications.** — Affections cytotoxiques et spasmodiques du Rhino-Pharynx : Coryzas, Rhumes de cerveau, Rhumes des Foins, Coqueluche, Mal de Mer, Asthme, Rhinites, Sinusites, Laryngites, Gripes, Trachéites et Bronchites.

**Posologie.** — Une, cinq ou six ampoules par jour.

**Laboratoires GROSJEAN**

36, rue de Malte — PARIS (X<sup>e</sup>).

---

## CÉRÉALES-BÉBÉ FAVRICHON

Régime de l'enfant constipé.

**Composition.** — Les Céréales-Bébé, préparées avec la partie des céréales la plus riche en sels minéraux, offrent à l'organisme en formation les phosphates naturels sous leur forme la plus assimilable. Les enfants chétifs et malingres qui en font usage ne tardent pas à prendre du poids.

**Propriétés.** — La constipation, très fréquente chez les petits enfants, provient souvent de l'alimentation concentrée destinée à favoriser leur croissance. Les Céréales-Bébé joignent à leurs propriétés très nourrissantes celle de faire disparaître rapidement la constipation la plus obstinée.

**Particularités.** — Elles ne contiennent aucun produit chimique ou pharmaceutique, aussi peut-on en faire quotidiennement usage, aussi longtemps qu'il est nécessaire.

**Dose.** — 1 an : 4 cuillerées à café pour 150 gr. de lait.

2 ans : 2 cuillerées à soupe pour 200 gr. de lait.

4 ans et plus : 3 à 4 cuillerées à soupe.

**CÉRÉALES GRANULÉES.** — Déjeuner délicieux pour adultes et personnes âgées. A raison des atonies intestinales les plus anciennes et les plus rebelles.

Echantillons et littérature sur demande :

**FAVRICHON et VIGNON**

**Pharmacien-Chimiste**

à Saint-Symphorien-de-Lay (Loire).

## CÉRÉALINE TULIVET

**Composition.** — Farine de Céréales complète (Sels minéraux), tyndallisée à basse température et conservant toutes ses vitamines.

### Forme :

- I. Simple sans cacao ni sucre.
- II. Légèrement cacaotée et sucrée.
- III. Légèrement cacaotée, sucrée et maltée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Aliment de choix pour les enfants et les vieillards.

**Mode d'emploi.** — N° 1. Se prépare au bouillon de légumes ou lait sucré.

Nos 2 et 3. Se préparent à l'eau ou au lait sucré (jaune d'œuf à volonté).

Une cuillerée à bouche pour bouillie claire, 2 cuillerées pour bouillie épaisse.

### Laboratoires TULIVET

52, rue de Poissy — Saint-Germain-en-Laye.

## CÉRÉBRINE FOURNIER

Liqueur agréable, de composition définie, spécifique par excellence des migraines, névralgies rebelles, règles douloureuses.

**Cérébrine simple.** — Pour tous les cas en général de migraines et névralgies.

**Cérébrine bromée.** — Migraines, névralgies tenaces, agit efficacement contre les coliques menstruelles.

**Cérébrine bromo-iodée.** — Névralgies rebelles à tous traitements antérieurs, névralgies faciales, sciatiques.

**Cérébrine iodée.** — Névralgies rhumatismales.

**Cérébrine quiniée.** — Courbature, grippe infectieuse.

**Dose.** — Une cuillerée à soupe dans un peu d'eau une heure avant le repas ou deux heures après. Renouveler au besoin la dose jusqu'à 3 cuillerées par 24 heures.

Prix : 12 fr., toutes variétés.

**A. FOURNIER et C<sup>ie</sup>, Pharmaciens**  
147, boulevard Montparnasse — PARIS (VI<sup>e</sup>).

# CÉRÉBROÏL LEISYN

et Sève Cérébrale Leisyn.

**Composition.** — Sels solubles non oxydés de phosphore directement assimilables. Yagéine, Yagéine, Sels de terres rares.

**Présentation.** — Liqueur et comprimés.

**Indications.** — Insuffisance cérébrale, Dépressions nerveuses, Perte de mémoire, de volonté, Apathie, Irrésolution, Phobies, Tics, Aphasie, Asthénie génitale.

**Propriétés.** — Augmente la Faculté d'attention volontaire, l'Intensité de la pensée, l'Energie morale, la Puissance de travail et la Résistance physique, Facilite la Rééducation cérébrale. Spécifique réel de la Fatigue, du Surmenage et des Neurasthénies.

**Posologie.** — Un comprimé ou une cuillerée à café avant chacun des deux principaux repas. Supprimer toutes médications contenant de la strychnine ou de l'arsenic.

Prix (en France, sauf variations) au public : 25 fr.

Au corps médical, franco : 20 fr.

**Les Laboratoires LEISYN**

1 bis, rue Molitor — PARIS (XVI).

---

## **CERÉOSSINE DEHAUSSY**

(Simple).

**Reconstituant physiologique.**

**Minéralisateur complet.**

*Os frais* : Os longs de l'animal en période de croissance, traités avec leur moelle rouge (facteur antirachitique et de croissance, contrôlé biologiquement sur le rat blanc carencé. *Vitamines D naturelles*).

*Phytophosphine* : Élément phospho-organique extrait des graines de céréales.

*Sels minéraux* : Silice, Manganèse-fer (hémoglobine).

*Extrait parathyroïdien* : Fixateur des sels minéraux, anti-fixateurs du calcium.

*Aucune contre-indication* : Ni Adrénaline, ni Surrénale.

### **Indications :**

Etats pré-tuberculeux et tuberculose, Affections osseuses, Troubles de croissance, Grossesse, Lactation, Convalescence, Surmenage.

### **Posologie :**

*Cachets* : Adultes, 2 cachets. Enfants, 1 cachet.

*Granulé fondant* : Nourrissons : 1 cuillerée à café. Enfants : 2 cuillerées à café. Adultes : 4 cuillerées à café.

*Poudre* : Nourrissons : 1/2 cuill. à café. Enfants : 1 cuill. à café. Adultes : 2 cuill. à café.

**Prix** : 15 francs la boîte de 40 cachets.

**Granulé et Poudre** : 15 francs.

**Laboratoires DEHAUSSY**

**66, rue Nationale — LILLE.**



## CÉRÉOSSINE IRRADIÉE

**Ergostérine activée aux ultra-violets.**

(Triple contrôle : chimique, spectrophotométrique, biologique.)

Associée au complexe organo-minéral « Céréossine ».

### Indications.

*Rachitisme*, Pré-Rachitisme, Croissance, Déminéralisation accentuée chez la femme enceinte et la nourrice.

### Posologie.

La même que celle de la Céréossine simple.

**Cachets.** — *Adultes* : 2 cachets.

*Enfants* : 1 cachet.

Prix : 22 francs.

### Granulé fondant :

*Nourrissons* : 1 cuillerée à café.

*Enfants* : 2 —

*Adultes* : 4 —

Prix : 20 francs.

## CÉRÉOSSINE MÉTHYLARSINÉE

par cachet : 0,020 de méthylarsinate de soude.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 cachets.

*Enfants* : 1 cachet.

Prix : 15 francs.

## CÉRÉOSSINE GAÏACOLÉE

**Posologie.** — *Adultes* : 2 cachets.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires DEHAUSSY**

66, rue Nationale — LILLE.

## CÉRINIL

### Indications :

Tuberculose sous toutes ses formes. Prétuberculose.  
Anémie. Chlorose. Scrofule, etc.

### Action :

Agglutine le Bacille de Koch, neutralise les Toxines. Provoque l'Oxydase du sang ; augmente le taux de l'hémoglobine, le nombre des hématoblastes et des hématies.

### Formule gouttes :

Chlorure de Cérium .....	2 gr. 50
Chlorure de Sodium .....	2 gr. 50
Bromure de Radium .....	(traces)
Eau distillée .....	100 gram.

### Formule ampoules :

Chlorures de Cérium .....	0 gr. 55
Chlorure de Sodium .....	3 gram.
Bromure de Radium .....	20 micros
Eau distillée .....	400 gram.

### Formes :

Gouttes : Ampoules de 1 cc. et de 2 cc.

### Posologie et mode d'emploi :

Les 3 premiers jours faire prendre avant les repas du midi et du soir une goutte.

Tous les 3 jours augmenter d'une goutte à chaque repas, jusqu'à 30 gouttes par jour.

Rester à 30 gouttes pendant 2 mois, puis diminuer progressivement jusqu'à 0.

Reprendre le traitement progressif après un mois de repos.

Pour hâter les bons effets du CERINIL gouttes, faire des injections intraveineuses ou intramusculaires avec les ampoules CERINIL.

Ne commencer les injections que vers le 7<sup>e</sup> jour, après que la tolérance du médicament a été affirmée.

Tous les 3 jours une injection :

- 1 cc. les 3 premières ;
- 2 cc. les 3 suivantes ;
- 3 cc. les 3 suivantes ;
- 4 cc. les 3 dernières.

Suspendre pendant un mois et faire 2 ou 3 séries.

Toutes ces doses sont des doses moyennes. Elles peuvent être augmentées, même doublées sans observer aucun trouble particulier.

Dans le cas de courbature ou de migraine violente, diminuer la dose, pour reprendre, après disparition de ces troubles, la progression, mais ne pas arrêter complètement. Pour les enfants doses moitié moins fortes.

Echantillons et littérature :

Laboratoires CERIOMA

16, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie — PARIS (IV<sup>e</sup>).

# CÉRIOMINE

Reminéralisateur opothérapique radioactif.

**Indications.** — Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Rachitisme, Scrofule. Convalescences. Formation difficile. Neurasthénie. Caries dentaires.

**Action.** — Apporte par la poudre d'os frais et donne à l'organisme : la chaux, la magnésie, le manganèse, le fer, l'iode et le fluor qui lui sont nécessaires.

Supplée au rôle défaillant de certaines glandes, par le thymus et la parathyroïde, qui permettent l'assimilation et empêchent la déperdition minérale.

Enfin, la radioactivité induite du radium favorise la division infinie de tous les éléments de la CÉRIOMINE, la libération des ions minéraux et leur fixation dans les tissus vivants.

Par ses rayons alpha et bêta, *par son émanation, la radioactivité à dose presque infinitésimale, analogue aux radioactivités naturelles de l'organisme humain en état de santé*, provoque une suractivité chimique des sels en solution et des extraits glandulaires favorisant ainsi considérablement le transport et la fixation des ions minéraux ; en outre, elle augmente le taux de l'hémoglobine, le nombre des hématoblastes et des hématies : elle détermine une leucocytose utile.

Introduit dans l'organisme, le radium exerce une réelle stimulation vitale, qui résulte vraisemblablement *de son action élective sur les organes anguiformateurs et le système nerveux* ; on s'explique ainsi le relèvement de l'état général, constaté par tous les cliniciens.

## Formule :

Poudre totale d'os frais.....	500	grammes
Carbonate de chaux.....	1 250	—
Silicate de magnésie hyd.....	500	—
Carbonate de fer.....	250	—
Hydrate de magnésie.....	1 000	—
Sulfate de manganèse.....	65	—
Iodure d'amidon.....	25	—
Fluorure de chaux.....	50	—
Parathyroïde.....	5	—
Thymusine.....	15	—
Bromure de radium.....	250	microgrammes
Sucre vanillé.....	3 090	grammes
Cacao.....	1 250	—

Pour 10 000 comprimés.

**Forme.** — Comprimés agréables au goût.

**Posologie et mode d'emploi.** — Pour les adultes : 2 comprimés avant le repas de midi et 2 avant celui du soir.

Pour les enfants de moins de 7 ans : moitié de la dose ci-dessus. Délayer les comprimés dans un demi-verre d'eau ou les croquer.

Echantillons et littérature:

Laboratoires CÉRIOMA

16, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## CÉTÉMOL

**Formes.** — Perles glutinisées. Ampoules injectables.

**Propriétés thérapeutiques.** — Huile antiseptique stérilisée contenant Camphre, Eucalyptol, Menthol et Thymol, en quantités judicieusement dosées.

**Indications.** — Affections des voies respiratoires, Gripes et tous états infectieux.

**Posologie.** — *Perles* : 6 à 8 par jour.

*Ampoules* : Injection sous-cutanée ou intra-musculaire d'une ampoule de 2 centimètres cubes par jour, et même 2 ou 3 ampoules dans les états infectieux.

Prix de vente au public :

Perles : 12 fr. ; ampoules : 20 fr.

**Laboratoires CARTERET**

15, rue d'Argenteuil — PARIS (1<sup>er</sup>).

---

# CÉTHOCAL

## DU DOCTEUR P. LEMAY

### CÉRIUM — THORIUM — CALCIUM

Toutes les applications des terres rares.

**Indications.** — Traitement externe des Dermatoses, Eczéma, Lupus, etc., Ulcères variqueux, Hygiène des Bébés :

#### Poudre et Pâte CÉTHOCAL

Traitement interne des Dermatoses :

#### Gouttes et Ampoules CÉTHOCAL

Dépression physique et nerveuse, Convalescence, Arthritisme, Infections intestinales :

#### Gouttes CÉTHOCAL

Désensibilisation, traitement de l'asthme, des bronchites chroniques, de l'emphysème, de la coqueluche. Intra-dermo-réaction et Protéinothérapie de la Syphilis :

#### Ampoules CÉTHOCAL

Gynécologie : Traitement des métrites :

#### Poudre et Ovules CÉTHOCAL

**Mode d'emploi.** — *Poudre* : Employer la poudre telle quelle ou, mieux, délayée dans un peu d'eau bouillie, à consistance de crème ; l'appliquer sur la lésion et laisser sécher, faire tomber l'excès avec un coton ou un linge sec. Une application matin et soir.

**Pâte.** — Une application matin et soir.

**Gouttes.** — *Adultes* : XX gouttes, 2 fois par jour, au début des repas de midi et du soir.

*Enfants* : A partir de 6 ans, V à X gouttes.

**Ampoules.** — Voir instructions spéciales dans la notice intérieure des boîtes.

**Ovules.** — Un tous les soirs.

#### Forme et prix :

*Poudre* : 10 fr. *Pâte* : 10 fr. *Gouttes* : 15 fr.

*Ampoules* : 25 fr. *Ovules* : 18 fr.

#### Laboratoire du CÉTHOCAL

8 bis, rue J.-J.-Rousseau,  
FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine).

## CÉTRAROSE GIGON

**Composition.** — Solution d'acide protocétrarique  $C^{30}H^{22}O^{13}$  à 0,016 milligr. par cm. c.

**Forme.** — Gouttes.

**Indications thérapeutiques.** — Médicament à électivité musculaire, Analgésique gastrique, Spécifique contre les vomissements, Vomissements de la grossesse. Etats nauséux, Douleurs gastriques, Troubles digestifs, Indigestions.

**Mode d'emploi et doses.** — XV à XX gouttes en une fois dans un peu d'eau sucrée. Jusqu'à CC gouttes par 24 heures.

**Laboratoires des Produits du Dr GIGON**

**A. FABRE, pharmacien**

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## CHARBON FRAUDIN

**Composition.** — Association de charbons de peuplier et de saule sélectionnés, doués d'une grande porosité.

### Forme pharmaceutique :

1<sup>o</sup> Granulés sphériques.

Avec naphтол B : Charbon naphтолé.

Sans naphтол B : Charbon simple.

Aromatisés à la menthe ou sans arôme.

2<sup>o</sup> Comprimés sans sucre, à 0 gr. 75, recommandés aux diabétiques.

**Propriétés.** — Pouvoir absorbant et adsorbant très grand, grâce à la texture particulière des bois légers employés.

Friabilité des granulés ou comprimés, qui constituent le pansement gastrique par excellence.

**Indications thérapeutiques.** — Aérophagie, Dyspepsies flatulentes, Fermentations intestinales, Intoxications de toute nature.

**Doses.** — 3 à 6 cuillerées à café par jour, à la fin des repas.

### Prix :

Charbon Fraudin naphтолé . . . . 10 fr.

Charbon Fraudin simple . . . . . 9 fr.

Comprimés de charbon Fraudin 9 fr.

### Laboratoires du CHARBON FRAUDIN

4, av. Desfeux — BILLANCOURT (Seine).

Téléph. : Molitor 02-62.

## CHARBON TISSOT

(Grains anisés de).

**Forme.** — Charbon de peuplier aggloméré au gluten mucogène, aromatisé à l'anis, très légèrement additionné de benzo-naphtol, simple ou magnésien.

Le mode d'agglomération en gros grains glutinisés en fait la meilleure forme d'administration du charbon de peuplier en même temps que la plus agréable. *Divisent et expulsent* mieux que les laxatifs.

**Indications.** — Dyspepsie, Gastralgie, Flatulence, Digestions difficiles, Nausées, Hoquet, Renvois, Embarras et Fermentations intestinales. *Pour l'Estomac net et l'Intestin net.*

**Dose.** — 1 cuillerée à café, soit après chaque repas, ou le soir en se couchant, ce qui suffit habituellement.

**Nota.** — Avaler comme des graines de lin avec une gorgée d'eau si possible.

La forme des grains supprime le spasme intestinal. Ne contient ni atropine, ni belladone. Peut être donné à tous les âges et dans tous les états.

**Laboratoire du Docteur TISSOT**

34, boulevard de Clichy — PARIS.

## CHELOÏDINE

Pommade résolutive et calmante à base de Thiosinamine, salicylate de soude et stovaïne.

Dépourvue de toute toxicité.

**Indications thérapeutiques.** — Traitement du rhumatisme chronique, des cicatrices vicieuses et douloureuses, des scléroses.

**Mode d'emploi.** — Deux fois par jour, appliquer, gros comme une noisette, sur la surface malade et faire suivre d'un massage léger.

**Laboratoires DORANTOWICZ**

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI<sup>e</sup>).

Tél. : Roquette 14-12.



## CHENANTHOL

(Vers intestinaux.)

(Ascaris, Ankylostome, Anguillule, Oxyures, Trichocéphale, etc.)

Seule présentation officinale, définitive et parfaite, inoffensive et sûre, de l'essence pure américaine de Chenopode, suivant les prescriptions de la *Fondation Rockefeller*.

**Posologie et mode d'emploi.** — Capsules dosées en volume et non en gouttes (1/4 de cent. cube par capsule). On donne une capsule par 3 années d'âge : maximum : 6 capsules en 3 doses, heure par heure. Purge saline : 1 heure 1/2 après la dernière.

**Régime.** — Pas de régime préparatoire. *Diète de rigueur* pendant le traitement jusqu'à effet complet, de la purge.

Renouveler le traitement au bout de 10 jours si on juge à propos, comme cure radicale.

Prix de vente : 15 francs.

Laboratoire L. HINGLAIS  
EPERNAY (Marne).

## CHÉRALYS (Comprimés)

**Composition.** — Nickel catalytique Du-fayard. Peroxyde de manganèse colloïdal. Cobalt catalytique.

Carbonate de calcium léger. Silicate d'alumine et de magnésie. (En comprimés agréables à croquer).

**Propriétés.** — Basées sur les principes scientifiques les plus modernes. Activateurs des ferments digestifs normaux. Neutralisants. Antifermentescibles.

**Indications.** — Maladies de l'estomac, du foie, des intestins, Diabète.

2 comprimés après les repas et 2 autres ou plus 3 à 4 heures après.

Prix : 10 francs.

Laboratoires DUFAYARD

12, rue des Saints-Pères — PARIS (VII°).

## **CHLORAL BROMURE** **du D<sup>r</sup> DUBOIS**

Sédatif nerveux, de tous points préférable aux barbituriques et aux opiacés, dissimulant la saveur du chloral, n'irritant pas l'estomac.

Liquide sucré représentant 40 cgr. chloral et 60 cgr. bromure par cuillerée à soupe. 1 à 6 cuillerées à soupe ou à café, selon l'âge, dans les 24 heures.

Flacons et demi-flacons.

Insomnies, dysménorrhée, névralgies, névroses, psychoses, coqueluche, épilepsie, malaises des hypertendus.

**DURIEZ**

20, place des Vosges. — PARIS.

---

## **CHLORAL-GERANIE**

**Composition.** — Solution concentrée de chloral cristallisé (2 grammes par cuillerée à café) désodorisé par l'essence de géranium distillé sur roses.

**Forme.** — Délivré en flacon de 60 cc.

**Propriétés.** — Calmant, décongestif, antiseptique.

**Indications.** — Angines, laryngites, pharyngites, amygdalites, stomatites, gingivites.

**Posologie.** — Une cuillerée à café dans un verre d'eau tiède en gargarismes et bains de bouche.

**Laboratoires GROSJEAN**  
36, rue de Malte — PARIS (XI<sup>e</sup>)

## CHLORALOSANE

Hypnotique non toxique, « l'hypnotique de choix des cardiaques et des dyspeptiques ».

**Composition.** — Chloralose pur et complètement exempt de parachloralose.

**Propriétés.** — Non toxique, sans intolérance, ni accumulation, ni accoutumance.

**Indications.** — Insomnies des cardiaques, des dyspeptiques et des neurasthéniques, des fatigués et surmenés. Agitation nocturne. Psychonévroses et anxiété.

**Doses et mode d'emploi.** — De 1 à 4 comprimés, à prendre une demi-heure avant le coucher dans une tasse de tisane ou dans un peu d'eau. Dose moyenne usuelle : 1 à 2 comprimés.

**Prix :** le tube de 10 comprimés de 0 gr. 10 : 5 fr. ; le flacon de 20 comprimés de 0 gr. 10 : 9 fr.

Littérature et Echantillons médicaux :

Établissements **KUHLMANN**

145, boulevard Haussmann — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## CHLORAMINE FREYSSINGE

Sodium-paratoluène-sulfo-chloramine

**Forme.** — Pilules à enrobage de gluten recouvert d'un enduit inattaquable par le suc gastrique.

**Composition.** — Chloramine T 0 gr. 05.  
Charbon de peuplier pulvérisé 0 gr. 10.

**Indications thérapeutiques.** — Dysenteries, Entérites, Paratyphoïdes, Porteurs de germes, Colibacillose, Dermatoses, etc. D'une innocuité absolue, elles permettent *réellement* de réaliser la désinfection intestinale (Fétidité des selles, etc.).

**Posologie.** — 2 à 8 pilules par jour au commencement des principaux repas.

Laboratoire **FREYSSINGE**

6, rue Abel — PARIS.

## CHLORASEPTINE, OPTIMA

(Sodium paratoluène sulfochloramine, 0,25 par comprimé.)

Agit à l'instar de la solution de Carrel-Dakin.

**Forme.** — Comprimés dosés à 25 cgr.

**Indications.** — Antisepsie générale. Affections buccale, urétrale vésicale. Antisepsie hygiénique. Traitement d'affections septiques.

**Mode d'emploi.** — *Chirurgie générale* : 2 à 4 comprimés dans 100 cc. d'eau.

*Oculistique* : 1 à 2 comprimés pour 100 cc.

*Urologie et gynécologie* : 2 à 8 comprimés par litre.

*Stomatologie* : 1 comprimé par verre d'eau.

A dissoudre dans l'eau froide ou légèrement tiède.

**Laboratoires « OPTIMA » S. A.**

78-80, Grande-Rue-au-Bois — BRUXELLES.

---

## CHLORÉTHYLE BENGUÉ

**Chloréthyle Bengué.** — Anesthésie locale, névralgies.

Flacons en métal et en verre. Fermeture à clapet très pratique.

**Anestile Bengué.** — Mélange de chlorure d'éthyle et de méthyle volatil à 2°.

Anesthésie locale, névralgies.

**Narcotile Bengué.** — Chlorure d'éthyle pur pour anesthésie générale.

Flacon de 50 gr. gradué à gros jet, fermeture à clapet. — Tubes scellés 3, 5, 10 cc. pour anesthésie générale.

**Chlorure de méthyle pur.** — Bidons de 250, 500 grammes et 1. kilo.

**Docteur BENGUÉ**

Pharmacien,

16, rue Ballu — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## CHLORHYDROPEPTINE

**Excitant digestif complémentaire.**

**Composition.** — Ferments digestifs, acide chlorhydrique et noix vomique, en combinaison soluble.

**Action.** — Les dyspepsies par hypofonctionnement sont les plus fréquentes et l'action synergique des composants de cette préparation donne les meilleurs résultats dans les cas suivants :

**Indications.** — Dyspepsies par hypofonctionnement des glandes, par manque d'acide chlorhydrique, par excès d'acides organiques. Lourdeurs, Congestions de la face, Flatulences.

**Posologie et mode d'emploi.** — Une cuillerée à café dans un verre de boisson habituelle au milieu des deux principaux repas et au besoin une seconde à la fin des mêmes repas.

**Laboratoire du Docteur COIRRE**

5, boulevard du Montparnasse — PARIS.

---

## CHLORIDIA

Pepsine. — Chlorhydro — Cocaïnée — Chloroformique.

**Indications.** — Dyspepsie, gastralgie, crampes, renvois, vertige stomacal, dilatation de l'estomac et, en général, toutes les maladies de l'estomac se reliant à une insuffisance de sécrétion du suc gastrique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Le Chloridia restitue au suc gastrique tout son pouvoir digestif par l'effet de la pepsine et de l'acide chlorhydrique, oppose aux fermentations putrides l'action antiseptique de son eau chloroformée, et fait disparaître les sensations douloureuses grâce à la présence d'une légère quantité de chlorhydrate de cocaïne.

**Forme et dose.** — Le Chloridia est un liquide limpide de saveur sucrée et agréable, que l'on prend à la dose d'une cuillerée à café dans un quart de verre d'eau au commencement de chaque repas.

Les personnes qui n'obtiennent pas un soulagement rapide peuvent doubler la dose ou diminuer la quantité d'eau.

**Laboratoires des PRODUITS DANNEC'H**

**BRUN ET MARTINEAU**

64, rue des Tournelles — PARIS (III<sup>e</sup>).

R. du C. Seine 218-670.

## CHLORINOL

### INHALANT

**Forme pharmaceutique et composition.** — Huile végétale neutre et stérile avec chlorétone, orthoforme, camphre et essences.

**Propriétés.** — Sédatif, décongestionnant et antiseptique des voies respiratoires.

**Avantages.** — Huile de qualité *exceptionnelle* très *diffusible*, très *agréable*, associant à des médicaments actifs des essences dont le *choix* a été déterminé d'après leur *pouvoir antiseptique* et leur action *non irritante*.

**Indications.** — Toutes affections du rhinopharynx.

**Présentation et mode d'emploi.** — Deux formes :  
1° *Liquide* III à IV gouttes, 3 à 4 fois par jour, en instillations nasales ou en pulvérisations et en *injections intratrachéales*.

2° *Capsules* pour instillations nasales, 3 à 4 fois par jour.

**Prescription.** — Un flacon Chlorinol Falvy, ou une boîte capsules Chlorinol Falvy.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences

Ex-interne. Lauréat des Hôpitaux de Paris

40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## CHLORMAGNÉSIUM FISCH

**Composition.** — Comprimés Chlorure de Magnésium à 0 gr. 20, assez petits pour être avalés comme pilules ou dissous.

**Indications.** — *Cytophylactique*, *neurotonique*, *cholagogue*, préventif du cancer etc., Dermatoses, verrues.

**Mode d'emploi.** — 3 fois par jour 2 comprimés à chaque repas. On peut encore réduire à 3 comprimés par jour, selon indication du médecin.

Prix : 9 fr.

Laboratoires FISCH et C<sup>ie</sup>

4, rue d'Illzach — MULHOUSE (Haut-Rhin).

Dépôt à Paris : 49, rue de Paradis.

Tél. : Provence 30-32.

## CHLOROBACILLINE

**Composition.** — Chloramine T, Charbon de peuplier pulvérisé, Agar Agar pulvérisé.

**Forme.** — Comprimés glutinisés solubles dans l'intestin.

**Propriétés thérapeutiques.** — Bactéricide, Désodorisation complète des selles, Désinfection de l'intestin sans irritation ni toxicité.

Résultats cliniques concluants dans les divers états intestinaux toxi-infectieux : entérites, dysenteries, paratyphoïdes, affections grippales.

**Mode d'emploi.** — 1 à 3 comprimés au début de chaque repas (2 à 6 par jour).

**Laboratoires TULIVET**

G. de Saint-Stéban, Docteur en pharmacie.

52, rue de Poissy — Saint-Germain-en-Laye.

## CHLOROBYL

**Composition :**

Tochlorine .....	0 gr. 05
Bile purifiée .....	0 gr. 10
Charbon .....	0 gr. 10

**Forme.** — En comprimés de 0 gr. 25.

**Propriétés thérapeutiques.** — Désinfection intestinale.

**Indications.** — Entérite, Dysenterie, Affections cutanées.

**Mode d'emploi.** — 2 à 6 comprimés par jour avant les repas.

Prix de vente au public : 12 francs.

**Laboratoires « LOBICA »**

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## CHLORO-CALCION

**Forme :** Solution.

**Composition :**

Solution titrée de *Chlorure de calcium* cristallisé, chimiquement pur, stabilisé.

LXXX gouttes (ou 1/2 cuiller à café) = 1 gr. Ca Cl<sup>2</sup>.

**Indications :**

*Recalcifiant* : Croissance, Tuberculose, Entérites, Carie dentaire, Spasmophilie, Accidents sériques, Grossesse, Allaitement.

*Hémostatique* : Toutes hémorragies ; et comme *préventif* des hémorragies post-opératoires.

*Diurétique déchlorurant* : Albuminuries, Néphrites, Pleurésies, Ascite.

**Mode d'emploi et Doses :**

Dans de l'eau sucrée, de préférence avant les repas.

*Chez les enfants au-dessous de 10 ans :*

IV gouttes par année comme *recalcifiant* ;

XX gouttes par année comme *hémostatique* ;

L à CC gouttes dans les *accidents sériques* ;

3 à 6 fois LXXX gouttes dans la *spasmophilie*.

*Chez les adultes :*

XL gouttes 2 fois par jour comme *recalcifiant* ;

LXXX gouttes 4 fois par jour comme *hémostatique* ;

L à CL gouttes par jour comme *anti-albuminurique* ;

3 à 10 cuillers à café comme *diurétique* ;

LXXX gouttes 4 fois par jour comme *anti-anaphylactique*.

**Laboratoires MICHELS**

9, rue Castex — PARIS.

Tél. Archives 45-12.



## CHLORO-MAGNESION

**Composition.** — Solution titrée et stabilisée de Chlorure de magnésium pur sec, et de Chlorure de calcium pur cristallisé.

XXX gouttes = 1 gr. 20  $\text{MgCl}^2$  + 0 gr. 50  $\text{CaCl}^2$ .

**Indications.** — Médication anticancéreuse, Dermatologie, Verrues, Papillômes, Régulation de la Sécrétion biliaire, Asthénie nerveuse, Tremblements séniles ou pathologiques.

**Emploi.** — XV gouttes avant chacun des deux principaux repas, pendant 20 jours, suivis d'un repos d'une semaine, le traitement étant continué pendant 2 ou 3 mois, et repris au besoin après une période égale.

Prix : 12 fr. 50.

**Laboratoires DESCOURAUX**

52, boulevard du Temple — PARIS.

**Descouraux et Fils, Pharmaciens.**

Docteur en Pharmacie.

---

## CHLOROSULFOL VIGIER

Chute des cheveux

Antiséborrhéique

**Composition.** — Solution de soufre octaédrique.

**Action.** — Le soufre est le médicament spécifique de toutes les lésions du follicule pilo-sébacé (Sabouraud).

**Indications.** — Folliculites, acnés, hyper-sécrétion sébacée, séborrhée, alopecies et surtout chute des cheveux banale d'origine séborrhéique.

**Laboratoire R. HUERRE ET C<sup>ie</sup>**

12, boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS.

## CHOLÉOY8TINE

Pilules kératinisées de sulfate de magnésie.

*Réalisation en thérapeutique journalière  
de l'épreuve de Meltzer-Lyon.*

**Forme.** — Pilules kératinisées de sulfate de magnésie dosées à 0,30 cgr. *La variété peptonée renferme en plus 0,05 cgr. de peptone.*

**Indications.** — Cholécystites aiguës et chroniques, ictères, migraines, entéro-colites muco-membraneuses.

**Doses.** — 6 à 10 pilules par jour, en une fois, le matin à jeun, ou en plusieurs fois, trois quarts d'heure avant les repas.

**VINCENT**, pharmacien,  
14, avenue Mac-Mahon — PARIS.

---

## CHOLÉINE CAMUS

Extrait inaltérable de fiel de bœuf,  
capsules dosées à 0 gr. 20.

**Dose et mode d'emploi.** — 4 à 6 capsules par jour, 2 ou 3 à la fin de chaque repas.

**Propriétés thér.** — Opothérapie biliaire.

**Indications.** — Lithiase Biliaire, Coliques Hépatiques, Ictère, Cholémie, Constipation, Entéro-Colites, Dyspepsie, Auto-Intoxication.

**Laboratoires DARRASSE**  
7 à 13, rue Saint-Maurice  
NANTERRE (Seine).

## **CHOLÉINE LACTIQUE**

Opothérapie biliaire et ferments lactiques

**Dose et mode d'emploi.** — 4 à 6 capsules par jour, dosées à 0 gr. 20, à la fin des repas.

**Indications.** — Congestion du foie, lithiase, cholécystite, acholie, ictères, hépatites, cirrhoses, cholémie, phénomènes gastro-intestinaux, constipation, colite muco-membraneuse, arthritisme.

**Laboratoires DARRASSE**

7 à 13, rue Saint-Maurice

NANTERRE (Seine).

---

## **LA CHOLÉLYSE CARBOU**

A base d'acide oléique chimiquement pur.

Traitement spécifique et préventif de la lithiase biliaire et de la colique hépatique.

En capsules dosées à 0,50 d'acide oléique.

**Doses :** Une capsule par jour, 10 jours par mois.

En cas de crises, 2 à 3 capsules dans la journée.

**M. CARBOU**

Pharmacien.

8, rue du Ballay — PARIS.

# CHOLÉOBOLDINE THEVENOT

## Opothérapie biliaire

**Forme.** — Pilules glutinisées.

**Composition.** — Extrait Fiel de bœuf,  
Extrait de Boldo, Podophyllin.

**Propriété.** — Cholagogue très puissant,  
légèrement laxatif.

**Indications.** — Toutes affections du foie.  
Troubles biliaires, Constipation, Dermatoses liées à des troubles hépatiques.  
Lithiase. Ictère.

**Doses.** — 2 à 3 pilules à chacun des principaux repas.

Prix du flacon de 50 pilules : 11 fr. 50.

**Laboratoire THEVENOT**  
DIJON.

# CHOLÉO-COMBRETOL BOLDINISÉ

**Composition.** — Extrait de Combretum. Extraits biliaires boldine et boldo.

**Propriétés.** — Opothérapie et Phytothérapie associées : Cholagogue, Diurétique Eueptique, Antitoxique, Laxatif.

**Indications.** — Insuffisances hépatique et biliaire. Cirrhoses, Ictères, Cholécystites, Cholémié, Constipation, Entéro-Colite muco-membraneuse, Fièvre bilieuse hématurique et toutes intoxications.

**Dose.** — Prescrire 1 à 2 pilules après chacun des deux grands repas ou 3 à 4 pilules au repas du soir.

Prix : le flacon, 10 francs.

**Laboratoires CAILLAUD**

37, rue de la Fédération — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Téléphone : Invalides 12-63.

## CHOLÉOKINASE

Extrait spécial de fiel de bœuf et de kinase.

Dragées ovoïdes kératinisées dosées

à : Bile en pâte : 0,20 ; Secrétine : 0,003

**Doses et mode d'emploi.** — 4 à 6 ovoïdes par jour en 3 doses égales : à la fin du déjeuner, à la fin du dîner, le soir en se couchant. Ces doses peuvent même être doublées au début du traitement.

**Propriétés thérapeutiques.** — Active les sécrétions biliaire et pancréatique, améliore la digestion duodénale.

**Indications.** — *Entérocologie muco-membraneuse*, angiocholite, cholémie familiale.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires DURET et REMY**  
**et du Dr Pierre ROLLAND**  
 ASNIÈRES (Seine).

## CHOLÉO-LACTOL DAGUIN

Formule du Dr L.-G. MARY

**Forme.** — Comprimés à enrobage de Kératine soluble dans l'intestin seulement.

**Composition.** — Boldine 1/2 milligr., incorporée avec :

Extraits biliaires dépigmentés.....	} à à 0,10
Pancréatine extractive.....	
Ferments lactiques purs.....	

par comprimé.

**Dose.** — Adultes : 4 à 6 par jour, aux repas.  
 Enfants : 1/2 dose. Avaler sans croquer.

**Indications.** — Infections intestinales et auto-intoxications. Toutes affections hépatiques, Diarrhées estivales, Troubles de la peau.

*Echantillons sur demande aux*

**Etablissements DAGUIN**  
 à SAINT-MAUR (Seine).

## CHOLERGINE

**Médication Antitoxique, Colloïdes et Lipoïdes**  
Principes définis du foie et de la bile de taureau dissous  
dans l'huile végétale.

*Société de Thérapeutique (janvier 1911)*

*Académie de Médecine (avril 1911)*

*Académie des Sciences (juin 1911)*

**Forme.** — Ampoules injectables de 2 cc.

**Posologie et mode d'emploi.** — Une injection tous les 2 jours, chaque série comprenant 20 à 30 injections avec arrêt de quelques jours entre chaque dizaine.

**Injection intramusculaire profonde, aux points d'élection.** Injecter lentement.

**Propriétés.** — Antitoxique, antibacillaire et dynamogénique. — Tuberculose, Insuffisance hépatique, Convalescence des maladies infectieuses.

**Préparation sans similaires employée journellement dans les hôpitaux.**

**Laboratoires A. DANIEL-BRUNET**

8, rue de la Source, PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Tél. : Auteuil 11-86.

## CHOLINE « ROCHE »

**Chlorhydrate de Choline**

(en ampoules de 1 cc. à 2 p. 100).

Le Chlorhydrate de Choline est un médicament *simple, inoffensif*, qui modifie chimiquement le milieu sanguin (augmentation constante et régulière de la Cholestérolémie sans action sur la Glycémie), cette modification s'accompagne de *résultats cliniques particulièrement impressionnants dans toutes les formes de la Tuberculose* (régularisation de la température, diminution de la toux, de l'expectoration, amélioration de l'appétit, de l'état général, du poids, etc...) et *sans aucun inconvénient* (1 ampoule tous les deux jours par voie sous-cutanée).

**Choline ROCHE**

Boîte de 6 ampoules de 1 cc.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**

21, place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

## CHOPHYTOL-ROSA

**Tonique du Foie et Puissant Diurétique**

**à Base d'extrait de feuilles d'artichaut (*Cynara Scolymus*).**

Communication à la Société de Thérapeutique de Paris  
par le D<sup>r</sup> J. Brel.

**Forme.** — Dragées inaltérables et très assimilables

**Composition.** — Extrait de feuilles d'artichaut, extrait hépatique, extrait biliaire, Boldo.

**Indications.** — Toutes insuffisances hépatiques et biliaires et leurs nombreuses conséquences :

- a) *Troubles de l'excrétion biliaire* : Ictère, cholécystite, lithiase, cholémie, etc.
- b) *Troubles d'origine hépatique* : Cirrhose, Diabète gras, Urticaire, Maladies de la peau, etc.
- c) *Troubles lésant toujours le Foie* : Grippe, Fièvres infectieuses, maladies des pays chauds, etc.

**Posologie.** — De 4 à 12 dragées par jour.

**Laboratoires du CHOPHYTOL-ROSA**

1, place Champerret — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

---

## CHRYSEMINE

(Pyréthrine Carteret).

**Propriétés thérapeutiques.** — Vermicide et anthelminthique, sans aucune toxicité ou contre-indication.

**Indications.** — Employée dans tous les cas de parasites bien définis (oxyures, ascaris, tænias, trichocéphales, lamblias, amibes, etc.), elle est également indiquée dans le traitement d'affections qu'on soupçonne être d'origine parasitaire : diarrhée à cause ignorée, entérites et colites à oxyures, colibacilliose et colibacillurie, occlusions intestinales à lombrics, troubles et accidents nerveux dus aux toxines vermineuses.

**Formes.** — Gouttes (*enfants*). Perles glutinisées (*adultes*).

**Administration.** — Les perles s'absorbent les unes après les autres dans une gorgée de liquide. Les gouttes se prennent dans de l'eau sucrée ou édulcorée par du sirop de fruits, des confitures, etc.

**Posologie.** — *Ascaris, tous Helminthes, Amibes, tous Protozoaires.* — *Adultes* : 3 à 4 perles. *Enfants* : L à C gouttes suivant l'âge. Ces doses sont à prendre le matin à jeun pendant 5 jours consécutifs. La même cure est à renouveler après un repos de 2 semaines.

**Trichocéphales.** — Même traitement que pour les *Ascaris* en prenant comme dose quotidienne : *Adultes* : 5 perles. *Enfants* : C à CC gouttes.

**Oxyures.** — *Adultes* : 3 à 4 perles. *Enfants* : L à CL gouttes, à prendre le matin à jeun pendant 5 jours consécutifs. Le soir, au moment des démangeaisons anales, administrer un petit lavement (200 cc.) d'eau bouillie presque froide dans laquelle seront comptées C gouttes de Chrysémine. Le traitement est à renouveler plusieurs fois à 8 jours d'intervalle.

**Tænias.** — *Adultes* : 12 perles. *Enfants* : CC à CCC gouttes, à prendre le matin à jeun pendant 2 jours consécutifs. Supprimer le repas du soir le jour qui précède la cure et réduire le régime alimentaire les 2 jours suivants. Administrer une purgation légère (huileuse ou saline) le dernier jour, 1 heure après la dernière dose.

**Remarque importante.** — Les doses mentionnées peuvent être largement dépassées sans inconvénient, si le résultat de la première cure n'a pas été suffisant.

**Prix de vente au public :** *Perles* : 20 fr. *Gouttes* : 12 fr.

**Laboratoires CARTERET**

15, rue d'Argenteuil — PARIS (1<sup>er</sup>).



## CIBALGINE

Analgésique, sédatif

(sans aucune substance du tableau B).

Diallylmalonylurée-diméthylaminiphényl-  
diméthylpyrazolone.

**Indications.** — Les algies d'une façon générale : migraine, névralgies, courbature, torticolis, sciaticques, douleurs dentaires, angines, otites, mastoïdites, sinusites, etc.  
*Comprimés. Gouttes. Ampoules.*

**Doses.** — 1 à 4 comprimés par 24 heures.  
20 à 60 gouttes —  
1 à 2 ampoules —

Le flacon de 15 comprimés : 9 francs.

Le flacon de 15 cmc (gouttes) : 13 francs.

La boîte de 5 ampoules : 13 francs.

La boîte de 20 ampoules : 40 francs.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**

109-113, boul. de la Part-Dieu. — LYON.

---

## CIMATRYL

**Composition.** — Saccharose, Jaborandi, Prêle, Acide borique, Borate de soude.

**Propriétés.** — Action remarquable sur les plaies atones, grâce au pouvoir osmotique considérable du saccharose qui provoque une diapédèse favorable à la réparation des tissus ; celle-ci est aidée par la silice, le Jaborandi favorisant lui-même leur action grâce à son pouvoir vaso-dilatateur périphérique.

**Indications.** — Affections aiguës et chroniques des fosses nasales, polypes récidivants, rhinites atrophiques, etc.

**Formes.** — Poudre impalpable en prises, 5 à 6 fois par jour.

Prix : 12 fr. 50.

**Laboratoire du CIMATRYL**

M. LE BONZEC

4, place Royale — NANTES.

## CINALOSE

**Présentation.** — Ampoules et Pilules.

**Composition.** — Cinnamate de Benzyle, Cholestérols et Lécithines, Extrait hépatique, splénique, pancréatique, surrénal, mammaire.

Les ampoules contenant les parties liposolubles des extraits d'organes.

Les pilules les parties hydro et glycérosolubles.

Ces deux formes se complètent l'une l'autre.

**Propriétés thérapeutiques.** — Modification du terrain, augmentation du processus de défense antibacillaire de l'organisme. Immunisation et vaccination artificielles para-spécifiques vis-à-vis du bacille de Koch.

**Indications.** — Tuberculose pulmonaire et osseuse, adénopathies, convalescences des affections anergisantes, lupus, affections pulmonaires : Broncho-pneumonies, bronchite chronique, asthme ; emphysème, pleurésies, péritonites bacillaires.

**Posologie.** — *Ampoules* : 1 à 3 par jour, en injections intramusculaires indolores.

*Enfants* : 1 par jour.

*Comprimés* : 3 à 9 par jour, aux repas.

**Laboratoire du D<sup>r</sup> TAVERNIER**

32, rue de l'Ouest — PARIS.

## CINNOZYL

### Composition :

Cinnamate de benryle pur .....	5 centigr.
Cholestérine pure .....	10 —
Camphre .....	125 —
Huile d'olives pure lavée à l'alcool .....	5 cc.

**Propriétés.** — Cette formule concourt à l'immunisation artificielle de l'organisme vis-à-vis du bacille de Koch, grâce aux actions biochimiques associées du cinnamate de benzyle et de la cholestérine.

**Applications.** — Le Cinnozyl doit être employé dans tous les cas de *tuberculose pulmonaire*, même dans les formes évolutives à la période cavitaire.

**Formes.** — Ampoules de 5 cc. Boîte de 8 amp. CINNOZYL U. V. — Même formule que celle du *Cinnozyl*, la *Cholestérine* est irradiée aux rayons ultra-violets.

**Applications.** — Prétuberculose, Imprégnation bacillaire au début, Rachitisme, Asthénie.

**Formes.** — Ampoules de 5 cc. Boîte de 8 ampoules.

**Laboratoires CLIN — PARIS.**

## CIPROMAROL

**Composition.** — *Cupressus semperv.* *Equisetum Arvense.* *Capsella Bursæ Pastoris.* *Æsculus Hippocastanum.*

**Indications.** — Toutes affections caractérisées par une dilatation temporaire ou permanente des veines.

**Mode d'emploi.** — L à LXXV gouttes et plus par jour, ou 2 à 3 mesures. La mesure en aluminium jointe au flacon contient XXV gouttes.

**LANDRIN et C<sup>ie</sup>**

12, rue de la République  
 PUTEAUX (Seine).

## CITROCARBINE

Antisepsie digestive.

**Composition.** — Granulé fondant de goût agréable, répondant à la formule :

Citrate acide de soude.. 10      Charbon animal.. 90

**Action.** — Eupeptique, cholagogue par le citrate de soude, fixateur, antifermentescible par le charbon.

**Avantages.** — Stabilité du citrate acide non détruit dans l'estomac comme le citrate alcalin. Hyperactivité du charbon animal plus fin que le charbon végétal. Action constipante du charbon corrigée par le citrate.

**Indications.** — Dyspepsies, Aérophagie, Insuffisance et infections biliaires, Entérites aiguës et chroniques, Diarrhées, Fermentations intestinales, Auto-intoxication, Artério-sclérose.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 cuillerées à café à la fin des repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau.

Se fait aussi en comprimés.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires WARIN**

4, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## CITROFLUYL

Citrate monosodique pur.

**Forme.** — Granulés à saveur agréable. Une cuillerée à café contient 0 gr. 50 de citrate monosodique-comprimés pour diabétiques à 0 gr. 50 de citrate monosodique pur.

**Dose.** — Par jour, 2 à 6 cuillerées ou comprimés dissous, avant ou entre les repas, selon l'avis du médecin et l'effet désiré.

**Indications.** — Hypertension artérielle, Insuffisance hépatique, Rhumatismes, Goutte, Dyspepsies, Gastrites, Vomissements, Congestions pulmonaires.

Prix : 15 francs. ●

**Laboratoires G. WARIN**

4, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## CITROLARGOL

Argent sol et Citrate de Soude.

**Action.** — L'argent stérilise la muqueuse détergée par le Citrate de soude.

**Indications.** — Toutes les affections du Rhino-pharynx, Rhinites, Sinusites, Laryngites, Grippe, Coryza.

**Mode d'emploi.** — IV à V gouttes dans chaque narine matin et soir. Badigeonnage. Pulvérisation.

**Laboratoires LEBEAULT.**

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## CITROPAÏNE DU D<sup>r</sup> FONTAL

### Composition :

Phosphocitrate mangano-sodique associé à un ferment végétal.

### Propriétés :

Eupeptique, Cholagogue, anti-acide, décongestive, régulatrice des fonctions digestives et circulatoires.

### Indications :

Dyspepsies, hyperchlorhydrie, gastro-entérites, mauvaises circulations, congestions veineuses, maladies d'estomac, foie, intestin.

### Forme et Posologie :

*Granulé* : de 3 à 6 cuillerées à café par jour.

*Comprimés* : de 6 à 9 par jour.

*Cachets* : de 2 à 3 par jour.

**Laboratoires JICEM**

304, rue Saint-Jacques — PARIS (V<sup>e</sup>).

## CITROSODINE LONGUET

Hyperacidité (douleurs gastriques).  
 Antiémétique (vomissements des nourrissons).  
 Eupeptique (dyspepsies, gastro-entérites).  
 Action lithotriptique et diurétique.  
 Action sur la viscosité du sang.

(*Pneumonies — Broncho-pneumonies*  
*Gangrènes séniles.*)

Comprimés de 0 gr. 25 citrate trisodique.

Granulé à 1 gr. de citrate par cuillerée à café.

### Doses et mode d'emploi:

*Nourrissons* : 1 comprimé à chaque tétée.

*Enfants* : 2 à 4 comprimés par jour.

*Adultes* : 3 à 4 comprimés (2 ou 3 fois par jour).

*Pneumonies* : 4 comprimés toutes les heures ou 8 comprimés toutes les 2 heures, dans un demi-verre d'eau ; la médication étant continuée jour et nuit, jusqu'au 2<sup>e</sup> ou 3<sup>e</sup> jour qui suit la crise.

Le flacon de comprimés : 13 francs.

Le flacon de granulé : 14 francs.

### Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI<sup>e</sup>).

## CLISEMINE LONGUET

Médication citratée injectable.

### Indications. — HÉMORRAGIES.

Cancers (M. Renaud).

Tuberculose, Hémoptysies.

Gynécologie.

Interventions chirurgicales (Neuhof et Hirschfeld).

Ampoules de 20 cc. de solution stabilisée renfermant 30 p. 100 de citrate de soude et 10 p. 100 de chlorure de magnésium.

**Dose et mode d'emploi.** — Injection intraveineuse de 15 à 30 cc. (20 cc. en moyenne), selon le poids du sujet.

*Enfants* : Injection intraveineuse de 10 cc.

La boîte de 2 ampoules de 20 cc. : 20 fr.

### Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI<sup>e</sup>).

## CLONAZONE DAUFRESNE

Antiseptique organique chloré  
non toxique.

(Méthode de Carrel.)

**Composition.** — Chloramine sodique du toluène en poudre cristalline ou comprimés dosés à 0 gr. 25.

**Indications.** — Gynécologie et obstétrique, urologie, angines, petite et grande chirurgie.

**Posologie.** — *Usages médicaux* : 1 à 5 comprimés par litre d'eau pour gargarismes, lavages de gorge et du nez, irrigations vaginales.

*Usages chirurgicaux* : 5 à 10 comprimés par litre d'eau, pour pansements humides, tamponnements, irrigation des plaies suivant la technique de Carrel.

La solution à 10 comprimés est d'un emploi et d'une action identiques à ceux de la solution de Dakin.

Stérilisation instantanée de l'eau sans ébullition : 1 comprimé par litre.

**Avantages.** — Action antiseptique puissante et rapide, sans phénomènes d'irritation.

Deux formes :

*Comprimés* : tubes de 20 à 60 comprimés à 0 gr. 25.

*Poudre* : tubes de 20 gr. avec cuiller-mesure correspondant à 0 gr. 25 comme les comprimés.

Prix : 3 fr. 80 et 10 fr.

Conditionnements vrac pour cliniques et hôpitaux.

*Echantillons médicaux sur demande.*

**LABORATOIRE DES ANTISEPTIQUES  
CHLORÉS**

40, rue Thiers — LE HAVRE.

## CLUPEYL

Reconstituant général sans équivalent ni similaire.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés faciles à avaler.

**Composition.** — Poudre intégrale de laitances de harengs, fraîches, desséchées dans le vide et à froid.

**Propriétés thérapeutiques.** — Par sa richesse en phosphore organique (acide nucléinique, lécithine, cérébrine), le Clupeyl est un reconstituant général de tout premier ordre et un excellent stimulant du système nerveux, sur lequel il agit sans le surexciter. C'est l'aliment phosphoré par excellence.

**Indications.** — Anorexie, Amaigrissement, Surmenage physique et intellectuel, Neurasthénie, Asthénie post-grippale, Tuberculose, Rachitisme et toutes adynamies et débilités.

**Posologie.** — *Adultes* : 6 à 8 comprimés par jour.  
*Enfants* : à partir de 7 ans, 3 à 4. A prendre aux repas. Avaler sans croquer ni sucer.

Prix : 16 francs.

**Lab<sup>re</sup> du CLUPEYL** — **Pharmacie PANIER**  
MALO-LES-BAINS (Nord).

---

## COALTAR SAPONINÉ LE BEUF

**Forme.** — Emulsion de Coaltar.

**Propriétés.** — Antiseptique, Cicatrisant, Désinfectant.

**Indications.** — Hygiène de la bouche, pansement des brûlures, furoncles, anthrax, plaies, traitement de la leucorrhée.

**Dose.** — *Leucorrhée* : 1 cuillère à soupe par litre d'eau.

**Pansement** : Parties égales eau et Coaltar Saponiné.

**Laboratoires LE PERDRIEL**  
11, rue Milton — PARIS (IX<sup>e</sup>).



## COCAÏNE MIDY

(Chloroborates).

**Chaque pastille contient :**

0,002 mgr. de Chlorhydrate de Cocaïne.

0,075 mgr. de Chlorate de Potasse.

0,025 mgr. de Biborate de Soude.

**Doses et mode d'emploi.** — Laisser fondre dans la bouche 10 à 12 pastilles par jour, 4 à 8 aux enfants selon l'âge.

**Propriétés thérapeutiques.** — Anesthésique local, antiseptique modificateur.

**Indications.** — Affections de la bouche, gorge, larynx : Pharyngites, Laryngites aiguës et chroniques, Granulations, Angines, Amygdalites, Toux nerveuses, Picotements et Chatouillements de la gorge (avocats, chanteurs, orateurs, prédicateurs).

**Laboratoires MIDY**

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## CODOCOL

**Calmant de la Toux**

**Composition.** — Association de Thiophenolate de Codéine, Cinnamate de soude, Soufre assimilable, sous forme de comprimés.

**Action thérapeutique.** — Antiseptise l'appareil pulmonaire. Fluidifie la sécrétion bronchique. Facilite l'expectoration. Diminue l'excitabilité du centre tussigène. Active la défense de l'organisme.

**Avantages.** — Médication à la fois causale et symptomatique, forme comprimés pratique, suppression du goût désagréable du Gaïacol.

**Indications.** — Trachéites, Bronchites aiguës et chroniques, grippe, pré tuberculose et tuberculose, et toutes les affections de l'appareil respiratoire.

**Mode d'emploi.** — 4 à 8 comprimés par jour.

**Laboratoires COUSSINET**

20, rue des Martyrs — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## CODOFORME

**Composition.** — Comprimés enrobés constitués par une nouvelle combinaison bromoformique solide associée à la codéine ; se dissolvent dans l'intestin seulement où ils libèrent sans fatigue pour l'estomac une quantité rigoureusement constante de bromoforme pur.

Chaque comprimé représente : Codéine, 1 cgr. ; bromoforme, IV gouttes ; teinture d'aconit et belladone, ââ V gouttes ; terpine et benzoate de soude comme excipient.

**Indications.** — Spécifique des toux sèches (spasmodiques, laryngo-trachéales, post-grippales, névropathes). Sédatif remarquable de la toux des tuberculeux, assurant calme et repos sans irritation gastrique ou inappétence.

**Posologie.** — 5 comprimés p. j. ; 6 à 8 d. toux rebelles. Grands enf. (à partir de 5 ans) 2 à 3 compr. par 24 heures. Avaler sans sucer ni croquer.

**Laboratoires BOTTU**

35, rue Pergolèse — PARIS (XVI<sup>e</sup>). Tél. Passy 43-89.

## COLCHI-SAL MIDY

(Colchicine — Ess. de Wintergreen.)

Chaque capsule contient :

1/4 de mgr. colchicine pure dissoute dans 0,20 salicylate de Méthyle naturel (Ess. de Wintergreen, obtenu par fermentation et distillation et équivalent à 0,25 cgr. salicylate de Soude.

**Dose.** — 4 à 16 capsules par jour par prises fractionnées.

**Propriétés thérap. de l'Ess. de Wintergreen.**

1° Augmente l'élimination de l'acide urique et des autres éléments solides de l'urine. — 2° Calme la douleur. — 3° Liquéfie et augmente la sécrétion biliaire. — 4° Légèrement diurétique. — 5° Diaphorétique. — 6° Diminue la fièvre. — 7° Combat la congestion et facilite la résolution des inflammations (G. Sée). — 8° Action antiseptique sur le sang.

**Propriétés thérap. de la Colchicine.**

1° Diminue la production d'acide urique. — 2° Augmente rapidement l'élimination de tous les produits brûlés et pousse à l'oxydation. — 3° Soulage la douleur. — 4° Augmente la sécrétion biliaire. — 5° Légèrement diurétique. — 6° Diaphorétique. — 7° Purgatif.

**Laboratoires MIDY**

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## COLITIQUE

Vaccin curatif anti-colibacillaire

D'après la technique du Dr Fisch.

**Adopté par les Hôpitaux de Paris.**

**Indications.** — Toutes les manifestations du syndrome provoqué **uniquement** par le colibacille.

*Double supériorité* : Action directe sur le microbe, pas de réaction fébrile.

**Formes.** — Buccale, *la plus logique et la plus active* (10 ampoules de 3 cc.).

Injectable (10 ampoules de 1 cc.).

Filtrat, pour applications sur les foyers ouverts (6 ampoules de 3 cc.).

Prix : 25 fr.

Boîte de 50 ampoules pour cliniques et hôpitaux.

**Laboratoires P. ASTIER,**

41, 42, 43 à 47, rue du Dr-Blanche — PARIS.

---

## COLLOÏDINE LALEUF

Dragées.

**Composition :**

Extrait total pluriglandulaire associé à l'*Iodalbumine*.

**Propriétés et indications thérapeutiques :**

Remédie à la viciation fonctionnelle des glandes endocrines et, grâce à la présence de l'*Iodalbumine*, favorise la combustion intra-organique.

Est tout spécialement indiquée dans le traitement de l'*Obésité* considérée comme maladie par carence diastasique. Convient aux deux sexes.

**Doses et Mode d'emploi :**

De 2 à 4 dragées par jour suivant le cas, à prendre de préférence au début des repas. Les avaler en même temps qu'une gorgée d'eau.

Etui de 100 dragées : 24 francs.

**Laboratoires LALEUF**

20, rue du Lacs — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## COLLOÏDOGÉNINE du Docteur BAYLE

*Opothérapie splénique intégrale.*

**Nature.** — Extrait total de rate de porc.

**Formes.** — 1° Colloïdogénine injectable (ampoules de 5 cc.). La boîte de 6 : 20 francs.

2° Colloïdogénine sirop. Le flacon : 20 francs.

3° Colloïdogénine (flacons-ampoules pour voie buccale). La boîte de 6 : 20 francs.

**Indications.** — *Tuberculose* (toutes localisations et formes), où elle a fait ses preuves.

*Anémies*, où elle est supérieure à la méthode de Whipple.

*Dermatoses*, où elle est active.

**Action.** — Augmentation rapide des hématies (50 p. 100) et des leucocytes.

Relèvement du taux de l'hémoglobine (25 à 115 p. 100).

Progression rapide des forces et du poids.

Cicatrisation des lésions (visible à la radio) disparition des bacilles de Koch.

**Emploi et doses.** — Séries de 12 injections (intramusculaires dans la fesse ou sous-cutanées abdominales) en 22 jours. Après chaque série 8 jours de repos. Pendant les 22 jours de chaque série le sirop de colloïdogénine est donné en même temps (4 cuillerées à soupe par jour aux repas). Dans les cas légers ou comme prophylaxie le sirop suffit.

**Doses chez l'enfant.** — Au-dessus de 5 ans injecter 5 cc. Au-dessous de 5 ans injecter 1 cc. par année d'âge.

Colloïdogénine sirop : 1 cuillerée à café par jour jusqu'à 3 ans, 2 jusqu'à 5 ans, 1 à 2 cuill. à soupe jusqu'à 7 ans, 2 à 3 jusqu'à 10 ans, ensuite 3 à 4.

**Laboratoires CHAIX**

8 et 10, rue de l'Orne — PARIS (XV<sup>e</sup>).

# COLLO-IODE DUBOIS

## GOUTTES

**Composition.** — Solution titrée d'*Iodhydrates d'acides aminés* à 5% d'iode pur.

**Action.** — Suractive le tissu hymphoïde (*Lortat*), stimule les glandes endocrines (*Henno*) et exalte les moyens de défense de l'organisme. Le présence d'*amines* lui confère une *activité spéciale* dans certaines diathèses.

**Indications.** — Toutes les indications de l'iode, des iodures et leurs diverses préparations. Son champ d'activité est très étendu et s'exerce tout particulièrement dans la carence de la nutrition et des fonctions glandulaires, l'artério-sclérose et les affections du cœur, l'obésité, l'asthme, la goutte et les rhumatismes, la syphilis, l'hyperthyroïdie, la tuberculose pulmonaire à évolution lente et les bacillooses diverses (osseuses, ganglionnaires, etc.), les mycoses, les états infectieux, etc.

**Mode d'emploi.** — *Adultes*: de XX à C gouttes par jour suivant les cas. Il peut se prendre avant, pendant ou après les repas, mélangé à un liquide quelconque.

*Enfants*: de V à L gouttes par jour. Il n'est pas désagréable à prendre et sa tolérance est parfaite même à hautes doses prolongées. Sa dissociation se fait dans l'intestin et il ne donne pas d'*iodisme*.

## DRAGÉES

**Composition.** — Chaque dragée représente 2 centigr. d'*Iode* combinés à 2 centigr. de *Caféine* et à 8 centigr. de *Théobromine* pure. Dragées à noyaux facilement dissociables et assimilables.

**Indications.** — Asthme, emphysème, artério-sclérose, affections du cœur et des vaisseaux, troubles de l'hypertension, troubles vasculaires, de la ménopause, maladies infectieuses et intoxications, hydropysies, etc.

**Action.** — Cardio-tonique et vaso-dilatateur efficaces. Diurétique puissant et fidèle.

**Mode d'emploi.** — Sauf avis du médecin, la dose est de 1 à 5 dragées par jour chez les adultes, mais il reste seul juge de la médication chez les enfants et les hypertendus artériels.

Ces dragées peuvent être à volonté avalées entières, divisées en plusieurs morceaux ou même dissoutes dans un peu d'eau ou de vin, après les avoir écrasées grossièrement pour en faciliter la désagrégation.

Leur conservation est assurée par un enrobage spécial, mais nous recommandons néanmoins de tenir le flacon à l'abri de l'humidité.

**Laboratoire des Produits DUBOIS**

16, boulevard Pereire — PARIS.

## COLLUBORINE DUPUY

**Traitement des affections de la Cavité buccale et des maladies de la gorge.**

**Forme.** — Collutoire stérilisé et gargarisme aseptique renfermés dans un tube d'étain.

**Composition.** — Borate de soude neutre per-oxygéné-Résorcine Stovaïne et Trichloréthanal.

**Avantages.** — Préparation qui remplit le double rôle de Collutoire et de Gargarisme.

**Indications.** — Stomatites diverses : Angines aiguës, Amygdalites, etc.

**Mode d'emploi.** — A. En pressant sur le tube, imprégner de Colluborine le coton fixé à l'extrémité d'un porte-tampon et badigeonner la gorge comme avec un Collutoire.

B. En pressant sur le tube, une cuill. à café dissoute dans un verre d'eau chaude donne instantanément un Gargarisme.

Prix : 6 francs.

**LABORATOIRE J. LAUMONIER,  
PHARMACIEN-DIRECTEUR  
223, rue Saint-Martin — PARIS.**

## COLLUTOIRE V. E. DOUMER

### Formule :

Bleu de méthylène V. E.

<u>Doumer</u> .....	1 gr.
Résorcine .....	0 gr. 20
Glycérine .....	70 gr.
Eau distillée .....	30 gr.

**Indications.** — Angines diverses, ulcérations bucco-pharyngées des angines, stomatites, abcès des amygdales, etc...

**Laboratoires BOMEL**

ANNONAY (Ardèche) — France.

## COLLYRES CHIBRET

“ Optima ”

En ampoules compte-gouttes (supprimant le compte-gouttes et donnant ainsi toute sécurité comme asepsie) au Bleu de Méthylène, Argyrol, Atropine, Atropine et Cocaïne, Pilocarpine; Pilocarpine et Adrénaline, Borate de Soude et Adrénaline, Iodure de Potassium et Chlorure de Calcium, Sulfate de zinc, Sulfate de zinc et novocaïne, etc.

Renseignements thérapeutiques sur tous nos produits et échantillons, sur demande, à MM. les docteurs à Laboratoires Chibret, 5, rue St-Herem Clermont-Ferrand (P.-de-D.), France.

(Voir à *Pommades* la liste des Produits Chibret.)

### Laboratoires CHIBRET

5, rue St-Herem, CLERMONT-FERRAND  
(Puy-de-Dôme) (France).

Marque déposée “ OPTIMA ”

## COMITIOL

Formule	{	Tartrate-borico-potassique. . . .	0 gr. 50
normale	{	Phényl-Ethyl-Malonylurée. . . .	0 gr. 02
Formule	{	Tartrate-borico-potassique. . . .	0 gr. 50
forte	{	Phényl-Ethyl-Malonylurée. . . .	0 gr. 03

**Indications.** — EPILEPSIE, Convulsions, Parkinson, Chorée, Angor Pectoris, Angoisses.

**Avantages.** — Activité aussi grande que celle des hautes doses de Phényl-Ethyl-Malonylurée, sans leurs inconvénients.

**Doses.** — *Adultes* : 6 comprimés par jour, quelle que soit la formule employée.

*Enfants* : 1/3 de Comprimé par année d'âge et par jour.

Sous peine d'accident, ne jamais interrompre brusquement le traitement par le COMITIOL.

	Prix	Form. normale.	Form. forte.
Boîte 10 jours. . . . .		16 fr.	18 fr.
Boîte 30 jours. . . . .		40 fr.	50 fr.

### Pharmacie GRORICHARD

12, place de la Révolution — BESANÇON (Doubs).

## COMPLEXES COLLOÏDAUX

du Dr Riquoir.

### Néoplalysine.

Arrêt rapide des hémorragies dans le *Cancer* et le *Fibrome*, cicatrisation dans l'*Ulcère d'estomac*, vérifiée par la radiographie.

### Colloïxol antibacillaire.

Abaissement de la température et *cicatrisation dans la tuberculose pulmonaire*. Guérison rapide des adénites et des fistules dans la *tuberculose ganglionnaire, osseuse et génitale*.

### Colloïxol antiarthritique :

Sciatique, Goutte, Rhumatisme déformant.

### Colloïxol antipysique :

Salpingite, Furunculose.

### Colloïxol antientéritique :

Entérite, Diarrhée infantile.

### Mode d'emploi :

Ampoules : 1 par jour. Cachets : 3 par jour.

Prix : 30 fr. la boîte de 12 amp. ou 18 cachets.

### Vonol.

Céphalées, Migraines, Névrites.

2 à 3 cachets ou comprimés par jour.

Prix : 13 fr. la boîte de 20 cachets ou comprimés.

### Préalexol.

Puissant reconstituant et désinfectant du tube digestif.

2 cuillerées à potage par jour (demi-dose pour les enfants).

Prix : 20 fr. le flacon.

Représentants Dépositaires.

**Etablissements MERMINOD et C<sup>ie</sup>,**

**Ad. Buisson, pharmacien**

49, rue de Paradis — PARIS (X<sup>e</sup>).

Tél. : Provence 30-32.



## COMPLEXTRAITS

### Phytothérapie intégrale.

**Condurango.** — Toutes les gastralgies, XXV à XXX gouttes avant les deux repas.

**Kola fraîche.** — Toutes les asthénies, XXV à XXX gouttes avant les deux repas.

**G. P. V.** — Toutes les affections utérines, XXV à XXX gouttes avant les deux repas.

**Marron.** — Toutes les affections veineuses, XXV à XXX gouttes avant les deux repas.

**Valériane.** — Toutes les excitations, 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Littérature et échantillons :

**Laboratoire des COMPLEXTRAITS**  
**HÉRICOURT** (Haute-Saône).

---

## COMPOSÉ GMET

**Tonique aux effets précoces et durables.**

**Composition.** — Kola - coca - quinquina, sans addition d'alcool ni de caféine, ni de strychnine.

**Propriétés.** — Tonique général et nerveux. Effets *immédiats* mais *durables*.

**Indications.** — Anémie, Neurasthénie, convalescences, suites de couches, d'opérations, fatigue, surmenage, pré tuberculose.

**Posologie.** — 1 cuillerée à café dans un peu d'eau froide avant les repas, une ou deux fois par jour. (En cas de tachycardie, ajouter une cuillerée à café de Crataegus Gmet (régulateur cardiaque).

**Laboratoire GMET**

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## COMPRESSIF BESLIER

Appareil perfectionné pour le maintien et la guérison de la **Hernie ombilicale** chez les enfants.

Le **Compressif Beslier** est un appareil sans caoutchouc confectionné en sparadrap Beslier très adhésif et non irritant pour l'épiderme délicat des enfants.

Le **Compressif Beslier**, très pratique parce que très simple, est d'une application très facile. Il ne se déplace pas sous l'influence des mouvements du corps et maintient continuellement la hernie refoulée.

Le **Compressif Beslier** supprime tous les inconvénients des bandages en caoutchouc.

**M. COQUELU, Pharmacien-Fabricant**  
**DIGOIN.**

---

## COMPRIMÉS ADRIAN

à l'hydrate de magnésie ou au carbonate de chaux.

**Action.** — Médicament saturant de l'hyperacidité gastrique.

**Avantages.** — *Ne neutralise que l'excès d'acide*, comprimés très friables, se délitant facilement, grâce à leur constitution presque spongieuse.

**Indications.** — Hyperchlorhydrie, pyrosis, fermentations acides, gastralgies, etc

**Mode d'emploi.** — 4 comprimés une heure avant les repas, et au moment des douleurs.

**ADRIAN et C<sup>ie</sup>**

9 et 11, rue de la Perle — PARIS.

## COMPRIMÉS AQUA PURA

Pour la stérilisation rigoureuse de l'eau.

### Principe :

Iode naissant parfaitement éliminé après action.

### Indications :

1<sup>o</sup> Pour la *boisson* : stérilisation immédiate de l'eau suspecte ;

2<sup>o</sup> Pour tous *lavages aseptiques* : buccaux, gynécologiques, intestinaux.

### Avantages :

Sécurité absolue. — Saveur agréable.

### Mode d'emploi :

3 comprimés par litre d'eau suivant l'ordre indiqué par la notice.

**Laboratoires ROBERT et CARRIERE**

37, rue de Bourgogne — PARIS.

## COMPRIMÉS D'ALIBOUR

**Composition.** — Association de sulfate de zinc et sulfate de cuivre.

**Indications.** — Traitement des plaies, des inflammations des yeux, des flueurs blanches, impétigo, ecthyma.

**Action.** — Antiseptique d'usage courant prophylactique, hygiénique, anti-catarrhal.

**Dose.** — Deux comprimés dans 2 litres d'eau bouillie chaude pour injection vaginale, lotion pour les yeux et les muqueuses. Quatre comprimés par litre d'eau pour traiter les plaies superficielles infectées, l'impétigo, l'ecthyma.

**Prix :** 10 francs la boîte de 36 comprimés.

**Laboratoires DURET et RÉMY**  
**et du Docteur Pierre ROLLAND**  
ASNIERES (Seine)

# COMPRIMÉS DE PANTOLAXINE

du Docteur BOVEIL.

## Traitement de la Constipation.

Ainsi que leur nom l'indique, ces comprimés renferment tous les principes actifs de tous les laxatifs reconnus les plus efficaces et doivent, par conséquent, agir dans tous les cas de constipation.

**Composition.** — Bourdaine, Cuscute, Chardon-Marie, Cascara, Rhubarbe, Aloïne, Evonymine, Belladone, Extraits biliaires, Extraits de glandes intestinales.

**Indications.** — Constipation et ses conséquences (vertige, tension artérielle, éruptions, démangeaisons, haleine fétide, etc.).

**Doses et mode d'emploi.** — 1 à 2 comprimés pris au repas du soir, tous les jours, ou deux à trois fois par semaine suivant les besoins. Demi-dose pour les enfants.

Echantillon et Littérature sur demande.

Prix : 6 francs la boîte de 40 comprimés.

**M. PARIS, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**  
1, rue Lassalle — LYON (La Boucle) (IV<sup>e</sup>).

# COMPRIMÉS GUILLAUMIN

à l'oxycyanure d'hydrargyre.

**Composition.** — Comprimés d'oxycyanure d'hydrargyre dosés à 0 gr. 50 et 0 gr. 25.

**Propriétés.** — Ces comprimés sont très solubles dans l'eau avec laquelle ils donnent une solution très limpide, d'un pouvoir antiseptique élevé, très bien tolérée par les mains et les muqueuses et n'attaquant pas les instruments nickelés.

**Indications.** — S'emploient avec succès en gynécologie et en obstétrique, dans les maladies des voies génito-urinaires (métrite, flueurs blanches, vaginite, urétrite, blennorrhagie), dans le pansement des plaies, enfin comme antiseptique en général.

**Mode d'emploi.** — Faire dissoudre un comprimé dans un ou deux litres d'eau. La dissolution s'effectue en quelques secondes si on a soin d'écraser le comprimé dans l'eau.

Prix : 9 francs.

**Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN**

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

## COMPRIMÉS GYNÉCOLOGIQUES MERMINOD

### Formule :

Dichlorylsulfamide Benzoate de soude...	0 gr. 012
Acide dioxysuccinique .....	0 gr. 125
Acide tartrique.....	0 gr. 126
Bicarbonate de soude.....	0 gr. 144
Amidon et sucre.....	0 gr. 918

**Propriétés et avantages.** — Réalisation absolument nouvelle, inoffensive et la mieux adaptée aux besoins de la lutte spécifique contre la flore microbienne des organes génitaux.

**Indications.** — Comme prophylactique de toutes les infections vénériennes (gonocoques, staphylocoques, etc...) comme remède préventif et curatif de la leucorrhée, vaginite, métrite, endométrite, salpingite, etc... et comme préventif de la blennorrhée féminine et masculine.

**Emploi.** — Introduire 1 compr. dans le vagin (avant l'acte) et attendre une demi-heure à 1 heure pour procéder à un lavage ordinaire.

Littérature et échantillons

**Laboratoires MERMINOD et Co**

49, rue de Paradis — PARIS (X<sup>e</sup>).

Tél. : Provence 30-32.

## COMPRIMÉS NEYRET

**Formule.** — 0 mgr. 005 de lactate de mercure par comprimé dragéifié.

**Doses.** — 3 à 9 comprimés par jour.

**Avantages.** — Sel de mercure à acide organique, très stable, très soluble, très peu toxique et très peu irritant.

**Indications.** — Traitement général d'entretien de la Syphilis. Traitement local des Syphilides bucco-linguales.

Discretion absolue. Aucune indication sur l'étiquette. Aucun prospectus.

**Laboratoires NEYRET**

35, rue de la Bourse — LYON.

## COMPRIMÉS « ROCHE » DE THIOLCOL

1 comprimé « Roche » de Thiocol = 0,50 cgr. Thiocol « Roche ».

1 gr. Thiocol « Roche » = 0,52 cgr. galaccol cristallisé.

**Doses et mode d'emploi.** — 2 à 6 par jour et plus.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène, Eupéptique et Orexique.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les affections broncho-pulmonaires, Rhumes, Bronchites, Grippe, Tuberculose, Coqueluche, Rachitisme, Dyspepsie, Entérites, etc.

**Avis très important.** — Pour éviter toute substitution inactive ou même toxique, bien spécifier toujours :

*Comprimés « Roche » de Thiocol.*

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**  
21, place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

## COMPRIMÉS SALVÉ

Comprimés à base de poudre grise (Hg cum creta) — 1 centigramme par comprimé — et de carbonate de bismuth. Traitement Bismutho-mercuriel. Médication dissimulée.

**Indications.** — *Hérédo-syphilis*, Traitement d'entretien. *Insuffisance hépatique et ses manifestations* : Constipation habituelle de l'enfant, acétonémie. Dermatoses (eczéma-prurigo-strophulus). *Helminthiase* et plus particulièrement *Oxyurase*.

### Posologie :

De 6 mois à un an : Un 1/2 comprimé par jour.

De 1 an à 2 ans : Un comprimé par jour.

De 2 ans à 4 ans : Un comprimé 1/2 par jour.

De 4 ans à 15 ans : Trois comprimés par jour.

*Adultes* : Quatre comprimés par jour.

Délayer les comprimés dans un peu d'eau ou de lait avant les repas :

Prix : 13 francs.

Notices et échantillons sur demande.

**Laboratoires RICHER**

7, avenue Marceau — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Tél. : Passy 76-09.

# COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Effervescents

Aux sels naturels de Vichy.

Médication Alcaline pratique et économique.

**Mode de présentation.** — Les « Comprimés Vichy-Etat » présentés sous forme de pastilles effervescentes permettent de préparer, par simple dissolution, au moment du besoin, de l'eau alcaline gazeuse artificielle.

**Indications.** — L'usage des « Comprimés Vichy-Etat » est indiqué dans les affections de l'estomac, du foie, des reins, etc.

**Posologie.** — 3 à 4 Comprimés Vichy-Etat pour un verre d'eau, 12 à 15 pour un litre.

**Georges PRUNIER et C<sup>ie</sup>**

4, rue de la Coutellerie — PARIS  
et Pharmacies.

---

## CONJONCTOL

Collyre nouveau à base de :

1° *Borosalicyl* (acide salicylique dissimulé et *naissant*).  
Antiseptique puissant ;

2° *Hamamélis virginica* (200 gr. pour 1 000). A haute dose est un vaso-constricteur qui (différence avec l'adrénaline) ne donne *pas de vaso-dilatation réactionnelle*. De plus, l'*hamamélis virginica* est un *topique* de tout premier ordre et sans danger (différence avec cocaïne).

**Indications.** — *Toutes les conjonctivites* (aiguës ou chroniques). *Adulte ou nourrisson*. Se prescrit également dans le cas de : surmenage des yeux.

**Présentation.** — 1° Ampoule-collyre de 5 centimètres cubes. En lavage de l'œil (ceillère ou coton imbibé du contenu). Une ou deux fois par jour ;

2° Flacon compte-gouttes, soit en lavage (comme avec ampoule), soit en collyre (II à III gouttes dans l'œil matin et soir).

Littérature et échantillons au Corps médical.

**Laboratoires H. SALLE**

4, rue Elzévir — PARIS (III<sup>e</sup>).

## CORAMINE CIBA

Toni-cardiaque eupnéique.

Stimulant du système nerveux, de la respiration et de la circulation. Produit synthétique (diéthylamide de l'acide pyridine-B-carbonique) soluble dans l'eau et pouvant être administré par voie buccale, sous-cutanée ou intraveineuse. Se substitue toujours à l'huile camphrée et parfois aux autres toniques du cœur avec de grands avantages. Pas de contre-indications. Aucune toxicité.

**Indications.** — Collapsus cardiaque, syncope, états lipothymiques. Faiblesse du cœur au cours des maladies aiguës, des infections, des intoxications, de la période post-opératoire. Hyposystolie des vieillards, etc.

*Gouttes. — Ampoules.*

**Doses.** — 25 à 100 gouttes par 24 heures.

1 à 12 cc. par 24 heures.

Le flacon de 15 cc : 12 francs.

La boîte de 5 ampoules de 1 cc. : 12 francs.

La boîte de 20 ampoules de 1 cc. : 36 francs.

La boîte de 5 ampoules de 3 cc. : 25 francs.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**

109 à 113 boulevard de la Part-Dieu — LYON.

---





## CORÉINE

Mucilage rigoureusement pur, sans l'adjonction d'aucune substance laxative.

Produit exclusivement végétal.

(Procédé Taillandier.)

La **Coréine** n'est pas de l'agar-agar.

La **Coréine** n'est pas extraite de l'agar-agar.

C'est du mucilage pur, indigestible.

**Propriété unique.** — Absorbe et retient 50 fois son poids d'eau.

**Indications.** — Constipation simple, Colite muqueuse, Colite muco-membraneuse.

La **Coréine** constitue un traitement remarquable, souvent le seul, de la constipation et de certaines formes diarrhéiques.

**Formes.** — Granulé et paillettes.

« La **Coréine** est admise par l'Assistance publique. »

### *Pour absorber la Coréine :*

Mettre la **Coréine** en paillettes à sec dans la bouche ou la mélanger avec de l'eau, constituent des moyens sans inconvénient thérapeutique, mais peu agréables.

La **Coréine** en paillettes est très facile à absorber, à la condition de tenir compte des indications suivantes :

Le matin, mettez dans un bol la quantité de **Coréine** en paillettes prescrite, et versez dessus du lait... ou café au lait... chaud, dans la **proportion de 3 cuillerées à soupe pour 2 cuillerées à café de paillettes.**

Mélanger vivement et absorber **tout de suite comme un potage.**

Aux repas de midi ou du soir, mélangez la paillette avec quelques cuillerées de potage, de purée de légumes ou de compote.

La dose peut être augmentée ou diminuée suivant l'effet obtenu. La régularisation des fonctions intestinales étant obtenue, continuer l'usage de la Coréine à la dose de 1 à 2 cuillerées à café au petit déjeuner du matin.

Les enfants prennent très aisément la paillette de Coréine, mélangée avec quelques cuillerées de bouillie (phosphatine, farines lactées...) ou mélangée avec un peu de lait, de potage, de purée ou de compote.

Quant aux nourrissons et aux bébés, une pincée de paillettes dans une cuillerée à café de lait chaud.

Le **Granulé de Coréine** se prend comme tous les granulés ; mettre directement dans la bouche par cuillerée à café la dose prescrite et avaler un peu de liquide après chaque prise.

La seule chose à éviter, c'est de laisser séjourner le granulé dans l'eau.

**Bibliographie.** — Pathologie gastro-intestinale, A. Mathieu et J.-C. Roux, etc.

L'ouvrage du Dr O. Taillandier, *Le Mucilage pur en Thérapeutique*, — publié en avril 1930, — est en vente au prix de 12 fr. à la librairie Maloine, 27, rue de l'Ecole-de-Médecine, et à la librairie Le François, 91, boulevard Saint-Germain.

Il est adressé gracieusement aux médecins; sur simple demande aux :

**Laboratoires A. DANIEL-BRUNET**

8, rue de la Source — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Téléphone : Auteuil 11-86.

## CRATÆGINE

A base de fleurs fraîches d'aubépine stabilisées (non toxique).

**Propriétés thérapeutiques.** — **Tonique et régulateur cardio-vasculaire.** — Si elle ne peut être considérée comme un succédané de la digitale, elle maintient utilement l'action obtenue avec ce médicament cardiaque comme elle doit maintenir celle que l'on obtient avec l'ouabaïne. — **Vasodilatateur, Hypotenseur** par action vasculaire périphérique.

**Indications thérapeutiques.** — Eréthisme cardiaque. Palpitations des nerveux et des neurasthéniques. Troubles congestifs de la ménopause. Tachycardie paroxystique essentielle. Goître exophtalmique.

**Doses et mode d'emploi.** — XV à XX gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau sucrée. — Dose maxima : XXX gouttes 3 fois par jour.

Prix : 12 francs.

**P. BOUSQUET et E. LEROUX**

Anciens internes des Hôpitaux

46, rue de la Barrière — ELBEUF.

## CRATAEGUS GMET

**Très agréable au goût.**

**Composition.** — Extrait *total* de la fleur du *crataegus oxyacantha*; sans alcool ni sucre. Correspond à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

**Propriétés.** — Régulateur du sympathique. Cardio-tonique.

**Indications.** — Tachycardie, Arythmie, Eréthisme cardiaque, Plexalgies, Cardialgies, Prurit, Insomnie, Gastralgie et tous les troubles nerveux d'origine réflexe.

**Posologie.** — Une cuillerée à dessert un peu avant l'heure du coucher, dans un peu d'eau ou de lait. (La dose peut être doublée.)

**Laboratoire GMET**

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## CRAYONS ANTIFISSURE DOMERGUE

**Principes actifs.** — Sulfolarsan. Masse spéciale.

**Propriétés.** — Antiseptique. Cicatrisant.

**Indications.** — Fissures anales : « pas d'insuccès ». Hémorroïdes ulcérées. Hémorroïdes.

**Emploi.** — Un crayon à demeure jusqu'à guérison.

**Nota.** — L'application du premier et quelquefois du deuxième est un peu douloureuse.

**Laboratoires DOMERGUE**  
AGEN (Lot-et-Garonne).

---

## CREAGENOL

Médication reconstituante et tonique.

**Composition.** — Inositolphosphate de chaux et de magnésie. Acétylamino-oxyphénylarsinate de chaux et hypophosphite de manganèse en granulé sucré.

**Indications.** — Convalescences et états anémiques. Troubles de croissance. Rachitisme. Asthénie. Dépression nerveuse et surmenage. Tuberculose.

### Mode d'emploi :

*Adultes* : une à deux mesures, 2 fois par jour au repas, pur ou délayé dans 1/2 verre d'eau.

*Enfants* : 1/2 mesure, 2 fois par jour.

Granulé très actif et d'un goût très agréable.

**Laboratoires CORBIERE**  
27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## CREDONE DEHAUSSY

Méthyl-acétyl-phényl-diméthyl-oxāmyl-hydrazide.

*Nouvel analgésique neutre soluble.*

Communication à l'Acad. des Sciences du 12 nov. 1929.

Communication à l'Acad. des Sciences du 23 déc. 1929.

Communication à l'Acad. des Sciences du 6 janv. 1930.

Communication à la Soc. chimique de France du 24 janvier 1930.

### Indications :

*Algies* : Migraine, Névralgies dentaires, Névralgies périphériques, Douleurs des tuberculeux, Algies cataméniales, Douleurs rhumatoïdes, Douleurs fulgurantes, etc., etc.

*États infectieux* : Gripes, Rhumatisme articulaire aigu, Angines.

*Nervosisme* : Insomnie, Agitation, Anxiété.

### Posologie :

*Adultes* : 2 à 4 cachets par jour.

*Enfants* : 1 à 2 cachets par jour.

De préférence avec une infusion ou un verre d'eau.

**Laboratoires DEHAUSSY**

66, rue Nationale — LILLE.

## CRÈME GRAZIANA

**Érythèmes des nouveau-nés.**

**Composition.** — Excipient spécial : liniment oléocalcaire associé à la lano-vaseline purifiée. Sous-nitraté de bismuth, hydrocarbonate de magnésie, oxyde de zinc.

**Indications.** — Erythème fessier. Dermites érythémateuses. Eczéma des nourrissons. Gerçures des seins. Et toutes irritations cutanées.

Le tube : 4 fr. 25. Le double tube : 6 fr. 40.

## POUDRE CYTISIA

**Toilette des bébés.**

Infermentescible, entièrement minérale, antiseptique.

En boîte poudreuse à double couvercle.

La boîte : 5 fr. 60.

**Les spécialités de l'enfance.**

**Laboratoires AXAREL**

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

## CRÈME RÉSOLUTIVE du Dr RAP

**Composition.** — Produit onctueux sans corps gras, à base de principes à action fortement vaso-constrictive et analgésique :

(Hamamelis, Noix vomique, Arnica, etc.)

**Propriétés.** — Calme la Phlébalgie, décongestionne, facilite la résorption des œdèmes.

**Indications.** — Varices, phlébites, hémorroïdes, insuffisances veineuses, Stase post-traumatique, entorses, fractures,

**Mode d'emploi.** — En massages matin et soir. S'il existe une contre-indication au massage, employer « l'Extrait Rap » en lotion ou en pulvérisation.

Prix : 11 fr. et 15 fr.

Laboratoire du Dr R. CAVAILLÈS  
34, rue de Turin — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## CRÉOLINE PÉARSON

Après 40 ans d'existence, la Créoline Péarson reste un antiseptique moderne. La Creoline Pearson donne avec l'eau une émulsion colloïdale *ni toxique, ni caustique, ni oxydante*, d'une grande puissance microbicide et antiparasitaire.

**Présentation.** — En flacon de verre de 60, 125, 500 et 1.000 gr.

**Indications.** — Toutes désinfections et lavages antiseptiques en émulsion dans l'eau de 1 à 5 %. Traitement de la **gale** et toutes les parasitoses cutanées.

Etablissements Pharmaceutiques  
**JACQUES MIDY**

41, rue de Courbevoie — LA GARENNE (Seine).

Tél. : Charlebourg 09-80.

## CRÉOSAL DUBOIS

Sirop, Comprimés, Solution.

### Composition :

Le CRÉOSAL réunit dans sa composition le *Gaïacol*, l'*Acide Phosphorique* et le *Calcium* que la Thérapeutique a toujours associés.

### Propriétés et indications thérapeutiques:

Recalcifiant puissant, antibacillaire, accélérateur de la nutrition. Employé avec succès dans : la Tuberculose pulmonaire, osseuse ou cutanée, les Bronchites aiguës ou chroniques, les Toux rebelles, le Lymphatisme, la Scrofule, le Rachitisme, etc., etc.

*Sirop* : 12 fr. le flacon.

*Comprimés* : 10 fr. l'étui de 50.

*Solution* : 12 fr. 50 le flacon.

**Laboratoires LALEUF**

20, rue du Laos — PARIS (XV<sup>e</sup>)

## CRÉOSOFORME LAMBIOTTE FRÈRES

Combinaison d'aldéhyde formique (4 p. 100) et de créosote (95 p. 100). Inodore, non toxique, puissamment antiseptique. Supérieur à l'iodoforme dans tous ses emplois.

**Propriétés thérapeutiques.** — Au contact des cellules vivantes, il se décompose graduellement en créosote et aldéhyde formique à l'état naissant qui déterminent l'asepsie complète des plaies et leur rapide cicatrisation.

**Indications.** — Plaies, Ulcères, Brûlures, Engelures, Fistules, Tuberculoses chirurgicales, Dermites, Gynécologie, Hémorroïdes et toutes autres affections anales, etc.

**Mode d'emploi.** — Existe sous quatre formes :

- 1° *Créosoforme-Poudre*, présenté en flacons poudreux, pour saupoudrage des plaies.
- 2° *Créosoforme-Onguent*, présenté en tubes d'étain.
- 3° *Créosoforme-Ovules*, pour pansements gynécologiques.
- 4° *Créosoforme-Suppositoires*, 1 ou 2 par jour.

Littérature et Echantillons :

**Produits LAMBIOTTE FRÈRES**

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
124, avenue Rogier — BRUXELLES.



## CRÉOSOTE SOLUBLE VACHERON

**Contient :** 0 gr. 15 par cuillerée à soupe ; 0 gr. 05 par cuillerée à café de créosote de hêtre chimiquement pure, riche en gaïacol, et complètement absorbable. Une partie est en solution, le reste est émulsionné à l'aide d'un mucilage qui permet de passer de l'état émulsif à celui de solution (en ajoutant un liquide aqueux quelconque) sans que la créosote se sépare.

**Indications.** — Bronchites chroniques et spécifiques, catarrhe pulmonaire, pneumonie, laryngites chroniques et tuberculose.

### Modes d'emploi :

*Par voie stomacale :* 1 à 6 cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau sucrée, de tisane, de lait ou de vin.

*En lavements :* 1 ou 2 cuillerées à soupe dans un grand verre d'eau.

*En pulvérisations et inhalations :* 1 cuillerée à soupe dans un bol d'eau.

Prix : 14 francs.

### Produits GONNON

**J. et C. GONNON, Pharmaciens**

14, rue Victor-Hugo — LYON.

## CRESCOL BUISSON

(Produit non irradié)

**Contient :**

1° Tous les éléments minéraux qui existent dans l'organisme et dans les mêmes proportions que chez l'individu normal.

2° Les traces de minéraux catalyseurs nécessaires à la fixation des sels (manganèse, zinc, etc.).

3° L'insaponifiable de l'huile de foie de morue, avec la vitamine de croissance A et la vitamine antirachitique D.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication anticarcinogénique.

**Indications.** — Rachitisme, Ostéomalacie, Déminéralisation de la grossesse, de l'allaitement, États tuberculeux et pré-tuberculeux, Avitaminoses.

**Forme.** — Granulé.

**Posologie.** — *Nourrissons et enfants :* 2 à 4 cuillerées à café délayées dans un peu d'eau.

*Adultes :* 4 à 8 cuillerées à café par jour.

Prix de vente au public : 16 francs.

Prix médical : 10 fr. 80.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**

✂ THERAPLIX

Pierre BRETEAU, Pharmacien

Membre de l'Académie de Médecine

157, rue de Sèvres — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## CRESENTYL

Le CRESENTYL est un benzo-méta-Crésol chimiquement pur, présenté en comprimés titrés à 0 gr. 50 de produit actif.

Ce produit a été étudié et mis au point dans le laboratoire et le service du Dr Louis Fournier à l'hôpital Cochin. *Puissant anthelminthique, il a le grand avantage d'être dépourvu de toute toxicité,*

Spécifique des némathelminthes, ascaris, trichocéphales oxyures, etc., le CRESENTYL a aussi une action remarquablement rapide dans les amibiases et autres protozooses intestinales (Lambliia, Balantidium, etc.) Excellent antiseptique intestinal, empêchant le développement des microbes de putréfaction (anaérobies), le CRESENTYL sera employé avec succès dans tous les cas nécessitant une désinfection de l'intestin,

### Antiseptique intestinal.

4 à 6 comprimés par jour, par fractions de 2 ou 3 comprimés, 1/2 heure avant les repas, pendant 8 jours. Faire plusieurs cures de 8 jours de traitement à une semaine d'intervalle.

### Posologia anthelminthique.

**Adultes :** Prendre le matin à jeun, à demi-heure d'intervalle, 3 comprimés de 0 gr. 50 chaque fois (en tout 9 comprimés dans la matinée). Suivre ce traitement 4-5 jours consécutifs. Le 6<sup>e</sup> jour, prendre une purgation saline (15 à 30 gr. de sulfate de soude suivant l'âge).

Faire ainsi 3-4 cures de CRESENTYL à 6 jours d'intervalle.

**Enfants :** Suivant l'âge, 4 à 6 comprimés par jour par fraction de 2 ou 3 comprimés écrasés dans un peu de gelée de confiture à 1/2 heure d'intervalle, pendant 4-5 jours consécutifs. Le 6<sup>e</sup> jour, prendre une purgation saline.

Faire ainsi 3-4 cures de CRESENTYL à 6 jours d'intervalle.

Le tube de 20 comprimés. Prix au public : 12 francs.

### Laboratoire des ANTIGENINES

Dépôt et Bureaux : 1, place Lucien-Herr — PARIS (V<sup>e</sup>).  
(Anciennement 43, rue Tournefort.)


Tél. : Gobelins 26-21.

Laboratoire : 11, rue Michelet — PARIS (VI<sup>e</sup>).

# CRÉSOPIRINE

des Professeurs G. CARRIÈRE & E. GÉRARD

Acide Acétyl Crésotinique Ortho



Produit synthétique défini et pur.

**Indications.** — Traitement du rhumatisme aigu et chronique et de la douleur sous toutes ses formes.

**Posologie.** — *Douleurs rhumatismales, néuralgies* : Prendre de 1 à 4 comprimés ou cachets dans la journée.

*Insomnie* : Le soir en se couchant, prendre 1 ou 2 comprimés ou cachets dans une tasse d'infusion de tilleul.

*Rhumatisme articulaire aigu, fébrile* : Se conformer à l'avis du médecin, qui, selon les cas, peut prescrire d'emblée 4 à 8 grammes par jour.

*Grippe* : 2 à 4 comprimés ou cachets par jour.

La boîte de 30 cachets ou comprimés à 0 gr. 50 : 14 francs. Prix public

La boîte de 30 cachets à 1 gramme : 18 fr. Prix public.

Flacon vrac de 50 grammes de poudre de Crésopirine : 17 fr. net le flacon à MM. les Pharmaciens.

Laboratoires " STENÉ "

2, place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>).

# CRÉSYL JEYES

Le seul *Crésyl véritable*. Puissant désinfectant antiseptique ; le premier des *Crésols associés et saponifiés*.

Exiger du « Jeyes » pour éviter toute substitution.

Le « Jeyes » donne des émulsions stables et colloïdales qui enrobent les bactéries et les détruisent à coup sûr.

**Dose antiseptique.** — 1/2 pour 100 (une cuill. à café par litre d'eau).

**Dose bactéricide.** — 2 pour 100 (une cuill. à bouche par litre d'eau).

Livré en flacons de 150 et 250 grammes.

Désinfection et lavages antiseptiques.

Moyen flacon : 4 fr. 95.

Grand flacon : 6 fr. 95.

• Litre : 16 fr. 50.

35, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## CRISALBINE

Thiocrysiné.

(Thiosulfate double d'or et de sodium.)

Complexe chimique défini; teneur en or: 37 p. 100; le moins toxique des sels d'or actuellement connus. Injectable par voie intraveineuse.

*Indications :*

**Tuberculose pulmonaire.**

(Poussées évolutives récentes des malades jeunes.)

*Posologie et mode d'emploi.* — Injections hebdomadaires, en débutant par 0 gr. 05 ou 0 gr. 10. Augmenter progressivement, selon la tolérance du malade. Les doses élevées sont à déconseiller.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## CRISTOLAX WANDER

**Nouvelle formule.**

Huile de paraffine .....	50 p. 100
Extrait de malt .....	40 p. 100
Agar-Agar .....	10 p. 100
Le plus efficace parmi les laxatifs doux, sans action drastique.	

**Forme.** — Paillettes.

**Indications.** — Tous les cas de constipation: nourrissons, femmes en couches, vieillards, opérés, grabataires et personnes délicates en général.

**Doses.** — *Nourrissons*: 1 cuillerée à café 3-4 fois par jour dans le lait ou la bouillie. *Enfants*: 2 cuillerées à café 3-4 fois par jour. *Adultes*: 1 cuillerée à soupe 3-4 fois par jour aux repas, tel quel ou dissous dans un liquide.

Le résultat atteint, continuer un traitement à faible dose: 1 cuillerée à café ou à soupe aux repas principaux.

Le flacon: 12 fr. Le grand flacon: 18 fr.

**Établissements WANDER**

151 bis, route de Joinville — CHAMPIGNY (Seine).

## CRYOGÉNINE LUMIÈRE

**Antipyrétique, Analgésique.**

**Produit toujours les mêmes effets aux mêmes doses.**

**L'usage de la Cryogénine peut être prolongé sans danger.**

**Constitution.** — Semi-carbazide de formule :  $C^7H^9Az^3O$ , en comprimés et cachets de 0 gr. 25 et 0 gr. 50. Toxicité très faible. Les animaux en expérience supportent impunément des doses considérables : plus de 2 gr. par kilogramme d'animal.

**Propriétés.** — La CRYOGÉNINE LUMIÈRE ne ferme pas le rein, ne détermine pas de sueurs profuses, ni de tendance au collapsus. Elle ne provoque pas de vertiges, ni de troubles nerveux ou digestifs. La CRYOGÉNINE LUMIÈRE représente le médicament antipyrétique et analgésique type.

**Aucune contre-indication. Aucune action nocive, son usage peut être prolongé sans danger.**

**Indications.** — Grippe, fièvre au cours des maladies graves (fièvre des tuberculeux), fièvre typhoïde (permet d'éviter les bains froids), maux de tête, douleurs rhumatismales des membres, goutte, courbature, douleurs erratiques chez les tuberculeux, migraines, etc. Chez les enfants, la CRYOGÉNINE LUMIÈRE est employée de préférence, dans toutes les pyrexies, du fait de son absolue innocuité.

**Doses.** — Chez l'enfant : de 0 gr. 25 à 1 gr. 50 par jour. Chez l'adulte : de 0 gr. 50 à 3 gr. par jour et davantage au cas de besoin.

**LABORATOIRES LUMIÈRE**

23, Cours de la Liberté — LYON.

## CRYPTARGOL LUMIÈRE

**Antiseptique argentique, stable, atoxique.**

**Constitution.** — (Argentothio-glycérine, sulfonate de sodium) 35 p. 100 d'argent métallique.

**Propriétés.** — Pouvoir antiseptique égal à celui du nitrate d'argent sans toxicité, ni causticité. Ne tache pas, ne précipite pas les albuminoïdes. Jamais d'argyrie. Aucune réaction ni sensation douloureuse.

**Indications.** — Usage interne : embarras gastrique fébrile, états infectieux du tube digestif, diarrhées, typhoïde, para-typhoïde, diarrhées imputables aux bacilles de Shiga ou au colibacille, dysenterie amibienne, entérite, entéro-colite, dyspepsies gastro-intestinales avec coprostase, fermentations intestinales, etc.

Chez l'adulte, le CRYPTARGOL LUMIÈRE est administré par la bouche, en pilules dosées à 10 centigr. (4 à 6 pilules par jour au repas). Chez l'enfant, le CRYPTARGOL LUMIÈRE est administré sous forme de granulé à la dose d'une ou quatre cuillerées à café, selon l'âge de l'enfant sans aucun danger.

Usage externe — Antisepsie générale.

**DERMATOLOGIE, UROLOGIE, GYNÉCOLOGIE, OPHTALMOLOGIE.**

**Formuler.**

**Usage interne :** Etais de pilules de CRYPTARGOL LUMIÈRE. — Flacon granulé de CRYPTARGOL LUMIÈRE.

**Usage externe :** Flacon de solution-mère de CRYPTARGOL LUMIÈRE, titré à 1 gr. pour 10 cc. en flacon de 30 cc. et de 120 cc.

**Gynécologie :** Boîte d'ovules de CRYPTARGOL LUMIÈRE.

**Ophtalmologie :** Ampoules collire dosées à 1 p. 100 ou à 5 p. 100 de CRYPTARGOL LUMIÈRE.

**LABORATOIRES LUMIÈRE**

23, Cours de la Liberté — LYON.

## CRYPTHIOL

**Composition.** — Nouveau composé organique soufré, dérivé de la série aromatique ( $C^{10}H^{15}S$ ), ni toxique, ni irritant.

**Forme.** — Capsulines glutinisées.

**Action.** — *a.* Par le pouvoir catalytique du soufre non oxydé, le CRYPTHIOL active la désintégration des albuminoïdes jusqu'à leur terme final: l'urée, et accélère l'oxydation des déchets nuisibles de l'organisme.

*b.* Par son action élective sur la cellule hépatique, le CRYPTHIOL constitue un puissant cholagogue et stimule les fonctions urapoïétique et glycémique du foie.

**Indications.** — Insuffisance hépatique, États congestifs du foie, Lithiases biliaire et rénale, Goutte, Obésité, Rhumatisme chronique, et en général toutes les affections provenant d'une carence soufrée de l'organisme ou d'un métabolisme défectueux.

**Posologie.** — 2 à 4 capsulines par jour, un peu avant les repas.

**Prix :** l'étui de 30 capsulines, 15 francs.

---

**Laboratoires RENARD**

Docteur en Pharmacie

35, rue de Paris — CLICHY (Seine).

Anciennement : 142, av. de Clichy — PARIS.

## CRYSIODAL

du Docteur Et. MAIGRE.

Complexe organo-métallique à base d'or et d'iode, associé au cadmium.

**Indications.** — Pré-tuberculose et tuberculose.

**Présentation.** — Deux sortes de solutions réparties en ampoules de 5 cc. :

- 1° Pour injections intraveineuses (7 gr. d'iode et 0 gr. 0545 d'or pour 100 cc.) ;
- 2° Pour injections intramusculaires (3 gr. 50 d'iode et 0 gr. 027 d'or pour 100 cc.).

**Doses et mode d'emploi.** — Deux séries au moins de 25 ou 30 injections, à raison de deux injections par semaine, avec repos de 1 ou 2 mois entre les séries.

**Prix :** intraveineux, 30 fr. la boîte de 6 amp. ; intramusculaire, 25 fr. la boîte de 6 amp.

**H. VILLETTE, Pharmacien**

131, rue Cambronne, PARIS. — Tél. : Vaug. 11-23.

---

## CURATINE BRUNET

Analgésique.

Spécifique de l'élément douleur.

**Composition.** — Association rationnelle de : Phénacétine, Théine, Analgésine bi-carbonatée.

**Indications.** — Grippe, Migraines, Névralgies diverses, Rhumatismes, Règles douloureuses, Algies dentaires, etc.

**Posologie.** — 1 à 4 cachets par jour, de préférence loin des repas, pris à sec ou mieux dans un verre d'eau ou de tisane ; n'a pas de goût désagréable.

Se vend en boîtes de 1 cachet et boîtes de 6 cachets.

Prix réglementé de la boîte :

1 cachet : 1 franc. — 6 cachets : 5 fr. 50.

---

**Laboratoire**

**de la CURATINE BRUNET**

**23, rue des Ecouffles — PARIS (IV<sup>e</sup>).**



## CURATOXINE

Médication anti-infectieuse par voie buccale.

**Présentation et posologie.** — 1° *Granulé soluble* : 2 cuillerées à dessert par jour. 2° *Cachets* : 2 par jour.

**Formule.** — *Urotrolithine* (0,25 par cuillerée à dessert) en combinaison *Benzo-Salicylée-Sodique*. *Iode combiné* (0,01 par cuil. à dessert) *Extraits* et *Sels* laxatifs et diurétiques *Boldo*, extrait hépatique, glycérophosphates.

**Action.** — Anti-toxique, Antiseptique, Emonctorial « La Curatoxine élimine les toxines ».

**Indications.** — *Tous les états infectieux* aigus ou chroniques.

Infection des voies biliaires, Ictères, Infections vésico pyélo-rénales, Maladies infectieuses.

Septicémies, Suppurations chroniques.

*Rhumatisme goutteux. Arthritisme.*

Produits du Laboratoire de Dermatologie de Paris

**HOURQUET et VIENNE**

**Pharmaciens-concessionnaires.**

114, rue du Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## CURIODE

**Composition.** — Combinaison organique d'iode et d'un dérivé protéique d'origine animale.

**Avantages.** — Entièrement assimilable, plus efficace que les iodures alcalins et jamais aucun phénomène d'intolérance ou d'iodisme. — Elimination régulière.

**Propriétés.** — Le *Curiode* est :

- a) *Vaso-Dilatateur* (Artériosclérose, Hypertension, etc.).
- b) *Stimulateur des organes lymphoïdes et des Séreuses* (Adénopathies, Gourme, Végétations adénoïdes, Goitre, Arthropathie).
- c) *Donne de la fluidité au sang et aux sécrétions* (Asthme, Emphyseme, Toux spasmodique, Coqueluche).
- d) *Indispensable au traitement de la Syphilis.*

### Indications :

- 1° *Affections cardio-vasculaires* : Artériosclérose, Hypertension, Angine de poitrine, Péricardite.
- 2° *Affections respiratoires* : Asthme, Emphyseme, Toux spasmodiques, Coqueluche, Laryngite chronique, Bronchites anciennes.
- 3° *Affections des organes lymphoïdes* : Adénopathies de la scrofule et de la Tuberculose, Gourme, Végétations adénoïdes, Goitre, Arthropathies, Hydarthroses.
- 4° *Syphilis et toutes ses complications.*

**Posologie.** — XX gouttes correspondent à : 1 gramme de KI ou à 4 centigr. d'iode métalloïdique. Doses moyennes : XX à XL gouttes par jour, à prendre en deux fois (aux repas).

**Remarque.** — Quand les doses atteignent LX gouttes, il est préférable de commencer par X gouttes à chaque repas (XX gouttes par jour) et d'augmenter d'une goutte par repas tous les jours jusqu'à XXX gouttes par repas. Repos une semaine par mois.

## CURIODE ARSÉNIÉ

**Composition.** — Combinaison organique d'iode, d'arsenic et d'un dérivé protéique d'origine animale.

**Indications.** — Les mêmes que celles du *Curiode* et de l'arsenic, Recommandé chez les enfants et les adultes atteints d'affections pré-tuberculeuses et d'adénopathies simples ou trachéo-bronchiques.

**Posologie.** — XX gouttes correspondant à : 1 gramme d'iodure de potassium : 5 milligr. d'acide arsénieux ; 5 centigr. de méthylarsinate de soude (arrhénal), 2 cuill. à soupe de sirop iodotannique.

**Doses moyennes.** — *Adultes*, XX à L gouttes par jour. *Enfants* : II à III gouttes par année d'âge.

**Mode d'emploi.** — A prendre en 2 fois pendant les repas. Commencer par des doses faibles et augmenter tous les jours d'une goutte par repas. Repos une semaine par mois.

### TOLERANCE ET INNOCUITÉ ABSOLUES

Prix : 12 francs.

Echantillon gratuit à MM. les Docteurs

**Laboratoires DORANTOWICZ**  
17 bis, avenue Parmentier — PARIS.

## CURIOSAN

**Forme.** — Liquide.

**Composition.** — Mercurerythrosine (Sel nouveau ayant fait l'objet d'une thèse soutenue à la Faculté de médecine de Paris, 6 juillet 1926).

**Indications.** — Affections des voies génito-urinaires, Métrites aiguës et chroniques.

**Posologie.** — S'emploie :

1° en attouchements.

2° en instillations intracervicales.

**Laboratoires MARONNEAU-MOREL**

156, rue des Fauvelles — COURBEVOIE  
(Seine).

---

## CUROGÈNE

*Elixir* antidouleur (forme liquide, seule rationnelle), à base de camphorate de pyramidon et de pyramidon.

**Indications.** — Sédation de la douleur : Migraines, névralgies, rages de dents, rhumatismes, sciatiques, dysménorrhée, grippe, etc.

**Doses et modes d'emploi.** — *Adultes* : 2 cuillerées à café ; par jour : 2 à 8 cuillerées à café.

*Enfants* au-dessus de 5 ans : 1 cuillerée à café.

Prix au public : 14 fr. ;

Le flacon d'essai : 3 francs.

**Laboratoire du Curogène**

**Docteur J. GALIMARD**, ✱, ✱, ✱.

18, rue des Tribunes — VERSAILLES.

## CUROXYURE

Traitement efficace des oxyures.

**Forme.** — Pommade en tube muni d'une canule en os.

**Composition.** — Acide thymique, naphthaline; savon médicinal; extraits d'absinthe et de tanaisie.

S'applique aussi bien aux enfants qu'aux grandes personnes, *sans aucun danger.*

**Laboratoires B. E. A.**

Ch. BEHA, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
BELFORT.

## CYANHERMINE

**pour traitements antisyphilitiques**  
à base de Cyanure de mercure.

Ampoules pour injections intraveineuses.

### Composition :

Cyanure de mercure (chimiquement pur) .....	0 gr. 01 cgr.
Arséniate de sodium .....	0 gr. 005 mill.
Sérum isotonique .....	2 cc.

### Propriétés :

La Cyanhermine étant une solution à 1/200 en sérum isotonique réalise le maximum de tolérance. L'Arséniate de soude associé au mercure lutte contre l'anémie ou l'asthénie syphilitique.

### Mode d'emploi :

Voie intraveineuse et posologie habituelle du Cyanure de mercure.

La boîte de 12 ampoules : 10 francs.

**Laboratoires CAILLAUD**

37, rue de la Fédération — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Tél. : Invalides 12-63.

## CYNUROL-ROSA

A base d'extrait de feuilles d'artichaut, Urotropine, Salol, Pipérazine et Uva Ursi.

Antiseptique et Sédatif vésico-rénal,

Anti-urique et Diurétique.

**Forme.** — Dragées inaltérables et très assimilables.

### Indications :

- a) Affections vésico-rénales, cas aigus et chroniques.
- b) Diathèse urique : Rhumatisme, Arthritisme, Maladies de la nutrition.

**Posologie.** — De 4 à 12 dragées par jour.

**Laboratoires CYNUIROL-ROSA**

1, place Champerret — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

---

## CYTOBIASE

Extrait opothérapique de foies frais de Morue,  
(Vitamines A et D.)

### Formes :

- 1<sup>o</sup> Gouttes : Cytobiase simple. Cytobiase composé (addition de 5/1 000 d'arrhénal.
- 2<sup>o</sup> Granulé : association à l'extrait de foies de morue, de poudre d'os, glycérophosphates de Ca et Mg.

### Action :

Fixe la chaux par son cholestérol. Stimule les défenses organiques.

### Indications :

Anémies, avitaminoses, adénopathies, croissances, rachitisme, inappétence.

### Posologie :

*Gouttes. Enfants :*

Jusqu'à 5 ans : II gouttes par année d'âge.

De 5 à 15 ans : XV à XXV gouttes.

*Gouttes. Adultes :*

XXX à XL gouttes.

A prendre respectivement 2 fois par jour avant les repas dans un peu de vin, bière, eau, bouillon.

*Granulé. Enfants :*

Jusqu'à 5 ans : 2 cuillerées à café par jour.

De 5 à 15 ans : 4 cuillerées à café par jour.

*Granulé. Adultes :*

2 cuillerées à soupe par jour.

**Laboratoires MARTIN**

24, rue de Charenton — PARIS.

## CYTO-CHOLINE

### Composition :

Chlorhydrate de Choline pur..... 2 centigr.  
Sérum chloruré isotonisant..... 2 centicub.

**Indications.** — L'injection de **Cyto-Choline** peut être associée aux divers traitements chimiothérapiques et collapsothérapiques de la tuberculose.

Elle est indiquée chaque fois qu'une lésion tuberculeuse est en cause, que la localisation soit pulmonaire ou extra-pulmonaire, que l'évolution soit aiguë ou chronique.

**Mode d'emploi.** — La **Cyto-Choline** s'emploie en injections sous-cutanées, pratiquées avec les précautions aseptiques habituelles, au niveau de la cuisse, tous les deux jours.

Comme il s'agit d'une médication ayant pour but de modifier le terrain, elle doit être poursuivie pendant plusieurs mois, sans interruption.

**Résultats.** — Associée à la cure hygiéno-diététique, la **Cyto-Choline** favorise le développement du processus de sclérose cicatricielle chez les tuberculeux pulmonaires, et détermine chez ces malades une amélioration des symptômes fonctionnels.

Dans les tuberculoses extra-pulmonaires, les résultats de ce traitement ne sont pas moins remarquables.

Boîte de 12 ampoules : 20 francs.

**Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE**

fournisseurs des hôpitaux civils et militaires

**G. AUGER, pharmacien**

27, rue Desrenaudès, 27. — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## CYTO-MANGANOL CORBIÈRE

Médication mangano-calcique et magnésio-arseniée.

Le **CYTO-MANGANOL** constitue la médication hypodermique la plus active dans les cas d'asthénie, les états de dénutrition, la convalescence des maladies infectieuses et les troubles endocriniens.

**Indications.** — Déminéralisation en général et en particulier : décalcification ; dénutrition ; asthénies ; surmenage ; amaigrissement ; adénopathies ; lymphatisme, tuberculose.

**Mode d'emploi.** — En injection intramusculaire au niveau de la région fessière supérieure, en plein muscle.

**Dose.** — Une ampoule de 5 centicubes tous les jours ou tous les deux jours pour les adultes ; une ampoule de 2 centicubes pour les enfants.

### Présentation :

*Cyto-manganol pour adultes.*

Boîte de 12 ampoules de 5 cc.

Prix : 22 fr.

*Cyto-manganol infantile.*

Boîte de 12 ampoules de 2 cc.

Prix : 16 fr.

**Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE**

27, rue Desrenaudès. — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Téléphone : Carnot 78-11.

## CYTO-SÉRUM CORBIÈRE

### Composition :

<i>Cacodylate de soude chimiquement pur.</i>	<i>Trente centigr.</i>
<i>Sulfate de strychnine .....</i>	<i>Un milligramme.</i>
<i>Sérum isotonisant chloruré .....</i>	<i>Cinq centicubes.</i>

**Mode d'emploi.** — Une injection sous-cutanée ou intras-musculaire tous les jours ou tous les deux jours.

**Action.** — Multiplie les globules rouges, stimule l'activité cellulaire et accroît la résistance de l'organisme.

**Indications.** — Lymphatisme, Anémies, Tuberculose, Neurasthénie. Asthénie post-grippale, Convalescences.

**Présentation.** — Cyto-Sérum pour adultes, 12 ampoules de 5 centicubes.

Prix : 20 francs.

Cyto-Sérum infantile, 12 ampoules de 2 centicubes.

Prix : 14 francs.

**Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE**

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Tél. : Carnot 78-11.

---



## DECORPA

**Muilage spécial contre la faim.**

Mucilage pur, sans adjonction médicamenteuse, gonflant en milieu acide, indigestible, inassimilable, infermentescible ; « faux repas », remplissant l'estomac (après gonflement), illusionnant le tube digestif, assurant ses fonctions mécanique, sécrétoire et éliminatoire ; ne nourrissant pas.

**Action.** — Supprime la sensation de faim. — Maintient l'équilibre du tube digestif. — Evite la constipation des hypoalimentés. — Ne nourrit pas, mais rend tolérables les régimes de restriction alimentaire, même le jeûne complet.

**Indications.** — Adjuvant indispensable de toutes les cures de régime avec restriction alimentaire prescrites chez : *Obèses, Hypertendus, Pléthoriques, Urémiques, Uricémiques, Artério-Scléreux, Boulimiques, etc.*

**Doses.** — 2 à 3 cuillerées à café, 1 heure avant le repas (pour que le sujet se mette à table sans appétit), ou quand la faim se fait sentir.

**Laboratoires NORGAN**

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>). Tél. : Lab. 08-00.

## DELBIASE

Comprimés de sels halogénés de magnésium

Stimulant biologique général

par hyperminéralisation magnésienne.

Méthode cytophylactique du professeur Pierre Delbet.

**Indications thérapeutiques particulières.** — Asthénie et fatigue générale. Surmenage, Convalescence des maladies infectieuses, Dépression de certains malades devant être opérés.

Entérite chronique (désodorisation des selles), Constipation habituelle, Cholécystites, Angiocholites et toutes infections des voies biliaires, Tremblements séniles ou autres : Maladie de Parkinson, Sclérose en plaques, Contractures et Crampes.

Troubles cardiaques par hypervagotonie.

Affections de la peau, Prurits, Eczéma chronique, Psoriasis, Acné chronique, Verrues.

Adénome prostatique.

Lésions de type précancéreux et prophylaxie du cancer.

**Mode d'emploi et doses.** — De 2 à 4 comprimés par jour, selon qu'il s'agit d'obtenir une simple action stimulante, ou que l'on désire, au contraire, lutter énergiquement contre un état pathologique déjà institué, surtout s'il revêt un caractère un peu menaçant. Faire dissoudre les comprimés dans un demi-verre d'eau, à prendre immédiatement avant le petit déjeuner.

**Laboratoire de PHARMACOLOGIE GENERALE**

8, rue Vivienne — PARIS.

## DELCAÏNE ROQUES

Ghlorhydrate de pseudococaïne droite.

*Cocaïne aneuphorique* par double isomérisation chimique.

Plus active, moins toxique, n'est pas un stupéfiant.

**Emploi.** — Toutes anesthésies par injections, instillations, badigeonnages, infiltration.

**Forme.** — Solutions à 0,5 %, 1 %, 2 %, 5 %, 10 %, en ampoules de 1, 2, 5, 10 cc. Flacons O. R. L. 15 cc. à 5 % et 10 %. Flacons Delcaïne en poudre de 2 grammes.

**Doses.** — Mêmes doses que la cocaïne officinale.

### Établissements ROQUES

36, rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## DÉPURATIF KROMELINCK

Extraits stabilisés et stérilisés de Salsepareille rouge, Bardane, Réglisse, Sassafras, etc.

**Indications.** — Artériosclérose et toutes affections de l'appareil circulatoire. Affections du tube digestif productrices de toxines. Obésité.

**Posologie.** — 3 cuillerées à soupe (pur ou dilué dans une eau légère) par jour, pendant 1 mois.

Le grand flacon pour une cure : 40 fr. 10

Le flacon : 9 francs.

**Salsepareille rouge iodurée  
du Docteur Kromelinck.**

Recommandée pour le traitement des spécifiques.

Mêmes indications. — Même posologie.

Le flacon : 11 francs.

**Laboratoires BELIÈRES**  
19, rue Drouot — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## DÉPURATIF-ROB LECHAUX

Aux sucres végétaux concentrés et KI.  
Publicité uniquement médicale. Le Rob  
Lechaux est prescrit par le médecin.

**Indications.** — *Cure de désintoxication générale.* Printemps et automne.

**Action.** — Immédiate. Augmentation de toutes les sécrétions des glandes externes et internes. Abaissement de la tension sanguine. Désintoxication.

**Dose.** — Une cuillerée à soupe le matin à jeun pendant 2 mois. Une autre cuillerée à soupe le soir si nécessaire.

Le flacon : 14 fr.

Dépôt général :

49, rue de Maubeuge — PARIS (IX<sup>e</sup>).  
Echantillons sur demande.

---

## DÉPURIODE

du D<sup>r</sup> Roger Weber.

**Dépuratif** diurétique, ioduré, sans sucre ni alcool.

Une cuillerée à soupe contient

0 gr. 25 d'iodure de potassium.

**Formule.** — Extraits de bardane stabilisée, de fumeterre, de patience, de salsepareille, de pensée sauvage, de guaco, de stigmates de maïs, de noyer stabilisé, ââ 2 gr. Réglisse : 5 gr. Iodure de potassium 16 gr. 70. Benzoate de soude : 10 gr. Glycérine : 50 gr. Eau, q. s. pour 1 000 cmc.

**Indications.** — Furonculose, clous, anthrax, orgelets, éruptions, boutons, rougeurs, eczémas, impétigo, gourme, dartres, herpès, aphtes, scorbut, acné, psoriasis, urticaire, démangeaisons, dermatoses.

Arthritisme, uricémie, rhumatisme chronique, goutte, douleurs, névralgies, lumbago, sciatique, obésité.

Artériosclérose, athérome, hypertension, étourdissement, vertiges, mouches volantes, bourdonnements, céphalée, troubles cérébraux, pouls fort et tendu, signe de la temporale, crampes musculaires, refroidissement et engourdissement des extrémités, sensation de doigt mort, congestion, couperose, âge critique, scléroses, myocardite chronique, aortite, asthme cardiaque, angine de poitrine, bronchite chronique, emphysème asthme, cirrhoses, ictère spécifique, néphrite interstielle, albuminurie spécifique, oligurie, myélites, tabès névrites, paralysies, infections et intoxications, spécificité, bacillose, lymphatisme, scrofule, adénites, mycoses, actinomycose, alcoolisme, tabagisme, saturnisme, grippe, goître, abcès, suppurations, etc.

**Mode d'emploi et posologie.** — 20 jours par mois, au milieu de chacun des deux principaux repas, dans un demi-verre d'eau.

*Adultes* (dose moyenne) : 1 cuillerée à soupe. Contre artériosclérose et hypertension 1 cuillerée à dessert.

*Enfants* : au-dessus de 5 ans (dose moyenne) : 1 cuillerée à café.

Prix du flacon : 18 francs.

**Laboratoire du DÉPURIODE**  
61, rue de Seine — PARIS (VI<sup>e</sup>).  
Téléphone : Littré 47-76.  
Angellini, Pharmacien.

## DERMODULCIS

Spécifique de toutes les Maladies et Irritations de la Peau dont elles constituent le Pansement : idéal.

**Ni toxique, ni irritant.**

**Forme.** — Pommade et Poudre.

### POMMADE :

**Composition.** — Résorcine, Benzocaïne, Gomménol, Baume du Pérou, Ichtyol, Oxyde de zinc, Soufre précipité, Lanoline et Vaseline.

**Actions thérapeutiques.** — Antiseptique, analgésique, antiputride, astringente et siccative.

**Indications.** — Plaies atones, Ulcères variqueux, Brûlures, Escarres, Fistules anales, Eczéma sous toutes ses formes, Psoriasis, Sycosis, Acné, Intertrigo, Prurit.

**Mode d'emploi.** — En application une ou deux fois par jour, suivant prescription du médecin.

### POUDRE :

**Composition.** — Acide salicylique, Lycopode, Oxyde et Stéarate de zinc, Carbonate de chaux, Silicate de magnésie.

**Actions thérapeutiques.** — Antiseptique, infermentescible, adhérente, adoucissante et hygiénique.

**Indications.** — Rougeurs, irritations de la peau, escarres. Toilette des bébés.

**Laboratoire LAGOUTTE**

229, Cours Gambetta — LYON (III<sup>e</sup>).

## DERMOFAGINE

Crème pommade, légèrement parfumée, en tube.

(Extr. de hêtre.)

**Propriétés.** — Antiparasitaire, Antiseptique, Antiprurigineuse cicatrisante.

**Indications.** — Toutes les Dermatoses, principalement les Dermatoses sèches, Pityriasis du visage (dartres); du cuir chevelu (pellicules).

Eczémas secs, chroniques, hyperkératosiques.

Eczémas séborrhéiques (séborrhée concrète des vieillards (verruques plates séniles).

Impétigo, Herpès; Tricophyties (herpès circinné).

Toutes affections croûteuses et pelliculaires du cuir chevelu.

Erythèmes, crevasses, Hémorroïdes.

Irritations de la peau, rougeurs, engelures, par rasoir, fards, intempéries.

La *Dermofagine* est une excellente crème de toilette.

Prix au public : 12 francs.

Donner en même temps à l'intérieur un dépuratif (cholagogue et diurétique), le **Raiforyl** (granulé) à la dose de 4 ou 5 cuillerées à café par jour.

Prix au public : 12 francs.

**Laboratoires de la DERMOFAGINE**

15, pl. Godefroy-de-Bouillon — BOULOGNE-SUR-MER  
(Pas-de-Calais).

## DERMO-PLASTOL DUMESNIL

(Plastols Dumesnil.)

Formé avec le *Zébo-Plastol* et le *Crémo-Plastol* le groupe des Plastols Dumesnil, pâtes poreuses composées, très homogènes et destinées à être appliquées sur la peau, à la manière des pommades, dans toutes les dermatoses dont le type est l'eczéma sous toutes ses formes.

**Propriétés.** — Le Dermo-Plastol est la préparation qui convient au plus grand nombre de cas; il calme immédiatement les démangeaisons et assure la réparation intégrale des tissus malades.

**Indications.** — Les *Plastols* peuvent être appliqués sur toutes les parties du corps ou des membres; eczémas de la vulve ou du rectum, psoriasis, parakératoses psoriasiformes de Brocq, eczémas séborrhéiques de Unna, prurits avec lichénification et eczématisation, pityriasis, impétigo, prurigo, etc.

**Laboratoires DUMESNIL**

10, rue du Plâtre — PARIS.

## DERMORADOL

Complexe à radioactivité stabilisée.

**Composition.** — Pommade à base de Bromure de Radium associé aux meilleurs topiques usuels (soufre, camphre, Pix betulina, oxyde de Zn).

**Propriétés.** — Action particulière du Radium sur les réactions inflammatoires locales.

Accentuation des propriétés de chacun des topiques, par radioactivité induite.

**Le DERMORADOL** calme l'irritation et la douleur dès la première application. Cicatrise rapidement toutes les dermatoses.

**Indications.** — Eczémas, psoriasis, prurits, plaies atones, herpès, acné, érythèmes, brûlures, ulcères variqueux.

**Mode d'emploi.** — Appliquer 2 ou 3 fois par jour la quantité de pommade nécessaire pour recouvrir complètement la partie malade.

**Établissements LABORADIUM**

33, rue Saint-Jacques — PARIS.

---

# DERMO-RHINHISTOL

## TOPIQUE MIXTE GRAS

### OPOTHÉRAPIQUE ET CHIMIOTHÉRAPIQUE

à base d'extrait embryonnaire total.

**RÉGÉNÉRATEUR CELLULAIRE DES TISSUS**  
de la  
**PEAU DE TOUTES RÉGIONS ANATOMIQUES**  
et de la  
**MUQUEUSE DU RHINO-PHARYNX**

**PRODUIT MÉDICINAL FRANÇAIS**

exempt de toute substance irritante.

#### **COMPOSITION**

donnée par la formule suivante.

<b>Extrait embryonnaire total</b> (riche en tréphones).	2 grammes.
<b>Chlorure mercureux</b> (calomel) inodore, insipide .	4 —
<b>Camphre des Laurinées</b> .....	1 gramme.
<b>Goménol</b> (essence naturelle pure) .....	1 —
Essence de pin sylvestre .....	1 —
Eucalyptol.....	0 gr. 50
Menthol .....	0 gr. 20
Essence aromatique.....	1 gramme.
<b>Lanoline</b> {	pures, neutres, stérilisées. Q. S. p. 100 grammes.
<b>Vaseline</b> }	

**N. B. —** La préparation opothérapique d'extrait embryonnaire total employée est faite à partir de fœtus frais provenant d'animaux récemment abattus, rigoureusement sélectionnés et contrôlés. Chaque fœtus ou embryon est desséché dans le vide et à froid avant d'être pulvérisé. L'extrait embryonnaire total ainsi obtenu est garanti pur et sans odeur. Sa conservation est indéfinie.

#### **PRÉSENTATION**

Le « Dermo-Rhinhistol » est présenté sous forme de

#### **POMMADE STABLE**

en tubes métal de 40 grammes de produit

(modèle unique).

#### **EFFETS PHYSIOLOGIQUES**

- I. Appliqué en couche suffisante sur une lésion de la peau d'une région quelconque du corps ou sur une lésion de la muqueuse du nez et du pharynx, le « Dermo-Rhinhistol » entraîne une rapide multiplication des cellules du tissu épithélial et du tissu conjonctif lésés et, par suite, une promptة réparation des tissus précités. Dans ces conditions, la régénération cellulaire de la peau et des muqueuses altérées dans leur structure normale est la résultante de deux actions antagonistes :
- 1° Une action excito-cellulaire attribuée à certaines substances azotées connues sous le nom de tréphones, contenues dans tout suc



**embryonnaire**, utilisées par les cellules pour la construction de leur protoplasma et recherchées pour le **maintien d'un état de croissance** des tissus désorganisés.

- 2° Une **action fréno-cellulaire** dévolue à certains principes développés dans le **sérum des organismes vivants** arrivés à un **âge déterminé** pour chacun, dont la présence **retarde** ou même **arrête** les **proliférations cellulaires** inutiles ou nuisibles à la vie des êtres.
- La **rapidité de réparation tissulaire** est donc en **raison directe** de la **richesse en tréphones** des **extraits embryonnaires** employés comme topiques et en **raison inverse** de l'**âge du sujet traité**, porteur de lésions de la peau ou d'une membrane muqueuse accessible.
- II. Au cours de l'application rationnellement prolongée du « Dermo-Rhinistol », soit sur une surface cutanée désorganisée ou normale, soit sur une membrane muqueuse lésée ou intacte, celui-ci détermine généralement assez vite la **résolution des engorgements des tissus de revêtement** ou des **organes sous-jacents** troublés par le trauma ou la maladie, grâce à la **facile diffusion du calomel** et du **camphre** rapidement **véhiculés** par l'**excipient choisi** au travers des divers plans anatomiques des régions de l'organisme soumises à l'action du topique mixte gras.

### **PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES**

**CICATRISANT — RÉSOLUTIF**

Antiseptique — Analgésique.

### **INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES**

**DERMATOLOGIE — TRAUMATOLOGIE**

(Toutes les dermatoses). (Toutes plaies et brûlures).

### **OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE**

Rhinites — Pharyngites — Otites

**Coryza — Rhume de cerveau — Ozène.**

*Antisepsie indirecte par stimulation des tissus et  
antisepsie directe microbicide par action chimique  
de la muqueuse du nez et du pharynx*

*en vue de la mise en état de défense de l'organisme contre nombre d'infections  
(grippe, diphtérie, scarlatine, rougeole, etc.).*

### **MODE D'EMPLOI**

Pansements divers — Onctions — Aspirations nasales.

(Applications renouvelées plusieurs fois par jour.)

### **PRIX DE VENTE IMPOSÉ**

Le tube de 40 grammes : 15 francs.

### **LABORATOIRE DU MICELLIODE**

**Produits médicaux spécialisés.**

*Fabrication française.*

A. ROLLAND, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
31, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (IV<sup>e</sup>).

**DÉPOT GÉNÉRAL**

**Service commercial**

**Service médical**

88, rue de la Villette — PARIS (XIX<sup>e</sup>).

Tél. : Botzaris 34-32.

# DERMO-STALYS

du Docteur Wagon

(Pommade renfermant du Bactériophage).

## But et principe :

Application pratique aux affections cutanées des propriétés d'un Bactériophage antistaphylococcique multivalent.

## Composition :

Filtrat bactériophage antistaphylococcique .....	100 cc.
Orthoquinoléine sulfonate de potasse.....	0 gr. 25
Excipient. Q. S. pour.....	1 kg.

## Indications :

Toutes *Staphylococci* cutanées. Furoncles, Anthrax, Acné, Sycosis, Impétigo, et affections ou lésions aggravées par le *Staphylocoque* : Eczémas suintants, Intertrigo, Pyodermites, Ulcères, Plaies suppurées atones, Otites externes, Crevasses, Fissures anales.

Emploi sans danger.

Contre-indications. — Néant.

## Mode d'emploi :

Pour Furoncles, Anthrax, Pyodermites, Plaies, étaler une bonne couche sur la zone malade, enflammée, suintante ou purulente ; compresse stérile, bande ou bandelettes agglutinatives.

Sur la face (Acné, Sycosis), appliquer une mince couche matin et soir avec léger massage, sans pansement.

Eviter l'emploi concomitant de tout antiseptique.

## Résultats :

Disparition des phénomènes inflammatoires en 2-4 jours

## Remarques :

- Pour l'acné et le sycosis, faire suivre les premières applications d'un traitement d'entretien durant plusieurs jours en utilisant la pommade à la manière d'une crème de beauté.
- Pour les vastes placards eczémateux, tâter la susceptibilité des malades en n'appliquant au début le produit que sur une surface de la dimension d'une pièce de 2 francs et augmenter ensuite progressivement.

Prix : Tube de 25 grammes : 18 francs.

Echantillons et littérature sur demande :

**SOCIÉTÉ DES PRODUITS STALYS**

Laboratoire SÍDEPAL

64, rue La Boétie — PARIS.

Téléph. : Elysées 98-82.

## DÉSENSIBILYSINE

Traitement de l'asthme et de l'emphysème (méthode du D<sup>r</sup> Paul Cantonnet).

### Traitement principal d'attaque :

1° Soluté de polypeptone iodée et de chlorure de calcium jaborandique injectable.

La boîte d'ampoules : 40 francs.

### Traitements adjuvants et de maintien :

Pulvérisations huileuses (aérol, trachéol).

Aérol : Le flacon avec pulvérisateur : 60 francs.

Le flacon de rechange : 25 francs.

Trachéol : Le flacon : 20 francs.

2° Pilules de Pilo-chlorine.

Pilo-chlorine : Le flacon : 25 francs.

### Traitement forme bronchitique :

Stock-vaccin bronchitique Beauvy-Cantonnet.

La boîte : 40 francs.

**Laboratoires BÉLIERES**

19, rue Drouot — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## DESITIN

Préparation à base de chlore et d'huile de foie de morue.

*Nouvelle formule désodorisée.*

**Indications.** — Acné, Dartres, Décubitus, Eczéma, Fistules, Hémorroïdes, Herpès, Inflammations, Intertrigo, Prurit, Séborrhée, Soins de la face, Sudation, Transplantation, Transpiration, Ulcus Cruris, Membres gelés, Engelures, Brûlures (aussi du soleil et des glaciers) etc. *Traitement de toutes les plaies.*

**Pommade :** 1/2 tube (25 gr.), 10 francs.

1/1 tube (65 gr.), 16 francs.

**Poudre :** Assèchement des plaies et emploi général en dermatologie, en pédiatrie et dans la vie sportive.

Boîte poudreuse (100 gr) : 12 francs.

**Suppositoires.** — Spécifique contre les hémorroïdes.

Boîte de 10 : 18 francs.

**Ovules :** Pour affections des annexes. Pertes blanches.

Boîte de 6 : 18 francs.

Représentants dépositaires

**Établissements MERMINOD & Cie**

Ad. Buisson, pharmacien

49, rue de Paradis. — PARIS (X<sup>e</sup>).

Tél. : Provence 30-32.

## DÉTERGINE

du Docteur BOURDEAU

(pommade aux peroxydes, persulfate de soude, gaiacol, terpinol).

### TRAITEMENT des PLAIES

Plaies en général.

Plaies post-opératoires : appendicite à chaud, cystostomie, ostéomyélite, fistule, mastoïdectomie.

Déterge rapidement les plaies les plus infectées, c'est là son originalité.

Convient également dans l'eczéma consécutif aux plaies post-opératoires.

Nombreuses références médicales et chirurgicales.

Laboratoire du Docteur BOURDEAU

PARTHENAY (Deux-Sèvres).

## DIABÉTIFUGE

Spécialité synthétique antidiabétique à base de bioxyde de manganèse, de bicarbonate de soude, de chlorhydro-méthylarsinate de lithine, d'antipyrine, de nitrate d'urane et de santonine.

Médication complémentaire de l'Insuline.

**Doses.** — Un cachet, le matin et l'après-midi, avec un demi-verre d'eau minérale, Pougues de préférence. Continuer pendant 10 jours : diminuer, s'il y a lieu, après analyse du sucre ; cesser au bout de 20 jours. Repos de 20 jours et reprendre.

Prix au public : 25 francs.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D<sup>r</sup> E. PERRAUDIN, pharmacien  
21, rue Chaptal — PARIS.

## DIABÉTULINE

**Traitement du diabète par l'Huile de Gabian.** (Pétrole chimiquement pur).

(Aucune contre-indication formelle.)

**Forme.** — Cachets.

**Formule.** — Huile de Gabian, 0 gr. 25 ; Levurine, 0 gr. 50 ; Eucalyptus pulvérisé, 0 gr. 90 ; Poudre inerte, 0 gr. 25. Pour un cachet.

**Indications.** — Diabète sous toutes ses formes.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 cachets par jour, pris au milieu des repas.

**Prix.** — La boîte de 30 cachets : 18 francs (exempt d'impôt).

Echantillons et littérature :

**Laboratoires V. CHARRET-TOMASI**  
SAINT-JUST-SUR-LOIRE (Loire).

---

## DIADERMINE

Excipient pour pommade.

**Définition.** — La Diadermine est un savon mou à la glycérine, sans odeur, inaltérable, absolument neutre, soluble dans l'eau et les sérums et pénétrant très rapidement l'épiderme.

**Indications.** — Remplace la vaseline, l'axonge et la lanoline dans la préparation des pommades médicamenteuses, *éteint le mercure*. *Touchers*, ne graisse pas et n'abîme pas les gants.

*Massages, Soins de la peau*, Brûlures, Engelures, Gerçures du sein. Préviens et guérit l'érythème fessier du nouveau-né.

Prix de vente au public : Pot : 6 fr. 50 ; Tube : 4 fr. 75.

Conditions spéciales au Corps Médical.

**BONETTI Frères**

12, rue Vavin — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## DIALACETINE CIBA

Sédatif, Antipyrétique, Analgésique.

Diallylmalonylurée, plus éther allylique du paracétaminophénol. Action sédatif, analgésique et antipyrétique permettant d'instituer une thérapeutique efficace et sûre dans l'ensemble des cas où l'irritabilité nerveuse compte parmi les symptômes dominants.

**Indications.** — Agitation et délire au cours des maladies aiguës. Epilepsie, Hystérie, Névroses diverses, Angine de poitrine, Névralgies, Lumbago, Insomnie des tuberculeux.

**Doses.** — Dose sédatif : 1 à 3 comprimés par 24 heures par 1/2 ou 1 comprimé, avec intervalle de 2 à 5 heures. Dose hypnotique et analgésique, 1/2 à 2 comprimés au maximum.

Le tube de 15 comprimés : 13 francs.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**

109-113, boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## DIAL CIBA

Hypnotique antinerveux.

Diallylmalonylurée. Hypnotique actif et rapidement éliminé, d'où réveil normal, non suivi d'hébétude. Procure un sommeil calme et réparateur et, à dose modérée, n'a jamais d'action nocive, son usage étant même prolongé.

**Indications.** — Insomnie nerveuse en général et chez les agités, les émotifs, les surmenés. Etats démentiels.

*Trois formes : Comprimés, Gouttes et Ampoules (Dial soluble).*

**Doses.** — 1 ou 2 comprimés au coucher pour les insomnies du soir, au réveil pour celles du cours de la nuit. *Adultes* : 1 à 2 comprimés, XXX à LX gouttes, 1 ou 2 ampoules.

**Prix** : le tube de 12 comprimés, 8 fr. — Le flacon Dial Soluble, 11 francs. — La boîte de 5 ampoules, 10 francs.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**

109-113, boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## DIALYL

Dissolvant urique.

Médicament-type de l'arthritique et du rhumatisant.

**Indications.** — Diathèse urique, Rhumatismes, Goutte, Sciatique, Névralgies, Migraines, Lumbago, Gravelle, Calculs, Coliques néphrétiques et hépatiques, Dermatoses, Surmenage physique ou intellectuel.

**Forme.** — Granulé effervescent.

**Posologie.** — Deux cuillerées à café par jour, chaque cuillerée dans un peu d'eau, entre les principaux repas. — Dans les crises aiguës, 4 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix au public : 12 fr. le flacon.

**Laboratoire ALPHONSE BRUNOT**

16, rue de Boulainvilliers — PARIS.

Téléphone : Auteuil 20-21.

## DIASCLÉROL

**Composition.** — Association Sédobenzyl ( $C^2 H^3$   $CH^3 SO^5 K$ ) (antispasmodique, hypotenseur), hydrate de pipérazine, salicylate de lithine et hexaméthylène tétramine en milieu citraté.

**Indications.** — Diathèse urique, Hypertension, Artério-sclérose, Arthritisme, Goutte, Gravelle. Rhumatisme, Coliques hépatiques et néphrétiques, Obésité, Diabète.

**Dose et mode d'emploi.** — Granulé effervescent, 3 à 6 cuil. à café par jour, dans un peu d'eau, quelques minutes avant les repas.

Le **DIASCLÉROL** n'étant pas toxique, son emploi peut être prolongé.

**LABORATOIRE ODILIA**

**E. LACOMBE**, pharmacien

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

## DIASES

**Composition.** — Farines fraîches diastasées de céréales et de légumineuses renfermant toutes leurs vitamines.

**Propriétés.** — Elles réduisent au minimum le volume alimentaire à absorber. Grâce à une pré-digestion s'opérant pendant la cuisson, elles permettent l'obtention de bouillies très concentrées possédant une agréable fluidité.

Sans aucun surmenage des organes digestifs, elles assurent une suralimentation rationnelle.

**Indications.** — Nourrissons (particulièrement au moment difficile du sevrage), Enfants, Malades, Convalescents, Vieillards. Tous les malades à régime : Cardiaques brightiques, Rhumatisants, Dyspeptiques, Tuberculeux, Cachectiques.

**Mode d'emploi.** — Délayer parfaitement et à froid 3 cuillerées à soupe (soit 50 grammes environ) de Diase dans environ 10 à 15 cuillerées à soupe d'eau, de lait, de bouillon de légumes ou de viande. Chauffer à *feu très doux*, en remuant ; la préparation s'épaissit d'abord, puis s'éclaircit. Elle est prête alors à recevoir tous les condiments (sel, beurre, épices) qu'on désire lui ajouter.

### Nomenclature.

**DIASE CACAO :** Déjeuners et goûters pour adultes et enfants. La boîte de 1/3 de kilo : 8 fr. ; de 1 kilo : 22 fr.

**DIASE CÉRÉALE** sans sucre : Bouillies très fluides pour bébés au biberon, enfants et adultes délicats. La boîte de 1/3 de kilo : 7 fr. 50 ; de 1 kilo : 20 fr.

**DIASE CÉRÉALE** sucrée : Diase complète aromatisée, recommandée pour les enfants en bas âge. La boîte de 1/3 de kilo : 7 fr. 50 ; de 1 kilo : 20 fr.

**DIASE LÉGUMINEUSE :** Potages excellents instantanés. La boîte de 1/3 de kilo : 7 fr. 50 ; de 1 kilo : 20 fr.

**Laboratoires PROGIL**

6, boulevard de Strasbourg — PARIS (X<sup>e</sup>).



## DIASTOGÈNE DEHAUSSY

Reconstituant intensif.

### Composition.

*Arsines*, stimulant de la nutrition.

*Nucléine manganésifère*, catalyseur nutritif, excitant des centres hématopoïétiques.

*Kola fraîche stabilisée*, toni-cardiaque, éliminateur des toxines et des déchets de la nutrition.

### Indications.

Chaque fois qu'il faut stimuler un organisme affaibli, une nutrition ralentie.

### Formes.

*Diastogène Elixir* (légèrement alcoolisé).

*Adultes* : 2 verres à liqueur par jour, pur ou dans un peu d'eau.

*Diastogène granulé*. — *Adultes* : 4 à 5 cuillerées à café, 10 ans, 2 ; 5 ans, 1.

*Diastogène comprimés*. — Le Reconstituant des Diabétiques : 6 par jour.

### DIASTOGÈNE F

Poudre de Fenugrec, associée au complexe diastogène. Le Fenugrec, en un comprimé glutinisé (évite au malade : odeur, saveur, nausées) est incorporé au milieu du cachet.

### Indications.

Amaigrissement, asthénies, convalescences.  
2 à 3 cachets par jour.

Prix : 16 francs.

**Laboratoires DEHAUSSY**

66, rue Nationale — LILLE.

## DIASTO-PEPSINE RICHEPIN

Pilules et Elixir (très agréable).

Contiennent toutes les vitamines  
et hormone des glandes fraîches.

L'activité des ferments digestifs : *Pepsine*, *Pancréatine* et *Diastase* dépend de la façon dont ils ont été recueillis et préparés. Aussitôt isolés par les procédés décrits ailleurs à basse température, ils sont incorporés aux excipients spéciaux, pilule ou élixir (très agréable). Leur puissance active est ainsi bien supérieure aux agents habituels du commerce.

La digestion stomacale et intestinale est donc complète : viandes, graisse, légumes, féculents, etc. L'assimilation est totale : c'est le repos du foie, du pancréas et de tous les organes digestifs souvent déficients, surtout avec l'âge et la fatigue.

**Doses.** — 2 ou 3 pilules après les repas ou 1 verre à liqueur d'élixir. Pour les enfants, faire fondre 1 pilule dans du lait ou 1 cuillerée à café d'élixir dans de l'eau sucrée.

**Laboratoire du Docteur TISSOT**

34, boulevard de Clichy — PARIS.

## DIATHERMIE

### A. — Diathermie médicale.

- 1° *Troubles de la circulation artérielle et veineuse ;*
- 2° *Douleurs thoraciques d'origine pleurale, et Douleurs abdominales : gastralgies, entéro-colite, épiploïtes et périviscérités, séquelles douloureuses post-opératoires, affections douloureuses du foie, de la vésicule biliaire, des organes génitaux ;*
- 3° *Rhumatismes chroniques, arthralgies et myalgies ;*
- 4° *Névralgies et névrites ;*
- 5° *Trophicité des tissus ; paralysies, poliomyélite.*

### B. — Diathermie chirurgicale.

#### Diathermo-coagulation.

Utilisée pour la destruction de nombreuses lésions, en dermatologie, en gynécologie, en oto-rhino-laryngologie, en ophtalmie ainsi qu'en chirurgie générale.

Vente et location de tous appareils et accessoires à :

**La Verrerie Scientifique,**

12, avenue du Maine — PARIS (XV°).

Tél. : Littré 94-62 et Littré 01-63.

## DICALIODE

Complexe colloïdal d'iode.

Médicament de choix pour l'administration de doses massives d'*iode libre*.

**Composition et forme.** — Suspension aqueuse titrant 4 p. 100 d'iode total dont 3 p. 100 d'*iode libre, métallique*, en petits grains.

**Avantages.** — Beaucoup plus rapidement qu'avec la teinture d'iode, on peut arriver à des doses importantes d'*iode libre* (0,50 à 1 gr. par jour). On institue pour cela une posologie par progression arithmétique.

**Mode d'emploi.** — Prescrire toujours le dicaliode en cc. (une mesure graduée accompagne chaque flacon) et *dans du lait froid* (de préférence avant les repas).

**Indications.** — *Dicaliode à petites doses* : 1 à 2 cc. par jour. Goitre. *Enfants* : perte d'appétit, ganglions, grosses amygdales, rachitisme.

*Dicaliode à doses moyennes* : 2 à 5 cc. par jour. Affections du cœur et des vaisseaux : **Hypertension** ; de l'appareil respiratoire (bronchite chronique, asthme, emphyseme, coqueluche, tuberculose). *Affections de la peau* : eczéma, psoriasis.

*Dicaliode à hautes doses* : 10 à 30 cc. par jour. Tuberculoses localisées, adénites, ostéites, iritis, rhumatisme chronique, mycoses, septicémies, syphilis tertiaire.

**Laboratoires MAYOLY-SPINDLER**

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

A Bruxelles : **LE MARINEL**, pharmacien  
273, rue Victor-Rauter.

## DIDIAL CIBA

Hypnotique analgésique.

Diallylmalonylurée et diallylmalonylurate d'éthylmorphine, chaque comprimé étant formé de 0 gr. 075 de Dial pur, plus 0 gr. 025 de diallylmalonylurate. Pouvoir narcotique plus prononcé que le Dial, et action nettement analgésique, d'où indication toutes les fois que l'insomnie est sous la dépendance de la douleur.

**Indications.** — Toutes les insomnies relevant de la douleur : névralgies, traumatismes, tabes, cancers, etc. Agitation maniaque, excitation psychique. Calmant pré et post-anesthésique.

**Doses.** — 1 à 3 comprimés à 0 gr. 10 par jour, à prendre le soir dans les cas d'insomnie due à la douleur ; par doses réfractées, aux repas dans les autres cas.

Le tube de 12 comprimés : 14 francs.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**

109 à 113, boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## DIEMENAL

**Indications.** — Paludisme chronique, Paludisme, Fièvre bilieuse hémoglobinurique.

**Composition.** — Fer, Manganèse colloïdaux, obtenus par électrolyse.

**Forme.** — Ampoules isotoniques de 10 cc. en boîtes de 6 ampoules.

**Mode d'emploi.** — Dans le Paludisme et la fièvre bilieuse hémoglobinurique :

Injection hypodermique ou intraveineuse d'une ampoule de 10 cc. toutes les 12 heures environ.

Dans le Paludisme chronique : Commencer le traitement par : 12 injections à raison de une par jour ;

Le continuer par : 6 injections à raison de une tous les 2 jours ;

Le terminer par : 6 injections à raison de une tous les 4 jours.

En se conformant à la posologie ci-dessus, on peut être assuré de voir les accès disparaître complètement chez le paludéen chronique, devenu le plus souvent insensible à l'action de la quinine.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 16 fr. 50 (en France).

**Laboratoire J. DEPRUNEAUX,**  
18, rue de Beaune — PARIS (VII<sup>e</sup>).

## DIENOL

**Indications.** — Broncho-pneumonie, Infections septicémiques. Toutes septicémies (grippe, pneumonie, broncho-pneumonie) et tous états toxi-infectieux médicaux et chirurgicaux.

**Composition.** — Métaux colloïdaux, Fe Mn, obtenus par électrolyse.

**Forme.** — Ampoules isotoniques de 10 cc. en boîtes de 6 ampoules, et tubes-doses de 40 cc. pour l'emploi par voie rectale.

**Mode d'emploi.** — Une ampoule toutes les 12 heures, en injection hypodermique (indolente) ou intraveineuse, et pour la voie rectale : 2 tubes-doses par jour.

Quand on ne veut pas employer le DIENOL en injection hypodermique, surtout chez les enfants. on peut opérer par voie rectale.

Dans ce cas, on se servira des tubes-doses spéciaux à grande capacité, qui donneront des effets encore plus rapides et aussi puissants.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 14 francs.

Prix de la boîte de 3 tubes-doses : 15 francs.

**J. DEPRUNEAUX**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
18, rue de Beaune, PARIS (VII<sup>e</sup>).

---

**DIGALÈNE « ROCHE »**

Digitale injectable.

Tous les principes actifs de la macération de feuilles fraîches de digitale solubilisés et injectables.

**Posologie et mode d'emploi :**

Ampoules, Solution, Comprimés

1 cc. = XXX gouttes = 2 comprimés.

Doses très faibles ou d'entretien cardiotonique :

Adultes : XX gouttes. — Enfants : I à X gouttes (voies buccale ou rectale).

Doses faibles ou sédatives :

Adultes : XXX à LX gouttes (voies buccale ou rectale) ; 2 à 4 comprimés (voie buccale) ; 1 à 2 cc. (voie intramusculaire indolore). — Enfants : V à XV gouttes, selon l'âge.

Doses fortes ou antiasystoliques :

Adultes : XC à CLXXX gouttes (voies buccale ou rectale) ; 3 à 6 cc. (voies intramusculaire ou *endoveineuse*). — Enfants : V à XX gouttes et même 1 à 2 cc. (*cas désespérés*).

**Propriétés thérapeutiques.** — Action très rapide, tolérance parfaite, pas d'accumulation.

**Indications thérapeutiques.** — Chaque fois que le cœur faiblit.

**Produits**

**F. HOFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**

21, Place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

## DIGESTIF HARVEY

### Composition :

Benzonaphtol .....	50 centigr.
Carbonate de chaux.....	25 —
Salicylate de bismuth .....	25 —
Hydrate de magnésie.....	50 —
Pepsine extractive .....	10 —
Maltine.....	05 —
Sucre anisé .....	6 grammes.

**Propriétés thérapeutiques.** — Régulateur de l'acidité gastrique et des fonctions digestives.

**Formes.** — Granulé d'un goût agréable, pouvant être croqué.

**Indications.** — Dyspepsies, Gastralgies, Gastrites, hyperchlorhydrie, fermentations acides, Entérites.

**Posologie.** — Une cuillerée à café dans un quart de verre d'eau, après chaque repas. Avant d'absorber le granulé, le laisser pendant vingt minutes en contact avec l'eau.

Prix au public : 10 francs la boîte.

**Laboratoire MALMANCHE**

Pharmacien. Docteur ès sciences,

101, avenue de Paris.

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

## DIGESTONIC

**Composition.** Citrate de soude, Phosphate de Bismuth, Fluorure d'Ammonium, Macération hydro-glycérique de sedum telephum et de gonolobus condurango.

**Forme.** — Elixir.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action sédative s'exerçant sur les terminaisons nerveuses de la muqueuse gastrique. Calme le spasme, Action anti-émétique. Pouvoir antiseptique s'opposant aux fermentations. Supprime la constipation.

**Indications.** — Dyspepsies hypersthéniques, hyperchlorhydrie, spasme du pylore, irritations gastriques douloureuses, motrices et sécrétoires, vomissements du début de l'ulcus, fermentations gastriques par stase, constipation.

**Doses et mode d'emploi.** — 1 à 2 cuillerées à soupe dans un peu d'eau ou de tisane. Répéter la dose jusqu'à cessation de la douleur. Adjonction d'un régime le cas échéant.

Prix : 17 fr. le flacon de 250 cc. environ.

Autorisé par les Assurances Sociales.

**Laboratoire des Produits Scientia**

21, rue Chaptal — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## DIGIBAÏNE

Complexe tonicardiaque.  
Association digitaline-ouabaïne.

**Présentation et posologie.** — 1° *Voie buccale.* Solution glycéro-alcoolique titrée de telle sorte que XV gouttes = 1/10 millig. : Digitaline crist. pure + 2/10 millig. ouabaïne crist. pure.

Doses faibles (cures prolongées d'entretien) : X à XV gouttes par jour.

Doses moyennes : XXX gouttes par jour en 2 fois (pendant 6 à 7 jours).

Doses fortes : XL à L gouttes par jour en 3 fois (pendant 4 ou 5 jours).

2° *Voie intraveineuse* (méthode exceptionnelle). Ampoules titrées à XV gouttes de solution par cc. (1 cc. par injection et par jour pendant 6 à 7 jours.)

**Indications.** — En général toutes celles des préparations digitaliques. Action plus sûre, plus rapide et plus durable. Tolérance parfaite. Agit là où tous les autres tonicardiaques ont échoué.

**Remarques importantes.** — La Digibaïne est la première association digitaline-ouabaïne préconisée en thérapeutique cardiaque (MM. Ch. Laubry, D. Routier et R. Giroux, C. R. Soc. méd. hôpitaux de Paris ; 26 janvier 1923).

La Digibaïne est préparée *uniquement* par les Laboratoires Deglaude.

**Laboratoires DEGLAUDE**

*Médicaments cardiaques spécialisés.*

(Cardibaïne,

Spasmosédine, Théoxanthine, etc.)

6, rue d'Assas — PARIS (VI<sup>e</sup>).

Tél. : Littré 31-85.

**Belgique : Agent général : L. Prunières,**  
19, rue Louis-Hap — BRUXELLES.



## DIGIFOLINE CIBA

Préparation digitalique totale contenant, sous une forme optima, l'ensemble des glucosides cardio-actifs de la feuille de digitale. *Stable, d'action constante, toujours bien tolérée, rigoureusement dosée.*

**Indications.** — Celles de la digitaline et de la digitale, par voie buccale, hypodermique et intraveineuse. Plus spécialement lorsque le foie est gros (ampoules) et lorsqu'il y a lieu de stimuler la diurèse.

**Posologie.** — Celle de la poudre de feuille de digitale, à laquelle elle correspond poids pour poids.

**Formes pharmaceutiques.** — Comprimés de 10 cgr. — 10 cgr. poudre de feuilles. — Ampoules de 1 cm<sup>3</sup>. — 10 cgr. poudre de feuille.

Le tube de 25 comprimés : 14 francs.

La boîte de 5 ampoules : 15 francs.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**

109 à 112, boulevard de la Part-Dieu — LYON.

---

## DIGIMIALBAÏNE

### Composition :

Cent gouttes contiennent :

1/3 de mmgr. de digitaline Mialhe ;

2/3 de mmgr. d'ouabaïne Mialhe.

### Posologie :

**Cardiotonique.** — X à XV gouttes par 24 heures.

**Sédatif.** — XXX gouttes, 2 fois par 24 heures pendant 7 jours.

**Antisystolique.** — XL à L gouttes, 2 fois par 24 heures, pendant 5 jours.

**Laboratoire du Dr MIALHE**

8, rue Favart — PARIS.

## DIGITALINE CRISTALLISÉE MIALHE-PETIT

La plus fidèle  
de toutes les préparations de digitale.

Titrage chimique rigoureux.

1 cc. = 50 gouttes = 0,001 digitaline cristallisée.

Effets thérapeutiques toujours identiques à eux-mêmes.

Effets physiologiques constants et contrôlés.  
(Employée dans les hôpitaux depuis 1889).

**Dose.** — Cardiotonique : III à IV gouttes par jour. — Sédatif : V à X gouttes. — Anti-  
asystolique jusqu'à L gouttes dans les  
24 heures.

**Laboratoire du Docteur MIALHE**

8, rue Favart — PARIS.

## DIGITALINE INVAR

Produit soumis au contrôle physiologique le plus rigoureux ; donne les plus sûres garanties de pureté chimique et d'activité constante.

**Action ;** — Toni-cardiaque, régularise et stimule les contractions cardiaques, diurétique cardio-vasculaire.

**Indications.** — Insuffisance aortique, rétrécissement mitral, affections pulmonaires, œdème, hydropisie.

**Formes.** — Ampoules de 1 cc. au 1/10<sup>e</sup> de milligr.,  
boîtes de 6 et 12. Granules roses au 1/10<sup>e</sup> de milligr.  
flacons de 50. Solution au 1/1000<sup>e</sup>, flacons  
de 10 cc. et 5 cc.

Le demi-flacon . . . . .	au public . . . . .	11 fr.
L'étui de 50 granules . . . . .	— . . . . .	11 fr.
La boîte de 6 ampoules . . . . .	— . . . . .	10 fr.

**Pharmacie Centrale de France**

21, rue des Nonnains-d'Hyères — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## DIGITALINE NATIVELLE

Prix Orfila (1872) — Prix Desportes (1904).  
Décernés par l'*Académie de Médecine* de Paris.

La Digitaline Nativelle agit plus sûrement que toutes les autres préparations de Digitale. Elle est employée dans tous les Hôpitaux de Paris.

**Indications.** — Insuffisances cardiaques ; Cardiopathies valvulaires ; Arythmies ; Tachycardies ; Myocardites ; Myocardie ; Maladies infectieuses.

**Formes.** — *Granules* au 1/10 de mgr. — *Solution* au 1/1000. — *Ampoules* au 1/4 de mgr. pour inj. intramuscul. — *Ampoules* au 1/5 de mgr. pour inj. intravein.

## LABORATOIRE NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

## DIORADIN

Combinaison radio-active. — Médication antibacillaire.

**Composition.** — Sels d'iode, camphre mentholé, terpènes et Bromure de Radium.

**Présentation.** — Ampoules de 1 cc., 12 ampoules.

**Propriétés.** — Bactéricide, exaltant la phagocytose.

**Indications.** — Tuberculose. Tous états infectieux.

**Mode d'emploi et doses.** — En injections intramusculaires ou sous-cutanées, région supérieure du bras et de préférence dans la région musculaire des fesses. — On injectera aux adultes une ampoule de 1cc. et aux enfants au-dessous de 10 ans 1/2 ampoule de 1/2 cc. 30 injections quotidiennes consécutives ; continuer jusqu'à la 40<sup>e</sup>, avec une injection tous les deux jours. On peut recommencer une seconde série après un intervalle de 15 jours à 3 semaines.

La boîte de 12 ampoules : 22 francs.

## Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Téléphone : Invalides 12-63.

## DIOSÉINE PRUNIER

Comprimés Fluo-Nitrités renfermant les Glycérophosphate et Formiate Sodiques associés à la Caféine.

**Mode de présentation.** — Présentée sous forme de pastilles comprimées pesant chacune 0 gr. 25.

**Mode d'action.** — La « Dioséine Prunier » diminue la tension artérielle et régularise la circulation du sang.

**Indications.** — Artériosclérose, Dilatations veineuses, Menstruations difficiles, Troubles de la ménopause.

**Posologie.** — 2 à 4 comprimés par jour, à prendre en deux fois, matin et soir, en les accompagnant d'une gorgée de liquide.

**Dépositaires généraux :**

**CHASSAING, LE COQ et C<sup>ie</sup>**

**(Anc. Maison Chassaing-Prunier)**

**1, quai Aulaguier — ASNIÈRES (Seine).**

---

## DISMINE FAVROT

### Capsules glutinisées

**Composition.** — Capsules renfermant la totalité des principes actifs, glucosides et alcaloïdes retirés par un procédé spécial du BUCHU (*Barosma betulina*) et 0,05 de Salicylate de Phényle.

**Propriétés et indications thérapeutiques.** — *Antiseptique, décongestif, sédatif, diurétique.*

Indiquée dans toutes les affections pyogènes et douloureuses de l'appareil urinaire : Uréthrites, Prostatites, Cystites, Pyélites, Pyélo-néphrites, Coliques néphrétiques.

La Dismine Favrot n'irrite ni l'intestin, ni les reins et ne cause pas d'éruption.

**Mode d'emploi.** — Prendre dans un peu d'eau, sauf indication du médecin, 3 capsules le matin, 3 au déjeuner, 3 au coucher.

*La Dismine Favrot a été expérimentée avec succès dans les hôpitaux.*

Littérature et échantillons

**Laboratoires Docteur H. FERRÉ**

Docteur en médecine

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

Membre de la Société de Médecine de Paris

6, rue Dombasle — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## DISOLURANE "VELY"

**Composition.** — Granulé à base de :  
Pipérazine, Hétraline (Dioxybenzohexaméthylentétramine), Benz. de soude, Benz. de lithine, Citrate de lithine.

**Indications.** — Antiseptique urinaire, uricémie, urisolvant énergique, antisepsie hépato-rénale, diurétique doux, arthritisme, acidification de l'urine.

**Posologie.** — 2 à 6 cuillerées à café par 24 heures une demi-heure avant les repas, dans un demi-verre d'eau.

**Laboratoires des produits Vely.**  
132, avenue Victor-Hugo — PARIS  
Tél. : Passy 87-85.

---

## DITAGEL

Médication puissante associant les vitamines A et D dans une gelée de fruits de prise agréable.

**Dosage.** — Chaque cuillerée à café contient 2 000 unités de vitamine D et 200 unités rat de vitamine A.

**Indications.** — Les débilités, les convalescents, les retardataires. Véritable spécifique de la reprise de l'appétit.

**Posologie.** — D'une cuillerée à café par jour chez le nourrisson à trois ou quatre chez l'adulte.

Prix au public : 18 francs.

**Laboratoire français de Chimiothérapie**  
89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## DIURÉGINE

**Action.** — Diurétique puissant et anti-albuminurique. Désinfectant urinaire.

**Forme.** — Cachets.

**Formule.** — Théobromine, 0 gr. 50 ; phosphate de soude, 0 gr. 25 ; acide gallique, 0 gr. 15 ; bleu de méthylène, 0 gr. 03. pour un cachet.

**Indications.** — Toutes les albuminuries et affections rénales. Rétention d'urine et urémie.

**Mode d'emploi.** — 2 ou 3 cachets par jour.

**Prix.** — La boîte de 30 cachets : 18 francs (exempt d'impôt).

Echantillons et littérature :

**Laboratoires V. CHARRET-TOMASI**  
SAINT-JUST-SUR-LOIRE (Loire).

---

## DIURÈNE

(Extrait total d'Adonis Vernalis.)

**Formes.** — Liquide. Pilules.

**Propriétés thérapeutiques.** — Tonique, cardiaque et diurétique. Adjuvant inoffensif de la digitale, agit rapidement sans accumulation et sans augmenter la tension artérielle.

Contient tous les principes actifs de l'Adonis.

**Indications.** — Indiqué dans tous les cas d'Arythmie, d'Asystolie, d'Œdème, dans toutes les Affections du foie, Néphrites, Artério-Sclérose.

**Posologie.** — 2 à 6 cuill. à café ou 4 à 12 pilules par 24 heures.

Prix de vente au public :

Liquide : 15 francs ; pilules : 12 francs.

**Laboratoires CARTERET**  
15, rue d'Argenteuil — PARIS.

## DIURÉTIQUE GMET

**Composition.** — Extrait *total*, liquide et sans alcool de la pulpe d'oignon cru.

**Propriétés.** — Diurétique puissant et jamais contre-indiqué.

**Indications.** — Oliguries diverses : Pneumoniques, cardio-rénaux, brightiques, grippés, etc.

**Posologie.** — 1 à 4 cuillerées à soupe par jour dans un peu de liquide. Ces doses en général suffisantes peuvent être augmentées.

### Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX<sup>e</sup>).

---

## DIUROCALCINE GROS

**Association Calcium-Théobromine.**

**Indications.** — Diurétique cardio-rénal.

**Propriétés.** — Pouvoir diurétique activé. Tonique et régulateur cardiaque. Innocuité et tolérance parfaites.

**Posologie.** — 3 à 5 comprimés par jour.

Prix : 10 francs les 24 comprimés à 0 gr. 50.

## DIUROCALCINE IODURÉE.

**Indications.** — Sclérose rénale et tous troubles physiologiques survenant après la quarantaine.

**Dose.** — 3 à 5 comprimés par 24 heures.

Par comprimé : Iodure de K 0 gr. 10 associé à 0 gr. 50 de Diurocalcine.

### Laboratoires GROS

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.



## DMELCOS

Stock-vaccin anti-chancrelleux.

Emulsion de cultures de bacille de Ducrey, injectable exclusivement par la voie veineuse.

*Indications.* — **Chancrelle (chancre mou) et ses complications : Bubon, Phagédénisme, Diagnostic de l'affection par cuti-réaction, Paralysie générale (py-rétothérapie).**

*Présentation et mode d'emploi.* — Série de 6 ampoules à doses croissantes.

Une injection intra-veineuse tous les trois ou quatre jours.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## DOLOMA

Professeurs Dubard et Voisenet, de Dijon.

**Composition.** — Carbone-Fluophosphate-Magnésien-Mangano-Calcique.

**Formes.** — Poudre, granulé et comprimés.

**Propriétés.** — Antidyspeptique. Spécifique des états hyperacides, reconstituant puissant des réserves minérales.

**Indications.** — Dyspepsies. Entérites chroniques. Tous états déminéralisants et leurs conséquences : *Cancer et Tuberculose.*

**Cure antidyspeptique.** — Entre et loin des repas. *Doloma*, 2 à 3 sachets de poudre, ou 2 à 3 cuillerées à café de granulé, ou 6 à 10 comprimés.

**Cures reminéralisantes, simple ou intensive.** — Voir fiche *Ænophos.*

## DOLOMA INJECTABLE

**Composition.** — Citrophosphite Magnésien. Mangano-calcique. Ampoules de 2 cc. et de 5 cc. sans toxiques. Injections hypodermiques indolores.

**Propriétés.** — Névrosthénique idéal. Agent le plus actif de reconstitution des réserves minérales : Ph. Mg. Ca., de la cellule nerveuse.

**Indications.** — Epuisement du système nerveux, déminéralisation phospho-terreuse. Prétuberculose, Cancer, Prophylaxie de la récurrence post-opératoire. 1 à 2 ampoules de 2 cc. ou 1 ampoule de 5 cc. par jour, par période de 10 jours.

**Prix.**

La boîte de poudre <i>Doloma</i> .....	18. »
— granulé <i>Doloma</i> .....	15. »
— 10 ampoules <i>Doloma</i> ....	15. »
— 100 comprimés <i>Doloma</i> ..	16. »

**Communications :** à l'Académie de médecine, avril 1918 ; à la Société française pour l'étude du cancer juin 1919 — décembre 1920 ; Concours médical, mars 1920 ; Journal des Praticiens, mai 1920, etc., etc.

Littérature et échantillons sur demande à  
**Laboratoire général d'Études Biologiques**  
 S. A., 29, place Bossuet — DIJON.

## DOLOPHOS

**Composition.** — Anhydroinositophosphate de Chaux et de Magnésie, Chlorure de Magnésium, Carbonate de Manganèse, Carbonate de Magnésie.

**Mode d'action et avantages.** — Le *Dolophos* constitue un médicament d'ionisation magnésienne renforcée, de conservation parfaite, se présentant sous forme de *granulé sucré agréable au goût*.

**Indications thérapeutiques.** — Affections gastro-intestinales et hépatiques, déminéralisation et asthénie, *arthritisme*, tumeurs bénignes et malignes, prophylaxie du cancer, *médication post-opératoire du cancer*. Affections de la peau.

**Mode d'emploi.** — Adultes : 3 à 5 cuillerées à café par jour ; enfants : 1 à 3 cuillerées par jour.

Prix : 12 fr. 50

**Laboratoires du DOLOPHOS**

59, 61, rue de Saint-Quentin — CAUDRY (Nord).

## DOLYSINE

**Goutte, Rhumatismes, Névralgies.**

1° **Cachets.** — Acide phénylcinchoninique en cachets dosés à 0 gr. 50.

**Propriétés thérapeutiques :**

Puissant dissolvant de l'acide urique.

**Doses :**

1 à 4 gr. par 24 heures, puis doses décroissantes. Ni tolérance, ni accoutumance.

**Mode d'emploi :**

Aux repas ou en même temps qu'une boisson alcaline ou sucrée abondante. — La boîte : 9 francs.

2° **Liniment.** — Chloral-chloroforme-menthol, éther amyl-salicylique en solution étherée aromatisée, odeur agréable.

**Mode d'emploi :**

Badigeonnages suivis d'enveloppement.

Le flacon : 9 francs.

**M. ROCHEREAU**, pharmacien,  
ancien interne des hôpitaux de Paris,  
SALBRIS (Loir-et-Cher).

**DRAGÉE ADRIAN**  
**AU**  
**CHLORURE DE MAGNÉSIUM**

Préventive des Néoplasmes.

Dragées dosées à 121 milligr. de Chlorure de Magnésium Anhydre correspondant à 259 milligr. de Chlorure de Magnésium cristallisé.

**ADRIAN et Cie**

9 et 11, rue de la Perle  
PARIS (III<sup>e</sup>)

---

**DRAGÉES BENGUÉ**  
**AU MENTHOL**

**Composition.** — Menthococaïne et borate de soude ou menthol-borate de soude (sans cocaïne).

**Indications.** — Affections de la gorge, pharyngites, laryngites, angines, faiblesse de la voix, antiseptisme de la bouche.

**Mode d'emploi.** — 8 à 10 dragées par jour. Laisser fondre dans la bouche.

**Docteur BENGUÉ**  
Pharmacien

16, rue Ballu — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## **DRAGÉES DU D<sup>r</sup> GELINEAU**

Flacons de 100 et de 50 dragées.

### **Composition :**

Bromure de potassium associé à l'arsenic  
et à la Picrotoxine.

### **Indications thérapeutiques :**

Epilepsie, Affections nerveuses.

### **Posologie :**

Par dragée :

Kbr..... 1 gramme.

Arsenic..... 1 milligr.

Picrotoxine..... 1/2 milligr.

De 2 à 6 dragées par jour au milieu des repas.  
(Doses supplémentaires en cas de besoin.)

*Littérature et échantillons sur demande.*

**Laboratoire J. MOUSNIER-DELERME**

9, bd Carnot — BOURG-LA-REINE (Seine).

## **DRAGÉES ELKIN**

## **GRANULES ELKIN**

## **BILE**

## **SOUFRE**

## **PANCRÉATINE**

Sans aucun drastique

**(Voir ELKIN**

page 333.)

## DRAGÉES FERRO-ERGOTÉES MANNET

### Composition :

Ergot de Seigle .....	5 centigr.
Fer .....	10 —

Par dragée.

**Indications.** — Anémie, Leucorrhée, Règles irrégulières, Métrorragies consécutives à l'Avortement, à l'Accouchement et à la Ménopause. Ménorragies de la puberté. Incontinence d'urine.

**Posologie.** — 4 à 8 dragées par jour avant les repas.

**Laboratoire MANNET**  
**LOUDUN (Vienne)**

## DRAGÉES GMET

**Friandise autant que médicament.**

**Composition.** — Kola Glycerophosphate de chaux.

**Propriétés.** — Toniques stimulantes reconstituantes. Très agréables au goût. Se prennent n'importe où et à n'importe quel moment de la journée.

**Indications.** — Faiblesse musculaire. Adynamie. Surmenage. Fatigue. Dépression nerveuse.

**Posologie.** — 1 à 4 dragées par jour pour les adultes. 1/2 ou 1/4 de dose pour les enfants au-dessus de 7 ans.

Ne pas donner de dragées le soir après le dîner à moins que l'on ne doive veiller dans la nuit.

**Laboratoire GMET**  
27, faubourg Montmartre — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## DRAGÉES HECQUET

(Sesqui-Bromure de Fer).

**Propriétés.** — Associent les qualités anti-spasmodiques du brome et l'action hématopoiétique du fer sous la forme d'un sel très assimilable ne produisant jamais de troubles digestifs ou intestinaux. Le seul ferrugineux qui réponde à cette indication :

Calmer sans affaiblir,  
Reconstituer sans exciter.

**Indications.** — Chloro-Anémie, Nervosisme.

**Dose.** — 4 à 6 dragées par jour.

(Se fait également sous forme de « Sirop ».)

Prix : 12 fr. 50.

**Laboratoire MONTAGU**

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

## DRAGÉES LEBRUN TONI-CARDIAQUES

**Composition.**

Strophantus .....	0,01	pour une dragée.	
Spartéine.....	0,01	—	—
Caféine.....	0,06	—	—
Ext. de Scille .....	0,04	—	—

**Propriétés thérapeutiques.** — Cardiotonique, sédatif de la dyspnée cardiaque. Régulatrices et renforçatrices, elles tonifient le myocarde et activent la diurèse.

**Indications.** — Insuffisance cardiaque, Asystolie, Maladies mitrales, Œdèmes cardiaques, Myocardites.

**Posologie.** — 6 dragées par jour, en 2 prises, soit au début, soit entre les repas.

Le flacon de 50 dragées : 12 francs.

**Laboratoire LEBRUN**

155, boulevard de Magenta — PARIS (IX<sup>e</sup>).

Téléphone : Trudaine 50-34.

## DRAGÉES LUMEVAL

Sédatives, antispasmodiques.

**Composition.** — Pilules glutinisées renfermant :

Extrait stab. de Valériane.....	} 0 gr. 03	ââ
— — Passiflore.....		
— — Crataegus .....		
Butylethylmalonylurée (Syn. Soneryl) ...		

**Indications.** — Troubles d'origine nerveuse, Insomnies, Agitation, Anxiété, Syndromes Neurasthéniques en général, Palpitations et Troubles cardiaques spasmodiques.

**Posologie.** — Jusqu'à 7 dragées par jour ; dose moyenne, 2 à 4 par jour. Pas d'accumulation ni d'accoutumance.

Prix : 15 francs le flacon de 42 pilules.

**Laboratoires DESCOURAUX**

52, boulevard du Temple — PARIS.

**Descouraux et Fils, Pharmaciens.**

Docteur en Pharmacie.

## DRAGÉES NÉVROSTHÉNIQUES « YSE »

à base de Phosphure de Zinc (2 milligr. par dragée), Nux vomica-Kola-Guarana.

**Indications et propriétés thérapeutiques.**

— Spécifique de la Neurasthénie, *du surmenage intellectuel, des dépressions physique, cérébrale* et des états adynamiques et asthéniques.

**Mode d'emploi** (sauf avis du médecin). —

Six dragées par jour : deux avant chacun des trois principaux repas.

Les dragées névrosthéniques « Yse » *se font sans sucre* pour les diabétiques. *Formule B.*

Prix : 13 fr.

**Laboratoire « YSE »**

**H. Chatelut, pharmacien**

65, rue Louis-Blanc — PARIS (X<sup>e</sup>).



## DRYCO

**Lait sec antirachitique.**

Activé par les rayons ultra-violets.

**Analyse approximative :**

Matières grasses.....	12 p. 100.
Sucre de lait.....	46 —
Matières azotées .....	32 —
Sels .....	7 —
Eau .....	3 —

**Indications.** — Lait rigoureusement pur, partiellement écrémé.

*Pour nourrissons :* digestibilité et assimilation parfaites, supprime vomissements et troubles intestinaux.

*Pour adultes :* régime de suralimentation, affections du foie et de l'estomac.

**Doses.** — Dilution normale : une cuillerée à soupe arasée de poudre non tassée dans 50 centilitres d'eau bouillie chaude.

A modifier suivant l'âge du nourrisson et selon les prescriptions médicales.

Sucre comme pour le lait ordinaire.

*Préparer sans cuisson.*

**Société Française du « DRYCO »**

3, rue Saint-Roch, — Paris (1<sup>er</sup>).

## DYSPEPTINE HEPP

Suc Gastrique physiologique pur,  
extrait de porc vivant.

Procédé du D<sup>r</sup> HEPP

Ancien Interne en Chirurgie des Hôpitaux de Paris.

**Indications.** — Hypopepsie. Dilatation, Gastrites chroniques, Dyspepsie nerveuse, Anorexie des tuberculeux et convalescents, Diarrhées, Entérites tropicales, Gastro-entérites et Dyspepsies des nourrissons.

**Doses.** — *Adultes :* 1 à 2 cuillerées à soupe un peu avant ou pendant le repas.

*Enfants :* 1/2 cuillerée à café *avant* chaque tétée ou prise d'aliments.

Adresser toutes demandes :

**Laboratoire**

**de Physiologie du Puits d'ANGLE**

Le Puits d'Angle — LE CHESNAY (S.-et-O.).

*Représentants pour la Belgique :*

**M. MICHAUD**

23, rue Plantin — BRUXELLES.

## DYSTHÈNE

Médication tonique et régulatrice, forme gouttes.  
Complexe phosphorique et magnésien.

**Indications.** — Syndromes d'hypotonie, Dépressions, Asthénie, Fatigue, Faiblesse générale, Diminution de l'activité physique et cérébrale, Inaptitude au travail.

**Emploi et Doses.** — *Adultes* : XL gouttes au total par jour, en deux fois, aux repas, dans un peu d'eau.

*Vieillards* : XXX gouttes au total par jour.

*Enfants* : De 7 à 12 ans : VIII gouttes par jour.

De 12 à 16 ans : XII — —

De 16 à 18 ans : XX — —

Prix : 18 francs.

Echantillon grandeur normale sur demande.

**Laboratoire d'Hygiène et de Thérapeutique  
appliquées**

47, rue de Paris — ASNIÈRES (Seine). ,

---

## ECZEDA

**Ichtyosulfosalicylée.**

Pommade polyréductrice, ne déterminant pas d'irritations. Excipient spécial doué d'un grand pouvoir absorbant et épidermisant.

**Propriétés thérapeutiques.** — Dermatoses suintantes et aiguës et plus spécialement Dermatoses prurigineuses, qui sont améliorées presque immédiatement.

**Indications.** — Eczémas sous leur différentes formes, Dermatoses des Nourrissons, Prurits, Érythèmes, Dartres, Brûlures, Intertrigo.

**Laboratoires PORCHER**

35, rue des Blancs-Manteaux—PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## ECZOSEC

**Pâte adhésive sans corps gras.**

**Propriétés.** — Étendue sur l'épiderme sèche en quelques instants, constituant ainsi un pansement très adhésif. Ne tâche pas, ne coule pas et s'enlève complètement à l'eau.

*Eczosec* n'est pas un vernis, étendue en couche mince, elle permet la respiration.

**Indications.** — Dermatoses sèches, Eczémas, Prurits, Dartres, Érythèmes.

**Laboratoires PORCHER**

35, rue des Blancs-Manteaux—PARIS (IV<sup>e</sup>).

## EDISTOL

**Composition.** — Acide borique, tartrique, citrique; menthol, huile de Pinus sylv., gaiacol, terpinéol, pinéol, cinéol, Styrax benz.

**Indications.** — Toutes affections et antiseptie des muqueuses rhino-bucco-pharyngo-laryngées.

**Mode d'emploi.** — *Gargarismes* et bains de gorge: 1 cuillerée à café par verre d'eau bouillie chaude.

*Fumigations* ; 1 à 2 cuillerées à café par verre d'eau bouillante.

*Vaporisations* ; 1 cuillerée à café dans le verre d'eau d'un pulvérisateur à vapeur.

*Bain nasal* ; 1/2 cuillerée à café dans un verre d'eau bouillie tiède, au moyen de la pipette nasale.

Echantillon sur demande.

Prix : G. M., 13 fr. ; P. M., 8 fr. 75  
(exempt d'impôt).

Laboratoire R. O. L.

(Spécialités oto-rhino-laryngologiques).

**H. DUFOUR, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,**  
Anc. interne des hôp. de Paris,  
40, rue des Carmes — ORLEANS (Loiret).

## EKTOGAN BOCQUILLON

Poudre composée à base de  $\text{ZnO}^2$  traité, sans odeur ni couleur, se prêtant à toutes les formes de pansements.

Sa formule est :  $2(\text{Zn}^2\text{C}^{12}\text{O}^{25}\text{G}^{22})$ .

**Propriété.** — Dégage d'une façon lente et continue de l'oxygène à l'état naissant dès qu'on le met en contact avec un ferment ou un acide organique quelconque (sang, pus, transpiration, moiteur, salive, etc.).

**Indications.** — En chirurgie, Gynécologie. Obstétrique, Dermatologie, Brûlures, Crevasses.

**Formes.** — Poudre, Pommade, Pâte, Emplâtre, Gazes. *Méchettes* pour Nez et pour Oreilles, *Ovules* et *Plura-bandes* pour gynécologie.

Laboratoire des  
**PEROXYDES MÉDICINAUX**  
12-18, rue Lamartine — PARIS.

## ELASTOPLASTE

Emplâtre *élastique* adhésif, sous les *formes* suivantes :

**Elastoplaste** pour plaies, avec compresse au dermatol. Dim. :  $4 \times 4$  —  $6 \times 6$  —  $8 \times 8$  cm.

**Elastoplaste** pour doigt, avec compresse au dermatol.

**Elastofuron**, pour furoncles.

**Elastoplaste** en bandes pour plaies variqueuses, ajourées ou pleines. Dim. : 2 m.  $1/2 \times 6$  cm. jusqu'à 15 cm.

**Elastoplaste** en bandes ajourées ou pleines, 1 m  $\times$  3 à 10 cm.

**Elastocapsil**, emplâtre américain, perforé, élastique.

**Laboratoires FISCH & Cie**

4, rue d'Illzach, MULHOUSE — PARIS.

Dépôt : 49, rue de Paradis — PARIS (X<sup>e</sup>).

## ÉLATINE BOUIN

Dérivé du Sapin de Norvège (Gemme et Goudron)

Liquide limpide et de conservation indéfinie.

**Dose et mode d'emploi.** — Se prend mélangée à du lait chaud ou tisane pectorale ou diurétique, à la dose de 2 cuil. à soupe par tasse, plusieurs fois par jour. 1 à 2 cuil. à café pour les enfants.

**A titre préventif.** — En temps d'épidémie, et chez les sujets prédisposés aux inflammations trachéo-bronchiques, l'*Elatine* peut être prise additionnée à la boisson habituelle au repas, à raison d'une cuil. à dessert par verre de liquide.

**Indications thérapeutiques.** — Affections des bronches (toux rebelles, catarrhes, emphysème, asthme) ; de la vessie et des reins (cystites, pyérites, gravelle).

**Laboratoire FAGARD**

44, rue d'Aguesseau — BOULOGNE-SUR-SEINE.  
Pharmacie Derneville, 66, boulevard de Waterloo,  
BRUXELLES.

## ELBON CIBA

Cinnamoyl-*p*-oxyphénylurée.

**Antipyrétique** doux, d'action durable, pour le traitement des pyrexies tuberculeuses et des catarrhes infectieux des voies respiratoires. Se décompose avec mise en liberté d'acide benzoïque qui réalise la benzoïlisation continue de l'arbre broncho-pulmonaire.

**Indications.** — Tuberculose pulmonaire fébrile. Catarrhes pulmonaires et toutes affections bronchiques fébriles.

**Doses.** — 2 à 4 comprimés par jour. Commencer par la dose forte pour l'abaisser ensuite progressivement à mesure que la courbe thermique descend.

Le tube de 20 comprimés : 18 francs.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND** \  
109-113, boulevard de la Part-Dieu—LYON.

---

## ÉLECTRARGOL

**Composition.** — Argent colloïdal électrique à petits grains, stable, d'une pureté, d'une activité supérieures à celles de l'argent colloïdal chimique.

**Applications.** — L'Électrargol est employé dans toutes les maladies infectieuses sans spécificité pour l'agent pathogène.

**Formes.** — Ampoules de 1, 2, 5, 10, et 25 cc.; flacons de 50, 100 et 250 cc.; Collyres d'Électrargol et d'Électrargol radio-actif; Pommade, Ovules.

**Laboratoires CLIN**  
PARIS

## ÉLECTROCUPROL

**Composition.** — Oxyde de cuivre colloïdal à petits grains, obtenu par pulvérisation électrique. L'Electrocuprol se présente sous l'aspect d'un liquide brun clair, dichroïque, possédant toutes les propriétés générales des métaux colloïdaux, savoir : pouvoir fermentaire, catalytique, etc.

**Formes.** — Ampoules de 5 et 10 cc.

**Applications thérapeutiques.** — L'Electrocuprol est employé dans le cancer, dans la tuberculose et dans les maladies infectieuses.

**Dose et mode d'administration.** — L'Electrocuprol est délivré en ampoules de 5 centimètres cubes et de 10 centimètres cubes. L'isotonie de la solution est assurée au moment même de l'usage. On l'injecte dans les muscles, à la dose de 5 ou 10 centimètres cubes tous les jours ou tous les deux jours, dans les veines à la dose quotidienne de 5 à 20 centimètres cubes selon l'urgence, la gravité de l'affection et la résistance du malade.

Laboratoires CLIN — PARIS

---

## ÉLECTROMARTIOL

**Composition.** — Fer colloïdal à grains très fins et uniformes obtenu par voie électrique. Se présente sous l'aspect d'un liquide brun ambré, légèrement dichroïque, titrant 1 gr. de fer p. 1000.

**Formes.** — Boîtes de 12 ampoules de 2cm<sup>3</sup>, 6 ampoules de 5 cm<sup>3</sup>.

**Applications thérapeutiques et posologie.** — Permet de réaliser une médication ferrugineuse, hypodermique ou intraveineuse modèle. Unit aux propriétés spécifiques du fer les propriétés générales des métaux colloïdaux. Injection complètement indolore et ne déterminant jamais de nodosité. Relève rapidement le chiffre des globules rouges et la valeur globulaire ; améliore la nutrition générale. Formellement indiqué dans tous les cas de syndrome anémique ; anémie essentielle, chlorose (injection quotidienne de 2 centimètres cubes), anémies post-hémorragiques, anémies toxiques et anémies infectieuses (5 à 10 centimètres cubes en injection intraveineuse tous les jours ou tous les deux ours).

Laboratoires CLIN — PARIS.

## ÉLECTROSÉLÉNIUM

**Composition.** — Sélénium colloïdal à grains ultra-microscopiques extrêmement fins et uniformes, obtenu par la voie électrique. Se présente sous l'aspect d'un liquide rouge-corail, transparent, fortement trouble par réflexion.

**Formes.** — Ampoules de 5 cc.

**Applications thérapeutiques.** — Affections cancéreuses. L'Electrosélénium a été substitué au sélénium simple à cause de sa très faible toxicité, liée à une activité remarquable. Les travaux de Cade et Girard, Girard, Bougeant et Galliot, Blumenthal, Trinkler, Szecsi, etc., ont montré que, sous l'action des injections d'Electro-sélénium chez les cancéreux, on observait régulièrement la diminution, puis la disparition des douleurs, le relèvement du poids, l'amélioration de l'état général, le ramollissement des tumeurs ganglionnaires, la régression des lésions néoplasiques, et parfois leur cicatrisation, ou tout au moins la suppression des sécrétions fétides et des hémorragies.

**Posologie et mode d'administration.** — L'Electrosélénium s'administre à la dose moyenne de 5 cc. à la fois tous les deux jours ou tous les jours suivant les cas. On peut doubler cette dose. Pour retirer du traitement tout le bénéfice possible, il faut administrer le Sélénium, de préférence par voie intra-veineuse.

**Laboratoires CLIN**  
PARIS

## ÉLÉODERMINE

Traitement des différentes dermatoses et de certaines maladies des muqueuses. Grâce à la nature de ses composants et à leur dosage scientifiquement réalisé, ELEODERMINE est toujours employée avec succès.

**Indications.** — Maladies de la peau : Eczéma, Impétigo, Acné, Psoriasis, Engélures, Lupus, Sycosis, Furoncles, Anthrax. Plaies infectées ou atones : Fistules, Ostéite, Brûlures graves.

Affections du système circulatoire : Ulcères variqueux.

Métrites, Rhinites, Ozène.

Prix :

En France : 11 fr. 20. — A l'Etranger : 20 fr.

**Laboratoires de l'ADOUR**  
38, rue Soult — TARDES (H.-P.).



## ELGINE JULIEN

Comprimés.

### Composition :

Collargol argent colloïdal ....	0,05 cent.
Benzoate de soude .....	0,40 —
Urotropine française.....	0,20 —
En comprimés se dissociant rapidement.	

**Indications.** — Maladies infectieuses aiguës, Intoxications, Voies urinaires (urétrites, cystites, pyélites, prostatites), Diathèse urique (rhumatismes, goutte, lithiase).

**Posologie.** — *Adultes* : 3 à 6 comprimés par jour.  
*Enfants* : 1/2 dose. Avaler avec une infusion ou dissoudre dans de l'eau.

Prix : 12 fr. 50. — Boîte gratuite sur demande.

**Louis JULIEN**

Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris  
105, rue de Rennes — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## ÉLIXIR BONJEAN

à base d'éther et de plantes aromatiques.

**Tonique** puissant des voies digestives.

INDIGESTIONS

DIGESTIONS DIFFICILES

**Diarrhée, Cholérine, Vomissements nerveux,**  
**Choléra des enfants.**

**INCOMPARABLE et MERVEILLEUX**  
**dans les cas de GRIPPE INTESTINALE**

Le grand flacon : 16 francs.

Le 1/2 flacon : 8 fr. 50.

**Docteurs FAURE et DUSSUEL**  
AIX-LES-BAINS (Savoie).

## ÉLIXIR DÉRET

Iodure double de Tanin et de Mercure  
Solution vineuse titrée d'Iodure de Tanin et de Mercure  
en combinaison stable. Teneur en iode 35 milligr.  
et en mercure 5 milligr. par cuillerée à soupe. Dépouvé  
d'arrière-goût métallique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antisypilitique. 1° Absence d'accidents d'hydrargyrisme, grâce à l'action spéciale du tannin ; 2° innocuité sur les voies digestives (jamais de diarrhée). Des faits cliniques montrent l'Elixir Déret souvent toléré par des malades qui ne pouvaient antérieurement supporter un autre traitement mercuriel.

**Doses.** — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe ; *Enfants* : 1/2 à 1 cuillerée à café ; à prendre 2 fois par jour dans un verre gradué pour éviter le contact du médicament avec le métal de la cuillère. Ces doses peuvent être doublées.

**Nota.** — Aucune indication de la nature mercurielle de la préparation n'est faite sur l'étiquette ni sur l'enveloppe. L'Elixir Déret peut donc être pris aussi discrètement qu'on le désire.

Laboratoires CLIN — PARIS.

## ÉLIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

**Composition.** — Hamamelis virg., Capsicum bras., Æsculus hip.

**Indications.** — Dilatation des veines, Varices, Varicocèles, Hémorroïdes, Phlébites, Accidents congestifs de la puberté et de la ménopause.

**Mode d'emploi.** — Un petit verre à liqueur après chaque repas.

**Produits NYRDAHL**

12, rue de la République  
PUTEAUX (Seine).

## ÉLIXIR DUCHAMP

**Composition.** — Extrait d'eaux de Foie de Morué, Quinquina, Arrhénal et Phosphates. Cacao vanillé.

**Propriétés thérapeutiques.** — D'un goût exquis, apéritif puissant, tonique, reconstituant et hématopoiétique, l'*Elixir Duchamp* remplace avantageusement l'huile de foie de morue, les amers et les fortifiants.

**Indications.** — Tous états de faiblesse physique ou intellectuelle. Manque d'appétit, Grippe, Tuberculose, Rachitisme, Convalescence. Lymphatisme, Scrofule, etc.

**Dose.** — 1 verre à liqueur (enfants, 1 cuillère à soupe) un quart d'heure avant les repas. Pur ou avec de l'eau.

Prix : 20 fr. le flacon de 350 cc.

Laboratoires

C<sup>te</sup> RENÉ de GRAUWE, ☼, ☽, ✠,

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,

16, rue de Rocroy, PARIS — Usine à Saint-Denis.

## ÉLIXIR DUCRO

Ecorces d'oranges amères. Hypophosphite : 10 cgr. par 15 gr. d'élixir.

Tonique *antianorexique* très agréable : asthénie, convalescences, états consomptifs, sénilité, grossesse : 1 cuil. à soupe ou 1 verre à liq., selon l'âge, étendu d'un peu d'eau, avant ou entre les repas.

*Eupeptique*, euphorisant : mêmes doses, pur, après les repas.

Action *d'épargne* : pneumonie, maladies infectieuses adynamiques : 1 cuil. à café ou à soupe, selon l'âge, chaque 2 heures.

DURIEZ

20, place des Vosges — PARIS.

## ÉLIXIR DU D<sup>r</sup> MIALHE

**Préparation.** — Suc gastrique complet.  
— Un procédé particulier lui conserve toute son activité plusieurs années.  
(*Journal de Pharmacie et de Chimie.*)

**Indications thérapeutiques.** — Dans tous les cas où le suc gastrique fait défaut : Dyspepsies ; douleurs nerveuses ; digestions lentes et difficiles ; vomissements incoercibles de la grossesse.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à bouche immédiatement après le repas ; demi-dose pour les enfants.

**Laboratoire du D<sup>r</sup> MIALHE**  
8, rue Favart — PARIS.

## ÉLIXIR DUSSAUD

Véritable suc digestif.  
*Aliment complet de surassimilation.*

**Composition.** — Pepsine, diastase, pancréatine, en milieu alcalin de lactates et de sels de Vichy.

**Propriétés.** — Transforme les albuminoïdes en peptones assimilables, les matières amylacées en glucoses ; émulsionne et saponifie les corps gras.

**Indications.** — *Eupeptique puissant*, réveille l'appétit et facilite la digestion. *Régulateur parfait* des fonctions intestinales, combat la constipation et la diarrhée, même, chez les enfants. *Agent d'une assimilation intégrale*, se prescrit dans tous les états de carence : anémie, convalescences, athrepsie infantile, hypogalactie.

**Mode d'emploi.** — 1° *Premier âge* : 1, 2 ou 3 cuillerées à café (dans un peu d'eau bouillie sucrée). — 2° *Enfants* : 2 ou 3 demi-verres à liqueur. — 3° *Adultes* : 4 à 5 verres à liqueur.

Par jour et après le repas ou les tétées.

Prix du flacon : 15 francs.

**Laboratoire de l'ÉLIXIR DUSSAUD**  
52, rue de Rome — MARSEILLE.

## ELIXIR EUPEPTIQUE TISY

**Composition.** — Pancréatine, diastase et pepsine additionnées de sécrétine et d'entérokinase.

**Avantages.** — Digère les corps gras, amylacés et protéiques.

Contient à l'état de pureté tous les ferments de l'estomac et de l'intestin. De goût très agréable. Se conserve pendant de longues années.

**Indications thérapeutiques.** — Embarras gastriques, dyspepsie, gastro-entéralgie, douleurs et dilatations d'estomac, manque d'appétit, digestions difficiles, diarrhée, atrepsie, vomissements.

**Posologie.** — Un à deux verres à liqueur au début, ou à la fin de chaque repas.

Prix : 18 francs.

**Laboratoires VAUDIN et GUILLAUMIN**

Docteurs en Pharmacie

12, rue Charles-V — PARIS.

---

## ÉLIXIR FERRO-ERGOTÉ MANNET

**Composition :**

Ergot de Seigle ..... 5 centigr.

Fer ..... 10 centigr.

Par cuillerée à café.

**Indications.** — Anémie, Leucorrhée, Règles irrégulières, Métrorragies consécutives à l'Avortement, à l'Accouchement et et à la Ménopause, Ménorragies de la puberté. Incontinence d'urine.

**Posologie.** — 4 à 8 cuillerées à café par jour avant les repas.

**Laboratoires MANNET**

LOUDUN (Vienne).

## ELIXIR GREZ

Chlorhydropepsique.

Spécialement préparé pour combattre l'*insuffisance gastrique* sous toutes ses formes.

A base de chlorhydropepsine unie aux amers digestifs. Son action doit être recherchée dans tous les cas où les fonctions sécrétrices de l'estomac sont déficientes, depuis la simple dyspepsie due à une mastication insuffisante ou trop rapide (mauvaise dentition, repas précipités, etc.) jusqu'aux plus graves troubles sécrétoires.

Joignant l'utile à l'agréable.

est employé dans le monde entier et universellement apprécié par le corps médical. Le nombre des Docteurs qui emploient l'Elixir *chlorhydropepsique* pour leur usage personnel augmente de jour en jour. C'est pour nous la meilleure preuve de la qualité de notre produit et de son efficacité.

**Posologie.** — Un verre à liqueur après chaque repas.  
Prix : 18 francs.

Dépôt général :

**Laboratoire de l'ELIXIR GREZ**  
49, rue de Maubeuge — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## ÉLIXIR HYMEL

Traitement mercuriel d'entretien dissimulé.

**Titrage.** — Par cuillerée à soupe : 0,007 Bi-iodure de mercure. — 0,075 Iodure de potassium.

**Originalité.** — Excipient spécial à base de Miel, lui procurant un goût très agréable, et une parfaite tolérance pour l'estomac.

**Présentation dissimulée.** — Aucune indication de maladie, ni de nature de médicament.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 cuillerées à soupe au début ou au milieu des repas.

*Enfants* de 9 à 14 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.

— de 5 à 8 — 2 à 3 cuillerées à café par jour.

— de 2 à 4 — 1 à 2 — — —

**A prescrire.** — Par périodes de 20 jours, intercalées de préférence entre deux périodes de 20 jours de suppositoires Hymel.

**Indications.** — Traitement d'entretien de la Syphilis, Imprégnation mercurielle (entre les séries de piqûres). Hérédo-syphilis. Dermatoses.

**Laboratoires A. DUTEIL**  
90, avenue de Saint-Ouen, PARIS.

## ELIXIR IODÉPURATIF PÉPIN

Médication mercurielle active préparée sous une forme à la fois tonique et agréable permettant de remédier en grande partie aux effets débilissants de la médication mercurielle.

**Composition.** — Bi-iodure de mercure solubilisé par l'iodure de sodium, Teinture de cacao, Teinture de vanille.

**Indications.** — Traitement d'usure. Traitement de l'hérédosyphilis chez les enfants et les adolescents. Le traitement par excellence pour la femme enceinte.

Médication infantile. — Sirop iodépuratif PÉPIN, parfumé aux sucres de fruits (mêmes caractéristiques).

### Mode d'emploi :

*Adultes :* Une cuiller à soupe, soit 1 cgr. de bi-iodure.

*Adolescents :* Une cuiller à entremets, soit 1/2 cgr. de bi-iodure.

*Enfants :* Une cuiller à café, soit 1/4 cgr. de bi-iodure.

**Administration.** — Toujours au début du repas (condition la plus favorable à une tolérance parfaite).

Prix : 18 francs.

**Nota.** — Le conditionnement de ce produit ne porte aucune indication concernant sa composition ou son emploi thérapeutique.

### Pharmacie ROGÉ-CAVAILLES.

M. LACHARTRE, Docteur en Pharmacie, Successeur,  
116, boulevard Haussmann — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## ELIXIR SPARK

**Composition.** — Extrait fluide composé d'espèces amères stomachiques et digestives. Au complexe végétal obtenu par des lixiviations successives il est ajouté une quantité de glycérine et d'alcool strictement suffisante pour assurer une stabilité et une conservation parfaites ; le produit final, d'une amertume aromatique, possède une saveur agréable et franchement apéritive.

**Propriétés thérapeutiques.** — *Affections du foie :* gastro-hépatite, insuffisance biliaire, congestion du foie, lithiase biliaire.

*Affections de l'estomac :* dyspepsies, stases gastriques, dilatations stomacales ; atonie des voies digestives ;

*Affections de l'intestin :* entérites, ballonnement abdominal ; constipation et ses conséquences.

Pas de contre-indications.

**Doses.** — Une cuillerée à café, dans un peu d'eau pure ou sucrée, avant ou après les deux principaux repas.

ECHANTILLONS et LITTÉRATURE :

LABORATOIRES NARODETZKI

19, boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS.

## ELIXIR SPES DU D<sup>r</sup> GUIRAUD

Ex-pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux.

**Composition de l'Elixir.** — Iodure double d'Arsenic et de Mercure.  
Préparation moins alcoolique qu'un vin et posologiquement assimilable au *Sirope de Gibert*.

Une cuillerée à soupe contient exactement :

I.....	0,008	} correspondant à {	0,01 Biiodure Hg.- 0,005 Iodure As.
Hg.....	0,006		
As.....	0,001		

Très agréable à prendre.

**Indications.** — *Syphilis et Hérédo-syphilis*. Bien toléré, son emploi n'occasionne ni hydrargyrisme, ni stomatite, ni érythème, ni diarrhée.

**Doses :** {  
De 1 à 3 ans : 2 demi-cuillerées à café par jour.  
De 3 à 7 ans : 2 cuillerées à café par jour.  
De 7 à 15 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.  
De 15 à 20 ans : 3 cuillerées à dessert par jour.  
Adultes : 2 à 4 cuillerées à potage par jour.

Apprendre au moment des repas, pur ou dans un peu d'eau. Se servir du verre gradué qui accompagne chaque flacon.

**Observation importante.** — Présenté comme tonique et modificateur, l'Elixir Spes ne contient aucune indication permettant de soupçonner la présence du Mercure. Susceptible de rendre les plus grands services en Gynécologie, Ophtalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie.

Prix : 18 francs.

**Laboratoire SPES GUIRAUD**

10, impasse Milord — PARIS (XVIII<sup>e</sup>) — Tél. Marcadet 37-98.

## ELIXIR THIOGAÏACOLÉ ARQUEVAUX

**Composition.** — Thiogaïacol crist. pur, 0,15 ; Extrait Thébaïque, 0,0025 ; Codéine, 0,01 ; Bromoforme, solut. offic., 0,20 ; Teint. Rac. Aconit et Teint. Belladone titre int., àà XI gouttes = 0,20 ; Benz. Sodique et Drosora, àà 0,25 ; E. d. Laur.-Cerise t. int., 1 gr. ; véhicule : Elixir de Polygala au Garus, Q. S. pour 15 cc.

**Forme.** — Liquide.

**Indications.** — Antiseptique eupnéique cicatrisant des voies respiratoires. Enrouement. Bronchite et Toux chroniques. Tuberculose, Asthme. Catarrhes.

**Posologie.** — Adultes : selon les cas, 3 à 5 cuillerées à dessert ou à soupe par jour, entre les repas, pures, suivies d'une tasse de tisane très chaude.

Prix du flacon de 210 cc. : 15 francs sans impôt.

**Laboratoires ARQUEVAUX, &**

Pharmacien à Etampes (S.-et-O.).

**Dépôts :** O. C. P. et ses succursales. — C. N. P. F. Thiriet et C<sup>ie</sup> à Nancy. Établissements Silbert et Ribert à Marseille, Nice, Toulouse.



## **ELKIN (Dragées)**

## **ELKIN (Granules)**

**Digestives — Cholagogues — Laxatives.**  
(Sans aucun drastique.)

### **Composition.**

#### **Adultes.**

Bile.....	} ââ 0 gr. 05.
Soufre .....	
Pancréatine.....	

Par pilule dragéifiée.

#### **Enfants.**

Bile.....	} ââ 0 gr. 01.
Soufre .....	
Pancréatine.....	

Par granule.

### **Indications thérapeutiques :**

Digestions incomplètes. Somnolence. Ballonnement. Douleurs post-prandiales. Pesanteurs après les repas. Insuffisance hépatobiliaire. Insuffisance pancréatique. Dermatoses hémoclasiques. Rougeurs de la face. Urticaire. Eczéma. Acné.

### **Présentation :**

#### **Deux formes pharmaceutiques :**

##### **Pour les adultes : forme Dragées.**

Une ou deux pendant ou après les deux principaux repas (avalé sans croquer).

##### **Pour les enfants : forme Granules.**

Deux à quatre par repas (à prendre dans un dessert, compote, confiture, etc.).

**Remarque.** — Par procédé spécial de fabrication, les Dragées et Granules Elkin sont inaltérables à l'air et solubles dans l'estomac.

**Laboratoires DEPRUNEAUX**  
18, rue de Beaune — PARIS (VII<sup>e</sup>).

## ELZÉVIR-DENTITION

Collutoire spécifique et puissant de la première dentition.

**Composition.** — 1° Borate de soude (antiseptique et astringent), drosera et safran (sédatifs locaux);

2° *Hamamelis virginica*. Base de l'Elzévir-dentition (1/5 du poids total). A cette dose l'*Hamamelis Virginica* est un *vaso-constricteur puissant* (muqueuse congestionnée) et un topique remarquable (douleurs de la poussée dentaire).

**Mode d'emploi.** — En frictions douces avec la pulpe du doigt sur les gencives douloureuses. Adopté dans les services d'enfants des hôpitaux. Littérature et échantillons au Corps médical et à M<sup>mes</sup> les sages-femmes.

**Laboratoire H. SALLE**  
4, rue Elzévir — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## **EMERSON'S BROMO-SELTZER**

(The Emerson drug Company, Baltimore).

### **Indications :**

Céphalalgies, Névralgies, Action rapide.

### **Composition :**

Citrate de soude, Acétanilide, Bromure de Sodium, Caféine.

### **Posologie :**

Une cuillerée à café dans un verre d'eau, et boire de préférence quand le liquide est en effervescence.

Prix : 10 fr., 20 fr. et 40 fr.

Littérature et échantillons au Dépôt général :

## **PHARMACIE ANGLAISE DES CHAMPS-ÉLYSÉES**

62, avenue des Champs-Élysées,  
PARIS (VIII<sup>e</sup>)

Téléph. : Élysées 22-52.

## EMGÉ LUMIÈRE

**Prophylaxie et traitement de tous les troubles liés à un état d'instabilité humorale.**

**Constitution.** — Thiosulfate magnésien ( $S^2O^3Mg$ ).

**Propriétés.** — L'Emgé Lumière tonifie le système nerveux central et le système neuro-végétatif ; il est un antiseptique pulmonaire et bronchique.

Dès son contact avec le suc gastrique, il se décompose en : chlorure de magnésium, sulfuryle et soufre naissant.

L'Emgé Lumière, sous forme de comprimés, est un régulateur des fonctions digestives. Il combat les diarrhées du type lienterie post-prandiale, toutes les constipations, les toxémies d'origine intestinale ; l'anaphylaxie digestive et ses manifestations.

L'Emgé Lumière, sous forme de solution injectable, est aussi un stimulant des fonctions endo et exocriniennes du foie et surtout un médicament antichoc (tous phénomènes anaphylactiques lui sont justiciables).

**Doses.** — Ampoules : d'une injection intramusculaire quotidienne à trois et quatre par semaine.

Comprimés : de 2 à 4 par jour, les avaler au milieu des repas.

**Formuler :** Boîte de comprimés d'Emgé Lumière.

— Bouteille de 3 ampoules d'Emgé Lumière.

**LABORATOIRES LUMIÈRE**

23, Cours de la Liberté — LYON.

## EMPLATRES ROGE-CAVAILLÈS

**Caoutchoutés, Adhésifs** (formule de l'hôpital St-Louis).

**Oxyde de zinc :** Eczémas torpides, Lichénisation.

**De Vidal :** Furoncles, Impétigo, Folliculites.

**Huile de cade :** Psoriasis, Dermatoses squameuses.

Le tube : 10 francs.

**Colopastre.** — Bandes adhésives à l'Oxyde de zinc pour pansements : toutes dimensions.

**Gaze anadhère.** — Gaze grasse stérilisée, non adhérente aux plaies.

La boîte de 25 compresses : 18 fr. 50.

**Laboratoire du Dr R. CAVAILLÈS**

34, rue de Turin — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

Détail : Ph<sup>le</sup> 116, boulevard Haussmann, et toutes pharmacies.

## ENDOPANCRINE

Insuline Française

Forme et composition :

**ENDOPANCRINE** : Tube de 6 cc. chaque cc. titré à 20 unités cliniques.  
**ENDOPANCRINE 10** : Boîte de 12 ampoules de 1 cc. titré à 10 unités cliniques.

**ENDOPANCRINE 5** : Boîte de 12 ampoules de 1 cc. titré à 5 unités cliniques.

**Avantages.** — La présentation en tubes permet de prélever le nombre exact d'unités que l'on désire injecter, le reste du tube conservant toutes ses propriétés.

La présentation en ampoules est d'un emploi plus commode pour l'Insulinothérapie à faible dose.

**Indications.** — Diabète et ses complications. Acidose, Affections hépatiques, Angine de poitrine, Anémies pernicieuses, Artériosclérose, Artérites oblitérantes, Dénutrition chez l'adulte, Insuffisances cardiaques, Menorragies d'origine ovarienne, Troubles parkinsoniens, Troubles trophiques des nourrissons, Ulcérations chroniques.

**Mode d'emploi.** — En injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses.

**Dose du début dans le diabète.** — Un cc. La conduite du traitement ultérieur sera dictée par les dosages du sucre dans les urines ou éventuellement dans le sang.

Demandez notre notice :

« La Thérapeutique par l'Insuline ».

Pour recevoir à titre d'échantillon le modèle de vente en faire la demande en indiquant exactement le conditionnement que l'on désire recevoir.

Laboratoire de Thérapeutique Générale  
 48, rue de la Procession — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## ENERGINE IODÉE DE BERCK

Bardane — Iode — Noyer — Arsenic.

**Forme.** — Sirop agréable.

**Posologie.** — *Enfants* : 1 cuillerée à dessert deux fois par jour.

*Adultes* : 1 cuillerée à soupe deux fois par jour.

**Indications.** — Croissance, lymphatisme, scrofule, ganglions.

## ÉNERGINE PHOSPHORÉE DE BERCK

Complexe opo-minéral nucléine.

**Forme.** — Granulée.

**Posologie.** — *Enfants* : 1 cuillerée à dessert deux fois par jour.

*Adultes* : 1 cuillerée à soupe deux fois par jour.

**Indications.** — Convalescence, pré tuberculose, faiblesse osseuse, asthénie, etc...

Laboratoire du Professeur PANCIER

G. RUIN, docteur en pharmacie,

21, rue Saint-Leu — AMIENS (Somme).

## ENÉSOL

**Composition.** — Salicylarsinate de mercure, à arsenic et mercure dissimulés. Renferme 38, 46 p. 100 de Hg métal, et 14,4 p. 100 de As sous forme dissimulée. Les solutions sont incolores et ne coagulent pas l'albumine.

**Formes.** — Ampoules de 2 cc. et de 5 cc. contenant 0 gr. 03 de salicylarsinate de mercure par cc. correspondant à 0 gr. 0115 de Hg métal et à 0 gr. 0043 de As métalloïde par cc. Ampoules compte-gouttes (collyre) de 10 cc. dosées à 0 gr. 03 par cc.

**Propriétés thérapeutiques.** — Agent antisyphilitique (agissant à la fois par son arsenic et par son mercure). Action analeptique par l'arsenic.  
Psoriasis, lichen plan.

**Doses et mode d'emploi.** — Dose moyenne : injection intramusculaire d'une ampoule (2 cc.) par jour. Dose massive : injection intramusculaire ou intraveineuse de 4 à 8 cc. tous les deux ou trois jours.

**Laboratoires CLIN — PARIS.**

---

## ENIODE LEFEBVRE

**Composition.** — Iode en combinaison stable avec une albumine d'origine animale.

**Forme.** — Comprimés kératinisés contenant chacun 1 centigramme d'iode en combinaison organique.

**Propriétés thérapeutiques.** — L'*Eniode* possède toutes les propriétés de l'Iode, sans les inconvénients de l'iodisme.

**Doses et mode d'emploi.** — *Enfants* : 1 à 2 comprimés par jour.

*Adultes* : 2 à 8 comprimés par jour, avant les repas.

**Pharmacie GRIGNON**  
2, rue Duphot — PARIS.

## ENTÉRALTHINE (Comprimés)

Nouvelle et unique préparation à base de racine de guimauve (althéa) et d'essences antiseptiques calmantes et non irritantes. Action émolliente et antiseptique.

**Indications.** — Lavements émollients alcalins, rectites, prostatites et entérites.

**Forme.** — *Comprimés* immédiatement solubles dans l'eau chaude.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 comprimés dans un demi-litre d'eau chaude.

Échantillons et littérature.

**Laboratoires FORTEAL**

**J. CHAKI, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**  
3, rue Barbette — PARIS (III<sup>e</sup>).

## ENTÉRO-ANTIGÈNES

*préparés d'après la méthode et selon les procédés de M. le Professeur DANYSZ de l'Institut Pasteur.*

**Propriétés thérapeutiques.** — Anti-anaphylaxie curative des maladies chroniques non contagieuses.

**Indications.** — *Intestin* : Constipation chronique, Colites, Entérocolites, Diarrhées chroniques.

Dysenterie microbienne (Shiga, Fleixner), etc.

*Asthme*, Rhume des foins, Migraines, Neurasthénies, Insuffisances hépatiques et polyglandulaires,

*Peau* : Eczémas chroniques, Urticaires, Prurits généralisés ou localisés (anal, vaginal), Prurigo, Psoriasis, Furonculose, etc.

*Rhumatismes chroniques*, Troubles de la ménopause, dysménorrhées.

Tous les cas de dysharmonie endocrinienne.

Adénopathie trachéobronchique.

**Deux formes.** — 1<sup>o</sup> Ampoules à injecter.

2<sup>o</sup> Ampoules à boire.

Boîtes de 10 ampoules. Littérature sur demande.

**LABORATOIRES F. DUCATTE**

31, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## ENTEROBYL DEHAUSSY

Médication entéro-hépatique rationnelle.

### Composition.

Chlorure de Magnésium, Sulfate de Magnésie, Peptone ; *Cholérétiques* (Drainage biliaire).

Héxaméthylènetétramine, Charbon animal pur ; *Antiseptiques* (Désinfection intestinale et biliaire).

**Indications.** — Lithiase biliaire, Cholécystites chroniques, Congestion hépatique, Cirrhoses (alcool, paludisme, ictère, cholémie).

Troubles digestifs et troubles divers d'origine hépato-biliaire (Constipation, Diarrhées, Migraines, Vertiges, Urticaire, Prurit).

**Posologie et Formes.** — Cachets. Granulé.

*Drainage biliaire* : 1 à 4 cuillerées à café, 1 à 4 cachets, le matin à jeun avec un demi-verre d'eau chaude ou une infusion. Rester étendu sur le côté droit un quart d'heure.

Tâter la sensibilité du malade en commençant par des doses faibles.

*Cure d'entretien* : 1 à 2 cuillerées à café, 1 ou 2 cachets, vingt minutes avant les repas.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires DEHAUSSY**  
66, rue Nationale — LILLE.



## ENTÉROHÉPATINE

Rééducateur opo-physiologique de l'Intestin.

**Composition.** — Ext. fl. intestinal, Extr. fl. pancréatique, Extr. fl. hépatique, Extrait salicaire, Teinture Belladone, Acide lactique.

**Indications.** — Toutes formes d'Entérites, Diarrhées, Dysenteries indigènes ou exotiques. Atonie intestinale.

### Mode d'emploi et présentation :

Flacon pour *adultes* : 3 cuillerées-mesure par jour.

Flacon pour *enfants* (compte-gouttes) : II gouttes par année d'âge, 3 fois par jour.

### ENTÉROHÉPATINE SB.

Même formule, moins la Teinture de Belladone.  
Mêmes indications, mêmes doses.

Le flacon : 15 francs.

**Laboratoires Henri FOUCHER**

77, boulevard de Grenelle — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

## ENTÉROSEPTYL

Phosphate de B trinaphtyle, 0 gr. 05 par comprimé.

**Dose.** — 2 à 6 comprimés par jour à jeun.

**Indications.** — Diarrhées saisonnières, Intoxications alimentaires (gibier, crustacés, champignons), Entérites, Ictères, Urticair, Colibacillurie, Rougeurs postprandiales, Fétidité d'haleine, Syndrome entéro-uro-génital.

**Avantages.** — Ne se décompose que dans l'intestin, n'irrite pas l'estomac, ni hépatotoxique, ni déminéralisant comme les ferments lactiques. Peut se prescrire aux enfants.

**CLERAMBOURG-D<sup>e</sup> BRUNERYE**

10, rue Saint-Antoine — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## ENTEROVACCIN LUMIÈRE

**Vaccin antitypho-colique polyvalent**  
**Vaccination antityphique par voie gastro-intestinale.**

**Constitution.** — Masse pilulaire constituée par des corps bacillaires (éberth-coli-bacille, paratyphique A et B.) rigoureusement stérilisée et enrobée dans une enveloppe kératinisée qui leur permet d'arriver jusqu'à l'intestin sans subir aucune désintégration des produits immunisants.

### Propriétés :

**Préventives :** La durée de l'immunité est variable selon les individus, efficacité de même ordre que celle des vaccins s'administrant par voie sous-cutanée.

**Pas de contre-indication, pas de réaction.**

**Curatives :** Etats typhiques, paratyphiques et colibacillaires en cours d'évolution.

**Doses.** — Pour adultes, 4 pilules par jour pendant 7 jours consécutifs ; 2 le matin et 2 le soir, aussi loin que possible des repas.  
Pour enfants, demi-dose, soit 2 pilules par jour pendant 7 jours consécutifs, aussi loin que possible des repas.

**Formuler :** Une boîte de 28 pilules d'Enterovaccin Lumière.

Les personnes soumises à la vaccination par l'Enterovaccin n'ont rien à changer à leurs occupations habituelles ni à leur régime normal.

**LABORATOIRES LUMIÈRE**

23, Cours de la Liberté — LYON.

---

## ENTÉROXIN LECLERC

Vaccin buccal polyvalent contre l'infection intestinale.

### Composition :

Mélange de cultures atténuées de B. Coli, Entérocoque, Staphylocoque, autrement dit « bouillon vacciné », tenant en suspension les corps microbiens ci-dessus.

### Présentation :

Ampoules de 10 cc. (boîtes de 8 ampoules).

### Mode d'emploi et dose :

Le matin à jeun, 3/4 d'heure avant toute alimentation, bien agiter une ampoule et en absorber le contenu dans un demi-verre d'eau froide sucrée.

Aucune réaction à craindre. On peut donner 1 ampoule à un nourrisson, 2 à 3 ampoules à un adulte pour agir plus énergiquement, sans aucun inconvénient.

Durée du traitement : 10 à 20 jours par mois, à renouveler plusieurs mois de suite.

Il est recommandé de faire précéder l'Entéroxin d'un cholagogue léger (Magnétone).  
(Voir ce mot, page 609.)

Prix : 25 francs.

## ENTÉROCHIR LECLERC

L'ENTEROCHIR LECLERC est obtenu de l'Entéroxin Leclerc, filtré sur bougie, débarrassé des corps microbiens. Il est constitué par un bouillon vacciné polyvalent (Staphylocoque, B. Coli, Entérocoque) et est réservé aux usages chirurgicaux, instillations, lavages, etc.

Prix : 40 francs.

Littérature, échantillon sur demande :

### Etablissements T. LECLERC

Docteur P. Lemeland, pharmacien  
10, rue Vignon — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## ENZYPAN

Dragées réunissant la totalité des Enzymes digestifs :

Pepsine, Diastase, Trypsine, Lipase et Bile associées.

Médication digestive polyvalente pour tous les troubles par insuffisance d'un ou plusieurs ferments.

Bonne solution d'un problème ancien demeuré jusqu'alors sans solutions satisfaisantes.

Pas de cloison de gluten ou de kératine entre les ferments destinés à l'estomac et les ferments destinés à l'intestin. Trop souvent kératine comme gluten, ou se laissent attaquer par le suc gastrique ou traversent l'intestin sans libérer leur contenu.

Dans les dragées d'Enzypan la protection des enzymes intestinaux, pendant leur séjour dans l'estomac, est assurée, particule par particule pour ainsi dire, par l'enduit où elles baignent, et qui s'est révélé aussi bien inviolable par le suc gastrique que détruit par le suc intestinal, dès leur arrivée dans le duodénum.

**Doses.** — 2 ou 3 dragées au début ou pendant les repas. En cas d'hypochlorhydrie, certaine ou probable, prescrire conjointement :

Acide chlorhydrique officinal : X à XX gouttes pendant ou à la fin des repas.

**Laboratoire NORGAN**

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>). Tél. Laborde 08-00.

## ÉPHOLÉINE

(Inhalant).

**Forme pharmaceutique et composition.** — Huile éphédrinée au centième (éphédrine *naturelle* chimiquement pure) avec addition d'acétone chloroforme et orthoforme.

**Propriétés.** — Vaso-constricteur local à action non irritante, diffusible et durable.

**Avantages.** — *Décongestionnant* de la muqueuse nasale, outre ses indications particulières, l'Epholéine remplace l'adrénoléine dans les cas d'intolérance individuelle à l'adrénaline.

**Indications.** — Asthme, Emphysème, Rhume des foins, Coryza spasmodique, Rhinites congestives.

**Mode d'emploi.** — En instillations (III ou IV gouttes dans chaque narine 2 à 3 fois par jour ou en pulvérisations). Chez l'asthmatique, l'ordonner *préventivement*.

**Prescription.** — Un flacon *Epholéine Falvy*.

**Les Laboratoires A. FALVY**

Licencié ès sciences

Ex-interne. Lauréat des Hôpitaux de Paris

40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## EPICRAL

(Solution iodo-arséno-mercurielle (lactate) citratée).

*Antisypilitique, dépuratif et tonique* très actif, de goût agréable, bien toléré, présenté sans indication de sa nature mercurielle.

**Composition.** — Lactate mercurique, arséniate de soude, iodure de potassium, iode en combinaison organique, citrate de soude et extraits de plantes dépuratives. Chaque cuillerée à soupe contient 0 gr. 007 de lactate mercurique, 0 gr. 003 d'arséniate de soude, 0 gr. 015 d'iode et 0 gr. 100 d'iodure de potassium.

**Originalité.** — Emploi du lactate mercurique, bien toléré (surtout par les enfants) et très actif et du citrate de soude qui fluidifie le sang et les sécrétions et augmente l'action du mercure et de l'arsenic. Formule nettement tonique.

**Indications.** — Hérédo-syphilis, prophylaxie pendant la grossesse, traitement d'entretien. Particulièrement indiqué pour la femme enceinte, les enfants, les adolescents et les adultes vers la cinquantaine (troubles nerveux, hépatiques et digestifs, de la vision, de la circulation, états d'anémie, dermatoses, etc...).

**Doses.** *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants* : 1 à 4 cuillerées à café par jour, suivant l'âge dans un peu d'eau.

**Laboratoires G. LAMBERT**

Docteur en Pharmacie.

6, rue de Longchamp — VICHY (Allier).

---

## ERANOL

Iode colloïdal en suspension aqueuse.

**L'Eranol** ne saurait être comparé aux composés iodo-organiques, aux peptones iodées, à l'albumine iodée, à la caséine iodée, à l'huile iodée, ni aux iodures alcalins, tous produits dans lesquels l'iode se trouve à l'état de combinaison stable, difficilement dissociable. C'est un iode libre, à l'état colloïdal, en milieu aqueux, non caustique, ni toxique, même aux doses thérapeutiques élevées.

**Propriétés.** — Grâce à l'état particulier sous lequel se présente cet iode, l'*Eranol*, de beaucoup plus actif que l'iode métalloïdique dans ses indications habituelles, possède une action catalytique très nette, due à ses ions métalloïdiques, qui augmente, par excitation, le pouvoir thérapeutique de l'iode. Son hyperactivité, sa teneur en iode (10 p. 1 000) sa parfaite tolérance et sa forme aqueuse en font la préparation d'iode la plus maniable, la plus active et la moins toxique.

**Indications.** — Lymphatisme, Hypertension, Rhumatismes, Prétuberculose, Tuberculoses torpides, mycoses, etc.

**Forme.** — Flacon, avec compte-gouttes.

**Mode d'emploi.** — Au moment des repas ou entre les repas, dans une boisson quelconque : eau, vin, bière, etc.

**Posologie.** — *Adultes* : XX à L gouttes et plus, deux fois par jour. *Enfants* : V gouttes par année d'âge et par jour, en deux fois.

Prix au public : 13 fr. 75.

**Laboratoire de L'ERANOL**  
45, rue de l'Echiquier — PARIS.

## ERCERHINOL

Ampoule nasale à l'Argent Colloïdal.

**Avantages.** — Bactéricide puissant, Traitement *pratique*, rapide et propre.

**Indications.** — Grippe, infections broncho-pulmonaires, Catarrhe nasopharyngien, Coryza, Sinusite, etc.

**Mode d'emploi.** — Verser quelques gouttes dans chaque narine 2 à 3 fois par jour, la tête inclinée en arrière.

**Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE**  
37, rue de Bourgogne — PARIS.

---

## ERGORONE

Solution huileuse de vitamine (D) antirachitique titrée à 6.000 unités physiologiques par cent. cube, soit 200 unités pour une goutte.

**Indications.** — Rachitisme, Spasmophilie, Ostéomalacie, Déminéralisation dans la grossesse. Pendant la lactation, comme prophylactique contre le rachitisme de l'enfant. Etats précaires accompagnant les croissances déficientes.

**Présentation et posologie.** — Flacons de 15 cc. Au-dessous de 1 an, II à VI gouttes; au-dessus d'un an, VI à X gouttes; adolescents et adultes, X à XX gouttes.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## ERGOTINE LAMANTE

### Traitement des hémorragies

**Forme.** — Gouttes et ampoules pour injections hypodermiques.

**Composition.** — Solution stabilisée et inaltérable de tous les alcaloïdes de l'ergot de seigle, obtenue par le procédé de fabrication spécial de Lamante.

**Indications.** — Hémorragies de toute nature. Hémorragies utérines. Accouchements, Fausses-couches, Fibromes, Accidents de la Ménopause, Hémorroïdes, Crachements de sang, Saignements de nez, Leucorrhée, Troubles de la Puberté, Incontinence d'urine chez les enfants. Contre l'Asthme bronchique et la Toux quinteuse, en injections hypodermiques.

**Doses et mode d'emploi.** — XXX à XL gouttes par 24 heures chez les adultes en deux fois dans un peu d'eau sucrée. XXX gouttes à la fois, 3 à 4 fois dans les 24 heures dans les très fortes hémorragies.

**Enfants:** 1/3 des doses ci-dessus.

**Ampoules.** — En injections hypodermiques : 1 ampoule comme préventif d'hémorragie après l'accouchement, ou dans les hémorragies légères. Deux ampoules consécutives dans les hémorragies abondantes. A répéter au besoin 2 à 3 fois dans les 24 heures.

Echantillon et littérature sur demande.

Le flacon gouttes : 12 fr. — La boîte 6 ampoules : 12 fr.

M. PARIS, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

1, rue Lassalle — LYON (La Boucle) (IV<sup>e</sup>).

## ERYTHRA

### DYN

La première et la seule chimiothérapie de la ROUGEOLE

**Amidopyrine Lactique pure à pH 3,2**

Solution titrée : une goutte = un centigramme.

Introduite dans la thérapeutique de la rougeole par les cliniciens anglais et américains (Læwenthal, Hoyne, Collier, Ronaldson), l'amidopyrine lactique est un antithermique puissant, bien toléré par les nourrissons et les enfants, même à doses élevées.

**Indications.** — Médicament de choix de la Rougeole et des Pyrexies aiguës en général (Fièvres éruptives, saisonnières et de croissance.) Excellent analgésique (zona, névralgies, migraine, grippe).

### Posologie :

1<sup>o</sup> Dans la Rougeole : faire prendre, sans interruption, toutes les 4 heures exactement :

**Enfants :** IV gouttes par année d'âge.

**Adultes :** L à LXXX gouttes.

2<sup>o</sup> Dans les autres fièvres et névralgies, mêmes doses 3 à 4 fois par jour en dehors des repas.

Le flacon compte-gouttes : 18 francs.

**Société d'Applications Pharmacodynamiques**

5, rue Claude-Decaen — PARIS (XII<sup>e</sup>).



## ESCULEOL

**Composition.** — Alcoolé concentré de Marron d'Inde frais et stabilisé.

**Indications et propriétés.** — Action vaso-constrictive sur le système nerveux périphérique et en particulier dans les cas d'hémorroïdes, varices, varicocèles, phlébites, stase veineuse, etc.

**Supérieur aux préparations médicinales parce que concentré, stable et d'action constante.**

**Mode d'emploi.** — **Hémorroïdes :** Administrer 2 fois par j. dans l'intervalle des repas XV gouttes d'Esculéol dans un peu d'eau. Dans les cas rebelles, graduer la dose suivant l'intensité des douleurs, en augmentant de V gouttes par jour. **Varices, varicocèles, etc.,** toutes les fois que la médication devra être continuée pendant un certain temps administrer XV gouttes 2 fois p. j. dans l'intervalle des repas, 20 jours par mois.

Prix : 14 francs.

**MICHEL DELALANDE**

16, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE (Seine).

## EUBIOL

Modificateur des états Asthéniques et Atoniques. Régénérateur du Sang, des Muscles et des Nerfs.

Méthylarsinate sensibilisé, Citrate de Fer, Noix Vomique.

**Indications.** — **Combat** Anémie, Chlorose, Neurasthénie, Débilité générale.

*Prévient* Tuberculose, Diabète, Scrofule, etc...

Fortifie l'organisme, le rend réfractaire aux infections.

**Formes.** — Elixir, granulé, pilules, ampoules.

**Posologie.** — *Elixir :* adultes, 2 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants,* moitié dose.

*Granulé :* adultes, 3 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau sucrée.

*Enfants :* moitié dose.

Avant ou après chacun des principaux repas.

*Pilules :* adultes, 6 pilules par jour. *Enfants,* moitié dose.

Après chacun des principaux repas.

*Ampoule :* 1 ampoule de 1 cc. par jour (série de 10, puis repos).

**G. COUDERT,** Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

Ex-Interne des Hôpitaux.

116, avenue Ledru-Rollin — PARIS.

**Province, Exportation, Service Médical :**

R. DOUENCE, 13, rue du Cancera — BORDEAUX

## EUCALYPTINE LE BRUN

(Antiseptique pulmonaire)

**Composition.** — Eucalyptol 0,12 cgr. ; Gaïacol, 0,05 cgr. ; Acide phénique, 0,02 cgr. ; Camphre, 0,05 cgr. ; pour une ampoule de 1 cc., le tout dans une décoction huileuse de plantes balsamiques calmantes, spécialement étudiée et rendant *l'injection absolument indolore*.

**Formes.** — Amp. de 1, 2 et 5 cc. gaïacolées ou non gaïacolées. — Caps. glutinisées.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique pulmonaire. Anti-oxydant. Antithermique. Sédatif de la toux. Diminue et facilite l'expectoration.

**Indications.** — Toutes les affections aiguës des voies respiratoires : Grippe, Pneumonie, Broncho-pneumonie, Tuberculose, Gangrène pulmonaire, Maladies infectieuses.

**Posologie et mode d'emploi.** — Sous la forme capsules : 6 par jour, 2 à chaque repas. En injections intra-musculaires. Adultes : 1 à 5 cc. par jour. Enfants de 5 à 12 ans :  $\frac{3}{4}$  de cc. ; 2 mois à 5 ans,  $\frac{1}{2}$  de cc. Le flacon de 42 capsules : 11 francs. La boîte d'amp. : 18 francs.

**Laboratoire LEBRUN**

155, boulevard de Magenta — PARIS (IX<sup>e</sup>).  
Téléphone : Trudaine 50-34.

# EUCHOL.

## Tonique Hépatique

**Composition.** — Extrait *stabilisé* et total des feuilles de la tige du *Cynara Scolymus* (Artichaut), 0 gr. 30 par comprimé.

**Forme pharmaceutique.** — COMPRIMÉS DRAGÉIFIÉS.

**Propriétés.** — Tonique du foie.

Cholagogue.

Décongestionnant des tissus.

Diurétique puissant.

Innocuité absolue.

Action douce nécessaire dans les cas de crise.

Emploi dans les hôpitaux de Paris.

**Remarque.** — Le vocable « Artichaut » ne paraît pas dans la boîte vente.

**Posologie.** — 4 à 6 COMPRIMÉS à avaler par jour.

Etat chronique : **4 comprimés** (2 au moment des principaux repas).

Etat de crise : **6 comprimés** (2 au moment des 3 repas).

Durée moyenne du traitement : 3 semaines.

### Indications :

Ictère catarrhal.

Cholécystite et angiocholite.

Toute insuffisance hépatique.

Troubles hépatiques des coloniaux.

Paludisme, cholémie familiale, **Cirrhoses.**

Coliques

Congestions

Migraine

Constipation

Intoxication

Urticaire

} d'origine hépatique.

Prix au public : 16 francs.

### Laboratoire MORELLET

J. MORELLET, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
ex-interne des hôpitaux de Paris,  
95, boulevard Magenta — PARIS.

## EUCYTOT

**Composition.** — Combinaison d'extraits végétaux et de sels phospharsénicaux organiques, 25 cc. = 3 centigr. d'iode + 2 milligr. d'arsenic.

**Forme.** — Liquide à base de vin de liqueur.

**Avantages et propriétés thérapeutiques.** — Réminéralisateur et stimulant dans toutes les déchéances organiques. Plus assimilable que l'huile de foie de morue et plus actif que les sirops iodotanniques.

**Indications.** — *Enfants* : Affections des os et de la nutrition. Affections des glandes et des voies respiratoires. Etats pré-tuberculeux et tuberculose sous toutes ses formes. Anémie et troubles nerveux.

*Adultes* : Convalescence des maladies infectieuses, affections des voies respiratoires, troubles de la circulation.

**Posologie.** — *Enfants* : de 2 à 5 ans, 2 cuillerées à soupe par jour ; de 5 à 10 ans, 2 verres à liqueur par jour ; de 10 à 15 ans, 3 à 4 verres à liqueur par jour.

*Adultes* : 1 à 2 verres à liqueur à chaque repas.

**Laboratoires MAYOLY-SPINDLER**

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

A Bruxelles :

**LE MARINEL, Pharmacien, 273, rue Victor-Rauter.**

## EUDYNOL

**Composition.** — Arsenic, phosphore, strychnine.

**Formes.** — Ampoules, gouttes, perlules.

**Indications.** — Asthénie, pré-tuberculose, surmenage, dépressions nerveuses, convalescence, paludisme.

**Dosage, Prix et Posologie.**

Ampoules, 14 fr. la boîte de 12. Arsenic : 0 gr. 015 ; Phosphore : 0 gr. 008 ; Strychnine : 0 gr. 002 pour 1 cc. Une injection par jour.

Gouttes, 12 fr. le flacon. Arsenic : 0 gr. 02 ; Phosphore : 0 gr. 01 ; Strychnine : 0 gr. 002, pour 1 cc. soit 24 gouttes. 10 à 12 gouttes 2 fois par jour aux repas.

Perlules, 14 fr. le flacon. Arsenic : 0 gr. 005 ; Phosphore : 0 gr. 007 ; Strychnine : 0 gr. 005 par perlule. 2 perlules à chacun des principaux repas.

Préparé par le Dr ROGER, pharmacien.

**Echantillons et vente en gros**

**François CARTIER,**

1, rue de la Martinière — LYON.

## EUFOSFYL "VELY"

**Composition.** — 1° *Ampoules à 1 cc.* à base de : Méthars. de soude, Phosphonucléate, Magn. Cacod. Glycéro-Phosphate, Caféine (Méthar. de Strychn. 1/2 milligramme). Phosph. de manganèse (ampoules avec et sans Strychnine). Indolores.

2° *Cachets*, à base de Splénine, Méthylarsin. sodique, Phosphonucléate de Chaux, Noix vomique, Glycéro-phosph. calcique, Phosphate tricalcique, Phosph. magnésium, Phosph. de manganèse.

**Indications.** — Reminéralisateur nerveux et tonique, surmenage, neurasthénie, asthénie, régénérateur des centres nerveux, impuissance, débilité sénile, hypertension artérielle et ses conséquences, stimulant des glandes endocrines.

**Posologie.** — *Ampoules* : 1 injection sous-cutanée par jour, pendant 24 jours.

*Cachets* : 1 à 4 cachets par jour aux deux principaux repas. Cesser pendant 8 jours et recommencer une nouvelle cure.

**Laboratoire des produits Vely**

132, avenue Victor-Hugo — PARIS.

Tél. : Passy 87-85.

## EUGALINE

**Hygiène intime de la femme.**

**Propriétés thérapeutiques.** — Poudre antiseptique et décongestive.

**Forme.** — Paquets dosés pour une injection.

**Formule.** — Microsodine, oxycyanure d'Hg., sulfate de zinc, borate de soude, sulfate d'alumine et de potasse, tannin à l'éther, résorcine, carbonate acide de sodium, sulfate de cuivre, acide borique, ess. de géranium rosat.

**Doses et mode d'emploi.** — Un paquet pour deux litres d'eau bouillie chaude pour injections vaginales.

Prix de la boîte de 20 paquets, au public : 18 francs.

**Laboratoire HOCQUETTE**

191, rue du Faubourg-St-Antoine — PARIS.

Tél. : Diderot 04-71.

## EUGASTROL

Charbon animal

purifié à l'alcool exempt de cyanure.

**Propriétés thérapeutiques.** — Traitement spécifique des maladies de l'estomac, de l'intestin et du foie.

**Indications.** — Combat avec une efficacité certaine toutes les maladies de l'appareil digestif, gastrites, dyspepsies, gastro-entérites, cholecystite pure ou associée, colite muco-membraneuse, migraines d'origine gastrique, ulcères digestifs.

**Formule.** — Charbon animal pur lavé à l'alcool exempt de toute trace de cyanure, carbonate de chaux pur léger, hydrocarbonate de magnésium, sucre de lait, acide acétylsalicylique, mélange, étuvé, tamisé, suivant procédé spécial.

**Dose et mode d'emploi.** — 1 à 2 cuillerées à café après chacun des principaux repas.

Prix de la boîte au public : 21 francs.

**Laboratoires BOUTROY**

8, rue de Passy — PARIS.

## EUGYNOL GRANDVAL

**Composition :**

Association d'extraits d'Hydrastis-Hamamélis-Viburnum Gossypium.

**Propriétés thérapeutiques.** — Il favorise la formation chez les jeunes filles, évite les palpitations et provoque l'élimination des toxines.

Vaso-constricteur par excellence ; il régularise la circulation du sang, décongestionne les organes, et apporte toujours un soulagement à la souffrance produite par la moindre affection des organes de la femme.

*L'Eugynol* permet d'enrayer la formation des Varices ; soit au moment de la grossesse, soit au retour d'âge.

Il rétablit la régularité des règles. Son usage à dose modérée finit par supprimer les douleurs qui accompagnent ou qui précèdent si souvent ce moment désagréable.

**Indications thérapeutiques.** — Complications du retour d'âge, telles que Varices, Hémorroïdes, Hémorragies, Flux sanguins de toute nature, Eruptions diverses, etc.

**Dose.** — XV à XX gouttes avant chaque repas. On peut aller jusqu'à XXX gouttes.

Le flacon : 10 fr. (toutes pharmacies).

**LABORATOIRES GRANDVAL**

12, 14, rue Féry — REIMS.

## EUMICTINE

### Indications thérapeutiques :

Antigonococcique, diurétique, antiseptique, etc.

Affections des voies urinaires :

Blennorrhagie, Urétrite, Cystite, Pyélite, Catarrhe, Prostatisme, etc.

Traitement complet, sans aucun retentissement sur les organes, estomac en particulier.

### Doses et mode d'emploi :

Capsules enrobées au gluten pur, contenant chacune 0,20 Santalol, 0,05 Salol et 0,05 Hexaméthylène — Tétramine : 8 à 12 par jour aux repas, ce qui constitue un traitement complet des affections urogénitales et prostatites.

Prix de vente au public : 20 francs.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> M. LEPRINCE**

62, rue de la Tour — PARIS (XVI<sup>e</sup>)

---

## EUONYMINE PAUL THIBAUT

*Pilules d'Euonymine purifiée, procédé Paul Thibault*, licencié ès sciences physiques, ancien Président de la Société de Pharmacie de Paris, Euonymine associée à l'extrait stabilisé de boldo. Le plus actif cholérétique et cholagogue d'origine strictement végétale. Stimulant par excellence de la cellule hépatique.

**Indications.** — Affections du foie, Insuffisance biliaire, Cirrhoses, Ictères, Lithiase biliaire, Cholécystites, Céphalée, Migraines et Constipation chronique d'origine hépato-biliaire.

**Posologie.** — Pilules dosées à 0,06 d'Euonymine et à 0,06 d'extrait de boldo. 1 à 3 pilules par jour, soit au dîner, soit au coucher.

**Laboratoire R.-J. SOUDAN**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

Ex-interne des Hôpitaux de Paris.

6, rue Rosenwald — PARIS (XV<sup>e</sup>)

**Nota.** — Afin d'éviter les mécomptes donnés par de nombreuses evonymines du commerce, prescrire toujours : *Pilules d'Euonymine Paul Thibault*.

## EUPAVERYL PACHAUT

Chlorhydrate de Papavérine  
chimiquement pur.

**Indications.** — Spasmes viscéraux, Asthme, Coqueluche, Déséquilibres vago-sympathiques.

### Présentations :

Gouttes : X gouttes = 1 centigramme.  
Ampoules : 1 cc. = 5 centigrammes.  
Granules : 1 granule = 2 centigrammes.

### Posologie :

*Adultes* : de 0 gr. 05 à 0 gr. 25 en doses fractionnées.

*Enfants* : 1 centigramme par année d'âge en doses fractionnées.

### Laboratoires PACHAUT

130, boulevard Haussmann — PARIS.

## EUPEPTIQUE MONAVON

**Composition.** — Liqueur exactement dosée et renfermant par cuillerée à soupe :

Pepsine pure .....	0 gr. 12
Diastase.....	0 gr. 15

**Propriétés thérapeutiques.** — Digère les viandes et les féculents.

**Avantages.** — Il supplée à l'insuffisance et à l'inactivité des liquides digestifs, et par là améliore la digestion, augmente l'absorption et l'assimilation et lutte efficacement contre l'amaigrissement.

**Indications.** — Digestions lentes et difficiles ; dyspepsies, gastralgies, crampes d'estomac, certaines formes de migraine, et tous les états de faiblesse que ces maladies produisent, tels que : amaigrissement, consommation, anémie, etc.

**Posologie.** — Un à deux verres à liqueur pour les adultes, après chaque repas, pur ou mélangé d'eau.

Prix : 18 francs.

### Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.



## EUPHON

Sirop et Pastilles contre l'enrouement.

**Composition et forme.** — Sirop à base d'extraits de plantes et de Produits organiques : extrait fluide de coca I + Teinture rac. aconit, 0 gr. 20 ; formiate sodique, 5 + sirop d'erysimum et d'aunée 100.

**Propriétés thérapeutiques.** — Tonique par excellence des cordes vocales (tant chez l'adulte que chez l'enfant), calme complètement les picotements de la gorge qui accompagnent souvent un rhume ou une bronchite. Son emploi s'associe à tous les sirops pectoraux sans aucune contre-indication.

**Indications thérapeutiques et posologie.** — Entretien de la voix : 3 cuill. à café par jour. — Enrouements, toux laryngées : 3 cuill. à dessert par jour. — Aphonie, trachéite, laryngite (simple ou chronique), 3 cuill. à potage par jour. — Chez les enfants ne pas dépasser 3 cuill. à café par jour.

### Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

A Bruxelles : LE MARINEL, pharmacien, 273, rue Victor-Rauter.

## EUPHORYL

Méthode de désensibilisation polyvalente. Traitement des dermatoses prurigineuses et affections anaphylactiques.

**Formule.** — Hyposulfite de soude et chlorure de calcium en combinaison bromurée silicatée.

**Présentation.** — 1<sup>o</sup> *Cachets* ; 2<sup>o</sup> *Ampoules* pour injections intraveineuses.

**Indications.** — a) *Dermatoses prurigineuses* : Eczémas secs et suintants. Prurits, érythrodermies, dermites médicamenteuses et professionnelles, psoriasis.  
b) *Manifestations anaphylactiques* : Urticaire, migraines, oedème de Quincke, maladies sériques.  
c) *Affections à tendance suppurative des voies respiratoires.*

**Posologie.** — *Cas moyens* : 3 cachets par 24 heures, combinés à un traitement local approprié.

*Cas aigus* : Une injection intraveineuse bi-hebdomadaire, avec prise de 2 cachets les jours intercalaires.

*Nota* : Il est recommandé de pratiquer simultanément l'injection intraveineuse d'Euphoryl et une autohémothérapie de 10 cc.

**Produits du Laboratoire de Dermatologie de Paris**  
**HOURQUET et VIENNE,**  
Pharmaciens-concessionnaires.

114, rue du Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## EUPHYTOSE

Traitement phytothérapique des états anxieux et des Dystonies du sympathique.

**Forme.** — Solution.

**Composition.** — Une cuillerée à café contient :

Cratægus oxyacantha .....	31 centigr.
Extrait fluide passiflora incarnata	50 —
Alcoolature Ballota marrubium nigrum .....	98 —
Extrait fluide de Paullinia sorbilis	16 —
Extrait mou de Valeriana officinalis .....	12 —

**Posologie.** — De 1 à 3 cuillerées à café en 24 heures dans un peu d'eau sucrée ou dans une infusion chaude.

**Indications.** — Angoisse et états anxieux, Insomnie anxieuse, Eréthisme cardio-vasculaire, Palpitations, Tachycardie, Angoisse précordiale, Vertiges, Spasmes viscéraux, Douleurs angineuses.

**Propriétés thérapeutiques.** — L'**Euphytose** est antispasmodique par la Ballotte. Elle est tonique cardiaque par le Cratægus oxyacantha. Par la passiflore, elle est sédative de tous les troubles nerveux ayant leur point de départ dans le sympathique. Elle modère l'excitabilité réflexe par la Valériane. Enfin, elle doit au Paullinia sorbilis (Guarana) une action tonique puissante, mais non excitante, action régulatrice qui produit cette euphorie spéciale, si appréciée après la phase d'angoisse qu'elle remplace.

L'**Euphytose**, d'autre part, n'entraîne aucune accoutumance ; ne s'accumulant pas, son usage peut être prolongé, et même alors, elle n'arrive jamais à troubler le fonctionnement rénal ou à modifier l'équilibre de la tension artérielle. Enfin, elle est parfaitement tolérée par les voies digestives.

Pour toutes ces raisons, l'**Euphytose** représente le médicament parfait de la crise d'angoisse.

Prix de vente au public : 15 francs.

**Laboratoire MADYL**

14, rue de Miromesnil — PARIS.

Téléphone : Anjou 16-55.

## EUPLASMOL IRRADIÉ

Reconstituant cellulaire, Recalcifiant intensif,  
Stimulant biologique.

### Composition :

*Granulé pour enfants* (2 cuillerées à café par jour) :  
Végéphos, Ergostérine irradiée, Fer, Manganèse,  
traces d'Arrhénal.

*Cachets pour adultes* (2 par jour) : Végéphos, Ergos-  
térine irradiée, Fer, Manganèse, Arrhénal, Fluor-  
ure, Fenugrec désodorisé.

**Indications.** — Anémies, troubles de croissance,  
amaigrissement, surmenage, insuffisance phos-  
phorée ou calcique, rachitisme.

*L'Euplasmol permet une fixation rapide des phos-  
phates naturels et des minéraux organiques par la  
présence de quantité importante d'Ergostérine irra-  
diée (fixateur vitaminé).*

Littérature et échantillon sur demande à

**M. VALENTIN, docteur en pharmacie,**  
79, rue de Wazemmes — LILLE.

---

## EUPNINE VERNADE

à l'Iodure de Caféine stable. .

**Doses et mode d'emploi.** — Une cuillerée  
à café matin et soir, au commencement  
des repas, mélangée dans 2 cuill. à potage  
d'eau, de lait ou de bière.

**Propriétés thérapeutiques.** — Diuré-  
tique, toni-cardiaque et respiratoire.

**Indications.** — Asthme, Emphysème, Op-  
pressions, Bronchite chronique, maladies  
du Cœur et des Vaisseaux, Artério-sclé-  
rose, Hydropisies, Angine de poitrine,  
Intoxications, Urémie, suites de la Grippe.

**Laboratoires DARRASSE**

7 à 13, rue Saint-Maurice  
NANTERRE (Seine).

## EURECTOL

Deux formes : Pommade et Suppositoires.

**Indications.** — Hémorroïdes, Constipation, Prurit anal, Rectite, etc.

**Composition.** — Marron d'Inde frais stabilisé. Hamamélis. Orthoforme. Extraits biliaires et Nouveauté absolue : *Extrait spécial d'Arum triphyllum*, un spécifique de premier ordre.

**Propriétés thérapeutiques.** — Décongestionnant Calmant. Vaso-constricteur analgésique, antiseptique. Action rapide et sûre *loco dolenti*.

**Dose et mode d'emploi.** — Chaque soir, étant couché introduire dans le rectum, soit de la pommade ou mieux de préférence un suppositoire. Continuer pendant 8 jours. Interrompre une semaine. Terminer le traitement par une nouvelle cure de 8 jours.

**Crises aiguës :** Traitement matin et soir.

Prix : 12 francs.

Littérature et échantillons sur demande.

**Laboratoires J. PERROCHON**

57, rue Origet — TOURS.

## EURONAL

**Composition et forme.** — Comprimés.

Diéthylmalonylurée .....	0,15
Intrait de Valériane.....	0,10

**Propriétés thérapeutiques.** — Analgésique et Antispasmodique, Hypnotique léger des surmenés et névropathes, Sédatif nerveux des excités et neurasthéniques.

**Indications.** — Insomnies rebelles et nerveuses, Épilepsie, Névralgies, Traumatisme, Toxicomanies.

**Posologie.** — *Dose sédatrice* : 1 comprimé avant chaque repas.

*Dose hypnotique* : 2 ou 3 comprimés avant le repas du soir.

Prix de vente au public : le tube : 6 francs.

**Laboratoires CARTERET**

15, rue d'Argenteuil — PARIS (1<sup>er</sup>).

## EUSOMNINE BÉLIÈRES

(Diéthylmalonylurée ammonio-bromée).

**Forme.** — Comprimés.

**Propriétés thérapeutiques.** — Hypnotique, sédatif, antialgique.

**Indications.** — Insomnies nerveuses, Névroses, Neurasthénie, Hystérie, Dyspnée, Névralgies, Démorphinisation, Dyspepsie nerveuse.

**Mode d'emploi et dose.** — *Comme sédatif* : Un comprimé pour les adultes. Un demi-comprimé pour les femmes. Deux fois par jour.

*Comme hypnotique* : Une heure avant de se coucher : Pour les adultes, 2 comprimés. Pour les femmes, 1 comprimé 1/2. Ces comprimés doivent être pris le soir dans une tasse de tisane chaude, camomille, tilleul, oranger, thé léger.

Chez les enfants atteints de Coqueluche et de Crises nerveuses, on peut très utilement donner 1/6 ou 1/4 de comprimé.

L'étui : 6 francs.

**Laboratoires BELIERES**

19, rue Drouot — PARIS (IX<sup>e</sup>).

---

**EUTENSYL GRÉMY**

Traitement de l'hypertension artérielle.

**Formule.** — Principes actifs totaux purifiés et stabilisés des organes suivants pris à l'état frais.

Corps thyroïde .....	0 gr. 02
Muscle cardiaque .....	0 gr. 50
Parenchyme rénal ....	0 gr. 50
Iodotyrosine.....	0 gr. 05
Scille.....	0 gr. 06
Scammonée .....	0 gr. 04

pour une pilule.

**Doses et mode d'emploi.** — Deux à quatre pilules par jour à prendre une demi-heure ou une heure avant les repas.

**Indications.** — Artériosclérose au début, hypertension artérielle, obésité avec hypertension, Athéromateux, Néphrite chronique hypertensive, Cardiopathies avec hypertension.

L'Eutensyl provoque une hypotension mesurable au Sphygmomanomètre, et il compense cette hypotension en excitant le rein, en favorisant les évacuations intestinales, en rassurant le cœur.

Le médecin peut associer à l'Eutensyl la digitale.

14, rue de Clichy — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## ÉVINE

### OVULES ÉVINE

**Composition.** — Métaoxyphénol, acide orthoxybenzoïque, Para amino benzoate d'éthyle, tétraborate disodique, glycérine solidifiée, parfum antiseptique et désodorisant.

**Indications.** — Toutes affections gynécologiques, bartholinites et gonococcies, néoplasmes.

**Posologie.** — Un ovule le soir au coucher. Au préalable prendre une injection tiède avec une solution de Poudre Evine. Renouveler cette injection le matin au lever.

### POUDRE ÉVINE

Antiseptique, soluble (injections vaginales, lotions, compresses, bains).

**Composition.** — Saponine pure, acide orthoxybenzoïque, tétraborate disodique, fluosilicate de soude. Cérasine, parfum.

**Indications.** — 1° Hygiène féminine ; 1 paquet p<sup>r</sup> lit. d'eau bouillie, tiède, en injections et lotions. — 2° Gynécologie, Leucorrhée, Vulvite, prurit : 2 à 3 paquets p<sup>r</sup> 2 lit. eau bouillie (injections, lotions, compresses), précieux adjuvant aux pansements médicaux. — 3° Obstétrique (même posologie qu'en gynécologie). — 4° Hygiène masculine : 1 paquet p<sup>r</sup> lit. d'eau bouillie en bains et lotions. — 5° Dermatologie : 1 paquet p<sup>r</sup> 1/2 lit. d'eau bouillie tiède (bains, lotions, compresses).

### THÉ ÉVINE

Contre l'obésité (plantes sélectionnées) adjuvant précieux aux traitements prescrits par le médecin. En infusion le matin à jeun, plusieurs fois dans la journée et le soir en se couchant,

Laboratoires ÉVINE, 3, rue de la Perle — PARIS.

## ÉVOLAXINE

(Le Laxatif de la Femme.)

Traitement physiologique de la constipation habituelle de la femme.

Pas d'accoutumance. Pas de coliques.

**Par ses lipoides ovariens** stabilise et régularise la sécrétion endocrinienne en général, la sécrétion intestinale en particulier.

**Par son mucilage** lubrifie les parois intestinales.

**Par son rhamnus frangula** excite le péristaltisme.

**Par sa duodénase** augmente les sécrétions biliaire, pancréatique et intestinale.

**Par ses sels biliaires** désinfecte le tube digestif.

**Indications.** — Constipation habituelle de la femme, Entéro-colite chronique, Dermatose, Acné, Furunculose, Auto-intoxication intestinale.

**Doses.** — 1 à 3 comprimés le soir en se couchant (action rapide), 1 comprimé par jour pendant 30 jours (cure de régularisation intestinale).

Prix au public : 10 francs.

Laboratoires du D<sup>r</sup> LAURENT-GERARD

Docteur ès sciences,

Ancien-Chef de Laboratoire

à la Faculté de Médecine de Paris,

40, rue de Bellechasse — PARIS. Tél.: Littré 97-95.

## EVONYL

**Composition.** — Extraits biliaires, de glandes intestinales, Evonymine, Fucus, agar-agar, ferments lactiques, podophyllin, etc., en milieu ergostérique irradié suivant notre méthode de vivification des végétaux donnant à la synergie médicamenteuse un coefficient supérieur pour sa valeur thérapeutique.

**Propriétés.** — Laxatif doux, absolument certain. Cholagogue de premier ordre. Un seul produit pour toutes les affections du foie et de l'intestin.

**Indications.** — Constipation aiguë ou chronique. Insuffisance hépatique, cholécystites, lithiases biliaires, hypertension.

**Forme.** — Tablettes dragéifiées.

**Posologie.** — Une à deux tablettes le soir au repas (à avaler sans mâcher).

Prix au public : 15 francs pour un mois.

**Laboratoires FLUXINE**

**J. BONTHOUX, Pharmacien.**

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

---

## EXONEROL

**Propriétés thérapeutiques.** — Désintoxication de l'organisme, traitement de la constipation.

**Indications.** — Stase intestinale chronique, constipation atonique et spasmodique, désintoxication à la suite de maladies infectieuses.

**Formule.** — Magnésie calcinée légère Codex, magnésie lourde anglaise, hydrate de magnésie, peroxyde de magnésium, chacun des produits étuvés séparément mélangés, finement pulvérisés et tamisés, suivant procédé spécial.

**Dose et mode d'emploi.** — 1 à 2 cuillerées à café le soir au coucher.

Prix de la boîte au public : 18 fr. 50.

**Laboratoire BOUTROY**

8, rue de Passy — PARIS.



## EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

**Composition.** — Extrait aqueux obtenu dans le vide, à basse température, contenant les principes solubles et assimilables des céréales, orge, seigle, avoine, très riche en sucres, sels, oxydases, vitamines.

**Action.** — Reminéralisant, tonique général, apport de vitamines.

**Indications.** — Anémie, Chlorose, Troubles dyspeptiques prolongés, Hémorragies, Lymphatisme, Scrofule, Neurasthénie, etc.

### Formes et mode d'emploi :

*Liquide* : 4 cuillerées à soupe dans un peu d'eau.

*Granulé* : 4 à 6 cuillerées à café par jour.

Demi-dose pour les enfants.

**ADRIAN et C<sup>ie</sup>**

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## EXTRAIT DE MALT FRANÇAIS DÉJARDIN

Bière de santé extrêmement concentrée additionnée de glycérophosphates.

**Indications.** — Les nourrices défaillantes, les dyspeptiques, les anémiques et les chlorotiques.

Aliment des faibles, des délicats, des épuisés.  
Remède des arthritiques, scrofuleux et lymphatiques.

**Posologie.** — *Pour les adultes* : Pur, un verre à bordeaux un quart d'heure avant les repas et mélangé comme boisson, en mangeant, dans la proportion de 1 pour 3, à une eau naturelle très légèrement alcaline.

*Pour les enfants* : Le quart ou la moitié de ces doses.  
Prix : 3 fr. 30, verre compris.

**Établissements DÉJARDIN**

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## EXTRAIT HAMYD

**Composition.** — Mélange en proportions définies de Hamamelis Gmet, Hydrastis Gmet.

**Propriétés.** — Vaso-constricteur. Décongestif pelvien et vasculaire.

**Indications.** — Tous les troubles de la circulation veineuse. Tous les états congestifs du petit bassin (fibromes, métrites, prostatites, hémorroïdes, varicocèle, etc.). Troubles de la puberté et de la ménopause.

**Posologie.** — 1 cuillerée à café dans un peu d'eau une ou deux fois par jour.

**Laboratoire GMET**

27, Faubourg Montmartre — PARIS (IX<sup>e</sup>).

---

## FACMINE LONGUET

**Agent puissant et facilement maniable de désinfection et désintoxication intestinales.**

**Indications thérapeutiques.** — Entérites glaireuses et muco-membraneuses ; constipation chronique et toutes maladies et troubles fonctionnels reconnaissant pour cause

L'AUTO-INTOXICATION intestinale, principalement dans les maladies de la peau :

Eczémas, Furunculose, Acnès, Urticaires, Herpès, etc.

**Doses et mode d'emploi.** — 3 à 4 comprimés après les repas du matin, de midi et du soir. Chaque comprimé correspond à 0 gr. 30 d'alumine lactique et 0 gr. 05 de phosphate de chaux. Pour les enfants : 1/2 dose.

Les comprimés peuvent être avalés à la façon d'une pilule ou délayés dans un peu d'eau.

Le flacon : 12 francs.

**Laboratoires LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS (XI<sup>e</sup>).

---

## FANGO FISCH ET C<sup>ie</sup>

**Forme.** — Boue volcanique radioactive en poudre.

**Mode d'emploi.** — Application sous forme de cataplasme de 44° à 54°.

**Indications.** — Affections chroniques douloureuses, musculaires, tendineuses, nerveuses, articulaires, gynécologiques, uro-génitales et des organes internes.

**Contre-indications.** — Fièvre et insuffisance fonctionnelle circulatoire.

Prix : Paquet de 1 kg. 500 : 12 fr. 50.

— de 4 kg. 500 : 33 fr. .

Pour hôpitaux : Prix sur demande, par 100, 1 000 kilos et par wagon.

**Laboratoires FISCH et C<sup>ie</sup>**

4, rue d'Illzach — MULHOUSE.

Dépôt à Paris :

49, rue de Paradis — PARIS.

Tél. : Provence 30-32.

## FARINE ALIMENTAIRE « SUCKINE »

**Au pur jus d'orange.**

**Sans cacao. — Sans chocolat.**

**Composition.** — Farines de Céréales sélectionnées non cuites. Sucre. *Pur jus d'orange.*

**Caractéristiques.** — Aliment vitaminé et *rafratchissant.*

**Indications.** — Alimentation normale après sevrage. Particulièrement indiqué dans les troubles du tube digestif, du foie et des reins.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à potage dans la valeur d'une tasse à thé 1/2 de lait froid. Cuisson à feu doux. 3 à 4 minutes d'ébullition à feu doux.

**Paris : Laboratoire COURRET,**  
12, avenue Stéphane-Mallarmé (XVII<sup>e</sup>).

**Province et Exportation : Établiss<sup>ts</sup> ETLANDIS,**  
16, rue Berthelot — LE HAVRE

## FARINE DE MALT HEUDEBERT

**Composition.** — La Farine de malt HEUDEBERT produit de la mouture de l'orge germée, est à la fois riche en diastases et en vitamines.

**Avantages.** — Une bouillie bien maltée est à moitié digérée. La farine de malt doit être employée de préférence aux extraits liquides, pâteux ou secs, dont une partie importante des ferments est détruite pendant la fabrication.

**Indications.** — Troubles de la nutrition et tous désordres du tube digestif amenant un ralentissement de l'assimilation des substances amylacées.

**Mode d'emploi.** — On peut en saupoudrer tous les aliments. Les bouillies ou purées, préparées avec une cuillerée à soupe de farine (de céréales ou de légumineuses), seront maltées, avec une cuillerée à farine de malt, 2 à 3 minutes après cuisson. Laisser un quart d'heure en contact et faire suivre d'une courte ébullition.

**Produits de Régime HEUDEBERT**

85, rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine).

2 et 4, chemin Feuillat — LYON.

## FARINES DE RÉGIME BLOCH

Riches en Phosphates, Blutage minimum, Variées. Pures.

### Farines de Céréales :

Crème de Riz, d'Orge, d'Avoine, de Blé vert.

### Farines de Légumes :

Farine de Pois, de Lentilles, de Haricots.

### Farines de Fruits :

Farine de Châtaignes. Farine de Bananes.

**Semoules** : de Blé, de Riz, d'Avoine.

**Flocons** : d'Avoine, d'orge.

### Rapidoats.

Petits flocons d'Avoine. Cuisson cinq minutes.

### Blokao.

Déjeuner de suralimentation à base de Farine de Bananes et Hydrates de Carbone parfumés au cacao.

### Tapiocas — Fécules — Arrow-Root

**Indications thérapeutiques.** — Alimentation des enfants, régime des Dyspeptiques et Entéritiques, Constipés, Nerveux, Anémiés et Surmenés.

**Laboratoire des Etabl. AUG. BLOCH et FILS.**

à TOMBLAINE, près NANCY (Meurthe-et-Moselle).

Maison fondée en 1811.

## FARINE LACTÉE DIASTASÉE

### « SALVY »

**Composition.** — Produit français : farine de céréales sélectionnées, additionnée de sucre et de lait, effectivement diastasée sous un contrôle scientifique rigoureux.

**Dose.** — De 1 cuillerée à café à 2 cuillerées à soupe par prise, suivant l'âge.

**Propriétés.** — Aliment diastasé, prédigéré, homogène, entièrement digestible et assimilable.

**Indications.** — Aliment spécial du premier âge, avant, pendant et après le sevrage.

**Préparation.** — La préparation des bouillies diastasées ne comporte aucune précaution spéciale : délayer soigneusement, cuire à feu doux pendant 8 à 10 minutes, en remuant, faire bouillir et ajouter la proportion de lait convenable selon l'âge et l'état digestif de l'enfant.

Prix : 7 fr. 50 la boîte.

### Farine SALVY

4, rue Lambrechts — COURBEVOIE (Seine).

## FÉLAMINE « SANDOZ »

Association de l'acide cholique cristallisé pur et de l'hexaméthylène tétramine.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés à 0 gr. 30.

**Propriétés thérapeutiques.** — Cholagogue, désinfectant des voies biliaires, dissolvant de la cholestérine.

**Indications.** — Cholélithiase et cholécystites, ictères, constipation par hypocholie, insuffisances hépatiques.

**Posologie.** — Après les repas, avaler les dragées sans les mâcher.

1° Cas sub-aigus : 2 à 6 comprimés : 2° Cas chroniques : 3 à 4 comprimés par jour.

Traitement : 15 jours par mois et pendant plusieurs mois de suite (cholélithiase).

### PRODUITS SANDOZ

3 et 5, rue de Metz — PARIS (X<sup>e</sup>).

Dépôt général et vente :

**USINE des PHARMACIENS de FRANCE**

129, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## FELICOL

**Médicament spécifique des Colibacilluries.**

**Composition.** — Le « Felicol » est une solution huileuse au quart d'Hexylrésorcine.

**Présentation.** — Capsules de 0 gr. 60 contenant chacune 0 gr. 15 de médicament actif.

**Dose et mode d'emploi.** — Deux capsules *après chaque repas*, en augmentant progressivement la dose jusqu'à 4 capsules dans les mêmes conditions. Ne jamais absorber le Felicol à jeun.

**Prix :** Le boîte de 60 capsules : 60 francs.

**Etablissements T. LECLERO**

**D<sup>r</sup> P. LEMELAND**, pharmacien

10, rue Vignon — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## FÉMINADÈNE

Synergie d'extraits des glandes génitales, magnésium (oxyde de), phénylethylmalonylurée.

**Indications :** *Nervosité féminine*, dans toutes ses manifestations, à toutes les périodes de la vie génitale.

Anxiété, émotivité, dépression, subagitation, insomnies, etc.

Troubles à la puberté, à la ménopause, après castration, après couches.

Malaises des femmes célibataires, veuves, stériles.

**Doses :** 4 dragées par jour, en moyenne.

*Le flacon :* 20 francs.

**Laboratoires du FÉMINADÈNE**

120, rue Lecourbe — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

## FENUGRÈNE

Poudre de Fenugrec déshuillée et désodorisée.

**Propriétés.** — Stimulant puissant de l'appétit, Agent d'augmentation de poids, Producteur d'énergie et de forces.

**Indications.** — Tous les cas d'amaigrissement, Maigreur habituelle, Amaigrissement au cours ou à la suite de maladies aiguës ou chroniques, Amaigrissement chez les nerveux, Stimulant de la nutrition et de la lactation chez les femmes enceintes et les nourrices. Donne des couleurs, de l'embonpoint et des forces aux enfants débiles.

Le Fenugrec donne de très bons résultats lorsqu'il est seul et n'est pas mélangé à d'autres produits.

**Mode d'emploi.** — Le Fenugrène se présente sous forme de cachets, de dragées et de granulé.

Dose journalière moyenne : 4 cachets ou dragées pour les adultes. Elixir : 3 cuillerées à soupe pour adultes. Deux à quatre cuillerées à café de granulé pour les enfants.

**Laboratoires de la LIPOSEPTINE**

2, place des Vosges — PARIS.

## FER BRAVAIS

### Nouvelle Formule.

**Formule.** — Ions de Fer catalysé actifs

**Composition.** — Solution colloïdale de Fer à 30 p. 100 et de Manganèse catalyseur à 0,50 p. 1 000.

**Propriétés thérapeutiques.** — Fer pur (infiniment divisé, puisque colloïdal), accompagné de son catalyseur naturel, le Manganèse (mêmes proportions que dans le sang); donc Fer assimilable sans nécessiter de réactions internes.

**Indications.** — Appauvrissement du Sang et toutes ses conséquences : Anémie, Chlorose, Débilité, Dysménorrhée, Fièvre des pays chauds. Formation de la jeune fille, Incontinence d'urine, Leucorrhée, Neurasthénie, etc.

**Dose.** — X à XX gouttes (I goutte par année d'âge) à chaque repas dans de l'eau sucrée.

**Examen du sang**  
**avant et après le traitement**  
**par le Fer Bravais.**  
 (Moyenne de très nombreux cas).

	Avant.	Après.	Augmen- tation.	Diminution.
Globules roug.	3.500.000	4.500.000	30 %	
Globules bl...	7.150	6.500		10 %
Hémoglobine.	60 %	85 %	40 %	

Prix : 20 fr. le flacon pour un mois.  
 14 fr. le 1/2 flacon pour 15 jours.

**Laboratoires**

**C<sup>te</sup> René de GRAUWE,   **  
**Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,**  
**16, rue de Rocroy — PARIS. Usine à St-Denis**



## FER LARCADE

**Composition.** — Combinaison d'hydrate ferrique et d'acide organique, associée au manganèse, qui renforce son action par l'apport d'oxygène et aux principes toni-aromatiques des oranges amères qui en masquent la saveur styptique.

**Forme.** — Liqueur d'un goût agréable et d'une très faible teneur en alcool.

**Action.** — Favorise la formation des hématies, augmente leur richesse en hémoglobine.

**Indications.** — Spécifique de tous les états anémiques, des cachexies chroniques.

**Mode d'emploi.** — Un verre à liqueur (2 cuillerées à soupe) au commencement des deux repas.

Prix : la bouteille, 22 fr.  
(traitement d'une quinzaine).

La demi-bouteille : 13 fr.

Laboratoire, 151, rue Lafayette — PARIS.

**P. ROUX, Pharmacien,**  
**Ex-interne des hôpitaux.**

---

## FERMENT PUR DE RAISIN

du Prof. Jacquemin.

(Exposition Pasteur, Strasbourg 1923 —  
Hors Concours, Membre du Jury.)

**Immunisation et Désintoxication Générale de l'organisme.**

Source de *Diastases* et de *Vitamines*.

**Indications physiologiques.** — Dépuratif et anti-staphylococcique. Affections gastro-intestinales. Stimulant de la Nutrition et de la Croissance. Régénérateur dermique et épidermique.

**Thérapeutique.** — Furonculose, Maladies de peau, Dyspepsie, Entérite, Diabète, Gripes, Rhumatismes, Insuffisances endocriniennes et nutrition.

**Posologie.** — 1 flacon pour une cure de 3 semaines à prendre 1/2 heure avant les repas.

Littérature et échantillons à :

**INSTITUT JACQUEMIN**

à MALZEVILLE-NANCY (Meurthe-et-Moselle).

## FER OVARINE VITALIS

contre anémie et insuffisance ovarienne.

**Composition.** — Pilules composées, à base d'extrait d'ovaire, de fer et de manganèse.

**Propriétés thérapeutiques.** — Excitant de la sécrétion interne de l'ovaire déficient, régénérateur des globules rouges.

**Indications.** — Anémie, Puberté, Ménopause, Asthénie nerveuse, Obésité, Dysménorrhée.

2 pilules avant les 2 principaux repas, 20 jours par mois.

*Echantillons et Notice documentaire.  
sur demande.*

Prix de la boîte : 14 fr. 50.

**Laboratoire  
de la FER-OVARINE VITALIS**

38, boulevard de Charonne — PARIS.

BEAULIEU, pharmacien,  
ancien interne des hôpitaux.

## FEROXAL BUISSON

Granulé de protoxalate de fer  
(0 gr. 10 par cuillerée à café)  
associé à des phosphates alcalins.

**Propriétés thérapeutiques.** — Hyperglobulise et minéralise. Tolérance absolue par le tube digestif. Action rapide, ne constipe pas, ne noircit pas les dents.

**Indications.** — Celles des ferrugineux, Anémies diverses, Prétuberculose, Chlorose, Anémie des jeunes enfants, Grossesse, Allaitement, Convalescence.

**Dose.** — Une à deux cuillerées à café à chaque repas  
Prix de vente au public : 17 fr. le flacon.  
Prix médical : 11 fr. 50 le flacon.

**Société Générale  
d'Applications Thérapeutiques  
THERAPLIX**

Pierre BRETEAU, Pharmacien  
Membre de l'Académie de Médecine  
157, rue de Sèvres — PARIS (XV°).

## FERROCODILE ET FERRICODILE

Cacodylate Ferreux — Cacodylate Ferrique.

**Indications thérapeutiques.** — Spécifiques de l'Anémie et de la Chlorose, Malaria, Anémie palustre, etc. Tous les avantages des sels ferreux et ceux de l'arsenic organique. Le Cacodylate Ferrique est le seul sel de fer agissant très bien en injections hypodermiques, qui, faites intramusculaires, ne sont pas douloureuses.

Préparations réellement supérieures dans les infections des pays chauds.

**Doses et mode d'emploi.** — *Ferrocodile* : Pilules à 0,025 : 4 par jour aux repas.

*Ferricodile* : Ampoules à 0,05. Une injection par jour pendant huit jours : repos un temps égal, reprise en alternant jusqu'à guérison.

Prix de vente au public : Pilules, 11 fr. 25 ;  
Ampoules, 12 fr. 50.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> M. LEPRINCE**

62, rue de la Tour — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

---

## FERROPHYTINE CIBA

Phosphate de fer colloïdal.

Sel ferrique neutre de l'acide inosito-phosphorique, contenant 7,50 p. 100 de fer et 6 p. 100 de phosphore, ces deux éléments sous forme très assimilable. — Stimulant de l'hématopoïèse et excitant des fonctions cellulaires, c'est le médicament type des états anémiques et chloro-anémiques accompagnés de dénutrition.

Médicament toujours bien toléré.

**Indications.** — Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Scrofuleuse, Croissance détectueuse.

**Doses.** — *Adultes* : 3 cachets ou 3 cuillerées à café de granulé. — *Enfants* : 1/2 à 2 cuillerées à café de granulé.

La boîte de 30 cachets : 14 francs.

Le flacon de granulé : 16 francs.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**

109-113, boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## FIXASE

**Reminéralisateur effectif.**

**Présentation.** — Poudre insoluble agréable à boire dans l'eau.

### Composition :

Chaux, Magnésie, Phosphate, Fluor, Silice  
*sous forme utilisable.*

### Posologie :

*Adultes et enfants* : 1 cuillerée à café après les 2 repas. *Très jeunes enfants et bébés* : 1/2 ou 1/4 de cuillerée à café. *Avant le sevrage* : 1/4 de cuillerée à café dans un peu d'eau bouillie tiède.

### Indications :

**Enfants, Adolescents, Bacillaires, Prédisposés, Syphilitiques, Surmenés, Phosphaturiques, Affaiblis, Femmes enceintes, Nourrices.**

Prix : 12 francs.

## FIXASE IRRADIÉE

Titrée physiologiquement à 400 unités antirachitiques par *Cachet* ou cuillerée à café de *Poudre*.

*Poudre* : Même posologie que la FIXASE.

*Cachets* : *Adultes et Adolescents* : 3 par jour.

*Enfants* : 1 à 2 par jour.

Prix :

*Poudre* : 18 francs.

*Cachets* : 20 francs.

**Laboratoire PARET**

22, rue Guibal — MARSEILLE.

## FLAVUROL

Nouvel antiseptique puissant.

Traitement des vaginites, métrites, urétrites, cystites, blennorragie chronique, gouttemilitaire, prostatite, pyélonéphrites.

La boîte de 6 ovules. Prix public : 20 fr.

Le flacon de solution. Prix public : 18 fr.

La boîte de 6 crayons. Prix public : 18 fr.

La boîte de 6 bougies. Prix public : 18 fr.

### Laboratoires STENE

2, place des Vosges — PARIS.

---

## FLORHÉPATINE

Calmant et antispasmodique, puissant diurétique sans toxique, à base d'extraits végétaux.

**Composition.** — Ether amyvalérianique, Boldo, Artichaut, Arenaria, Uva Ursi Buchu, Corydalis, Fabiana, Genièvre, Menthe dans solution alcaline glycerinée.

**Indications.** — Coliques hépatiques et néphrétiques, Gastralgies, Règles douloureuses, Etats d'anxiété (fausse angine de poitrine, tachycardie).

**Mode d'emploi.** — Crises légères : 1 à 4 verres à madère par 24 heures, se prend pure ou additionnée d'eau simple ou minérale avant ou après les repas.

Crises aiguës : Il est indispensable de prendre un verre à madère tous les quarts d'heure jusqu'à cessation de la douleur.

*Enfants* : 1/2 doses.

Flacon de 500 cc. : 16 fr. 75.

### Laboratoires RICHER

7, Avenue Marceau — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Tél. : Passy 76-09.

## FLUDIOSE

### à l'Iodure de Manganèse.

**Composition.** — Iode, Tanin, Lactophosphate de chaux, Fer, Iodure de manganèse, Méthylarsinate de soude, Vanille et Cacao.

**Forme pharmaceutique.** — Sirop de goût très agréable, Infermentescible, ne constipe pas.

**Indications.** — Lymphatisme, Rachitisme, Pré-tuberculose, Scrofulose, Mal de Pott, Cyphose, Lordose, Scoliose, Chétivité, Troubles de la croissance, Paresse, Glandes, Ganglions, Impétigo, Engelures.

**Mode d'emploi et doses.** — En plus des autres éléments constitutifs, chaque cuillerée à café contient : 1 cg. 25 d'Iodure de Manganèse pur et 2 mmgr. 5 de Méthylarsinate de soude.

*Enfants* de 1 à 3 ans : 2 cuillerées à café par jour.

3 à 6 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.

6 à 12 ans : 2 cuillerées à potage par jour.

12 à 16 ans : 3 cuillerées à potage par jour.

Se prend pure ou dans un peu d'eau avant ou pendant les repas.

La *Fludiose* est le plus puissant succédané de l'huile de Foie de Morue.

*Par son Iodure de Manganèse, la Fludiose dépasse toutes les préparations iodotanniques.*

**Prescrire.** — *Fludiose* : 1 flacon.

Prix, le flacon : 15 francs.

---

**Laboratoire de MÉDECINE  
EXPÉRIMENTALE**

1 et 3, rue de Malherbe — BEAUVAIS (Oise).  
Téléph. : 4-84.

Echantillons et littératures à la disposition  
de MM. les Docteurs.

## FLUOBYL

### Granulé

Fluidifiant et excitant de la sécrétion biliaire.

Le *Fluobyl*, dépourvu de toute action irritante sur l'épithélium intestinal, provoque une chasse biliaire importante sans effet drastique fâcheux.

Granulé de goût agréable à base de *Lactosérum*, *Citrate de magnésie*, *Peptone de fibrine sèche*.

Le *Fluobyl* réalise le « drainage » des voies biliaires en stimulant le flux de la bile. Il favorise la migration du bol fécal, en rendant ainsi à l'intestin son excitant normal. Il exerce également une action excito-sécrétoire sur le parenchyme rénal, provoquant la diurèse et l'accroissement de la sécrétion des sels et de l'urée.

### Indications.

*Maladies du Foie* : Ictères, Cholécystites, Coliques hépatiques.

*Dyspepsies réflexes* : Nausées, vertiges, constipation d'origine hépatique.

*Maladies rénales*.

**Posologie.** — 1 à 2 cuillerées à soupe dans un demi-verre d'eau tiède le matin à jeun ; se coucher 10 minutes sur le côté droit ; attendre une demi-heure avant de prendre le petit déjeuner.

Le traitement doit être suivi environ deux semaines par mois.

**Laboratoires LICARDY**

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS.

Téléph. : Maillot 17-75.

## FLUODYLE

**Forme : Ampoules.**

Chaque ampoule renferme :

Fluorure de sodium .....	0,001
Hypophosphite de manganèse.....	0,001
Cacodylate de soude.....	0,15
Sulfate de strychnine.....	0,002
Sérum physiologique.....	2 cmc.

**Mode d'emploi.** — Pendant 10 jours consécutifs, faire une injection sous-cutanée. Repos de 10 jours.

Puis recommencer une nouvelle série de piqûres. La boîte de 10 ampoules : 12 fr.

**Forme : Granulé.**

Contient tous les minéraux indispensables à l'organisme. Chaux, Phosphore, Fer, Manganèse, Fluor, Silicium. Zinc, Soufre et Magnésie.

**Doses.** — 1 ou 2 cuillerées à café, 3 fois par jour.

**Indications.** — Déminéralisation, Convalescence, Affections pulmonaires, Anémie, Surmenage.

La Boîte : 12 fr. plus impôt 0.75

**Établissements SABATIER**

**A. EMPTOZ, pharmacien.**

10, rue Pierre-Ducreux — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## FLUOSALYL BEAUGOURDON

**Formule.** — Solution de fluorures alcalins préparée en partant de l'acide fluorhydrique, soumise à l'action de dérivés aromatiques dans des conditions spéciales.

**Propriétés.** — Détruit le tartre dentaire. Antiseptique buccal de premier ordre, ne coagulant pas l'albumine et ne détruisant pas les cellules vivantes.

**Usages.** — Dans toutes les affections de la bouche et particulièrement dans la *pyorrhée alvéolo-dentaire* à tous les degrés. Dans les gingivites mercurielles ou bismuthiques les accidents ont un arrêt si rapide que le traitement peut être repris et continué deux ou trois jours après que le FLUOSALYL aura été employé.

**Emploi.** — A la dose d'une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau tiède en bains de bouche de cinq minutes.

Dans les cas aigus et en cas d'abcès les séances de bains de bouche devront être répétées 4 à 5 fois par jour.

Employé pour les pulvérisations suivant la méthode Joyeux.

Pour le détartrage mécanique on emploie FLUOSALYL'S PASTE,

**Laboratoire de FLUOSALYL**

M. BEAUGOURDON, pharmacien,  
43, avenue Kléber — PARIS (XVI<sup>e</sup>).



## FLUVEINOSE MAUCHANT

(Gouttes.)

Régulateur circulatoire.

**Principes actifs.** — Sulfate double de benzyle et de sodium, chlorure de magnésium. Extraits fluides : Yohimbehe, marron d'Inde, hamamélis, séneçon, armoise.

**Indications.** — Troubles propres de la ménopause, aménorrhée, dysménorrhée, métrorragies, hémorroïdes, hypertension artérielle, tendance aux néoplasies, affaiblissement provoqué par l'âge.

**Dose.** — XXV gouttes 3 fois par jour.

**Laboratoire MAUCHANT.**

14, rue de Birague — PARIS.

## FLUXINE (gouttes)

XX gouttes =

0,01 centigr. d'intrait de marron d'Inde Dausse.

IV gouttes d'alcoolat concentré d'anémone.

IV gouttes de teinture de noix vomique.

en combinaison inaltérable, radio-activée par les rayons ultra-violets.

**Propriétés.** — Vasoconstricteur énergique. Tonique de la paroi vasculaire, stimulant ovarien, sédatif utérin.

**Indications.** — Stases sanguines, inflammations de l'utérus et du bassin, inflammations veineuses : métrorragies, dysménorrhée, aménorrhée, hémorragies du retour d'âge, règles douloureuses, varices, hémorroïdes, phlébite, ulcères variqueux, etc.

**Mode d'emploi.** — X gouttes à la fois dans un peu d'eau sucrée ou non, dose à renouveler 2 à 3 fois par jour avant les repas.

Prix au public : 15 francs pour 1 mois.

**Laboratoires FLUXINE**

**J. BONTHOUX**, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

**FOLESTRINE GRÉMY**

Hormone folliculaire  
physiologiquement titrée.

Traitement des aménorrhées de la puberté, de l'âge adulte et de la ménopause, et des hypoplasies utérines.

**Formule.**

Hormone folliculaire ... 10 unités-rat.  
Huile d'olive purifiée .. 1 cc.  
pour une ampoule injectable.

**Posologie.** — Pendant la quinzaine qui précède les règles, ou la date présumée des règles : injecter intramusculaire, tous les jours ou tous les deux jours, 1 cc. à 2 cc. de Folestrine.

Continuer le traitement, la quinzaine écoulée par l'ingestion d'Ocréine (4 à 6 pilules par jour. Voir *Ocréine*).

Ne jamais associer Folestrine et Ocréine, ces deux hormones se neutralisant.

**Indications.** — Aménorrhées de la puberté, de l'âge adulte et de la ménopause. Hypoplasies utérines. Diabète ovarien. Sclérodermie.

14, rue de Clichy — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## FOLLICORMONE BUCCALE HINGLAIS

Première préparation de folliculine par voie buccale.

Activité buccale contrôlée  
(Acad. Méd., 27 Janvier 1931).

**Composition.** — Solution huileuse, concentrée, d'hormone folliculaire en capsules de gélatine.

40 capsules = 120 unités-rat.

**Mode d'emploi.** — Trois doses par jour à intervalles de quatre heures au minimum, en augmentant progressivement les doses :

### Traitement type :

40 capsules réparties sur 7 jours.

1 <sup>er</sup> jour : 1+1+1	5 <sup>e</sup> jour : 2+2+2
2 <sup>e</sup> jour : 1+1+1	6 <sup>e</sup> jour : 3+3+3
3 <sup>e</sup> jour : 1+1+2	7 <sup>e</sup> jour : 3+3+3
4 <sup>e</sup> jour : 2+2+2	

Le traitement peut être intensifié ou réduit suivant les nécessités.

**Indications.** — Toutes déficiences ovariennes :

*Hypoménorrhée, dysménorrhée :* Une série dans la semaine précédant les règles.

*Puberté, Ménopause ; Castration chirurgicale ou radiothérapique ; Aménorrhées,* une série tous les 28 jours.

*Cas spéciaux* de stérilité, sclérodermie, diabète ovarien, épilepsie menstruelle, etc...

### Produits HINGLAIS

30, rue de Miromesnil — PARIS.

Tél. : Elysées 37-14.

## FOLLICULINE CHOAY

**Nature.** — Extrait purifié retiré du liquide folliculaire ovarien et considéré comme l' « hormone sexuelle femelle ».

**Indications.** — Hypoplasie utérine. — Infantilisme génital. — Insuffisance ovarienne. — Aménorrhée. — Troubles de la ménopause naturelle ou opératoire.

**Forme pharmaceutique.** — Ampoules de 2 cc., contenant, en solution huileuse neutre et stérilisée, 10 unités-rat (40 unités-souris) de folliculine.

**Posologie.** — 3 à 12 injections intra-musculaires, suivant le cas, de 2 jours en 2 jours.

Prix : 40 fr. la boîte de 6 ampoules.

**Laboratoire CHOAY**

48, rue Théophile-Gautier — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

---

## FOLLICULINE CRINEX

Active par voie buccale.

**Composition.** — Sol. alcool. d'extrait ovarien total désalbuminé. Contient, outre folliculine, toutes les hormones ovariennes.

V gouttes (50 par cc.) = 3 unités physiologiques.

**Indications.** — Tous les cas d'insuffisance ou de suppression de la fonction ovarienne. Troubles de la **puberté, menstruation, ménopause, castration, obésité.**

**Avantages.** — *Aussi active par voie buccale que par voie sous-cutanée.* Provient exclusivement d'ovaires frais d'animaux jeunes. Garantie exempte d'extrait d'urine. Prix modéré. Traitement à la portée de tous.

**Posologie.** — Prendre pendant les 20 jours qui suivent les règles en 2 ou 3 fois par jour 1/2 heure avant les repas ou 2 heures après :

*Insuffisances légères* (puberté, oligoménorrhée, castration stabilisée) de V à XV gouttes.

*Insuffisances moyennes* (dysménorrhée, aménorrhée, ménopause) de XV à XL gouttes par jour,

*Insuffisances graves* (castration ancienne) de XL à XC gouttes par jour.

Prix : le flacon de 240 unités (400 gouttes) 18 fr.

### Ampoules :

**Composition.** — Sol. aqueuse isotonique, désalbuminée, indolore :

20 unités par ampoules.

**Indication.** — Dans les aménorrhées, injecter le contenu d'une ou de plusieurs ampoules en injection intramusculaire tous les 2 jours.

Prix : la boîte de 12 ampoules : 25 francs.

**Laboratoire des Produits UVÉ**

18, rue Saint-Amand — PARIS (XV°).

## FONDANT DE COLA DAUSSE

(Saccharolé-Fondant) titré à 0 gr. 50 d'Extrait de Cola stabilisé par dose (ou 5 gr. de saccharolé).

*Toni-nervin* et *toni-musculaire* présentant l'activité entière de la noix de cola fraîche (stabilisée par le procédé **PERROT-GORIS**).

**Indications.** — *Adynamie, asthénie, surmenage physique et intellectuel, convalescence des maladies infectieuses.*

**Posologie.** — *Adultes* : 1 à 4 cuillerées à café par jour en moyenne et davantage si nécessaire. En cas d'effort à exécuter, ingérer la cola une heure au préalable et répéter la dose si l'effort doit durer.

## FONDANT IODOTANNIQUE DAUSSE

Granulé à base de *Tormentillo-tanin*, tanin physiologique essentiellement assimilable. Remplace avantageusement l'huile de foie de morue et les préparations antiscorbutiques.

**Indications.** — *Lymphatisme, scrofule, arthritisme, emphys. me, rhumatismes, obésité, eczéma, impétigo.*

**Posologie.** — La teneur en iode dissimulé du Fondant iodotannique étant la même que celle du sirop iodotannique du Codex, sa posologie est la même.

*Adultes* : 5 à 6 cuillerées à café par jour.

*Enfants* : jusqu'à 15 mois : 1/2 à 1 cuillerée à café par jour ; 3 ans : 1 à 2 cuillerées à café par jour ; 5 ans : 2 à 3 cuillerées à café par jour ; 12 ans : 4 à 5 cuillerées à café par jour.

## FONDANT MANGANO-FERREUX

Puissant excitant cytoplasmique et nucléaire par le *Manganèse*, vecteur d'oxygène et stimulant de l'hématopoïèse par le *fer*, ce saccharolé active les phénomènes de nutrition et favorise la régénération du sang.

**Indications.** — Tous les états anémiques : *anémie, chlorose, convalescences, pertes anguines.*

**Posologie.** — *Adultes* : 1 à 3 cuillerées à café par jour. *Enfants* : de 1/2 à 2 cuillerées à café par jour suivant l'âge.

**Laboratoires DAUSSE**

4, rue Aubriot — PARIS (VI°).

## FORCIVAL

Aliment nutritif et fortifiant.

**Composition.** — Concentration des meilleurs aliments naturels : farines de céréales et de légumineuses maltées, sucre, cacao. Aucun médicament surajouté.

**Forme.** — Farine d'un goût très agréable.

**Mode d'emploi.** — Bouillie délicieuse à l'eau ou au lait.

**Propriétés.** — Aliment léger et substantiel, reconstituant, réminéralisateur, d'une grande digestibilité.

**Indications.** — Suralimentation chez les enfants, les adultes et les vieillards.

La boîte de 250 gr. : 6 fr.

La boîte de 1 kg. : 20 fr.

**Laboratoires du FORCIVAL**

6, rue Bridaine — PARIS.

---

## FORIOD

Tétra-iodo-phénol-phtaléinate de Sodium.  
Matière colorante, opaque aux rayons X,  
s'éliminant par les voies biliaires.

**Indications.** — **Cholécystographie, Examen radiologique de la région vésiculo-duodénale.**

**Posologie et mode d'emploi.** — Employer l'une des méthodes suivantes :

1° *Injection intra-veineuse* d'une solution aqueuse titrée à 0 gr. 04 par kilog. de poids.

2° *Prise par voie buccale* de 15 pilules, pour un adulte de poids moyen.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**

86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## FORMINE ADRIAN

**Composition.** — Hexaméthylène tétramine rigoureusement pure.

**Mode d'action.** — Antiseptique urinaire, hépatique et intestinal.

**Indications.** — Néphrites, cystites, prostatites, urétrites, phosphaturies, calculs. — Hépatites, cholécystites, angiocholécystites, fermentations intestinales, entérite chronique, etc...

### Formes.

Comprimés : dosés à 50 centigr., deux à quatre par jour.

Ampoules : dosées à 0 gr. 5 et 1 gr. une à deux par jour.

Sel cristallisé : flacons de 50 gr., 100 gr., 250 gr. pour formules.

**ADRIAN et Cie**

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## FORMINT MERMINOD

**Principe.** — Aldéhyde formique polymérisé.

**Propriétés.** — Associé aux antiseptiques déjà connus, l'aldéhyde formique polymérisé chimiquement pur a un pouvoir microbicide extrêmement puissant, le Formint remplace ainsi les meilleurs gargarismes, réalise la désinfection totale de la cavité laryngo-pharyngée et protège l'entrée des voies respiratoires.

**Forme.** — Tube de 20 comprimés à 1 gr.  
Echantillons sur demande :

**Laboratoires MERMINOD et C<sup>o</sup>**

**Ad. BUISSON, Pharmacien**

49, rue de Paradis — PARIS (X<sup>e</sup>).

Tél. : Provence 30-32.



## FORMOCARBINE

### Composition :

Association de Charbon Animal pur, ultradivisé, absorbant privé de Cyanogène, à la Formine (Hexaméthylènetétramine cristallisée).

### Forme pharmaceutique :

Granulé friable, aromatisé, agréable au goût, avec ou sans addition de Benzonaphtol :

Formocarbine simple.

Formocarbine naphtolée.

Les granulés de Formocarbine ne sont pas durs à la dent, fondent très bien dans la bouche, se désagrègent instantanément dans l'eau.

### Propriétés :

Antiseptique interne de choix. Pouvoir absorbant et adsorbant considérable.

### Indications thérapeutiques :

*Infections gastro-intestinales.* — Dyspepsie, Fermentations, Entérites, Flatulences, Putréfactions intestinales; Stase intestinale, Auto-intoxication, Maladies infectieuses, Colibacillose.

*Infections biliaires.* — Désinfecte par la Formine la Vésicule et les canaux, en même temps que son Charbon animal absorbe les bactéries intestinales montant au foie par le veine-porte en ses diverses origines.

Angiocholites, Angiocholécystites, Lithiase biliaire, Tuberculose des voies biliaires, Hépatisme.

*Infections urinaires.* — Toutes les infections urinaires, rénales, vésicales, cystite, Pyélonéphrites, Urétérites, Prostatites.

### Posologie :

1 à 2 cuillerées à café après les repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau. Par demi-cuillerées à café chez les enfants.

### Prescrire :

Formocarbine simple ou Formocarbine naphtolée :  
1 flacon.

Il est à remarquer que la Forme Naphtolée ne provoque jamais de constipation.

Prix, le flacon : 12 francs.

**Laboratoire de MÉDECINE  
EXPÉRIMENTALE**

1 et 3, rue Malherbe — BEAUVAIS (Oise). Tél. : 4.84.

Echantillons et littérature à la disposition de  
MM. les Docteurs.

## FORMOCARBOS

**Composition.** — Charbon animal chimiquement pur (Carbos). Urotropine. Peptones de poisson, d'œuf, de viande, de lait et sulfate de magnésie.

**Forme.** — Granulé rond anisé.

**Indications.** — Troubles digestifs d'origine hépatique. Congestion du foie. Insuffisance hépatique. Cholécystite. Colibacillose. Migraines. Prurit. Rougeur de la face. Somnolence. Fermentations et en général *toutes les manifestations anaphylactiques.*

**Posologie.** — *Adultes* : 1 ou 2 cuillerées à café de préférence 1/2 heure avant chaque repas. *Enfants* : 1/2 ou 1 cuillerée à café suivant l'âge.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires E. MILLET**  
RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).

## FORMOCITRINE

**Composition.** — Hexaméthylène-tétramine à l'état pur et citrate acide de soude.

**Forme.** — Granulé effervescent soluble extemporanément.

**Propriétés.** — Antiseptique interne à réaction acide, indispensable à la transformation en formol de l'hexaméthylène-tétramine.

Eupeptique, Cholagogue.

Antivisqueux et anti-agglutinant (ion citrique) ; prévient les coagulations et les concrétions pathologiques.

Antispasmodique vasculaire (citrate), par action sur le système nerveux sympathique.

**Indications.** — *Reins et Voies urinaires* (Urétrites, Cystites, Pyélonéphrites, Lithiases).

*Foie et Voies biliaires* (Insuffisance, Ictères, Cholécystites, Lithiases).

*Sang et Vaisseaux* (Hyperviscosité, Artérites, Phlébites, Hyposphxyxie).

*Maladies infectieuses* (Broncho-pneumonie, Fièvre typhoïde).

*Accidents post-opératoires* (Thromboses, Embolies).

**Doses.** — 1 cuill. à café de granulé contient 0 gr. 25 d'hexaméthylène-tétramine et 1 gr. 50 de citrate de soude.

2 à 4 cuill. à café en solution étendue.

4 à 6 cuill. à café et plus dans les maladies des vaisseaux.

**Laboratoires du Dr BAREY**  
37, avenue Jules-Coutant — IVRY-SUR-SEINE.

## **FORNOSE**

La plus fondante des pommades nasales.  
Novocaïne, Adrénaline, Baume du Pérou,  
Ichtyol, Huile de vaseline et Lanovase-  
line geraniée, Désodorisante, Non irri-  
tante.

Tous états congestifs du nez et de la gorge.  
Soins préopératoires et post-opératoires.  
Antisepsie respiratoire, Ozène.

Etaler soigneusement à l'intérieur de chaque  
narine gros comme un pois de pommade  
matin et soir.

Toutes Pharmacies, le tube : 6 fr.

Échantillons :

**Laboratoire CHAVIALLE**

70, Grande-Rue — SÈVRES (S.-et-O.).

---

## FORTOSSAN CIBA

Phytine spéciale pour les nourrissons.

Sel sodique neutre de l'acide inosito-diphosphorique  
(principe phospho-organique végétal).

Médicament phosphoré très assimilable, spécialement préparé pour la pratique infantile.

**Indications.** — Rachitisme, ostéomalacie, retard du développement et de la dentition, scrofule et tuberculose infantile. Convalescence des maladies infectieuses, etc. )

**Doses.** — Poudre s'administrant avec le lait du biberon ou les bouillies, à la dose de 1 à 3 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

La boîte : 8 fr. 50.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**  
109-113, boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## FORTOSSAN IRRADIÉ

Même composition que le Fortossan ordinaire mais avec, en plus, une adjonction d'ergostérine irradiée, correspondant à une dose quotidienne de 40 à 200 unités cliniques.

Le Fortossan irradié est soumis à un contrôle chimique et biologique lui assurant une activité maximum constante. L'ergostérine irradiée s'y trouve sous une forme protégée, absolument inoffensive et, unie à l'élément phosphoré végétal, elle donne son maximum d'action thérapeutique.

**Indications.** — Celles du Fortossan chez l'enfant et chez l'adulte : Tuberculose, Prétuberculose, Etats de dépression liés à une insuffisante assimilation de la chaux et du phosphore, Fractures, etc.

**Doses.** — Chez l'enfant : 1 à 3 cuillerées à café par jour ; chez l'adulte : 1 à 2 cuillerées à soupe par jour.

La boîte : 12 francs.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**  
109-113, boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## FORXOL

**Forme.** — Elixir.

**Composition.** — Acide glycérophosphorique, Nucleïnates de Manganèse, de Fe et de Ca., Méthylarsinate de soude.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Reconstituant complet pour tout organisme, Dynamogénique. Stimulant hématogène, Antidéperditeur, Régulateur des échanges cellulaires.

**Indications.** — Etats de dépression. — Faiblesse générale. — Troubles de croissance et de formation. — Neurasthénie. — Anémie. — Débilité sénile. — Convalescences.

**Mode d'emploi.** — Une à deux cuillerées à café, suivant l'âge, au milieu des deux principaux repas, dans un peu d'eau, de vin ou liquide quelconque autre que le lait.

Le flacon : 14 francs. (En France.)

**Laboratoires A. BAILLY et C<sup>ie</sup>**  
15 et 17, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## FOSFOXYL CARRON

### PHOSPHORE COLLOIDAL

A l'état de terpénol hypophosphite de sodium.

**Formes.** — Fosfoxyll *sirop* : sirop opalin anisé, goût agréable.

Fosfoxyll *pilules* : petits grains couleur de jade, très faciles à avaler.

Fosfoxyll *liqueur* : liquide opalin glycérimé menthé spécialement destiné aux diabétiques.

**Dosage.** — 10 cc. de formes liquides (soit une cuillerée à dessert) ou 4 pilules contiennent 0 gr. 10 de colloïde chimique exprimé en terpénol hypophosphite sodique et équivalent à 13 milligrammes de phosphore blanc.

**Propriétés thérapeutiques.** — Spécifique de la dépression nerveuse et mentale, stimulant des glandes endocrines et tonique du système nerveux central. Modificateur de la nutrition et de l'assimilation. Apéritif, Créateur d'énergie physique et mentale. Fixateur de l'ion calcium.

**Indications.** — Maladies du système nerveux, maladies de la nutrition. Dépressions nerveuses et mentales, Impuissance, Surmenage, Neurasthénie, Psychasthénies, Convalescence, Anémie, Tuberculose, Diabète, Rachitisme, Arthritisme, Rhumatisme, Fatigues cérébrales ou physiques exagérées, Périodes d'entraînement, de préparation à des examens ou concours.

**Contre-indication.** — Etat congestif aigu.

**Mode d'emploi.** — Dose moyenne : une cuillerée à dessert (10 cmc.) de liqueur ou sirop, étendue d'eau ou d'un liquide froid quelconque, ou 4 pilules, avant les deux principaux repas. Si le malade est très excité ou dans le cas d'insomnie nerveuse, commencer par une cuillerée à café ou 2 pilules.

Dans le cas de dépression accentuée, doubler la dose moyenne.

*Prescrire :*

**Sirop de FOSFOXYL CARRON** 14 fr.

**ou Pilules de FOSFOXYL CARRON** 12 fr.

**ou FOSFOXYL LIQUEUR** 13 fr.

afin d'éviter les substitutions

**Laboratoires du FOSFOXYL**

69, rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine).

**CARRON**, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
ancien Pharmacien-Chimiste de la Marine.

# FOSYLS CARRON

**Terpénolhypophosphites minéraux.**

**Reminéralisateurs chimiques physiologiques  
assimilables directement.**

**Modificateurs de la Nutrition  
et de la Composition chimique des Tissus.**

Tous ces nouveaux corps — création des Laboratoires CARRON — possèdent les propriétés dynamiques et trophiques du phosphore sur le système nerveux et sur la nutrition générale, mais chacun d'eux, en raison de la base qu'il contient, présente en outre une électricité d'action particulière qui conditionne sa prescription dans les diverses affections. Ils ne sont ni toxiques ni irritants et ont été reconnus parfaitement assimilables.

Les corps de cette série actuellement à la disposition du Corps médical sont :

Les Terpénolhypophosphites de Calcium, de Magnésium, de Manganèse et de Cuivre. Tous sont présentés sous forme de comprimés lenticulaires dosés à cinq centigrammes (1).

Dénomination.	Titre.	Mode d'emploi.
CALCOFOSYL (C <sup>10</sup> H <sup>16</sup> PO <sup>3</sup> ) 2 Ca	13,19 % de Phosphore.	4 à 8 comprimés par jour.
Terpénolhypophosphite de Calcium.	8,51 % de Calcium	(Sirop pour enfants.)
MAGNÉSOFOSYL (C <sup>10</sup> H <sup>16</sup> PO <sup>3</sup> ) 2 Mg	13,65 % de Phosphore.	4 à 8 comprimés par jour.
Terpénolhypophosphite de Magnésium.	5,28 % de Magnésium.	
MANGANOFOSYL (C <sup>10</sup> H <sup>16</sup> PO <sup>3</sup> ) 2 Mn	12,57 % de Phosphore.	4 à 6 comprimés par jour.
Terpénolhypophosphite de Manganèse.	11,34 % de Manganèse.	
CUPROFOSYL (C <sup>10</sup> H <sup>16</sup> PO <sup>3</sup> ) 2 Cu	12,57 % de Phosphore.	2 à 4 comprimés par jour.
Terpénolhypophosphite de Cuivre.	12,77 % de Cuivre.	

Prix de l'unité : 12 francs.

Littérature et échantillons sur demande aux

**Laboratoires CARRON**

Rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine).

(1) N. B. — Les Terpénolhypophosphites de Fer, de Lithium, d'Uran, de Plomb et de Quinine ont été également obtenus dans les Laboratoires CARRON.

## FRANCOPLASTE

**Composition.** — Sparadrap caoutchouté adhésif à l'oxyde de zinc.

**Avantages.** — Adhérence parfaite. Ne sèche pas, ne poisse pas. Garantie de conservation minima 2 ans.

**Indications.** — Fixation des pansements.

**Dimensions.** — 1 m. sur 1-2-3-4-5-10-18 cm. de larg. 5 m. sur 1 1/4, 2 1/2 3 3/4, 5, 6 1/4, 7 1/2, 10 cm. de largeur, sur cretonne rose ou blanche; uni ou perforé. Réduction de 50 p. 100 au Corps médical.

**A. KRAUS, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.**  
Fournisseur des Hôpitaux, du Service de Santé, de la Croix-Rouge.

37, r. Godot-de-Mauroy — Usine à Courbevoie.

## FREINIX BUISSON

produit non toxique et ne faisant pas partie du tableau B  
Association Chlorh. de Papavérine et Adrénaline en solution isotonique (Ampoules de 1 cent. cube) pour injections sous-cutanées.

**Propriétés thérapeutiques.** — Freine le Pneumogastrique. Excite le Sympathique.

**Indications.** — Asthme, Emphysème, Asthme et Rhume des foins, Spasmes viscéraux. Tous les phénomènes liés à l'hypervagotonie.

**Mode d'emploi et doses.** — Une injection sous-cutanée de 1/2 cc. à 1 cc. suffit à juguler une crise d'asthme en quelques minutes.

Le *Freinix* peut également être employé en pulvérisations nasales dans le rhume des foins, en particulier.

**Prix de vente au public :** 22 fr. la boîte de 6 ampoules.

**Prix médical :** 14 fr. 85 la boîte de 6 ampoules.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
THERAPLIX

Pierre BRETEAU, Pharmacien  
Membre de l'Académie de Médecine  
157, rue de Sèvres — PARIS (XV<sup>e</sup>).



## FUCOGLYCINE DU D<sup>r</sup> GRESSY

**Forme.** — Sirop.

**Composition.** — Principes iodo-phosphorés naturels et hydrocarbonés du fucus.

**Indication.** — Scrofule, Lymphatisme, Tuberculose, etc.

**Posologie.** — Mêmes doses que l'huile de foie de morue.

**Laboratoires LE PERDRIEL**

11, rue Milton — PARIS (IX<sup>e</sup>).

---

## FUCOSINE

*Traitement efficace de la Constipation habituelle.*

**Composition.** — Agar-agar, extrait de rhamnées.

**Propriétés.** — Mucilagineux, émollient, cholagogue ; véritable aliment du constipé ; innocuité absolue.

**Formes et Posologie :**

*Paillettes.* 1 à 3 cuillerées à café.

*Poudres..* 1 à 3 mesures.

*Cachets ..* 1 à 3 cachets.

A chaque repas régulièrement.

**Indications.** — Constipation habituelle, quelle qu'en soit l'origine.

Prix : 11 francs la boîte.

**Laboratoire L. PROTHIÈRE**

55, rue Auguste-Comte — LYON.

## FUCUS GMET

**Composition.** — Extrait total, sans alcool, du fucus vésiculosus. Correspond à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

**Propriétés.** — Par son iode naturel régularise la sécrétion thyroïdienne et combat l'obésité.

**Indications.** — Obésité, Scrofule.

**Posologie.** — De 1 à 8 cuillerées à café par jour, *progressivement* dans eau ou vin blanc sec de préférence.

### Laboratoire GMET

27, Faub. Montmartre — PARIS (IX<sup>e</sup>).

---

## FUROL

(Nom déposé.)

**Composition.** — Cachets strictement dosés d'Oxyde d'étain, Poudre de Lappa, Carbonate de manganèse, Oxyde de Zinc, Kaolin chimiquement purs.

**Indications.** — Toutes les staphylococcies ; intoxications intestinales, furonculose, dermatoses, abcès, boutons, phlegmons, acné, dartres, etc.

**Emploi.** — 4 à 6 cachets par jour. Aucune contre-indication.

Echantillons sur demande.

**Laboratoires VARGAS**

8-10, rue de l'Arcade  
et 5, rue Chauveau-Lagarde — PARIS.

## GADUAMINE

La GADUAMINE est un extrait opothérapique de foies frais de morue renfermant outre les parties hydro-solubles de la glande vivante, la totalité de l'insaponifiable de l'huile. LA GADUAMINE se caractérise plus spécialement par ses *procédés scientifiques* de fabrication qui en font un produit sans goût ni odeur désagréable, et privé de tous produits de décomposition plus ou moins nocifs.

**Action :** — La GADUAMINE agit :

*Par les principes hydro-solubles du foie,* comme anti-anémique et antitoxique.

*Par les vitamines naturelles A et D,* comme stimulant de la croissance et fixateur du calcium.

**Principales indications.** — *Anémies :* anémies pernicieuses, toxiques, post-hémorragiques, infantile; chlorose. *Etats d'infection chronique :* Adénites, scrofules, lymphatisme, prétuberculose et tuberculose. *Avitaminoses :* Rachitisme, allaitement, suites de couche, croissance.

**Mode d'emploi.** — *Enfants :* X à XL gouttes. *Adultes :* XL à LX gouttes. A prendre en 2 fois, avant les principaux repas, dans un liquide quelconque (eau sucrée, tisane, bouillon, vin, etc.).

Prix : 13 fr. 50

**Laboratoires RENARD**

35, rue de Paris — CLICHY (Seine).

Anciennement : 142, av. de Clichy — PARIS.

## GADUASE

**Succédané classique de l'huile de foie de morue sous la forme d'un sirop framboisé très agréable.**

### Composition.

*Hypophosphites de sodium et de calcium* (stabilisés par la glycérine), toniques nervins, antirachitiques et reminéralisateurs, stimulants de la nutrition.

*Méthylarsinate disodique* (0,015 par cuillerée à soupe), reconstituant des tissus nerveux et sanguins.

*Iode* (en combinaison tannique parfaitement stable et inaltérable), régulateur du métabolisme et anti-infectieux de premier ordre.

*Convient à tous les âges,  
aucune incompatibilité.*

### Indications.

Anémie, Anorexie, Lymphatisme, Affections pulmonaires, Asthénie.

### Posologie.

Pure ou dans un peu d'eau, avant ou après les repas.

*Nourrissons*: demi à une cuillerée à café *pro die*. *Enfants*: deux à trois cuillerées à café. *Adolescents et adultes*: deux à trois cuillerées à soupe.

Flacon (210 cmc. environ): 9 francs.

Grand flacon (400 cmc. environ): 15 francs

**Laboratoires SERVIER**

25, rue Eugène-Vignat — ORLÉANS.

## GALABACTÉINE

La Galabactéine est une culture de bactéries lactiques sélectionnées en milieu protéino-lacto-sérique.

**Forme.** — Présentée en tubes scellés de 10 cc.

**Indications.** — Toutes infections intestinales et autres intoxications d'origine digestive, métrites, vaginites, pansement des plaies.

**Mode d'emploi.** — 1° Prendre le contenu de 2 tubes, le matin, à jeun, dans une tasse d'eau sucrée ;

2° *Enfants* jusqu'à 3 ans : 1 tube dans de l'eau sucrée par la bouche ou en petit lavement ;

3° En pansement lorsqu'il s'agit d'une infection externe.

Prix de vente : 12 francs.

**Laboratoires LUCINIA**

154 bis, rue de Breteuil — MARSEILLE.

## GALACTESIA

Granulé stimulant de la sécrétion lactée.

**Composition.** — 1° *Principes galactogènes* : extraits de semences de cotonnier, de galéga, de malt, essences d'anis, de cumin, de fenouil.

2° *Éléments reconstituants* : phosphate et polyglycérophosphates (de calcium, de magnésium, de fer, de manganèse).

**Indications.** — Insuffisance lactée, qualitative ou quantitative. Montée laiteuse tardive. Reprise de l'allaitement.

Douleurs lombaires consécutives à l'allaitement.

**Posologie** — *Dose stimulante* : 3 cuillerées à soupe par jour.

*Dose d'entretien* : 3 cuillerées à dessert par jour.

La boîte de 300 gr. environ : 14 fr. 85.

Les Spécialités de l'Enfance.

**Laboratoires AXAREL**

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

## GALACTOGIL

Extrait titré maltosé phosphaté de Galéga.  
Granulé à base d'extrait de malt, extrait de galéga stabilisé, phosphate tricalcique, cumin, fenouil, etc.

### Indications :

Allaitement. — Insuffisance lactée. — Montée laiteuse tardive. — Reprise de l'allaitement. — Nourrissons déficients.

### Mode d'emploi :

Trois fois par jour, une ou deux cuillerées à soupe dans un verre d'eau ou de tisane et persister à donner le sein avec régularité.

La boîte de 250 grammes : 16 fr. 30.

### Laboratoires PROGIL

6, boulevard de Strasbourg — PARIS (X<sup>e</sup>).

## GALFORM LAMBIOTTE FRÈRES

*Pastilles à l'Aldéhyde formique.*

**Propriétés thérapeutiques.** — Réalisent l'asepsie du rhino-pharynx sous une forme commode, agréable et inoffensive ; au fur et à mesure qu'elles se dissolvent dans la bouche, leur principe formolé se dégage à l'état naissant, communiquant à la salive ses actives propriétés germicides.

**Indications.** — 1<sup>o</sup> Prophylaxie des maladies infectieuses ; 2<sup>o</sup> Remède curatif des angines, amygdalites, stomatites, rhino-pharyngites, laryngites ; 3<sup>o</sup> Hygiène de la voix.

**Mode d'emploi.** — 1 pastille 4 à 5 fois par jour et, au besoin, toutes les heures ou 1/2 heures. La laisser fondre lentement dans la bouche.

Littérature et Echantillons :

**Produits LAMBIOTTE FRÈRES**

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
124, avenue Rogier — BRUXELLES.

## GALLIODINE

**Forme.** — Bonbon à sucer, absorption per-linguale instantanée.

**Composition.** — Iode, tanin, acide phosphorique.

**Avantages.** — Permet de « macher » de l'iode sans fatiguer l'estomac.

**Indications.** — Angines, Stomatites, Rhinopharyngites, Adénites, Laryngites, Lymphatisme, Pyorrhée alveolodentaire.

S'emploie également après tous soins dentaires et opérations d'amygdales et végétations adénoïdes.

**Posologie.** — Six à huit bonbons par jour.  
Prix : 10 francs la boîte.

**Laboratoires SCHMIT**  
71, rue Sainte-Anne — PARIS.

---

## GALYL

Spécifique de la Syphilis.

**Indications.** — Syphilis, Fièvre récurrente, Pian, Maladie du sommeil.

**Formes.** — Ampoules pour injections intraveineuses, injections intramusculaires et injections sous-cutanées.

**Posologie.** — Débuter avec 0 gr. 15 et passer progressivement à 0,20, 0,25, 0,30, 0,40, 0,50 suivant les malades.

**Établissements MOUNEYRAT**

12, rue du Chemin-Vert

à VILLENEUVE-LA-GARENNE  
près Saint-Denis (Seine).

## GAMBÉOL

Adopté par le Ministère de la Santé Publique.

**Principe actif.** — Protochlorure de mercure léger et dissociable (Proto-Gambier).

**Propriétés.** — Antiseptique, Résolutif, Cholagogue, Diurétique, Antiparasitaire, Antisyphilitique.

**Mode d'action.** — Agit en se dissociant en mercure métal et oxyde de mercure à l'état colloïdal sans formation de sublimé.

**Indications.** — Toutes celles du calomel sans ses inconvénients. Insuffisances hépatiques et biliaires. Infections intestinales Antiparasitaire (oxyures), syphilis acquise et héréditaire de l'adulte et de l'enfant à toutes les périodes.

### Formes et posologie

1° Cachets à 1 centigr. 2 ou 3 ch. jour.

Prix : 20 francs.

2° Cartouches de pommade pour frictions à 50 %. Prix : 20 francs.

*Adultes* : 1 chaque jour.

*Enfants* : Fractions suivant l'âge.

3° Suppositoires adultes à 10 cent. 1 ch. jour.

Prix : 18 francs.

Suppositoires enfants à 5 centigr. 1 ch. jour.

Prix : 16 fr. 80.

**Laboratoire du Gambéol**

42, rue Emile-Deschanel

COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Défense 17-67 et 17-68.



## GANDERMA

Pommade renfermant les principes actifs de l'eau d'Alibour associés au Gambeol et à l'oxyde de zinc.

### Formule :

Protochlorure de mercure léger et dissociable .....	8 gr.
Sulfate de cuivre.....	0 gr. 50
Sulfate de zinc .....	1 gr.
Oxyde de zinc.....	18 gr.
Excipient (Lanoline et Vaseline)....	72 gr. 50

**Indications.** — Toutes affections cutanées d'origine inflammatoire ou microbienne : Acnés, Dartres, Ectymas, Eczémas, Erythèmes polymorphes, Furoncles, Herpès, Impétigos, Intertrigos, Pityriasis, Prurits, Psoriasis, Pyodermites, etc...

**Présentation.** — En tubes étain imprimés de 30 gr. environ.

Prix : Le tube : 12 francs au public.

Littératures et échantillons sur demande à :

**Laboratoire du GANDERMA**

42, rue Emile-Deschanel — COURBEVOIE (Seine).

## GARDÉNAL

Phényl-éthyl-malonylurée.

Hypnotique et sédatif du système nerveux.

*Indications :*

**Épilepsie, Chorée, Convulsions,  
États anxieux, etc.**

*Posologie et mode d'emploi.* — Comprimés à 10, 5, et 1 centigr.

*Doses maxima par 24 heures :*

*Adultes :* 10 à 40 centigr.

*Enfants :* 2 à 10 centigr.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPÉCIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## GASTRÉPATINE

Sulfate, citrate, phosphate, bicarbonate de soude,  
Sels rigoureusement anhydres.

En faisant dissoudre 2 paquets dans une bouteille d'Eau d'Evian on réalise la solution de Bourget.  
Prescrire un verre à bordeaux le matin à jeun.  
La solution est d'absorption facile.

**Indications.** — Insuffisances glandulaires du tube digestif ; prescription courante dans la thérapeutique du foie, de l'estomac, de l'intestin : hyperchlorhydrie, insuffisance hépatique, dyspepsie, entérites, etc. Contribue au traitement des dermatoses et intoxications intestinales.

Dépôt O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS.

**Laboratoires B. C. L.**

M. BERGER,

29, faubourg Bourgogne — ORLÉANS.

## GASTRICINE

### DU Dr E. DUHOURCAU

**Composition.** — Extrait opothérapique, liquide, de muqueuses fraîches, d'estomacs de porcs et de caillettes de veaux.

Renferme tous les éléments naturels du suc gastrique organique, ses ferments lab, pepsine, et toutes les zymases enlevées à la muqueuse gastrique.

**Indications.** — Affections organiques de l'estomac. Cas de souffrance de l'organe (insuffisance gastrique par excès ou par défaut). Anémie pernicieuse.

**Mode d'emploi.** — A un 1/2 verre d'eau ajouter une cuillerée à café de gastricine.

Prendre une gorgée de temps en temps pendant le repas.

**Doses.** — 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 francs.

**Laboratoires du Dr E. DUHOURCAU**

6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).  
Anciennement, 10, rue de Turenne — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## GASTROCALCINE

**Forme.** — Granulé.

**Composition :**

Carbonate de chaux.....	0 gr. 40
Carbonate de magnésie..	0 gr. 20
Bicarbonate de soude...	0 gr. 20
Sucre anisé, q. s. pour....	5 gr.

**Posologie.** — 1 à 2 cuillerées à café, immédiatement après les principaux repas, ainsi qu'au moment des crises.

**Indications.** — Dyspepsies, Dilatations de l'estomac, Hyperchlorhydrie, Pyrosis.

Prix : 12 fr. 50

**Laboratoire OBERLIN**

**J. Tinardon**, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
de l'Ecole Supérieure de Paris.  
17, rue Cadet — PARIS.

---

## GASTROCAOL

### Pansement gastrique.

**Composition.** — Parties égales de Silicate hydraté pur d'Alumine et de Silicate hydraté pur de Magnésie, lavés, étuvés, stérilisés-porphyrisés.

**Forme.** — Poudre insoluble, en sachets de 20 grammes.

**Propriétés thérapeutiques.** — Réalisant le plus parfait des pansements gastriques, *peut* et *doit* remplacer dans cet usage les Sels de Bismuth :

Mêmes indications — Plus efficace.

Mêmes doses — Jamais toxique.

Même mode d'emploi — 6 fois moins coûteux.

**Indications.** — Pansement gastrique. — Hyperchlorhydrie. — Ulcères de l'estomac et du Duodénum. — Spasmes du Pylore. — Aérophagie. — Dyspepsies douloureuses. — Hémorragies du Tube digestif. — Diarrhées aiguës. — Diarrhée des tuberculeux. — Dysenteries bacillaires et amibiennes. — Etats cholériformes.

**Doses.** — 1° Moyennes : 20 gr. par jour (un sachet) en une ou trois fois.

2° D'entretien : 10 grammes par jour en une ou trois fois.

3° Exceptionnelles : 100, 150, 200 grammes par jour dans les états cholériformes.

**Mode d'emploi.** — En suspension dans de l'eau pure, sucrée ou non, soit le matin à jeun en une fois, soit en 3 fois, avant chacun des repas principaux.

**Prix.** — 12 fr. pour un minimum de traitement de 12 jours.

**Laboratoire de la Sulfoléine ROZET  
BENDERITTER ET C<sup>ie</sup>, à VENDOME  
(Loir-et-Cher).**

# GASTROPANSEMENT

du D<sup>r</sup> ZIZINE

Pansement gastrique polyvalent à base de charbon activé.

**Forme.** — Paquets.

**Composition.** — Charbon polyvalent activé très adhésif et d'un grand pouvoir d'adsorption, Kaolin purifié, Carbonate de bismuth, Carbonate de magnésie.

**Propriétés thérapeutiques.** — Traitement des ulcères gastriques et des gastropathies douloureuses.

**Indications.** — Hyperchlorhydrie.  
Gastrites.  
Spasmes du pylore.  
Atonie gastrique.  
Dyspepsies réflexes.  
Ulcères.

**Posologie.** — Prendre le matin à jeun, une demi-heure avant le petit déjeuner, le contenu d'un paquet délayé dans un peu d'eau.

Prix : 18 francs.

## Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie, Ex-interne en pharmacie — Lauréat des Hôpitaux, Lauréat des Facultés de Médecine de Paris et Bordeaux.

24-26, rue de Fécamp, — PARIS (XII<sup>e</sup>).

Tél. : Diderot 28-96.

## GASTROPEPTYL

**Formes pharmaceutiques.** — 1° Granulé ; 2° Comprimés.

**Composition.** — Peroxyde de magnésie, Carbonate de magnésie, Carbonate de calcium, Deuto-carbonate de soude (saturants formule Robin), Papaine et Diastase (ferments végétaux).

**Propriétés et avantages.** — Calme les douleurs gastriques et facilite la digestion. Il neutralise les acides de fermentation et agit en même temps sur la muqueuse gastrique en amorçant l'action des glandes stomacales.

**Indications.** — Dyspepsies gastriques et duodénales, pesanteurs, acidités, brûlures, aigreurs.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 cuillerées à café de granulé ou 3 comprimés avant, pendant ou après le repas, dans un peu d'eau, mais de préférence après les repas.

**Prescription.** — 1 boîte granulé ou 1 boîte comprimés. Gastropeptyl.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences

Ex-interne. Lauréat des Hôpitaux de Paris  
40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

---

## GATERCODÉINE DOMERGUE

**Principes actifs.** — Essences terpéniques, Codéine.

**Propriétés.** — Antiseptique des Bronches. S'éliminant surtout par les voies respiratoires.

**Présentation.** — Capsules.

**Indications.** — Enrouement, Pharyngites, Laryngites, Toux quinteuses, Catarrhes Spécifique de la Coqueluche.

**Mode d'emploi.** — 2 à 6 capsules par jour  
2 par 2. Enfants : 2 à 4.

Laboratoires DOMERGUE

AGEN (Lot-et-Garonne).

## GAUROL

Nouveau sel phosphoré, calcique et magnésien,  
entièrement assimilable.

### Trois formes :

Ampoules injectables de 1 cc. ; Comprimés ; Granulé.

### Propriétés thérapeutiques :

Reconstituant général de l'organisme. Reminéralisateur.  
Recalcifiant.

### Indications thérapeutiques :

Asthénie, anémie, convalescence, croissance, tuberculose, grossesse, allaitement, affections dentaires, rachitisme, troubles de l'ossification, lymphatisme, consolidation des fractures, dépression nerveuse.

### Mode d'emploi :

1 ampoule injectable par jour ; 1 à 3 comprimés par jour, suivant l'âge ; 1 à 3 cuillerées à café de granulé par jour, suivant l'âge.

**Laboratoires PÉPIN et LEBOUCC**

COURBEVOIE (Seine). — Tél. : Défense 09-71.

---

## GAZE NÉOLÉE

Demi-grasse, antiseptique, non adhésive.

La *Gaze Néolée*, constituée d'un tissu à mailles assez lâches dont les fibres sont imprégnées d'un corps gras rendu stérile par l'adjonction d'essences antiseptiques (Niaouli, Thym, etc.), est à la fois perméable aux liquides aqueux tout en n'adhérant pas aux tissus. Elle réalise les trois conditions du pansement des plaies (brûlures, ulcères, escarres, amputations, etc.) :

- 1° Ne pas coller, de façon à éviter : douleurs, saignement et arrachement des jeunes flots cicatriciels, cause de réinfection et de retard dans la cicatrisation ;
- 2° Être perméable, de façon à permettre l'évacuation des divers suintements de la plaie et éviter la rétention du pus.
- 3° Ne pas gêner ou détruire l'action thérapeutique des médicaments utilisés pour les pansements.

**Laboratoires BOTTU**

35, rue Pergolèse — PARIS (XVI<sup>e</sup>). Tél. : Passy 43-89.

## GÉLOBARINE

Sulfate de baryum crémeux.

L'homogénéité de cette préparation non toxique, son opacité, sa bonne conservation et son prix abordable motivent sa substitution aux sels de bismuth.

**Exploration radiologique du tube digestif.**

*Mode d'emploi :*

Le contenu d'un flacon (200 gr.) constitue la dose habituelle pour un repas ou un lavement opaque. La Gélobarine peut s'employer pure ou incorporée à un excipient.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## GÉLOGASTRINE LICARDY

Granulé ou tablettes.

A base de Gélose, Gélatine et Kaolin purifié.  
Réalisation pratique de la thérapeutique par le pansement gastrique à l'exclusion de tous narcotiques, alcalins ou astringents.

**Posologie.** — *Traitement des douleurs de l'estomac :*  
1/2 cuillerée à soupe de granulé, ou 2 tablettes, au moment des crises douloureuses et à n'importe quelle heure de la journée.

*Traitement de l'Hyperchlorhydrie et de l'Ulcère gastrique :* 1/2 cuillerée à soupe de granulé, ou 2 tablettes, le matin à jeun, le soir avant de se coucher et 1/2 heure avant chacun des principaux repas.

**Laboratoires LICARDY**

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS.  
Téléphone : Maillot 17-75.



## GÉLO-PANSEMENTS GASTRO-INTESTINAUX

**1° Gélo-kaol-belladoné** pour pansements gastriques et intestinaux.

**Indications.** — *Estomac.* Hyperchlorhydrie avec ses manifestations (brûlures, aigreurs, crampes).

*Intestin.* Coliques, Gaz, Tranchées, Diarrhées de fermentations.

**2° Gélo-carbone-bismuthé** pour pansements intestinaux.

**Indications.** — Spasmes douloureux de l'intestin, Coliques, Gargouillements, Intoxication alimentaire, Fermentations.

**Mode d'emploi.** — Verser le 1/2 contenu du couvercle-mesure dans une 1/2 tasse d'infusion très chaude un quart d'heure avant les 2 grands repas. 1/2 dose pour les enfants.

Prix : 12 fr. 50.

*Dépôt général :*

**Laboratoire LAMBERT**

8, avenue de Grammont — TOURS.

## GÉLOR

Lubrifiant et régulateur de l'intestin.

**Composition.** — Emulsion solidifiée d'une finesse microscopique et de stabilité parfaite, de 60 p. 100 d'*huile de paraffine* chimiquement pure et de haute viscosité dans de l'*agar-agar* et du *suc d'oranges douces*.

**Propriétés.** — Gélor cumule les avantages de l'huile de paraffine et du mucilage sans en avoir les inconvénients ; suintements, saveur huileuse, digestion pénible.

**Indications.** — Traitement de la constipation sous toutes ses formes.

*Son goût très agréable*, sans aucune saveur huileuse, permet au malade d'absorber l'huile de paraffine sans s'en douter.

**Posologie.** — Doses quotidiennes à prendre aux repas :

*Bébés :* 1/2 cuillerée à café.

*Enfants :* 1 à 2 cuillerées à café selon l'âge.

*Adultes :* 2 à 6 cuillerées à café.

Prix en France : 13 fr. 50.

**Laboratoires A. CESBRON**

63, rue de la Faisanderie — PARIS (XVI°).

## GÉLOTANIN

**Nature.** — Tannate de gélatine.

Poudre blanche, inodore, insipide, insoluble dans l'estomac, dissociable dans l'intestin en ses éléments antidiarrhéiques : tanin et gélatine.

**Indications.** — Toutes diarrhées non infectieuses. Aucune contre-indication.

**Formes pharmaceutiques et posologie.** —

1° Pour *nourrissons et jeunes enfants* : *Paquets* de 25 cgr. : 1/2 à 3 paquets par jour en suspension dans du lait ou tout autre liquide tiède, mais non pas chaud ;

2° Pour *adultes* : *Cachets* dosés à 50 cgr. : 4 à 8 par jour.

Prix : 8 fr. la boîte de 20 paquets.

10 fr. la boîte de 24 cachets.

**Laboratoire CHOAY**

48, rue Théophile-Gautier — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Téléph. : Auteuil 44-09 et 44-10.

## GÉLOTUBE 29

(Nom, forme et dispositif déposés.)

Protège contre les maladies vénériennes.

**Composition :**

Le Gélotube 29 contenant la pommade au cyanure de mercure, — thymol, — calomel (formule de M. le Docteur GAUDUCHEAU) est le désinfectant le plus puissant et le plus efficace que l'on connaisse aujourd'hui pour se protéger à la fois contre la syphilis et la blennorrhagie *après* qu'on s'y est exposé.

**Présentation :**

En boîtes contenant 6 GELOTUBES 29 (pour 6 applications). Un mode d'emploi accompagne chaque objet.

Prix en France : 10 francs.

**Les Établissements C. DAVID-RABOT,**

**C. DAVID & ses Fils, pharmaciens**

49, rue de Bitche — COURBEVOIE (Seine).

Fournisseurs des Ministères de la Santé publique, de la Guerre, de la Marine et des Colonies.

## GÉNACIDE

**Composition.** — Granulé acigène contenant pour 100 gr. :

Phosphate bi-ammonique...	12 gr.	75 %
Chlorure ammonique.....	5 gr.	%
Ac. phosphorique officinal..	1 gr.	35 %

Cinq grammes représentent comme coefficient d'acidité en N 150 cc.

$\frac{10}{10}$

**Indication.** — Alcalose.

**Forme.** — Granulé.

**Dose.** — 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 15 francs.

**Laboratoire MONTAGU**

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

## GENATROPINE

Polonovski et Nitzberg.

**Indications.** — Dyspepsie hyperacide. Douleurs intestinales. Sueurs des tuberculeux. Entérite muco-membraneuse.

**Formes.** — Gouttes : XX gouttes = 1 mgr.  
Granules au 1/2 milligr. Ampoules à 2 milligr.

**Mode d'emploi.** — XX à XXX gouttes deux fois par jour ou quatre à dix granules par jour. Dose injectable de deux à six milligrammes.

Le flacon ou la boîte : 16 francs.

**Laboratoire AMIDO**

**A. BEUGONIN, Pharmacien**

4, place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## GÉNERGOSINE

**Tonique et reconstituant du Système nerveux.** (Phosphure de Zinc, Métavanadate de Soude, Kola, Caféine, Quassia).

**Propriétés thérapeutiques.** — Tonique Nervin, médication phosphorée parfaite par le Phosphure de Zinc. La présence du Métavanadate de Soude complète l'action du médicament en stimulant l'appétit et les fonctions digestives.

**Indications thérapeutiques.** — Etats neurasthéniques, dépression nerveuse, Surmenage physique et intellectuel, Convalescences difficiles, etc.

**Forme.** — Comprimés-pastilles.

**Dose.** — 1 à 3 par jour.

**Laboratoires JONIDS**  
DIJON.

---

## GENESERINE

Polonovski et Nitzberg  
Salicylate de Génésérine.

**Formes.** — Granules et dragées au 1/2 milligr. Gouttes (Solution au millième). Ampoules à 2 milligrammes.

**Indications.** — Traitement du syndrome solaire et en particulier des dyspepsies hypochlorhydriques nerveuses. Excitant des sécrétions et de la motilité du tube digestif. Spécifique des troubles sympathiques.

**Mode d'emploi.** — La dose moyenne est de quatre à six dragées ou granules par jour. Si l'on prescrit les gouttes, on en donnera XX avant chaque repas, LX par jour. Les injections sous-cutanées sont surtout indiquées dans les cas de crises douloureuses intenses, contre l'angoisse et l'insomnie persistante des dyspeptiques.

Injecter une ampoule tous les jours pendant les cinq premiers jours, puis une ampoule tous les deux jours. Le flacon ou la boîte. Prix au public : 16 francs.

**LABORATOIRE AMIDO**

**A. BEAUGONIN, Pharmacien**

4, place des Vosges — PARIS (IV°).

## GENHYOSCYAMINE

Polonovski et Nitzberg.

**Indications.** — Etats spasmodiques en pathologie digestive. Chorée. Tremblement mercuriel et de causes diverses. Delirium tremens. Sueurs des tuberculeux.

**Formes.** — *Gouttes* : XX gouttes = 1 milligr.  
*Granules* au 1/2 milligr. *Ampoules* à 2 milligr.

**Mode d'emploi.** — XX à XXX gouttes deux fois par jour. Quatre à six granules par jour, ou injecter une ampoule par jour.

Prix au public : le flacon ou la boîte,  
16 francs.

**Laboratoire AMIDO**

**A. BEAUGONIN Pharmacien**

4, place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## GÉNOMORPHINE

Polonovski et Nitzberg

**Formes.** — Comprimés dosés à 2 centigrammes.  
Ampoules à 4 centigrammes.

**Indications :**

*La douleur* : Coliques hépatiques, coliques néphrétiques, douleur des cancéreux, crise gastrique du tabès, douleurs de l'ulcère et de l'entéro-colite, angine de poitrine, fractures, douleurs post-opératoires, migraines, névralgies. Dyspnée, asthme, anxiété, angoisse, agitations, délire, insomnies, cure de démorphinisation.

**Mode d'emploi.** — 4 centigrammes de Génomorphine correspondent à 1 centigramme de morphine.

*Comprimés* : 2 à 4 par jour.

*Ampoules* : 1 à 2 par jour.

**Laboratoire des produits Amido**

**A. BEAUGONIN, pharmacien**

4, place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## GENOSCOPOLAMINE

Polonovski et Nitzberg.

### Indications.

ETATS PARKINSONIENS, Paralysie agitante, Syndromes post-encéphalitiques, Anesthésie chirurgicale.

**Formes.** — Gouttes : XX gouttes = 1 milligr.

Granules au 1/2 milligr.

Ampoules dosées à 3 milligr. et à 1 milligr.

**Mode d'emploi.** — XX à XXX gouttes 2 fois par jour. Quatre à 10 granules par jour. Anesthésie chirurgicale : 4 granules la veille de l'opération, Trois quarts d'heure avant l'opération, 1 ampoule de Génoscopolamine suivie de l'injection de 1 cgr. 1/2 de morphine.

Prix au public : Le flacon : 20 fr.

La boîte d'ampoules : 30 fr.

**Laboratoire AMIDO**

A. BEAUGONIN, pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>)

## GENOSTHENIQUES

**Ampoules. Granules. Gouttes.**

Cacodylate de Genostrychnine et de Génésérine  
Polonovski et Nitzberg.

**Indications.** — Asthénies, Dépression nerveuse, Neurasthénie, Psychasthénie, Surmenage intellectuel, Asthénie intellectuelle et physique des vieillards, Convalescence des maladies graves, Asthénie cardiovasculaire des infections, Asthénie de la croissance, de la grossesse, de la lactation, des anémiés.

**Formes.** — Ampoules de 2 cc. Granules. Gouttes.

**Mode d'emploi.** — XX à XXX gouttes ou 2 ou 3 granules aux trois principaux repas.

**Ampoules.** — Injecter une ampoule tous les jours pendant dix jours.

Prix public : 18 francs.

**Laboratoire AMIDO**

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges.

PARIS (IV<sup>e</sup>).

## GENOSTRYCHNINE

Polonovski et Nitzberg.

**Indications.** — Système nerveux, Paralysies diphtériques, Paralysies bulbaires, Cœur et circulation, Alcoolisme, Asthénie, Neurasthénie, Affections oculaires.

**Formes.** — *Gouttes* : XXX gouttes = 5 milligr. *Granules* à 0 gr. 002. *Ampoules* à 0,01.

**Mode d'emploi.** — XX à XXX gouttes deux fois par jour. Quatre à dix granules par jour.

**Dose injectable** : une ampoule par jour.

Le flacon ou la boîte : 14 fr.

**Laboratoire AMIDO**

**A. BEAUGONIN, Pharmacien**

4, place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## GÉRANINE

**Composition.** — Diméthylcyclooctodiéanol, essence de melaleuca viridiflora, huile de paraffine.

**Action thérapeutique.** — Agit sur tous les parasites intestinaux (*tænia*, oxyures, tricocéphales, *ascaris*, protozaires, etc.).

**Avantages.** — Médicament non toxique, sans aucun danger, n'incommodant pas le malade.

**Présentation.** — Capsules gélatineuses : 16 par boîte.

**Mode d'emploi :**

*Contre le tænia* : deux fois 8 capsules à 1/2 heure d'intervalle.

*Contre les oxyures* : 2 capsules à chaque repas pendant 3 jours.

**E. BOULLÉ, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**

Ex-Interne des Hôpitaux

Lauréat de la Faculté de Paris

12, avenue de la Grande-Armée — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## GERMOCLASINE

Ch. GAUTIER

La GERMOCLASINE est un complexe aromatique destiné à être injecté uniquement par voie intra-veineuse.

**Indications.** — Combat les états infectieux aigus ou subaigus et surtout les septicémies.

**Présentation.** — Ampoules d'un demi-centimètre cube. Chaque boîte renferme une *seringue à injections hypodermiques divisée en dixièmes de cc. et une aiguille-trocart spéciale pour injections intra-veineuses.*

**Posologie.** — La dose à injecter ne doit pas dépasser 1/2 cc. par jour. Elle peut être répétée plusieurs jours de suite. *Faire l'injection très lentement en observant bien les réactions du sujet.*

Chez l'enfant ne pas dépasser deux dixièmes de cc.  
Prix au public : 25 fr.

**Laboratoires  
des**

**Spécialités Pharmaceutiques Ch. GAUTIER**  
13, rue Dorian — PARIS (XII<sup>e</sup>).

---



## GERMOSE

Gouttes à base de Fluoroforme stabilisé dans des extraits végétaux. Non toxique. Goût agréable.

**Indications.** — Employée contre la coqueluche dont elle arrête très rapidement l'évolution et évite les complications si graves.

Calme rapidement la Toux (sans en excepter la Toux sèche émétisante des tuberculeux), la Toux spasmodique, quinteuse, les crises d'asthme, les Toux opiniâtres.

Hâte la guérison des affections des voies respiratoires : Bronchites, Trachéo-bronchites, Pneumonie, Broncho-pneumonie, Gripes pulmonaires, etc., etc.

**Propriétés.** — Microbicide, antiseptique des voies respiratoires, puissant antispasmodique, sédatif, Combat efficacement l'infection.

Agit sur le symptôme Toux et sur l'affection qui le provoque. N'est pas toxique et n'a aucune action nuisible sur les fonctions digestives, propriétés précieuses qui permettent de prescrire directement la *Germose* aux nourrissons atteints de bronchites, de coqueluche, etc., etc., dans un peu de lait ou simplement dans de l'eau sucrée ou non.

**Forme.** — Gouttes concentrées : 1 gr. (46 gouttes) contient 1/10 de centimètre cube de fluoroforme stabilisé.

Doses habituelles dans les 24 heures. — Jusqu'à 1 an, 4 fois X gouttes; de 1 à 3 ans, 4 et 6 fois XV gouttes; de 3 à 12 ans, 4 et 6 fois XXX gouttes; au-dessus, 4 et 6 fois XL gouttes. A prendre dans une ou deux cuillerées d'eau ordinaire ou sucrée ou un peu de tisane

**Nota.** — Le médecin peut prescrire, sans inconvénient, la *Germose* à des doses plus élevées; il doit même le faire si les résultats ne lui paraissent pas suffisamment rapides.

Dans tous les cas, les doses doivent être prises aussi régulièrement que possible, toutes les deux ou trois heures, par exemple, sans tenir compte des accès de toux ou des quintes.

Aucune contre-indication.

**Laboratoires LEBEAULT**

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III<sup>e</sup>).

## GLANDOCALCYL

Récalcifiant. — Réminéralisateur.

**Composition.** — Surrénales, fluorure et formiate calciques, carbonate et phosphoglycérate de chaux et de manganèse, di-phosphate tricalcique et poudre d'os frais.

**Indications.** — Débilité, surmenage, convalescence, grossesse, allaitement, rachitisme, troubles de la croissance, carie dentaire, fractures, maladies des os, lymphatisme, adénites, hérédité et pré-tuberculose.

**Formes.** — Pour *adultes* : cachets ; pour *enfants* : granulé.

**Doses.** — 2 ou 3 cachets par jour aux repas. 1 ou 2 cuillerées à café deux fois par jour suivant l'âge de l'enfant. Faire dissoudre dans un peu d'eau ou mieux le croquer comme un bonbon.

Prix : *Cachets*, 12 fr. ; *Granulé*, 14 fr.

Laboratoire Moderne  
d'Opothérapie et Biologie médicale.  
40, rue Claire-Paullhac — TOULOUSE.

---



## GLOBULES FUMOUIZE

Iodure de Potassium.

Globules à enrobage de gluten, insoluble dans l'estomac, et à excipient résineux, graduellement soluble dans l'intestin, supprimant tous les phénomènes d'intolérance de l'estomac et de l'organisme.

**Doses.** — Les *Globules Fumouze* à l'iodure de potassium sont préparés sous deux formes :

*Globules Fumouze KI*, à 0 gr. 25 par globule.

*Globules Fumouze KI*, à 0 gr. 10 par globule.

**Indications.** — Les *Globules Fumouze* iodure de potassium sont prescrits dans toutes les maladies où l'emploi de l'iodure est indiqué.

### Établissements FUMOUIZE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

---

## GLOBULES ROMON

**Forme.** — Globules glutinisés.

**Composition.** — Extraits orchitique, prostatique et de moelle épinière joints à la strychnine, à l'Yohimbine et au phosphure de zinc pur.

**Indications.** — Traitement le plus rationnel de l'impuissance.

**Dose.** — 4 à 6 globules par jour.

**Observation.** — La même formule existe également en ampoules : *Ampoules Romon*.

**Dose.** — Une injection tous les 2 jours.

La boîte de 10 ampoules : 40 fr.

Le flacon de 40 globules : 25 fr.

### Laboratoires ROMON

6, rue Bridaine — PARIS.

## GLOTTYL

**Composition.** — Association d'Erysimum, Euphorbia pilulifera, Coca, Drosera, faibles doses de Belladone et d'Aconit.

**Formes pharmaceutiques.** — Gouttes et Dragées.  
**Propriétés thérapeutiques.** — Décongestionne la muqueuse laryngo-trachéo-bronchique, fluidifie et favorise les sécrétions. Eclaircit la voix, arrête la toux, calme la dyspnée.

**Indications.** — Laryngites aiguës et chroniques, Trachéites, Bronchites, Toux coqueluchoïdes.

**Posologie.** — *Gouttes* : *Jeunes enfants* : X gouttes par année d'âge et par jour (en plusieurs prises).  
*Enfants* : XX à XXX gouttes, 4 à 5 fois par jour.  
*Adultes* : XL à LX gouttes, 4 à 6 fois par jour, dans un peu d'eau ou de tisane. *Dragées* : sucer 6 à 12 par jour.

Prix : 12 francs.

**Laboratoires DENIS**

85 bis, rue du Ranelagh — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Téléphone : Auteuil 13-89.

## GLUCALCIUM R. X.

**Gluconate de Calcium pur.**

**Formule.** — Solution stérilisée à 10 p. 100 de gluconate de calcium en ampoules de 5 et 10 cc.

Le Gluconate de Calcium ( $C^6H^{11}O^7$ )<sub>2</sub> Ca est le sel calcique de l'acide gluconique ( $C^6H^{11}O^7...$ ) obtenu par l'oxydation du glucose ( $C^6H^{12}O^6...$ ).

**Mode d'emploi.** — Injections endoveineuses et intramusculaires.

**Indications.** — Décalcification, déminéralisation, faiblesse générale, hémorragies diverses, hémoptisie, épistaxis, phlegmatie pulmonaire aiguë, dermatose, manifestations exsudatives.

**Laboratoire Chimique et Thérapeutique**

**A. ROUX, Pharmacien**

58, rue de Maubeuge — PARIS.

## GLUTASPIRINE MERMINOD

**Aspirine kératinisée, sous forme de lentilles.**

**Forme.** — Acide acétylsalicylique chimiquement pur dosé à 0 gr. 25 et enrobé de kératine. Flacon de 50 lentilles.

**Avantages.** — Les mêmes que celles de l'aspirine. Les lentilles kératinisées ne sont pas dissoutes dans les acides de l'estomac, ce qui permet par contre la dissolution de l'aspirine dans le milieu alcalin hautement favorable de l'intestin, et évite surtout toutes les intolérances habituelles des malades ou sensibles du tube digestif.

**Indications.** — Les mêmes que celles de l'Aspirine.  
Echantillons sur demande.

**Laboratoires MERMINOD et Co**

**Ad. BUISSON, Pharmacien**  
49, rue de Paradis — PARIS (X<sup>e</sup>).  
Tél. : Provence 30-32.

---

## GLYCÉROPHOSPHATE DALLOZ

Granulé dosé à 0,50 de Glycérophosphate de chaux, chimiquement pur, par cuillerée à café.

**Indications.** — Reconstituant minéralisateur. Tonique nervin. — Médicament des enfants ; des mères pendant la période de l'allaitement ; des déprimés.

**Dose.** — 1 ou 2 cuillerées à café par jour, à croquer ou à dissoudre dans un peu d'eau.

Le flacon : 12 fr. 50.

**Laboratoire DALLOZ**

13, boulevard de la Chapelle — PARIS (X<sup>e</sup>).

## GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

Comprimés effervescents dosés à 0,15 centigr. par unité.

Granulé dosé à 0,30 centigr. par cuillerée-mesure.  
Ampoules injections dosées à 0,20 centigr. par ampoule de 2 cc.

**Doses et mode d'emploi.** — 2 cuillerées de Granulé ou 4 comprimés : par jour 2 fois dans un peu d'eau ; ampoules, 2 cc. 3 fois par semaine.

**Propriétés thérapeutiques.** — Reminéralisateur physiologique. Ne fatigue pas l'estomac. Son emploi continu ne présente aucun inconvénient.

**Indications.** — Dans tous les cas de déminéralisation phosphorée et d'asthénie nerveuse.

**Laboratoires M. ROBIN**  
13, rue de Poissy — PARIS.

---

## GLYCO-LACTIMASE

**Description.** — Association symbiotique de bacille lactique Bulgare et de bacille glycobacter, en comprimés de 0 gr. 50, 40 comprimés par flacon.

**Action thérapeutique.** — Le bacille glycobacter transforme les matières amylacées en sucres et fournit par conséquent un milieu de culture éminemment favorable au bacille lactique, dont l'activité se trouve ainsi considérablement renforcée.

**Indications.** — 4 à 8 comprimés par jour, dans les intoxications intestinales, diarrhées, entérites, affections du foie.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**  
18, avenue Hoche — PARIS.

## GLYCO-M.

**Composition.** — Benzoate, Salicylate, Bicarbonate et Borate de soude, formant avec le Thymol une solution du Thymolate de soude (dosé à 4 p. 100). Glycérine à 30° C. P. 17 p. 100. Menthol, 0,04 p. 100. Essence de Gaultheria, Pinus et Eucalyptol, 0,06 p. 100.

**Propriétés particulières.** — Antiseptique, analgésique, alcalin et exosmotique, non toxique, non irritant et non caustique. Par ses qualités désodorisantes, est d'une valeur incontestable dans l'ozène et la fétidité buccale.

**Indications.** — Dans le traitement des affections et infections de toutes les muqueuses. **Pharyngite, angine et laryngite :** 1 partie pour 2 d'eau chaude, en gargarismes ou pulvérisations. **Catarrhe, coryza, rhumes, fièvre des foins et végétations adénoïdes :** Une partie pour 3 d'eau chaude en lavages nasals au moyen de la pipette Kanar. **Gynécologie :** injections à 5 p. 100. Le soir en tampons saturés de GLYCO-M. pure à garder toute la nuit.

**Gencives spongieuses et maladies buccales.** — En bains de bouche, pure, en brassant toutes les parties de la bouche, pendant un quart d'heure. Au coucher, en tampon saturé, inséré entre les lèvres et la gencive, et à conserver toute la nuit.

**A efficacité égale, l'antiseptique alcalin l'emporte sur  
l'antiseptique acide :**

Par ses propriétés qui lui sont toutes particulières, la « GLYCO-M. attire à travers les tissus les sécrétions congestionnées et enflammées, active la circulation du sang, et rétablit rapidement un état normal. Par sa réaction alcaline, elle s'harmonise avec les tissus traités, de sorte qu'elle n'irrite pas.

**LA GLYCO-M.** est un antiseptique alcalin non toxique et non irritant. Sa formule, basée sur la composition saline du sang, est approuvée par le Corps Médical et c'est lui seul qui a appris au public sa valeur dans le traitement de toutes les muqueuses.

Se vend dans toutes les Pharmacies :

En flacons de 100 grammes : 6 francs, modèle de poche.  
En flacons de 200 grammes : 10 francs, modèle stilligoutte.  
En flacons de 500 grammes : 20 francs, demi-litre.  
En bocaux de 3 litres..... : 90 francs, modèle familial.

**Laboratoire GLYCO-M.**

**Etablissements GEO-MIQUEL**

3, avenue Lowendal,  
PARIS — (VII°).





## GLYCO-THYMOLINE

Selon la formule de KRESS et OWEN Co.

**Traitement des affections de toutes les muqueuses.**

**Composition.** — Benzoate de soude, Borate de soude, Bicarbonate de soude, Salicylate de soude, 6,3 %, Eucalyptol, 0,08, Thymol, 0,04, Huile de Pin, 0,03, Huile de Bouleau, 0,03, Alcool, 4,1 %, Menthol, 0,04, Glycérine, 17,30, Eau distil. 72.

**Avantages.** — La Glyco-Thymoline est une solution dont la formule a été scientifiquement étudiée et dont l'alcalinité et la composition saline ont été mises en harmonie avec l'alcalinité même du sang et des sécrétions muqueuses, ce qui lui permet de n'apporter aucun trouble dans l'équilibre humorale et de n'altérer en rien la vitalité des tissus.

**Action thérapeutique.** — Par son alcalinité et son pouvoir exosmotique la Glyco-Thymoline provoque un appel des sécrétions muqueuses et vide les culs-de-sac glandulaires de leur contenu vicié, rétablissant ainsi le fonctionnement physiologique des glandes congestionnées. Elle est dépourvue de toute toxicité, ne coagule pas les albumines, et ne produit aucune action irritante.

**Indications.** — *Voies digestives:* Catarrhe gastrique et intestinal, Fermentations, Flatulence, Embarras gastrique, Maladies infectieuses, Entérite, Parasites intestinaux, Dysenterie.

*Cavité buccale* : Stomatite, Aphtes, Gingivite, Pyorrhée alvéolaire, Fluxion dentaire.

*Pharynx et gorge* : Angines, Pharyngite, Laryngite, Affections des voies respiratoires.

*Voies nasales* : Coryza aigu ou chronique, rhinite, Rhume des Foins, Végétations adénoïdes, Sinusite.

*Yeux* : Conjonctivite, Blépharite ciliaire, Kératite, Granulations des paupières, Trachome, Ectropion.

*Maladies de la peau* : Erysipèle, Furonculose, Anthrax, Acné, Eczéma, Zona, Ulcères variqueux, Brûlures.

*Rectum et région anale* : Prurit anal et eczéma local, Hémorroïdes, Prostatite.

*Gynécologie et Obstétrique* : Pertes blanches, vaginite, Ulcérations du col, Métrites, Salpingites, Suites de couches.

*Plaies de toute nature.*

**Mode d'emploi.** — a) Usage externe : à utiliser pure ou diluée dans 1 à 10 parties d'eau.

b) Usage interne : 1 cuillerée à café dans 1/4 de verre d'eau.

Prix :

100 cc. ....	6 francs.
250 cc. ....	12 —
500 cc. ....	20 —
Modèle Hôpital (3 litres)....	90 —

Remise spéciale au corps Médical.

**Etablissements WEBER**

**A. GUILLAUME, Pharmacien**

5 bis, rue des Haudriettes — PARIS (III<sup>e</sup>).

# GLYCTONE PHOSPHATÉE CHARRIÈRE

**Zomo-Chimiothérapie.**

**Forme.** — Liquide.

## Composition :

Arséniate de soude . . . . .	5 centigr.
Glycérophosphate de soude.	5 grammes.
Sulfate de strychnine . . . . .	8 milligr.

Ferments musculaires, Corps Immunisants, Albuminoïdes spécifiques et Vitamines des muscles frais, Matériaux salins vitalisés phosphatiques, Hémoglobine, du Plasma de bœuf additionné de sucres de cerise et de framboise, Saccharose, 500 cc.

**Dose.** — *Après les repas :*

*Enfants :* 1 à 6 cuillerées à café ou à dessert par jour suivant âge.

*Adultes :* 1 à 6 cuillerées à soupe *pure ou non, de préférence dans de l'eau froide gazeuse ou du lait froid.*

## Indications :

Anémie, Chlorose, Convalescence, Post-opérations, Grossesse et Allaitement, Epuisement musculaire, Surmenage, Rachitisme, Tuberculose, Misère physiologique et Déchéances physiques carentielles. Post-hémorragies

## Contre-indications :

Albuminurie, Diabète et Artério-sclérose.

Prix :

Le flacon de 500 cc. : 35 fr.

Le 1/2 flacon de 250 cc. : 19 fr.

Sans impôt.

**Laboratoires L. ARQUEVAUX, ,**

Pharmacien à ETAMPES (S.-et-O.).

**Dépôts: Office commercial pharmaceutique.**

**Comptoir National de la Pharmacie Française  
PARIS**

**Établissements GILBERT et RIPERT  
MARSEILLE, NICE, TOULOUSE**

**Drogueries THIRIET et C<sup>ie</sup>  
NANCY**

## **GLYKOLAÏNE ROBIN**

Association de la kola  
aux glycérophosphates.

**Granulé.**

**Dose et mode d'emploi :**

1 à 2 cuillerées à café par repas.

**Indications :**

Stimulant du système nerveux, Surmenage, Névralgies, Neurasthénie.

**Laboratoires M. ROBIN**

13, rue de Poissy,  
PARIS.

---

## **GLYPHOSPHER**

Elixir non sucré, à très faible degré alcoolique,  
à base de Glycérophosphates chimiquement  
purs :

Glycérophosphate de Soude cristallisé.

— de Fer.

— de Quinine.

— de Strychnine.

Stimulant de la nutrition chez les surmenés,  
neurasthéniques, convalescents, anémiques.  
Réminéralise l'organisme, reconstitue la cellule nerveuse :

Asthénie, anémie, chlorose, phosphaturie, névralgies faciales et sciatique, hystérie.

Sa composition permet d'en recommander l'emploi dans le diabète.

**GIVAUDAN-LAVIROTTE**

56, Chemin de Combe-Blanche — LYON.

**GMET****(Extraits Gmet.)**

Extraits végétaux liquides concentrés sans alcool, ni sucre, ni éther, par le procédé spécial Gimbert qui permet d'obtenir une *extraction complète sans altérer la plante.*

**Correspondent** tous à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

**Se prescrivent** tous : de 1 à 3 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau, après ou entre les repas ou un peu avant.

Boldo, v. page 151.	Jugland.
Coca.	Kôla.
Composé, v. page 245.	Piscidia.
Condurango.	Quinquina, v. p. 854.
Crataegus, v. p. 256.	Sauge.
Frêne.	Ulmaire.
Fucus.	Valériane, v. p. 1121.
Gui, v. page 452.	Viburnum.
Hamamelis, v. p. 458.	Diurétique, v. p. 308.
Hydrastis.	Extrait Hamyd, v. page 366.

Littérature sur chaque produit et échantillons sur demande adressée au :

**Laboratoire GMET**

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX<sup>e</sup>).

Tél. : Provence 43-10.

## GOBÉROL

Eau oxygénée en poudre.

**Présentation.** — Poudre, Comprimés, Savon Suspendu.

**Composition.** — (Perborate de soude, Menthol).

**Propriétés.** — Soluble instantanément dans l'eau chaude à 38°-40°, donnant une solution d'H<sup>2</sup>O<sup>2</sup> faible, mais à l'état naissant alcaline et isotonique.

**Avantages.** — Pas d'intolérance. Ni toxique, ni corrosif, ni salissant, ni acide. Tous les avantages de l'H<sup>2</sup>O<sup>2</sup>, sans en avoir les inconvénients. *Titre fixe, alcalinité état naissant* qui donne une suractivité que le Professeur A. Robin évalue de 1 à 5.

**Indications.** — Injection alcaline, oxygénée, isotonique et analgésique : Toilette journalière, Gynécologie, Leucorrhées, Vulvite, Vaginite, Prurit, etc., Gargarismes.

**Posologie.** — *Solution normale* : 1 sachet ou 1 comprimé (pour 2 litres d'eau chaude à 38°), plus si c'est nécessaire.

Prix : 15 francs.

**Alphonse CHARMAISON**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe de l'Université de Paris  
35, avenue de Royat — CLERMONT-FERRAND.

## GOMENOL

Essence provenant d'une variété sélectionnée  
de *Melaleuca viridiflora*.

**Propriétés.** — Antiseptique, analgésique, anticatarrhal, désodorisant, hautement diffusible. Toxicité et causticité nulles.

**Action thérapeutique et usages.** — Préconisé, à l'intérieur, comme balsamique et anticatarrhal. Convient spécialement aux affections chroniques des voies respiratoires : Bronchites, bronchectasies, tuberculose. On le prescrit utilement dans l'urétrite et la cystite. — A l'extérieur, il est surtout employé en inhalations et pulvérisations dans le coryza, les laryngites, les bronchites, la coqueluche : en pansements chirurgicaux dans les cas de brûlures, plaies septiques, ulcères, furoncles, phlegmons ; en pansements vaginaux dans les métrites. — Le GOMENOLEO à 5 % est un bon antiseptique nasal non irritant. — Sous forme de GOMENOLEO, il est donné en injections intra-musculaires (tuberculose) et intra-trachéales (laryngite tuberculeuse, bronchite fétide, tuberculose pulmonaire) ; en instillations intravésicales (cystites). Contre les infections généralisées, tendre à l'imprégnation goménolée.

**Laboratoire du GOMENOL**

48, rue des Petites-Ecuries — PARIS (X°).

## GONACRINE

Chlorométhylate neutre de diamino-acridine.

Antiseptique puissant très diffusible, peu toxique, non irritant. Action élective à l'égard du Gonocoque.

**Indications.** — Affections gonococciques et leurs complications, Septicémies, Désinfection des porteurs de germes, Fièvre ondulante (*M. Melitensis*).

**Posologie et mode d'emploi.** — Lavages de l'urètre ; solution de 1/8.000 à 1/1.000. Injections intraveineuses : ampoules de solution à 0,50 p. 100 et à 2 p. 100.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## GONAGONE

Vaccin antitoxique et antimicrobien, adopté par les hôpitaux de Paris et de l'armée.

Stock vaccin polymicrobien renfermant :  
Corps microbiens + Lysat microbien + *Anatoxine*.

**Indications.** — Toutes les infections génito-urinaires de l'homme et de la femme.

**Posologie.** — Une injection sous-cutanée tous les 3 ou 4 jours, de 1/4 de cc. à 2 cc. , progressivement.

Littérature et échantillons :

**H. CARRION et C<sup>ie</sup>**

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS.

Tél. : Elysées 36-64 et 36-45.



## GOSIERINE DALLOZ

Formule p. 100 :

Cocaïne.....	0,05
Menthol .....	0,40
Borate de soude.....	4,00

**Forme.**

Dragées.

**Propriétés.** — Analgésiques, antiseptiques et antispasmodiques.

**Action.** — Antisepsie de la bouche et des voies respiratoires, soulagement immédiat et guérison des aphtes, gingivites, amygdalites, laryngites, angines, etc...

**Doses.** — 6 à 8 dragées par jour, pour les adultes.

La boîte : 6 fr. 25.

**Laboratoire DALLOZ**

13, boulevard de la Chapelle — PARIS.

---

## GOUTTES ANTISPASMODIQUES DAUSSE

A base de benzoate de benzyle et de Gelsémium.

X gouttes = 0 gr. 04 de Benzoate de Benzyle  
et II gouttes de gelsémium Dausse.

**Indications.** — Tous les états spasmodiques : *asthme vrai, coqueluche, hoquet persistant, affections spasmodiques du tube digestif, coliques utérines, vomissements de la grossesse, crises vasculaires des hypertendus.*

**Posologie.** — *Adultes* : XX à XL gouttes par prise, répétées suivant les cas, 4 ou 5 fois par jour ; à prendre dans un peu d'eau sucrée ou de lait.

*Enfants* : X gouttes par jour et par année d'âge.

## GOUTTES PHOSPHOSTHÉNIQUES DAUSSE

Administration de la strychnine, par voie gastrique, à doses progressives en association avec l'acide phosphorique officinal.

XX gouttes renferment :

I milligramme de sulfate de strychnine ;

III gouttes d'acide phosphorique officinal ;

2 centigr. d'extrait de quina ;

2 centigr. d'extrait de Coca.

**Indications.** — Asthénie, atonie nerveuse, Neurasthénie, adynamie des convalescents. Dépression nerveuse, surmenage physique et intellectuel.

**Posologie.** — Débuter par X gouttes à chacun des deux principaux repas et progresser chaque jour de V gouttes. On suspendra le traitement à l'apparition des symptômes de saturation. On peut atteindre progressivement des doses de C. et même CC. gouttes par repas. *Eviter tout arrêt dans l'administration progressive du médicament.*

## GOUTTES ARSÉNOSTHÉNIQUES DAUSSE

Association de la Strychnine par voie gastrique à doses progressives, avec le méthylarsinate de soude.

XX gouttes renferment :

Un milligramme de sulfate de strychnine ;

Cinq milligrammes de méthylarsinate de soude ;

Deux centigr. d'extrait de quina ;

Deux centigr. d'extrait de cola stabilisée.

**Indications.** — Atonie nerveuse, asthénie, amaigrissement, neurasthénie adynamie.

**Posologie.** — Débuter par X gouttes à chacun des deux principaux repas et progresser chaque jour de V gouttes. On suspendra le traitement à l'apparition des symptômes de saturation. On peut atteindre progressivement des doses de C. et même CC gouttes par repas. *Eviter tout arrêt dans l'administration progressive du médicament.*

**Laboratoires DAUSSE**

4, rue Aubriol — PARIS (IV°).

## GOUTTES DE SERÛ

Extrait total et concentré des galbules  
de cupressus sempervirens.

**Indications.** — Vaso-constricteur et tonique puissant du système veineux. Spécifique *efficace sûr et constant* des varices, ulcères variqueux, périphlébites, hémorroïdes, varicocèles et des troubles de la ménopause.

**Dose moyenne.** — XXX gouttes avant chacun des deux principaux repas.

Prix au public : 10 francs.

**LETTRY**

69, rue de Sèvres — PARIS.

## GOUTTES HALOGÈNES

Du docteur BERN.

Reminéralisation magnésienne intensive.

XL gouttes = 1 gr. 21 sels halogènes de magnésium chimiquement purs et anhydres.

**Indications.** — Dépression physique et intellectuelle. Infection des voies intestinales et biliaires, Maladies de la peau, Verrues, Prophylaxie du Cancer.

**Posologie.** — XL gouttes dans 1/2 verre d'eau le matin avant le petit déjeuner, 1/2 dosé pour les enfants.

Prix du flacon : 15 francs.

## OVULES HALOGÈNES

du Docteur BERN.

Magnésiées et goménolées, ni toxiques, ni caustiques.

**Propriétés.** — Antiséptiques, décongestives, cicatrisantes et désodorisantes.

**Indications thérapeutiques.** — Métrites, leucorrhées et toutes infections ou ulcérations.

Prix : 18 francs, la boîte de 6.

Laboratoires ABADIE-TANZI

3, Place Intérieure Saint-Michel — TOULOUSE (Haute-Garonne).

## GOUTTES LIVONIENNES DE TROUETTE-PERRET

Capsules de goudron de Norvège, de Créosote de Hêtre et de Baume de Tolu.

**Indications.** — Rhumes, toux, bronchites, catarrhes, tuberculose, maladies des voies respiratoires, antiseptie des voies digestives.

Le meilleur moyen de faire tolérer la créosote. Médicament préventif et curatif.

**Doses et mode d'emploi.** — 4 à 8 Gouttes Livoniennes de Trouette-Perret par jour *au milieu des repas*.

Bien spécifier : GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET, pour éviter les contrefaçons.

Prix au public : 9 fr. 90.

**Laboratoires TROUETTE-PERRET**

15, rue des Immeubles-Industriels,  
PARIS (XI<sup>e</sup>).

---

## GOUTTES MAGALO

**Composition.** — Solution de chlorure de magnésium pur à 50 p. 100 super-activé par un sel de manganèse.

**Mode d'action.** — Médicament d'équilibre minéral, tonique, cholagogue, de goût agréable, bien supporté par l'estomac; la plus économique de toutes les préparations similaires.

**Indications.** — Affections du foie et de l'estomac, asthénies, verrues, cancer.

**Etablissements GOY**

23, rue Beautreillis — PARIS (IV<sup>e</sup>).

# GOUTTES MALONE

du Docteur GUESNE

**Composition.** — Allylisopropylmalonylurée dans un solvant hydro-glycériné aromatisé.

**Propriétés.** — Action antispasmodique remarquable non toxique

**Indications.** — Véritable médicament spécifique de la *coqueluche* (amélioration immédiate, guérison en huit ou quinze jours), résultats constants, si la dose donnée est suffisante. Indiqué aussi dans les *toux rebelles ou émétisantes*, la laryngite striduleuse, les convulsions, délires et tous états spasmodiques.

## Mode d'emploi :

**Nourrissons :** avant 6 mois, III gouttes toutes les 3 heures ; de 6 mois à 1 an, III gouttes toutes les 2 heures.

**Enfants :** de 1 à 2 ans, VI gouttes toutes les 2 heures.  
de 2 à 4 ans, IX — 2 heures.  
de 4 à 6 ans, XII — 2 heures.  
de 6 à 10 ans, XV — 2 heures.

**Adultes :** XX à XXX gouttes toutes les 2 heures.

Ces doses peuvent être *augmentées* largement et même *doublées*, sans aucun inconvénient.

Laboratoires du MALONE

J. Vincent, pharmacien

ANCENIS (Loire-Inférieure).

---

# GOUTTES NICAN

(Sans sucre)

**Composition.** — Bromoforme et Codéine purs, Aconit Belladone, Drosera, Grindélia, Benzoate de Soude, Eau de Laurier-cerise.

(IV Gouttes = 1 goutte de Bromoforme stabilisé)

**Caractéristiques.** — Association synergique des principes médicamenteux reconnus les plus efficaces de la toux spasmodique, ramenés par un procédé spécial à un très faible volume et parfaitement dissous. La présentation par gouttes permet la précision du dosage clinique et fractionné à tous les âges, assure la continuité du traitement, et garantit contre les accidents dus à l'insolubilité du bromoforme.

Effet rapide et persistant, souvent surprenant, Tolérance parfaite.

**Indications thérapeutiques.** — *Toux spasmodique et quinteuse en général ; Coqueluche, Grippe, Toux des Tuberculeux, Asthme, Toux laryngées, Adénopathie trachéo-bronchique, Coryza, toux rebelles. Hoquet persistant, Dysménorrhée, etc.*

**Mode d'emploi.** — A absorber loin des repas dans un liquide tiède, eau, grog, ou lait (enfants) qu'on agitera en ajoutant les gouttes. L'emploi, avec une tasse de lait tiède sucré, supprime en majeure partie le goût du bromoforme désagréable à certains malades.

*Doses moyennes par jour en 4 fois :*

*Adultes : CCXL gouttes.*

*Enfants : XII gouttes par année d'âge.*

Calme et repos immédiats, et dans les toux grippales, jugulation souvent en quelques heures.

*Dans la COQUELUCHE, doses fractionnées et croissantes.*

Médication permettant l'emploi du bromoforme chez les enfants en bas âge.

*Doses initiales :*

*Adultes : CXX gouttes.*

*Enfants : VIII gouttes par année d'âge.*

A prendre en 3-4 fois par jour, après une quinte. Augmenter progressivement pendant les huit premiers jours.

Consulter la posologie détaillée par âge, dans la notice jointe au flacon.

N. B. — En cas de recrudescence des quintes ou de somnolence accentuée, cas excessivement rares, interrompre le traitement pendant 24 heures. Puis continuer la progression ascendante, si nécessaire.

Se méfier des contrefaçons.

*Échantillons et Littérature*

**Laboratoires CANTIN**

**PALAISEAU (S.-et-O.)**

**Ch. SCHOEFFER - 34, rue du Canada — BRUXELLES.**

## GOUTTES PILKA

(Pilka Golaz ou Thymipin).

### Composition :

Les gouttes *Pilka* sont essentiellement composées des dialysés de Thym, Grassette et Drosera (absolument sans danger pour les nourrissons).

### Propriétés :

Action élective spéciale due aux constituants des plantes entrant dans cette préparation.

### Indications :

A recommander dans la *coqueluche* et les *toux convulsives* des enfants et des adultes, ainsi que les *toux des tuberculeux* et les *affections des bronches* en général : bronchite, pneumonie, asthme.

### Mode d'emploi :

On donne le matin à jeun et le soir en se couchant : aux *enfants*, I à X gouttes de *Pilka*, dans un peu d'eau ; et aux *adultes*, V à XXX gouttes.

### Laboratoire ZYMA

4, rue Bellart — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## GOUTTES SCANDINAVES

à l'essence de sève de pin, au gâiacol,  
au goudron pur.

**Forme.** — En capsules gélatineuses légères et très digestes. *Plus de 30 ans de pratique et de succès.*

**Propriétés.** — Antisepsie des voies respiratoires par l'essence de sève de pin.

**Indications.** — Toux, rhumes, bronchites à toutes les périodes, catarrhes, emphyseme, tuberculose chronique.

**Dose.** — 6 à 8 capsules par jour, dont 3 à 4 avant chaque repas.

**Prix au public : 9 fr.**

**Laboratoire du Dr H. PHILIPPE**

14, rue du Palais-Grillet — LYON.

# GRAINS CÉPHALGIFUGES

## AU JASMIN DE VIRGINIE

### CURATIFS DES NÉVRALGIES REBELLES EN UNE SEMAINE

par  
médication synergique organo-végétale.

#### PRODUIT MÉDICINAL FRANÇAIS

rendu inaltérable par un enrobage approprié  
complètement soluble dans l'eau et le suc gastrique.

#### COMPOSITION

donnée par la formule suivante.

Poudre de racines de <b>Gelsémium sempervirens</b> ou <b>Jasmin de Virginie</b> ...	0 gr. 05
Poudre de racines d' <b>Aconit</b> napel des <b>Vosges</b> .....	0 gr. 01
Poudre d'écorce de racines de <b>Piscidia erythrina</b> .....	0 gr. 05
Extrait mou de <b>Quinquina jaune</b> .....	0 gr. 05
<b>Cholestérine pure</b> (point de fusion 145°-147°) .....	0 gr. 01
<b>Hépatine</b> (extrait total de foie).....	0 gr. 03
<b>Splénine</b> (extrait total de rate).....	0 gr. 02
Extrait mou de <b>Colombo</b> .....	0 gr. 01
Extrait mou de <b>Gentiane</b> .....	0 gr. 01
Extrait mou de <b>Quassia amara</b> .....	0 gr. 01
Excipient .....	Q. S.
pour un grain de 0 gr. 25 de produits actifs.	

**N. B.** — Les préparations organothérapiques ou opothérapiques employées sont faites à partir d'organes frais rigoureusement sélectionnés et contrôlés, puis desséchés dans le vide et à froid avant d'être pulvérisés. Ces préparations sont garanties pures et sans odeur. Leur conservation est indéfinie.

Les plantes utilisées sont toutes stabilisées.

#### AVANTAGES

Grâce aux procédés scientifiques actuels de stabilisation des végétaux, les poudres et extraits des plantes ont une activité constante et représentent toute l'activité des plantes.

A doses comparables et en utilisant la voie buccale, la thérapeutique par les plantes stabilisées (Phytothérapie moderne) expose beaucoup moins aux risques d'intoxication que la médication par les alcaloïdes, principes actifs cristallisés ou amorphes retirés des végétaux, tels la gelsémine, l'aconitine, etc.



Aussi, après échec des meilleurs produits antinévralgiques, est-il sage de recourir à la **Phytothérapie synergique** avant de s'adresser par étapes au courant galvanique, à l'ionisation (électrolyse dangereuse avec les alcaloïdes), aux injections profondes d'alcool rarement curatives et, finalement, à la chirurgie (neurotomie rétro-gassérienne).

### **PRÉSENTATION**

Les « Grains Céphalgifuges » sont présentés  
**en flacons de 28 pilules vert d'eau**  
 (modèle unique).

### **PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES**

**Pouvoir analgésique électif :**

Nerf trijumeau. Nerf facial.

**Action sédative :**

Système nerveux cérébro-spinal.

Nerf grand sympathique.

### **INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES**

Mal de tête (céphalalgie, céphalée, migraine).

Névralgies faciales secondaires à une cause définie.

Névralgie faciale essentielle (tic douloureux de la face).

Névralgies dentaires, intercostales, sciatiques.

*Nervosisme. Fièvres intermittentes. Rhumatisme.*

### **MODE D'EMPLOI ET DOSES**

Les « Grains Céphalgifuges » se prennent indifféremment  
 au cours ou en dehors des repas.

#### **ADULTES**

en moyenne 2 grains par 24 heures

(un grain le matin et un grain le soir)

pendant 7 jours consécutifs.

*Pour doses supérieures, prendre l'avis du médecin.*

#### **PRIX DE VENTE IMPOSÉ**

Le flacon de 28 grains : 15 francs.

### **LABORATOIRE DU MICELLIODE**

Produits médicaux spécialisés.

*Fabrication française.*

A. ROLLAND, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,

31, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (IV<sup>e</sup>).

#### **DÉPOT GÉNÉRAL**

Service commercial

Service médical

88, rue de la Villette — PARIS (XIX<sup>e</sup>).

Tél. : Botzaris 34-32.

## GRAINS DE VALS

Composition végétale et opothérapique.

Podophyllin 0,01.

Cascara et Bourdaine (extrait) ââ 0,025

Belladone (extrait) 0,01

Bile, 0,02 Erepsine 0,01, Entérokinase 0,01.

**Dose et mode d'emploi.** — 1 à 2 le soir avant ou au milieu du repas.

**Propriétés thérapeutiques.** — Laxatif régulateur de l'intestin ne donnant pas de coliques, pas d'accoutumance.

**Indications.** — Constipation, embarras gastrique ; les grains de vals décongestionnent le foie et la vésicule biliaire.

Pas de contre-indications.

Prix, le flacon : 4 fr. 50.

**Laboratoire H. NOGUÈS**

11, rue Joseph-Bara — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## GRAINS D'ÉVIAN

Laxatif entéro-hépatique doux.

**Indications.** — Constipation chronique, Stase incipiens, accidents stercorémiques, Hépatisme.

**Composition.** — Extraits biliaires et intestinaux, Podophylline, Purgène, Belladone, Rhamnus frangula, Rhamnus purshiana.

**Propriétés thérapeutiques.** — Activent les fonctions hépatiques et pancréatiques, accroissent la biligénèse, provoquent une hypersécrétion intense de toutes les glandes intestinales. Ni coliques, ni irritation. Pas d'accoutumance. Laxatif sûr, très doux, atoxique, parfaitement toléré.

**Dose et mode d'emploi.** — Un ou deux grains au début du souper ou au coucher avec une tasse de thé.

Prix : la boîte : 6 fr.

Littérature et échantillons sur demande.

**Laboratoires J. PERROCHON**

57, rue Origet — TOURS.

# LES GRANIONS

Diastases métalliques de synthèse  
Procédé E. FOUARD, Dr ès sciences.

## Propriétés essentiellement nouvelles.

1° Conservation indéfinie sans altération de l'état colloïdal et des propriétés thérapeutiques.

2° Suppression de la réaction du choc.

Communications

Académie des sciences, 7 février 1927

Congrès de Lyon (avancement des sciences), 1926.

Granions			La boîte
<b>As</b>	Tuberculoses, dermatoses, anémie, dénutrition, etc.	Ampoules de 2 cmc. voie buccale, inject. intramusculaires et intraveineuses.	18 fr.
<b>Argent</b>	Infections générales locales.	Ampoules de 2 cmc. injections intramusculaires et intraveineuses.	20 fr.
<b>Cuivre</b>	Cancer, angiocholites, cholécystites.	Ampoules de 2 cmc. voie buccale,	18 fr.
<b>Bismuth</b>	Syphilis.	Ampoules de 2 cmc. injections intramusculaires et intraveineuses,	20 fr.
<b>Mercure</b>	Syphilis.	id.	18 fr.
<b>Iode</b>	Hypertension, rhumatismes, syphilis, tuberculose, etc.	En ampoules de 2 cmc. pour infections, en solution pour voie buccale.	18 fr. 14 fr.
<b>Soufre</b>	Sciatique, rhumatismes.	En flacon : voie buccale.	25 fr.
<b>Or</b>	Tuberculose, infections, générales, locales.	Ampoules de 2 cmc. injections intramusculaires et intraveineuses.	25 fr.
<b>Sélénium</b>	Cancer	Ampoules de 2 cmc. injections intraveineuses, intramusculaires, voie buccale,	25 fr.
<b>Plomb</b>			25 fr.
<b>Magnésium</b>			18 fr.
<b>Uranium</b>			25 fr.

Littérature et échantillons sur demande

**Laboratoires FOUARD**

61, rue G.-Lauriau — MONTREUIL (Seine)

**G. GAUTIER, pharmacien**

Téléphone : Ayrón 01-42,

## GRANULÉ CARESMEL

Produit contenant le phosphore sous forme végétale, saturé de chaux et de magnésie, associé au carbonate de chaux fluoré et à l'oxyde de magnésium dans les proportions les plus aptes et les plus utiles à la formation du squelette et à la constitution de la cellule nerveuse.

**Propriétés thérapeutiques.** — D'une assimilation parfaite, stimulant des échanges nutritifs, c'est un puissant reconstituant et réminéralisateur indiqué dans tous les cas de faiblesse constitutionnelle, neurasthénie, névroses, etc., dans les maladies amenant l'épuisement : anémie, rachitisme, pré tuberculose, tuberculose, etc.

**Doses :** *Adultes* : 1 cuillerée à café à chaque repas.

*Enfants* : 1/2 — — —

La boîte : 15 francs (sans impôt).

La 1/2 boîte : 8 francs.

Echantillons :

**Laboratoires CARESMEL**

2, quai Paul-Bert — TOURS.

Téléphone : 19-42.

## GRANULES DE PANTOFORT

du Docteur BOVEIL

Composé formé des plus énergiques stimulants, destiné à favoriser l'assimilation, à combattre la déminéralisation, le surmenage, la déchéance organique du système nerveux, la dépression générale.

**Composition.** — Nucléinate de Manganèse, Sulfate de Strychnine, Quassine cristallisée, Arséniate de soude.

**Indications.** — Surmenage physique ou intellectuel, asthénie, épuisement nerveux, lymphatisme, neurasthénie, suite de grippe, convalescence, état pré-tuberculeux.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : 3 à 6 granules par jour, 1 ou 2 avant chacun des 3 repas.

*Enfants* : demi-dose.

Echantillon et littérature sur demande.

Prix : 12 fr. la boîte de 60 granules.

**Marc PARIS, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**

1, rue Lassalle — LYON (La Boucle) (IV<sup>e</sup>).

## GRANULES DES VOSGES

**Composition.** — Aconit, Drosera, feuilles Bella-donne, Cte Thébaïque et Dionine.

**Indication.** — TOUX, Picotements et Mucosités de la Gorge, Rhumes de cerveau, GRIPPE.

Médicament indispensable aux personnes qui, parlant beaucoup, se fatiguent et ont besoin d'un bon tonique des Bronches : Professeurs, Médecins, Avocats, Chanteurs.

Les « Granules des Vosges » sont d'une activité rapide et certaine et, étant d'un petit volume, il est toujours facile d'en avoir sur soi.

**Posologie.** — 2 granules le matin vers 9 heures, 2 l'après-midi vers 5 heures, 3 le soir en se couchant.

*Ne pas en donner aux enfants au-dessous de 6 ans.*

**Laboratoire G. BERNHARD**

11, rue Lafayette — PARIS (IX<sup>e</sup>).

---

## GRANULES 3 CACHETS

**Au phosphure de zinc.**

**Composition et préparation.** — Le phosphure de zinc permet d'introduire le phosphore dans l'organisme à l'état naissant (décomposition en hydrogène phosphoré), d'où sa grande activité.

**Action.** — Excitant du système nerveux, élévation du tonus.

**Indications.** — Neurasthénie, Dépression nerveuse, Aménorrhées, Dysménorrhées, Impuissance.

**Dose et posologie.** — Chaque granule contient : 4 mgr. de phosphure de zinc, soit 1/2 mgr. de phosphore actif.

4 à 8 granules par jour à chacun des principaux repas, de préférence dans du lait.

**Laboratoire du Docteur COIRRE**

5, boulevard du Montparnasse — PARIS.

## GRASSYL BUISSON

A base de chaton de saule frais.

Antispasmodique d'origine exclusivement végétale, dépourvu de toute toxicité.

Sédatif de l'éréthisme nerveux.

Régulateur du déséquilibre neuro-végétatif.

### Indications :

Etats spasmodiques. — Nervosisme. — Angoisses. — Palpitations. — Règles douloureuses. — Troubles de la ménopause et de la puberté. — Insomnies diverses.

### Possologie :

Une à deux cuillerées à café trois fois par jour et avant de se coucher, dans un peu d'eau ou une infusion.

Prix de vente au public : 16 francs.

Prix médical : 10 fr. 10

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

*Pierre BRÉTEAU, Pharmacien*

Membre de l'Académie de Médecine

157, rue de Sèvres — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## GRIPONAL

**Composition.** — Complexe alcoolique à base de bromhydrate de quinine, diméthylaminopyrazolone, cryogénine de Lumière, teinture de cola, teinture de coca, alcoolature de Céline d'Aubrac.

**Propriétés thérapeutiques.** — Spécifique de la grippe (formes légères ou graves les plus diverses). Fébrifuge et Antiasthénique puissant.

**Mode d'emploi.** — Un verre à liqueur après les repas ; ou le soir, dans une infusion bien chaude, avant de se coucher.

**Laboratoires du Dr NARODETZKI**  
19, boul. Bonne-Nouvelle — PARIS (II<sup>e</sup>)

## GRIPPOL-FORNET

**Vaccin buccal antigrippal.**

**Principe actif.** — Différentes souches de microbes isolés du sang d'un grand nombre de malades atteints de Grippe et Influenza. Les microbes sont soigneusement stérilisés et dégraissés par un procédé spécial breveté en France.

**Indications.** — Refroidissements, Rhume, Coryza, Grippe, Influenza et leurs complications.

**Posologie.** — 1 à 3 pilules toutes les 2 heures.

**Propriétés thérapeutiques.** — Pris à temps, dès l'apparition des premiers symptômes, il empêche le développement de la maladie ; plus tard, fait disparaître tous les symptômes de la maladie en quelques jours.

Prix : 25 francs.

Service de Vente et Echantillonnage :

**Laboratoires**

23, rue du Caire — PARIS (II<sup>e</sup>).

Service d'Etude et de Fabrication :

**Institut de Microbiologie**

SARREBRUCK (Sarre).

---

## GUÉTHURAL

(Allophanate de Guéthol).

**Forme.** — Granulé.

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant modificateur des sécrétions bronchiques, ni caustique, ni irritant. Calme la toux.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les affections pulmonaires à hypersécrétions. Bronchorrhées, Catarrhes, etc.

**Mode d'emploi.** — 3 à 4 cuillerées à café, prises dans l'intervalle des repas, dans un peu d'eau, de tisane, ou croquées tout simplement.

**Laboratoires PÉPIN ET LEBOUcq**

COURBEVOIE (Seine)

## GUI BYLA

(Vaso-dilatateur, antisléreux,  
antihémorragique).

Contient l'alcaloïde, les saponines et l'inosite du gui.

**Propriétés thérapeutiques.** — Hypotenseur par action centrale sur les vaso-dilatateurs. Dépresseur de l'excitabilité exagérée. Toni-cardiaque par action myocardique. Diurétique par action cardio-rénale.

**Indications.** — Artério-sclérose, hypertension, cardiopathies artérielles, albuminurie, néphro-sclérose, éclampsie, hémoptysies, hémorragies, ménorragies, épistaxis, migraines.

**Mode d'emploi.** — 3 cuillerées à café par jour.

**Les Établissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

## GUI GMET

**Liquide sans alcool ni éther**

**Composition.** — Extrait *total* du viscum album sous forme liquide; mieux assimilable que les pilules. Correspond à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

**Propriétés** — Régulateur cardiaque et artériel, Hypotenseur, Diurétique, Vaso-dilatateur.

**Indications.** — Hypertensions, Cardiopathies artérielles, Artério-sclérose, Anévrismes, Hémoptysies, Hémorragies, Éclampsie (dans la grossesse fait baisser l'albuminurie).

**Posologie.** — 1 à 3 cuillerées à café, une ou deux fois par jour, entre les repas.

**Laboratoire GMET**

27, Faubourg Montmartre. — PARIS (IX<sup>e</sup>)



## GUIPSINE

Principes utiles du Gui.

**Indications thérapeutiques.** — Véritable régulateur du travail du cœur et de la circulation générale, non vaso-constricteur.

**Médication hypotensive.** — Hypertension, Artério-sclérose, Hémoptysie, Goutte, Troubles de la Ménopause (Spécifique). Néphro-sclérose, Prostatisme.

**Doses et mode d'emploi.** — Pilules à 0,05 : 4 à 10 par jour entre les repas.

Ampoules à 0,05 : 1 ou 2 injections par jour (réservées aux cas d'urgence).

Prix de vente au public : 18 fr.

**Laboratoires du Dr M. LEPRINCE**

62, rue de la Tour — PARIS (XVI<sup>e</sup>)

---

## GUITOSE

Hypotenseur végétal aux principes actifs du *Viscum album*.

**Forme et dosage.** — Pilules dosées à 0 gr. 05.

**Posologie.** — 4 à 8 pilules par jour entre les repas.

**Indications** — Artériosclérose, hémoptysie, goutte, troubles de la ménopause, néphrosclérose.

**Prix.** — L'étui de 60 pilules : 10 francs.

Échantillons et vente en gros :

**F. CARTIER**

1, rue de la Martinière — LYON

**MURARD, Pharmacien.**

## GYNALTHINE (Comprimés)

Nouvelle et unique préparation de racine de guimauve (Althéa) et d'essences antiseptiques non irritantes.

Action émolliente et antiseptique.

**Indications.** — Affections gynécologiques, vulvo-vaginite, métrite, salpingite, leucorrhée, etc.

**Formes.** — *Comprimés* immédiatement solubles dans l'eau chaude.

*Ovules.*

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 comprimés pour 2 litres d'eau chaude.

Echantillons et littérature

Laboratoires FORTEAL

**J. CHAKI, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**  
3, rue Barbette — PARIS (III<sup>e</sup>).

## GYNERGÈNE SANDOZ

**Composition.** — Tartrate de l'Ergotamine cristallisée ( $C^{35} H^{35} N^3 O^3$ ), principal alcaloïde isolé de l'ergot de seigle et principe actif spécifique. Produit pur, exactement dosable.

**Formes.** — Ampoules : 1 cc. d'une solution à 1/2 pour mille de tartrate d'ergotamine pour injections intramusculaires et sous-cutanées. — Solution à 1 p. 1000, usage interne. — Comprimés : 1 mgr. de tartrate d'ergotamine.

**Propriétés thérapeutiques.** — Le Gynergène Sandoz est le plus puissant des hémostatiques utérins et le sédatif du sympathique. Effets constants.

**Indications.** — Toutes hémorragies utérines. Atonie de l'utérus. Cancer utérin. — Les sympathicotomies. Migraines, Basedow, Tachycardies, Hémoptysies.

**Posologie.** — 1/4 de cc. à 1 amp. par jour. XV à XX gouttes ou 1 à 2 comprimés 2 fois par jour.

### PRODUITS SANDOZ

3 et 5, rue de Metz — PARIS (X<sup>e</sup>).

Dépôt général et vente :

**USINE des PHARMACIENS de FRANCE**  
129, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

## GYNOCALCION

**Forme M.** — Traitement rationnel des troubles de la Ménopause naturelle, chirurgicale ou radiothérapique, de la sclérose-utérine.

**Forme P.** — Traitement des accidents de la Puberté chez la jeune fille.

**Propriétés.** — Agit sur le tonus du système vago-sympathique par son lactate de calcium et de manganèse ; agit par son phosphore sur l'élément douleur ; supplée à la déficience glandulaire par ses extraits opothérapiques.

Le *Gynocalcium P* agit en outre par son Hypophyse (lobe antérieur) sur le développement général et le fonctionnement ovarien de la jeune fille.

**Doses.** — *Gynocalcion M.* — 10 à 16 dragées par jour, huit à dix jours par mois. Dans les formes rebelles, et surtout dans les ménopauses chirurgicales, deux séries par mois séparées par un repos de huit jours.

*Gynocalcion P.* — 10 à 16 dragées par 24 heures en série de dix jours par mois.

Effets rapides. Tolérance parfaite.

Echantillons, Littérature :

**LABORATOIRES CORTIAL**  
15, boulevard Pasteur — PARIS

## GYNOPAUSINE

**Composition.** — Association pluriglandulaire (thyroïde-ovarine) à un nouveau sel de Benzyle, le Sedobenzyl ( $C^6 H^5 CH^2 SO^3 K$ ) antipasmodique et hypotenseur.

**Propriétés thérapeutiques.** — Le Sedobenzyl ( $C^6 H^5 CH^2 SO^3 K$ ) est un nouveau sel de benzyle. C'est un produit stable, très soluble dans l'eau, non toxique aux doses habituelles, qui s'élimine aisément et qui peut être employé sans danger pendant un temps prolongé. Il a surtout une action antipasmodique, aussi a-t-il une action sédative dans les règles douloureuses, les coliques utérines et les douleurs de la métrite aiguë ou chronique.

**Indication.** — Insuffisance ovarienne, troubles de la ménopause et de la puberté, coliques salpingiennes ou utérines, dysménorrhée.

**Dose et mode d'emploi.** — 2 cachets ou 4 comprimés par jour avant les repas. Il est possible de prescrire, dans certains cas, 3 et même 4 cachets par jour, avant les repas. Le traitement doit être suivi de préférence dans les 8 à 10 jours qui précèdent l'époque des règles.

Laboratoire **OSILIA.**

**E. LACOMBE**, pharmacien

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

## HAMAMELINE ROYA

Principe actif aromatique de

*l'Hamamelis virginica*, en solution aqueuse.

Obtenue directement de la plante, contient en dilution convenable (20 cgr. p. cuil. à soupe) l'Huile Essentielle aromatique, véritable principe actif de la plante, à l'exclusion de l'extractif, inerte au point de vue vasculaire.

**Propriétés.** — Vaso-constricteur, Tonique des fibres lisses, Sédatif vasculaire, Stimulant circulatoire.

**Indications.** — Toutes les dilatations, congestions et inflammations veineuses (Varices, varicocèles, hémorroïdes, phlébites aiguës et anciennes). Troubles circulatoires utérins (Ménorragies, Dysménorrhée, Accidents congestifs de la Ménopause).

**Dose.** — Par cuill. à soupe, 2 à 4 par jour, aux repas ou en dehors des repas.

**Pierre ALEXANDRE, Pharmacien**

41, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>). — Lab. 08-00.

---

## HAMAMÉLIODE

Combinaison stable et définie de l'iode métalloïdique aux principes totaux de l'Hamamelis Virginica.

**Indications.** — Maladies du système vasculaire, Varices, Hémorroïdes, Troubles congestifs de la Ménopause, Artério-sclérose.

1° **Gouttes concentrées** renfermant 0 gr. 04 d'iode métal pour L gouttes d'extrait représentant son propre poids de plante.

De XXX à XL gouttes par 24 heures.

Prix : 12 fr. 75

2° **Élixir** (Préparation très agréable au goût). 2 à 3 cuillerées à soupe dans les 24 heures, de préférence à la fin des repas.

Prix : 16 francs.

**Laboratoire OBERLIN**

**J. Tinardon,**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
de l'Ecole supérieure de Paris,  
17, rue Cadet — PARIS.

## HAMAMELIS GMET

### Composition :

Extrait total, liquide et sans alcool de l'hamamelis virginica, correspondant à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

### Propriétés :

L'absence d'alcool conserve à notre préparation toutes les propriétés décongestives de la feuille d'hamamelis, tandis que les préparations alcoolisées ont une activité restreinte. L'hamamelis Gmet agit sur les fibres lisses de la paroi veineuse qu'il tonifie. (Plus actif que les cachets de poudre.)

### Indications :

Toutes les dilatations et inflammations veineuses, varices, hémorroïdes, varicocèle, phlébites, conjonctivites, angines congestives, fibrômes, prostatites, varicosités du nez et du visage. Accidents de la puberté, de la menstruation et de la ménopause. Vertiges, bourdonnements, bouffées de chaleur après les repas, etc.

### Posologie :

1 cuillerée à café dans un peu d'eau froide avant le repas, une ou deux fois par jour. Hémorragies (fibromes) une cuillerée à soupe trois fois par jour dans une tasse d'eau froide. Lavements. Applications locales.

### Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## HAMAMELIS GRANDVAL

**Forme et Composition.** — Gouttes renfermant sous le plus petit volume l'activité complète de la feuille d'Hamamelis traitée de façon à fournir un produit soluble dans l'eau, possédant l'arôme tout spécial de la plante et d'une activité incomparable dans tous les cas de :

**Indications.** — Varices. — Hémorroïdes. — Ulcères variqueux. — Métrites. — Accidents du retour d'âge. — Hémorragies. — Œdème chronique. — Congestions, etc., etc.

**Dose.** — XXX à XL gouttes avant chaque repas, 2 ou 3 fois par jour. — Dans les cas aigus, on pourra doubler la dose sans inconvénient, pendant quelques jours.

Le 1/2 flacon : 6 fr. — Le flacon : 11 fr.  
(Toutes pharmacies.)

**Laboratoires GRANDVAL**

12-14, rue Féry — REIMS.

---

## HECTARGYRE

Spécifique de la Syphilis.

**Indications.** — Syphilis, Paludisme.

**Formes.** — Ampoules A, Ampoules B, Gouttes, Pilules.

**Posologie.** — *Adultes* : 15 ampoules pour une cure ou 2 pilules par jour pendant 15 jours, ou XL gouttes par jour pendant les 4 premiers jours ; ensuite LX ou LXXX pendant 15 jours.

*Enfants* : Moitié doses.

**Établissements MOUNEYRAT**

12, rue du Chemin-Vert  
à VILLENEUVE-LA-GARENNE  
près Saint-Denis (Seine).

## HECTINE

Spécifique de la Syphilis  
et succédané du cacodylate de soude.

**Indications.** — Syphilis, Paludisme, Fièvre des Foins, Tuberculose, Anémie.

**Formes.** — Ampoules A, Ampoules B, Gouttes, Pilules.

**Posologie.** — *Adultes* : 15 ampoules pour une cure ou 2 pilules par jour pendant 15 jours, ou LX gouttes par jour les 4 premiers jours, ensuite LXXX gouttes pendant 15 jours.

*Enfants* : Moitié doses.

### Établissements MOUNEYRAT

12, rue du Chemin-Vert  
à VILLENEUVE-LA-GARENNE  
près Saint-Denis (Seine)

---

## HÉLÉNINE DE KORAB

Spécifique de la toux.

**Composition.** — Héléline cristallisée obtenue par le procédé de Korab et codéine.

**Forme.** — Pilules.

**Indications.** — Toutes les affections des voies respiratoires, Bronchites, Emphyseme, Asthme, Trachéo-bronchite, Catarrhe.

**Doses.** — 2 à 6 pilules par jour.

**N. B.** — Une seconde formule contenant 2 centigrammes de créosote de hêtre par pilule est recommandée dans les cas de Bacillose.

Prix de l'étui : 12 fr.

**Laboratoires CHAPÉS**  
12, rue de l'Isly — PARIS.



## HÉMAGÈNE TAILLEUR

EMMÉNAGOGUE-ANALGÉSIQUE COMPLET  
à effet polyvalent et immédiat.

**Forme.** — Dragées.

**Composition.** — Folliculine, Principes vaso-dilatateurs, et analgésiques sélectionnés.

**Propriétés thérapeutiques.** — Calmant immédiat des douleurs les plus vives de la dysménorrhée et des coliques post-partum.

**Indication et posologie.**

1° DYSMENORRHEE : 2 dragées dès l'apparition des douleurs ; une demi-heure après : deux autres. Maximum : 8.

2° AMENORRHEE et MENOPAUSE : 4 à 6 dragées par jour.

3° COLIQUES POST-PARTUM : 2 dragées par heure. Maximum : 10.

Petit flacon de 12 dragées : 8 fr.

Grand flacon de 30 dragées : 15 fr.

**Laboratoire SEVENET**

10, rue Le Chapelais — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

---

## HÉMAGÉNINE GIRAUD

Médication iodo-arsénicale  
phosphorée-strychnique.

**Doses et mode d'emploi.** — Doses ascendantes et descendantes indiquées sur chaque flacon.

**Propriétés thérapeutiques.** — Lymphatisme. Adénopathie, Rachitisme, Anémie. Toutes maladies consomptives. Convalescences.

*Tonique puissant, antiscrofuleux.*

**Eugène PETIT**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
Ex-interne des Hôpitaux de Paris  
ARGENTEUIL (Seine-et-Oise)

## HÉMATOÉTHYROÏDINE

**Composition.** — Sang d'animaux éthyroïdés mélangé à parties égales avec de la glycérine chimiquement pure.

**Forme.** — Liquide. Comprimés dosés à 0,50 et correspondant à une cuillerée à café du produit liquide.

**Indications.** — Goître exophtalmique, Hyperthyroïdie, Troubles d'excitation nerveuse, Insomnie, Hémophilie.

**Mode d'emploi.** — 2 à 6 cuillerées à café par jour avant les repas ou 2 à 6 comprimés au moment des repas.

**Laboratoire de Biologie appliquée**

**H. CARRION et Cie**

54, Faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

**V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie.**

---

## HEMATO-IODINE

États lymphatiques et anémiques.  
Adénites chroniques.

La boîte de 36 cachets :

15 francs, prix public.

Le tube de granulés :

15 francs, prix public.

**Laboratoires STENE**

2, place des Vosges  
PARIS (IV<sup>e</sup>).

## HEMATOQUINA TRANTOUL

Hémoglobine cristallisée, extrait de quinquina rouge, excipient sucré et aromatisé.

Spécifique puissant de toutes les altérations sanguines par déglobulisation quelle que soit leur origine. Est le meilleur adjuvant de la méthode de Whipple.

Anémies de toute origine, états de faiblesse et de dépression organique, troubles de la croissance et de la puberté, dysménorrhée, ménopause, suites du paludisme.

Se présente sous 3 formes : Elixir sans alcool, Granulé fondant, Cachets méthylarsinés à 0,05 (pour adultes seulement).

*Elixir* : 1 à 2 cuillerées à café 2 fois par jour aux repas du midi et du soir dans eau pure ou gazeuse.

*Granulé* : Une cuillerée à café à chaque repas (croquer ou laisser fondre dans la bouche).

*Cachets* : Un à chaque repas (pour adultes seulement).

Pour les enfants, moitié des doses ci-dessus (se conformer aux indications du médecin).

Prix au public : Elixir 18 fr. Cachets : 15 fr. Granulé : 12 fr.

Laboratoires Ch. GAUTIER,  
13, rue Dorian — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## HÉMAXOL

*Troubles nerveux dysménorrhéiques.*

*Etats congestifs et douloureux.*

**Action.** — Sur l'élément congestif utéro-ovarien : Hamamelis. — Vaso-moteur : Marron d'Inde. — Sur l'élément douleur : Anémone.

**Indications.** — Règles douloureuses, Hémorragies utérines, Etats congestifs des Vieillards, Hémorroïdes, Varices, Métrites et Ovarites.

**Formes.** — Elixir et comprimés-pastilles.

**Dose et Mode d'emploi.**

*Elixir* : 1 à 6 cuillerées à café ou 2 cuillerées à soupe par jour, avant les repas.

*Comprimés* : 2 à 10 comprimés-pastilles par jour avant les repas.

Laboratoires JONIDS  
DIJON.

# HÉMOANTITOXINE « SOFOS »

de l'Institut du P<sup>r</sup> E. Maragliano

**Composition.** — Sang de bœuf immunisé contre la tuberculose, contenant 20 p. 100 d'antitoxine Maragliano ..... 25 p. 100

Alcool ..... 14 —

Glycérine ..... 10 —

Eau aromatique ..... 51 —

**Indications.** — Reconstituant spécifique du sang. Remède contre le rachitisme et la scrofulose. Préventif immunisant dans la prébacillose. Traitement spécifique de la tuberculose.

**Formes et Posologie.** — *Simple* : une cuillerée à potage quatre fois par jour (avant les repas).

*Triple* : même dose (s'emploie dans les périodes fébriles). Se prend pure ou mélangée avec de l'eau alcaline ou avec du sirop.

Prix : 20 francs.

**Echantillons et vente en gros : François CARTIER**

1, rue de la Martinière — LYON.

MURARD, Pharmacien.

## HÉMOCALCIOPECTINE

**L'Hémostatique rationnel.**

Solution antihémorragique de Pectine et de Chlorure de Calcium.

Inaltérable. Non toxique. Non anaphylactysante.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les hémorragies, Epistaxis, Hémoptysies, Hémorragies gastriques et intestinales, rénales, vésicales, utérines, Hémophilie, Hémorragies opératoires et post-opératoires.

**Présentation.** — Ampoules buvables de 10 cc. Boîtes de 3 et 6 ampoules.

**Mode d'emploi.** — De 1 à 6 ampoules par 24 heures dans de l'eau sucrée ou un jus de citron.

Dépôt général :

**Pharmacie J. ROBERT**

**J. BOUDIER, Successeur,**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

Ex-préparateur à la Faculté de Médecine

37, rue de Bourgogne — PARIS.

Tél. : Littré 64-53.

## HÉMO-CYTO-SÉRUM

CORBIÈRE

**Composition.** — Soluté de cacodylate de sodium chimiquement pur, fer et strychnine.

**Mode d'emploi.** — Une injection intramusculaire tous les jours ou tous les deux jours.

**Action.** — Multiplie les globules rouges, accroît la valeur globulaire.

**Indications.** — Anémies de toutes origines. Convalescences, Chlorose, Surmenage, Troubles de la croissance et de la puberté.

**Présentation.** — Hémo-Cyto-Sérum pour adultes, 12 ampoules de 5 centicubes.

Prix : 21 francs.

Hémo-Cyto-Sérum infantile, 12 ampoules de 2 centicubes.

Prix : 15 francs.

Laboratoires Pharmaceutiques

CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS. Tél. : Carnot 78-11.

---

## HEMODROME

(Berberis vulgaris, Thlaspi)

**Forme.** — Extrait fluide à prendre en gouttes.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action supérieure à l'hamamelis et similaires. Assimilation plus rapide sous sa forme liquide que les produits présentés en pilules ou comprimés.

**Indications.** — Varices, Hémorroïdes, Troubles de la ménopause. Règles irrégulières, Phlébite.

**Posologie.** — XV à XX gouttes 3 ou 4 fois par jour dans un peu d'eau.

LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS.

**HÉMODUCTYL****Pilules ou Solution.**

Extraits d'hamamelis, cupressus, marron d'Inde stabilisé, boldo et condurango associés aux extraits de gui et d'aubépine.

**Dose moyenne.** — 2 pilules, 1 cuillerée à café de solution, matin, midi et soir, avant les repas.

**Indications.** — Ménopause, Dysménorrhées douloureuses, Varices et Hémorroïdes, Hypertension, Bourdonnements d'oreilles.

**Laboratoires LICARDY**

38, boul. Bourdon — NEUILLY-PARIS.  
Téléphone : Maillot 17-75.

---

**HEMOFER****(Cachets)****Reconstituant général.**

**Formules.** — Nucléinate de manganèse, protoxalate de fer, surrénine, phosphure de zinc, associés à des sels de chaux et arseniate de soude.

**Indications.** — Anémie, amaigrissement, grossesse, allaitement, états pré-tuberculeux.

**Laboratoire LOBRY**

6, rue Parrot — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## HÉMOFIXINE BRANCHU

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Composition.** — Nucléinate de manganèse. Lécithine de l'œuf. Oxyhémoglobine, Méthylarsinate de soude. Quassine. Zymases.

**Propriétés therap.** — Reconstituant. Régénérateur des globules sanguins et des éléments protoplasmiques.

**Indications.** — Etats anémiques. Chlorose. Convalescences. Surmenage intellectuel et physique. Neurasthénie. Phosphaturie. Diabète. Bacillose.

**Posologie :**

Adolescents	{ 1 comprimé à midi	{ au milieu des repas
	{ 1 comprimé le soir	
Adultes	{ 2 comprimés à midi	{
	{ 2 — le soir	

Pendant 20 jours par mois. Se reposer 10 jours avant de reprendre le traitement.

**Laboratoire BRANCHU**

4, rue Beaurepaire — PARIS (X<sup>e</sup>).

## HÉMOFLUIDOL

**Fluidifie le sang.**

Chaque dragée contient :

Silicate de soude..... 0 gr. 12

Citrate de soude .... 0 gr. 20

**Artériosclérose**

**Hypertension**

**Troubles circulatoires**

Deux dragées matin et soir avant le repas

**Laboratoire LÉONARDON**

Docteur en Pharmacie, Arcachon.

Dépositaire général : O. C. P. Paris

## HÉMOGÉNOL DAUSSE

Sérum hémopoïétique de cheval.

**Formes.** — *Ampoules d'Hémogénol* contenant 10 cc. de sérum liquide.

*Sirop d'Hémogénol* à base de sérum hémopoïétique.

*Dragées d'Hémogénol* contenant chacune 0 gr. 15 de sérum hémopoïétique desséché, enrobé dans le gluten.

**Indications.** — Tous les états d'*adynamie* et toutes les *cachexies*. Puissant stimulant de l'hémopoïèse particulièrement indiqué dans le traitement des *anémies*. Hémostatique énergique recommandé dans les affections hémorragipares et l'*hémophilie*.

**Mode d'emploi.** — *Ampoules d'Hémogénol.* — 1 à 3 ampoules par jour prises par la bouche dans un peu d'eau sucrée ou en lavements.

*Dragées d'Hémogénol.* — Avaler, sans croquer, 4 à 6 dragées par jour.

*Sirop d'Hémogénol.* — *Enfants* : 3 à 6 cuillerées à café par jour. — *Adultes* : 3 cuillerées à soupe par jour.

**Laboratoires DAUSSE**

4, rue Abriot — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---



# HÉMOGLOBINE DESCHIENS

## OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE TOTALE

Médication rationnelle des syndromes anémiques.

**Nature.** — Le sirop de DESCHIENS à l'Hémoglobine contient :

- 1° Une hémoglobine vivante, préparée à froid, sans traumatisme histologique, physique ou chimique ;
- 2° Les substances minimales globulaires intactes ;
- 2° Les substances minimales du plasma (Hémo-poïétines, cytopoïétines) non altérées.

Ces éléments sont incorporés à un excipient dosé avec soin, sorte de sérum aseptique où leur vitalité persiste.

### Action :

- 1° Apport d'hémoglobine vivante (fer globulaire).
- 2° Stimulation prudente des organes hémopoïétiques (Hémocytopoïétines).
- 3° Puissante action tonique par les substances minimales : globulaires et plasmatiques.

### Indications :

Anémies.  
Chlorose.  
Déchéances organiques.  
Tuberculose.  
Convalescences.  
Grossesses.  
Suites de couches.  
Paludisme.

**Posologie.** — Une cuillerée à potage au début ou à la fin des 2 principaux repas.

Doubler dans les cas graves.

Pas de contre-indications.

Littérature et échantillons :

**DESCHIENS**

Docteur en Pharmacie.

9, rue Paul-Baudry — PARIS (VIII°).

## HEMOGLYNE

**Réparateur Thuau (sans Vin).**

**Composition** pour un cachet :

Ars : Strychnine.....	0 gr. 001
Ars : Soude.....	0 gr. 002
Glycérophosphate de chaux.....	0 gr. 40
Hémocristalline .....	0 gr. 30
Sels de Vichy et magnésiens vanillés.	

**Mode d'emploi.** — 2 cachets par jour, avant les 2 principaux repas.

**Action.** — Antidépériteur. Toni-reconstituant.

**Indications.** — Surmenage, Faiblesse générale, Anémie, Chlorose, Pertes.

**Présentation.** — Cachets. — Son Prix : 14 francs.

**Fabrication.** — Laboratoire du Réparateur Thuau, Angers.

**Vente :**

**PHARMACIE NOUVELLE**

22, faubourg Saint-Michel — ANGERS (M.-et-L.)  
et toutes pharmacies.

## HÉMO-HEPATEXT

Traitement d'assaut des anémies, leucémies, hypotension, syndromes pluriglandulaires, états déprimés.

**Composition :**

Mélange de sérum hémopoïétique de sérum de cheval et d'extrait de foie en *ampoules buvables*.

La boîte de 6 ampoules : 18 francs.

**Laboratoires**

**TAILLANDIER-SAMARCO**

107, avenue Jean-Jaurès. — PARIS.

## HÉMOLUOL

**Traitement rationnel des troubles des fonctions menstruelles et des affections du système veineux.**

**Composition.** — Éléments activés par synergie. Thlaspi (capsella Bursa Pastoris), Berberis, Hamamélis, Quinquina, Viburnum pruni folium, Anémone pulsatile.

Extraits de choix, combinés judicieusement sans perte de substances actives, en un élixir agréable à prendre.

Décongestif, tonique, stimulant des vaso-moteurs centraux. Analgésique et sédatif de l'appareil utéro-ovarien.

**Indication.** — Troubles des fonctions menstruelles. Aménorrhée, dysménorrhée douloureuse, ménopause naturelle et opératoire.

Insuffisances veineuses. Varices, hémorroïdes, phlébites, etc.

**Posologie.** — 1 cuill. à café dans un peu d'eau avant chacun des trois repas, quinze jours par mois.

**Laboratoires Docteur FERRE**

6, rue Dombasle — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

## HÉMOPANBILINE

**Forme.** — Comprimés.

**Définition.** — L'*Hémopanbiline*, application de la méthode modifiée de Whipple, est une *Panbiline* (voir *Panbiline*) à laquelle est ajouté l'*Extrait Hépatique* spécial, avec toute son *efficacité hémopoiétique*, mais d'où sont exclus les albuminoïdes et les lipoïdes, source de mécomptes.

**Composition.** — *Panbiline* (Opothérapies hépatique et biliaire associées aux Chologogues) et *Extrait hémopoiétique de Foie*.

**Indications.** — Médication hépatique des *Anémies, Chlorose, Convalescence, Etats de déchéance, Ictère hémolytique*.

**Dose.** — 10 à 20 *Comprimés d'Hémopanbiline* par jour à prendre *par tiers* avant les repas.

*Enfants* : demi-dose.

Le tube de 100 comprimés d'Hémopanbiline suffit pour 10 jours de traitement à la dose moyenne quotidienne de 10 comprimés.

Prix au public :

38 fr. la boîte de 100 *Comprimés d'Hémopanbiline*.

**Laboratoire de la PANBILINE**

ANNONAY (Ardèche).

## HEMOPAUSINE

**Composition.** — Liqueur à base de : Hydrastis, Viburnum, Hamamélis, Capsicum, Cinéraria, Sels de chaux, Gentiane, Ecorce d'oranges amères.

**Action.** — Vaso-constriction veineuse, décongestive, hémostatique, circulatoire.

**Indications.** — Troubles de la ménopause et de la puberté, varices, hémorroïdes, varicocèle, phlébites, règles douloureuses.

**Mode d'emploi.** — Adultes : 1 à 3 verres à liqueur. Adolescents : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

**Laboratoire de l'HEMOPAUSINE**

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

## HÉMOPECTAL

(Médication antithémorragique).

**Forme pharmaceutique et composition.** — Boîte de 3 flacons ampoules de formule :

Solution pectine stabilisée à 2 p. 100	10 .
Chlorhydrophosphate de calcium ...	0 . 50
Solution titrée de genêt .....	0 . 20
(Pour 1 ampoule.)	

**Avantages.** — Produit très actif, s'employant par voie buccale ; pas de contre-indication, pas de toxicité même pour le très jeune enfant, pas d'accidents sériques, pas désagréable à absorber.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes hémorragies (métrorragies, hémoptysies, hémorragies post-opératoires). A prescrire à titre *préventif avant* et *après* toute intervention sanglante.

**Mode d'emploi.** — 3 (*enfants*) à 6 (*adolescents et adultes*) flacons-ampoules par jour dans un peu d'eau sucrée ou gazeuse.

**Prescription.** — 1 boîte ampoules Hémopectal Falvy.

**Les Laboratoires A. FALVY**

Licencié ès sciences

Ex-interne. Lauréat des Hôpitaux de Paris

40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## HÉMO-PHAGOSTYL

**Phagosthyl ferrugineux**  
(pour adultes).

### Formule :

Cacodylate de soude pur.....	20 centigr.
— de magnésie .....	10 —
Sulfate de strychnine .....	2 milligr.
Fer colloïdal.....	2 centigr.
Soluté chloruré isotonique .....	5 cc.

### Indications :

Chloro-Anémie, Anémies de toute origine, Asthénie, Troubles de la puberté, Douleurs périodiques, Surmenage, Convalescences, Leucémies.

### Emploi :

Une injection intramusculaire ou sous-cutanée tous les deux jours au niveau de la cuisse ou de la fesse. Absolument indolore.

Se vend en boîtes de 12 ampoules de 5 cc.

Prix au public : 22 francs.

**Laboratoires Biologiques André PÂRIS**  
4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## HÉMOPHILINE PLANCHE

### Elixir et Dragées.

**Composition.** — Elixir, à base de piscidia, hydrastis, Hamamélis, viburnum, persil, séneçon, salsepareille spéciale.

Dragées, mêmes plantes fraîches stabilisées sous forme d'extraits obtenus dans le vide.

Tous deux contiennent en plus le catalyseur général de la femme (détecté par analyse vibratoire), ce qui en augmente l'activité et en décuple l'efficacité.

**Indications.** — Formation de la jeune fille, de la femme mal réglée, malaises précédant ou accompagnant les époques, régulateur du flux menstruel trop ou pas assez abondant dont il calme les douleurs; aménorrhée, dysménorrhée, ménorrhagie, troubles généraux de la ménopause.

**Modes d'emploi.** — *Elixir* : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour dans un peu d'eau.

*Dragées* : 12 à 16 par jour, pendant la durée des règles.

Prix : 15 fr. 50. impôt compris.

**Laboratoire PLANCHE**  
Membre de l'Académie de Médecine

**P. SAUVAGE, successeur**  
2, rue Volney — PARIS (II<sup>e</sup>).

# HÉMOPLASE LUMIÈRE

Opothérapie sanguine totale.

Toutes les déchéances organiques quelle qu'en soit l'origine.

**Constitution.** — Extrait protoplasmique de globules sanguins d'animaux réfractaires à la tuberculose contient : Hémoglobine dont l'activité oxydasique est maxima, sérum sanguin, lipoides des globules rouges, lipoides et ferments des leucocytes.

**Indications.** — Toutes anémies :

- 1° Toxiques d'origine exogène ou endogène ;
- 2° Infectieuses (convalescences, tuberculose) ;
- 3° Par spoliation sanguine (hémorragies) ;
- 4° Par cachexie néo-plasique.

**Doses courantes.** — L'Hémo-plase Lumière peut être administrée par voie buccale, sous forme de granulés, de cachets et de dragées.

Granulés..... de 2 à 6 cuil. à café par jour ;

Cachets..... de 4 à 6 par jour,

Dragées..... de 6 à 10 —

Chez les enfants employer de préférence la forme en granulés : 1 à 4 cuillerées à café par jour.

**Ampoules.** — Pour l'administration par voie intra musculaire :

**Adultes :** 2 ou 3 ampoules de 10 cc, par semaine ;

**Enfants :** 2 à 10 cc. deux fois par semaine.

LABORATOIRES LUMIÈRE

23, Cours de la Liberté — LYON.

## HÉMORROIDINE GOUTTES

**Composition.** — Hamamelis, hydrastis, intrait de marrons d'Inde.

**Propriétés.** — Régulateur de l'insuffisance veineuse et de ses conséquences.

**Indications.** — « L'Hémorroïdine gouttes » est une préparation rationnelle applicable au traitement des hémorroïdes, avant tout, mais dont peuvent bénéficier d'autres manifestations veineuses, à savoir : *varices, varicoèles, ulcères variqueux, œdèmes phlébitiques.*

**Mode d'emploi.** — Quinze gouttes matin, midi et soir, avant les repas, dans un peu d'eau.

Prix : 12 francs.

Laboratoires KERFYSER

DUNKERQUE

## HÉMORROÏDINE POMMADE

**Composition.** — Adrénaline, scuroforme, intrait de marrons d'Inde, carbonate de plomb.

**Propriétés.** — Spécifique par excellence des hémorroïdes externes et internes, fissures, prurit anal, fistules.

**Indications.** — Arrête les hémorragies, calme les douleurs, décongestionne.

**Mode d'emploi.** — Pour les hémorroïdes externes : faire une application de la pommade matin et soir et après les garde-robes.

Pour les hémorroïdes internes : adapter la canule au tube. Ce dispositif permet l'application profonde et étendue de la pommade. Après usage, la canule en ébonite sera facilement stérilisée dans l'eau bouillante.

Prix : 10 francs.

**Laboratoires KERFYSER**  
DUNKERQUE.

---

## HÉMORROÏDINE SUPPOSITOIRES

**Composition.** — Adrénaline-scuroforme-intrait de marron d'Inde stabilisé, carbonate de plomb.

**Propriétés thérapeutiques.** — Décongestionnants, analgésiques, calmants.

**Indications.** — Hémorroïdes internes, fissures, prurit anal, fistules.

**Mode d'emploi.** — Introduire un ou deux suppositoires par jour, soit le matin au lever, soit le soir en se couchant lorsque les hémorroïdes sont douloureuses, congestionnées par la fatigue et la station verticale.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires KERFYSER**  
DUNKERQUE.



## HÉMOSTRA " ROCHE "

Thérapeutique biochimique nouvelle des anémies graves par supplémentation de l'organisme en acides aminés hématogènes.

### Composition

Tryptophane (0 gr. 10) et Chorhydrate d'histidine (0 gr. 20) pour une ampoule de 5 cc. en solution isotonique, neutre et stérilisée.

### Propriétés

Apporte directement à l'organisme, en proportions rationnellement dosées, les principes actifs du foie et réactive immédiatement et d'une façon considérable les processus de l'hématopoïèse.

### Avantages

Ne provoque pas de dégoût chez le malade ; évite l'action destructrice de la flore intestinale et permet de poursuivre le traitement aussi longtemps qu'il est nécessaire.

1 ampoule de 5 cc. équivaut, par ses effets, à plusieurs centaines de grammes de foie de veau.

### Indications

Toutes les anémies graves : Biermériennes, hémolytiques, leucémiques, splénomégaliqes, secondaires et néoplasiques.

### Mode d'emploi et doses

1 ampoule de 5 cc. tous les jours par voie sous-cutanée ou intramusculaire rigoureusement indolore. Aucune toxicité ; pas de contre-indication. On peut, dès le début, vérifier l'activité de cette préparation par une numération globulaire.

Deux sortes de conditionnement : 6 ampoules et 1 ampoule.

Ce dernier a été institué pour permettre un essai thérapeutique.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie.**  
21, Place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

## HÉMOSTYL DU D<sup>r</sup> ROUSSEL

Agent d'hémostase  
(Voir en outre page suivante)

Sérum frais, hémopoïétique de cheval.

### Action.

Hémostatique et Hyperleucocytaire général et local. Hémopoïétique.

### Formes pharmaceutiques.

1<sup>o</sup> Boîte de six flacons-ampoules.

2<sup>o</sup> Boîte de quarante-cinq comprimés.

3<sup>o</sup> Flacon de sirop.

4<sup>o</sup> Ovules : usage gynécologique.

*Le sérum liquide (flacons-ampoules), seul est hémostatique.*

### Indications :

Syndromes toxi-hémorragiques, hémophilie, Hémorragies (hémoptyxies, entérorragies, métrorragies, etc.). Plaies saignantes.

### Posologie dans les hémorragies :

Dans les cas aigus : injection de 30 cc. (technique du sérum antidiphthérique). Dans tous les autres cas : ingestion ou mieux lavement de trois flacons-ampoules. Utiliser en outre, si possible, l'application locale : tamponnements (métrorragies, épistaxis, etc.).

Littérature et échantillons :

### Laboratoire de l'HÉMOSTYL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).  
Téléphone : Littré 68-22, 23, 24.  
R. C. 18.000.

# HÉMOSTYL DU D<sup>r</sup> ROUSSEL

Agent d'hémopoïèse.

Sérum *hémopoïétique* frais de cheval, c'est-à-dire recueilli sur un animal mis, par une saignée préalable, en pleine crise de régénération hématique.

**Action.** — 1<sup>o</sup> Hémopoïétique spécifique (Prof. Carnot, Acad. des Sciences 1906); 2<sup>o</sup> Tous les autres emplois du sérum de cheval : Hémostatique, Hyperleucocytaire général et local.

**Formes pharm.** — 1<sup>o</sup> Boîte de 6 flacons-ampoules de 10 cc. de sérum pur ; 2<sup>o</sup> Boîte de 45 comprimés de Sang hémopoïétique total desséché ; 3<sup>o</sup> Flacon de trois cents grammes de Sirop de Sang hémopoïétique total ; 4<sup>o</sup> Ovules.

**Indications et posologie dans les Anémies.** — Toutes les Anémies, quelle qu'en soit la nature, Convalescences, Tuberculose, Paludisme, Suites opératoires et Obstétricales, etc.

**Mode d'emploi.** — Un ou deux flacons-ampoules de 10 cc. par jour, en ingestion ou lavement, ou 6 à 8 comprimés, ou 2 à 3 cuillerées à potage de Sirop  
Enfants : demi-dose.

Littérature et Échantillons :

**Laboratoire de l'HÉMOSTYL**

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).

Téléphone : Littré 68-22, 23, 24.

R. C. 18.000.

## HÉMOTAL.

Complexe opo-organo minéral granulé, association synergique de toniques organiques et de produits opothérapiques.

**Indications.** — Spécifique des maladies de la nutrition. Anémie, neurasthénie, tuberculose, surmenage, débilité générale, croissance.

**Posologie.** — *Adultes.* — Laisser fondre dans la bouche 2 cuillerées à café de granulé au début des repas.

*Enfants* : 1 cuillerée par repas.

**Laboratoires UNIS SPÈS**

14, rue Demarquay — PARIS.

---

## HÉMOTONINE BUISSON

Complexe de Fer-Strychnine, arsenic et phosphore organique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Tonique sanguin complet.

**Indications.** — Tous les états anémiques, Convalescence, Asthénie, toutes causes de déchéance organique.

**Forme.** — Ampoules.

**Posologie.** — 1 ampoule par jour, par séries de 12 ; injections intra-musculaires profondes.  
Injections absolument indolores.

Prix de vente au public : 25 fr. la boîte de 12 amp.  
Prix médical : 16 fr. 90 la boîte de 12 amp.

**Société Générale  
d'Applications Thérapeutiques  
THERAPLIX**

Pierre BRETEAU, Pharmacien  
Membre de l'Académie de Médecine  
157, rue de Sèvres — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## HEMOVEINE

### Comprimés.

**Composition.** — 1° Extraits secs de Marron d'Inde, d'Hamamélis, de Viburnum, de Cupressus.

2° Poudres d'organes à sécrétion interne : ovaire, thyroïde, hypophyse, surrénale.

**Action.** — Pharmacodynamique multiple : Vasoconstriction et diminution progressive du calibre de la veine, disparition du spasme vasculaire et de la douleur consécutive, sédation utérine, régulation des règles, réapparition rapide du potentiel d'énergie tout en empêchant l'hypertension.

Fait merveille dans tous les cas de Stase Veineuse.

**Indications.** — Maladies nerveuses en général : Varices, Ulcères variqueux, Phlébites, Hémorroïdes, Troubles congestifs de la fonction ovarienne : Dysménorrhée, Métrorragie, Troubles de la ménopause, Troubles de la circulation générale.

**Mode d'emploi.** — 6 dragées par jour à raison de deux avant chacun des trois repas.

**Laboratoires BRICHARD et Fils**

BAR-LE-DUC (Meuse).

## HEMYPNAL CIBA

Analgésique obstétrical et urinaire.

Trichloro-butylalcool-diallylmalonylurate d'éthyl-morphine. Analgésique particulièrement propre à atténuer considérablement les douleurs de l'accouchement, sans aucun danger ni pour la mère ni pour l'enfant. Utilisable également pour les petites interventions gynécologiques ou urologiques.

*Trois formes : Cachets, Suppositoires, Ampoules.*

**Indications.** — Accouchements douloureux (rigidité du col, hypertonie utérine). Curettages, cystoscopies. Cathétérismes, prostatectomies.

**Doses.** — Pour un accouchement : 2 à 4 suppositoires, 1 à 3 ampoules. Interventions : 1 à 2 cachets ou suppositoires dans l'heure qui précède ; 2 à 4 suppositoires par 24 heures après l'opération.

Le tube de 10 cachets.	} 20 francs.
La boîte de 4 suppositoires.	
La boîte de 4 ampoules.	

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**

107-113, boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## HEPANEME

**Composition.** — Extrait de foie très concentré (méthode de Whipple) associé au Protoxalate de fer et au Phosphate de soude.

**Forme.** — *Comprimés seulement.*

**Indications.** — Recommandé pour le traitement des anémies ordinaires.

**Mode d'emploi.** — *Enfants* : 2 comprimés par jour aux repas.

*Adultes* : 4 à 6 comprimés par jour.

Prix de la boîte de 50 comprimés : 20 francs.

**Laboratoire de Biologie appliquée**

**H. CARRION et C<sup>ie</sup>,**

54, Faubourg Saint-Honoré  
PARIS (VIII<sup>e</sup>).

**V. Borrien, Docteur en Pharmacie.**

## HEPAPHOS

Reconstituant général.

**Composition et forme.** — Granulé fondant à base de : Extrait de Foie, Protoxalate de fer, Phosphore végétal, Vitamines.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

*Enfants* : 1 à 3 cuillerées à café par jour suivant âge et indications du médecin.

**Indications thérapeutiques.** — Anémies légères, Convalescences, Troubles de croissance, Surmenage, Déminéralisation.

*Aucune contre-indication.*

Prix : 20 francs (traitement d'une semaine).

Si Anémies graves, prescrire HEPATROL.

**Laboratoires A. ROLLAND**

31, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## HÉPARBILINE

(Cholagogue complet.)

**Forme.** — Granulé soluble et aromatisé.

**Composition.** — Sulfate de magnésie, Peptone (agissant sur l'excrétion biliaire), Bile, Boldo (agissant sur la sécrétion biliaire).

**Propriétés thérapeutiques.** — Cholagogue complet, efficace, à base de substances cholécysto-kinétiques et cholérétiques. Agit sur l'excrétion et la sécrétion biliaire.

**Indications.** — Toutes les affections du foie et des voies biliaires (ictère, cholécystites, lithiase biliaire, engorgement du foie et de la vésicule biliaire). Inappétence, migraine, urticaire, affections dermatologiques, certaines formes d'asthme, fatigue générale, etc.

**Posologie.** — Le matin à jeun, 1/2 h. avant de manger, deux cuillerées à café dans un verre d'eau tiède.

**Laboratoires « OPTIMA » S. A.**

78-80, Grande-Rue-au-Bois — BRUXELLES.

---

## HÉPARMONE

Ad optée par les Hôpitaux de Paris.

Traitement des Anémies (méthode de Whipple).

**Composition.** — Hormone hépatique purifiée, présentée en ampoules ingérables de 10 cc. (boîte de 6 et 12 ampoules). *Chaque ampoule correspond à l'activité de 125 gr. de foie frais.*

*Enfants* : ampoules de 2 cc. = 25 gr. foie frais.

**Indications thérapeutiques.** — L'Héparmone trouve son emploi non seulement dans l'anémie pernicieuse cryptogénique, mais encore dans toutes les anémies où la méthode de Whipple est indiquée.

**Posologie.** — *Adultes* : 1 à 3 ampoules par jour.

*Enfants* : 3 à 5 ampoules par jour, à prendre dans une demi-tasse de bouillon tiède ou même d'eau légèrement tiède, une demi-heure avant les repas.

**Les Établissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS

## HEPATHEMO

Méthode de Whipple  
(Technique de Minot et Murphy.)

**Traitement** des anémies par le foie de veau associé au fer globulaire (technique de Minot et Murphy).

**Nature.** — *L'Hépathemo* est constitué : 1° Par un extrait de foie de veau hydrosoluble préparé à froid sans traumatisme et contenant physiologiquement intact le principe anti-anémique du foie.

2° Les substances minimales (hémopoïétines) sériques et globulaires.

3° Une proportion rigoureusement déterminée de fer globulaire.

**Action.** — 1° Action spécifique du principe anti-anémique du foie de veau frais.

2° Action stimulante sur les organes hémopoïétiques.

3° Action réparatrice par apport de fer globulaire.

**Indications.** — Anémies pernicieuses. Anémies symptomatiques graves.

**Formes.** — Hepathemo ampoules ingérables de 10 cc. correspondant à 125 gr. de foie frais.

Hepathemo sirop.

**Posologie :**

*Ampoules :* 2 à 3 ampoules par jour. *Sirop :* 2 à 8 cuillerées par jour

Pas de contre-indications.

**DESCHIENS, Docteur en Pharmacie**

9, rue Paul-Baudry — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## HEPATISMINE

Synergie médicamenteuse à doses homœopathiques.

**Composition.** — Extraits : biliaire, 0,10 ; hépatique, 0,01 ; pancréatique, 0,01 ; duodénal, 0,01 ; boldo, 0,005 ; évonymine, 0,005, podophylline, 0,005 ; oléate de soude, 0,05 ; urotropine, 0,05, en comprimés glutinisés dragéifiés.

**Cholagogue,** excitant des fonctions hépatique, vésiculaire, pancréatique et intestinale. Antisepsie biliaire et urinaire. Prophylaxie des maladies dites par ralentissement de la nutrition.

**Indications.** — Hépatisme, cholémies familiales, insuffisances hépatique et biliaire, constipation, goutte, arthritisme, dermatoses, asthme uricémique. glycosurie, pléthore abdominale.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 comprimés à chaque repas.

**Produits SANOVA**

41, rue d'Amsterdam — PARIS (VIII<sup>e</sup>).



## HÉPATO-BYL

Opothérapies entérique, hépatique et biliaire en ovoïdes glutinisés.

**Dose.** — 4 à 8 ovoïdes par jour, en trois fois, dix minutes avant les repas, avec un demi-verre d'eau, ou le soir, la dose complète en une seule fois avant de se coucher.

**Propriétés.** — L'extrait biliaire seul est thérapeutiquement insuffisant. Aussi le Corps Médical prescrit de préférence l'extrait total de la glande hépatique (bile et foie) additionné d'extrait intestinal, dans la Constipation, l'Entérocolite et toutes les affections du foie.

Médication sans similaires.

**Laboratoires A. DANIEL-BRUNET**

8, rue de la Source — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
Tél. : Auteuil 11.86

---

## HÉPATODIASÉ

### Composition :

Opothérapie gastro-intestinale associée aux ferments. En comprimés dragéifiés à base de diastase, pepsine, duodenum, orchitine, chlorure de magnésium, bromure de calcium et noix vomique.

### Indications :

Traitement rationnel de toutes les affections du tube digestif. Dyspepsie nerveuse, entérite muco-membraneuse, aérophagie. Décongestif du foie.

### Posologie :

Deux comprimés après chaque repas.

**Laboratoires UNIS-SPÈS**

14 rue, Demarquay — PARIS.

## HÉPATOSODINE

**Médication** alcaline polyvalente associée au benzoate de soude et à l'héxaméthylène tétramine, Syndrome hépato-entéro-rénal.

**Action.** — Sur l'estomac, le foie, le sang, l'intestin.

**Indications.** — Insuffisance hépatorénale sous toutes ses formes. Angiocholécystites chroniques ou subaiguës, congestion hépatique, lithiase biliaire, ictère, hypotonie gastrique avec retard à l'évacuation, désintoxication pré ou post-opératoire.

**Doses.** — *Avant une opération* : Une cuillerée à café dans un verre d'eau au réveil, pendant les 8 jours qui précèdent l'intervention.

**Troubles gastriques** : Une demi-cuillerée à café dans 100 gr. d'eau tiède, à jeun le matin, et le soir à 18 heures.

**Troubles hépatiques** : Une demi-cuillerée à café dans un verre d'eau le matin à jeun, 10 jours chaque mois.

**Constipation** : 1 à 3 cuillerées à café dans un verre d'eau au réveil.

Prix : 14 francs.

Laboratoires DURET et REMY  
et du Docteur Pierre ROLLAND réunis  
ASNIERES (Seine).

## HÉPATOZYL CALDO

Traitement opothérapique  
des Fonctions hépatiques.

**Composition.** — Boldine cristallisée, Hépatine, Extrait Combretum, Fiel de bœuf, Rhamnus purshiana, Rhamnus frangula.

**Indications.** — Constipation, Entérocolite, Coliques hépatiques, Cirrhose et Précirrhoses, Ictère, Affections d'origine colomiale.

**Forme.** — Pilules à enrobage de gluten.

**Dose :**

4 à 8 par jour aux principaux repas.

Prix : 12 francs.

Laboratoire Moderne  
d'Opothérapie et Biologie Médicale.  
40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE.

## HÉPATROL

(Forme buvable)

Extrait hydro-soluble de foie de veau frais.

### MÉTHODE DE WHIPPLE

Sans contre-indication. Adultes et enfants.

**Indications.** — Toutes Anémies, Asthénies, Insuffisances hépatiques.

**Formes thérapeutiques.** — Ampoules buvables non injectables.

*Adultes* : 1 ampoule 10 cc. = 125 gr. de foie.

Boîte de 6 ampoules. Coffret 18 ampoules.

*Enfants* : 1 ampoule 2 cc. = 25 gr. de foie.

Boîte de 12 ampoules.

Ce dosage est indiqué également dans les anémies légères et les insuffisances hépatiques de l'adulte.

**Posologie.** — 1 à 3 ampoules par jour à prendre dans un liquide quelconque au début des repas.

## HÉPATROL INJECTABLE

Extrait de foie de veau entièrement déprotéiné ayant conservé toutes les hormones hépatiques de l'organe frais (activité standardisée par contrôle biologique.)

**Indications** — Anémies graves et cas d'intolérance absolue au traitement *per os*. Permet démarrage rapide.

**Mode d'emploi** — Par voie intramusculaire. Injecter chaque jour 2 à 6 cc. jusqu'à démarrage et disparition de l'intolérance puis associer Hépatrol buvable.

**Présentation** — *Adultes* : ampoules de 2 cc.

Boîtes de 6 et 12 ampoules.

*Enfants* : ampoules de 1 cc.

Boîtes de 6 et 12 ampoules.

Voir communications  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Presse Médicale 20 Sept. 1930} \\ \text{(Acharé)} \\ \text{Soc. Méd. Hôp. 19 Mai 1930} \\ \text{(Aubertin)} \\ \text{Soc. Dermato. Janv. 1931 (Pinard)} \end{array} \right.$

Laboratoire **ALBERT ROLLAND**

31, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## HÉRACLÉOL

(Héraclès-Hercule).

Nucléi-arrhénocalcium (procédé Elzévir). Fixe le calcium organique. Active l'hémopoïèse et la phagocytose. Nourrit la cellule nerveuse. Augmente l'appétit et le métabolisme basal. Augmente le coefficient respiratoire et l'assimilation des aliments.

**Indications.** — *Tuberculose, Rachitisme, Décalfications, Anémie, Asthénie, Convalescence.*

### Posologie :

*Granulé* : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

*Elixir* : *Enfants* : dose moitié.

*Ampoules* : 1 ampoule sous-cutanée (indolore) tous les jours.

Adopté par les hôpitaux et cliniques de Paris.

Littérature et échantillons au Corps médical.

**Laboratoires H. SALLE**

4, rue Elzévir — PARIS (III<sup>e</sup>).

## HERGENOL

Coqueluche. Toux spasmodiques et bacillaires. Asthme.

**Composition.** — Essences naturelles balsamiques et carbures halogénés antispasmodiques.

**Forme.** — Produit volatil. Usage externe.

**Emploi.** — Verser XXX gouttes sur un carré de flanelle. A maintenir en permanence à proximité des voies respiratoires.

### Doses :

*Bébés et enfants* : Renouveler 2 à 3 fois au cours des 24 heures.

*Adultes* : 3 à 4 fois suivant besoin.

Prix : Le flacon : 15 francs.

**Laboratoires GROS**

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.

# HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Antisypilitique, Cholagogue, Diurétique.

**Constitution.** — Mercure phénol disulfonate de sodium représente 40 p. 100 de mercure métallique.

**Propriétés.** — Elimination rapide, sans aucune réaction nocive sur le rein. Son hypotoxité permet à chaque injection intra-musculaire, d'administrer 5 fois plus d'Hg métallique qu'avec le cyanure.

## Indication et doses.

1° *Syphilis* : Accidents primaires, secondaires et tertiaires.

a) Par voie sous-cutanée (injections intra-musculaires ou dans le tissu cellulaire). 10 à 20 centigr. par injection. Une injection tous les 2 ou 3 jours.

b) Par voie stomacale : De 20 à 30 centigr. d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE par jour.

## 2° Antisepsie.

a) Chirurgie : Antisepsie des surfaces et des cavités purulentes, lavages des mains et des instruments, solution de 1 à 10 p. 1 000.

b) Antisepsie des voies génito-urinaires : Blennorrhagies, injections uréthrales, instillations et grands lavages uréthraux ou vésicaux, solutions à 1 p. 100 et 1 p. 200. Cystites : Lavages vésicaux à 7 p. 1 000.

**Formuler.** — Selon les cas :

Boîte d'ampoules d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE, 10 centigr. par cc. titrée à 5 centigr.

Flacon de dragées d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE.

Boîte de comprimés d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE.

**LABORATOIRES LUMIÈRE.**

23, Cours de la Liberté — LYON.

# HEXAFEL

Régulateur des fonctions biliaires et digestives.

Cachets globulaires : extrait biliaire, magnésie, térébenthine modifiée, hexaméthylènetétramine.

**Mode d'action.** — Favorise l'assimilation des aliments. Active la digestion intestinale. Régularise la fonction hépatique. Excite le péristaltisme intestinal.

**Indications.** — Insuffisances biliaires, troubles hépatiques.

Fermentations intestinales, entéro-colites.

Insuffisance ou stase du bol fécal, constipations chroniques.

Prix : 20 francs

Echantillon grandeur normale sur demande.

**Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées**

47, rue de Paris — ASNIÈRES (Seine).

## HEXOTAL

Antiseptique urinaire et hépato-rénal.

**Composition.** — Citroléate d'Hexaméthylènetétramine ; Santalol pur et gluten.

**Avantages.** — Stabilisation de l'urotropine sous une forme combinée et indécomposable par le chimisme gastrique. Production de composés formolés dans l'appareil urinaire seulement. Pas de troubles concomitants. Jamais d'hématurie. Antisepsie de surface et de profondeur (Santalol). Histogenèse puissante. Action urisolvante. Tolérance indéfinie.

**Emploi et doses.** — *Cas aigus* : 6-12-15 globules par jour, à doses filées.

*Cas chroniques* : 6-8-10 globules par jour.

**Indications.** — Cystites, Prostatites, Gonococcies, Bactériuries, Pyélites, Pyélonéphrites, Colibacilloses, etc. Phosphaturies, Urines ammoniacales, Coliques hépatiques et néphrétiques, Cholécystites, Diathèse urique. — Echantillons. Littérature.

Dépôt — Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**.

61, boulevard Malesherbes. — PARIS.

**Laboratoires CAMUSET**

18, rue Ernest-Rousselle. — PARIS

## HIPPOSARCINE ROY

Suc musculaire total exprimé à froid.

Provenant du cheval vigoureux et reposé.

Supérieur au suc musculaire des bovidés.

Par sa plus grande richesse en Azote, en Glycogène, en Hémoglobine, en Phosphate et en Fer ;

Par l'absence totale de Bacilles tuberculeux, de Cysticerques, du Taenia.

Assimilation parfaite.

Aucun inconvénient digestif.

Son goût agréable le fait accepter avec plaisir par les malades qui en retirent toujours grand profit.

Tuberculoses pulmonaires et chirurgicales. Tout état d'affaiblissement et de consommation. Maladies de l'estomac et des intestins.

**GIVAUDAN-LAVIROTTE**

56, Chemin de Combe-Blanche. — LYON.

## HIRUDINASE

Le premier produit spécialisé à base d'extrait de sangsues.

**Indications.** — Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Acrocyanose, Œdèmes trophiques, Artérites aiguës et chronique, Troubles de la ménopause, Troubles de la menstruation, Artério-sclérose.

### Formule :

Extrait de sangsues (procédé spécial).

Iode-citrate de soude.

Extrait d'hypophyse.

Hamamélis-hydrastis-marron d'Inde.

Extrait hépatique.

**Présentations.** — *a. Dragées ; b. Suppositoires.*

**Mode d'emploi.** — 2 dragées au milieu de chacun des principaux repas. (Affections vasculaires).

Un suppositoire le soir au coucher (Hémorroïdes, Fissures anales, Proctites).

Produits du Laboratoire de Dermatologie de Paris

**HOURQUET et VIENNE**

pharmaciens-concessionnaires

144, rue du Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## HISTOGÉNOL

Puissant reconstituant général.

**Indications.** — Tuberculose, Bronchites, Lymphatisme, Scrofule, Neurasthénie, etc.

**Formes.** — Elixir, Granulé, Ampoules, Comprimés, Concentré.

**Posologie.** — *Adultes :* Une cuillerée élixir ou une mesure de granulé avant chaque repas ou un comprimé matin et soir ou une ampoule par jour.

*Enfants :* Moitié doses.

**Établissements MOUNEYRAT**

12, rue de Chemin-Vert

à **VILLENEUVE-LA-GARENNE**

près Saint-Denis (Seine).

## HOLASEPTINE

Selon la formule du D<sup>r</sup> T.-L. Roux contre la Coqueluche et toutes maladies des poumons : bronchite, grippe, pneumonie, tuberculose, etc...

**Composition.** — Huile éthérée, camphrée, goménolée et essences balsamiques.

**Formes et posologie.** — **Liquide.** — S'administre par voie rectale sans irritation du rectum, même chez les nourrissons. Est employée avec succès pour le pansement de toutes plaies irritées.

**Ampoules.** — 1 à 6 par jour en injections sous-cutanées profondes ou intramusculaires.

Prix :

Holaseptine liquide : 25 francs.

Holaseptine ampoules : 20 francs.

**Laboratoires CH. LAVERGNE**

5, rue Grande — CANNES (Alpes-Maritimes).

## HOLOS

Opothérapie osseuse.

**Nature.** — Extrait opothérapique d'os vivants, renfermant périoste, corps osseux, éléments actifs (non gras) de la moelle, retiré à température physiologique d'os de bœufs et de veaux pris directement à l'abattoir sur des animaux encore chauds.

**Indications.** — Reminéralisation du terrain tuberculeux : Prétuberculose, tuberculoses osseuse et pulmonaire. Rachitisme et tous les troubles de l'ostéogénèse. Phosphaturie, Grossesse, Allaitement, Convalescences, Dentition, Fractures et en général dans tous les cas où s'impose une prompte reconstitution du terrain organique par des éléments phosphatés et fluorés réellement assimilables.

**Posologie.** — Une petite cuiller-mesure, bien pleine (1 gr.) à chaque repas, mêlée aux aliments (aucun goût). Chez les très jeunes enfants, se contenter d'une 1/2 mesure.

Littérature — Echantillons.

**DESCHIENS, Docteur en Pharmacie,**

9, rue Paul-Baudry — PARIS.



## HOLOVARINE

**Forme et composition.** — Cachets dosés à 0 gr. 10 et 0 gr. 20 de poudre d'ovaire intégral. Odeur agréable. Assimilation facile.

**Avantages.** — Desséchée par un procédé nouveau qui, par sa rapidité, permet à l'organe de conserver toutes ses propriétés. Contient tous les principes actifs de l'ovaire.

**Indications.** — Toutes les insuffisances ovariennes ; troubles de la puberté, de la ménopause, de la menstruation, de la grossesse, de la sécrétion lactée, stérilité, obésité.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 1 à 2 cachets à 0 gr. 20 par jour.

*Adolescentes* : 1 à 2 cachets à 0 gr. 10 par jour.  
Cures successives de 5 à 10 jours.

La boîte de 24 cachets à 0 gr. 20, 15 francs.

La boîte de 24 cachets à 0 gr. 10, 9 fr. 50.

**Laboratoire de Thérapeutique Générale**

48, rue de la Procession — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## HOPOGAN BOCQUILLON

Composé organo-minéral, à base de Peroxyde de Magnésium retraité pour l'emploi thérapeutique (interne).

Les Sels d'HOPOGAN-BOCQUILLON se désagrègent, entrent en réaction et agissent à volonté (suivant formes médicamenteuses), soit dans l'estomac, soit dans l'intestin, dont ils recouvrent et « tapissent » la paroi, à l'exemple d'un véritable pansement interne et Alcalin, chargé de détruire par l'Oxygène et la Magnésie, les fermentations anormales et les acides gastro-intestinaux qu'ils transforment, par réaction lente, en produits d'élimination.

L'emploi de l'*Hopogan* assure : la désinfection la plus complète, la désintoxication et la vivification de l'organisme dans chacune de ses fonctions cellulaires normales.

Sous les formes *intestinales*, il constitue le *Traitement Magnésien*, le plus efficace (oxygène et magnésie), contre la *Diathèse Cancéreuse* (VOIR Technique du Professeur Delbet, 1928.)

**Formes.** — *Estomac* : comprimés, cachets. — *Intestin* : pilules kératinisées, gélacapsules, prise-bébé. — *Arthritisme* : Hopoganase.

**Laboratoire des Peroxydes médicaux**

12-18, rue Lamartine — PARIS.

## HORMOBILINE

Laxatif opothérapique.

Médicament héroïque et rationnel de la CONSTIPATION et des affections chroniques du gros intestin.

**Composition.** — Hormones cœco — appendiculaires et extraits biliaires sélectionnés.

**Indications.** — Constipation, colopathies, séquelles d'appendicectomie, entéro-colite muco-membraneuse, insuffisances biliaires, ictères, cholémies.

**Avantages.** — Ne provoque ni dégoût, ni accoutumance, est facilement absorbable et ne présente aucune contre-indication.

**Posologie.** — *Forme liquide* : 1 à 3 cuillerées à café, diluées dans un peu d'eau naturelle ou gazeuse (Saint-Galmier ou Couzan) avant le repas du soir ou au moment du coucher.

*Clystère* : 4 cuillerées à café pour un litre d'eau bouillie.  
*Forme pilulaire* : 2 à 4 pilules avant le repas du soir ou au moment du coucher.

Echantillons et littérature

**Laboratoires DORANTOWICZ**

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI<sup>e</sup>).

Tél. : Roquette 14-12.

## HORMOCLINE

Chlorhydrate de Choline

Traitement des Etats Tuberculeux

**Propriétés thérapeutiques.** — Le chlorhydrate de choline est une hormone qui agit sur le métabolisme du cholestérol, excite les surrénales aux propriétés anti-toxiques puissantes et opère ainsi une transformation du terrain biologique se manifestant par un relèvement de l'état clinique général.

**Indications.** — Toutes les formes de la tuberculose à tous les stades d'évolution, aussi bien dans les formes médicales que dans les formes chirurgicales. Amaigrissements, Asthénies, anorexies rebelles.

Adjuvant précieux des cures hygiéno-diététiques. Abaissement de la température, diminution des signes fonctionnels, engraissement rapide et durable.

Innocuité absolue. Tolérance parfaite, aucune contre-indication.

**Mode d'emploi.** — Une injection sous-cutanée tous les deux jours. Boîtes de 12 ampoules de 1 cc. dosées à 2 centigr. de chlorhydrate de choline.

**Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT**

52, rue La Bruyère — PARIS (IX<sup>e</sup>).

Adresse télégr. : Chevrematte 90 — PARIS.

## HORMOTONE

**Composition.** — Association des hormones excitantes extraites des glandes thyroïde, pituitaire, surrénales et génitales, exerçant une action directe sur le métabolisme et le processus menstruel.

**Indications.** — Neurasthénie, dépressions, troubles nerveux, troubles menstruels, insuffisance cardiaque, hypertension, etc.

**Présentation.** — Flacons de 25 et 50 tablettes.

**Mode d'emploi.** — Une ou deux tablettes, trois fois par jour avant les repas.

Prix : Flacon de 25 tablettes : 25 fr. 85.

— 50 — 43 francs.

**G. W. CARRICK CO.**

20 Mt. Pleasant avenue Newark, N. J. U. S. A.

Agent pour la France : **DÉGÉCÉ**

7, rue Princesse — PARIS.

Agent en Belgique :

**Pharmacie Centrale de Belgique**

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

## HORMOVARINE BYLA

(Folliculine).

(En ampoules injectables, comprimés et ovules.)

**Composition.** — Folliculine, ou hormone ovarienne spécifique, physiologiquement titrée.

**Propriétés thérapeutiques.** — L'HORMOVARINE BYLA remplace la sécrétion interne de l'ovaire.

**Indications.** — L'HORMOVARINE BYLA peut être utilisée dans tous les cas d'hypo-fonctionnement ovarien et donne des résultats très favorables dans l'aménorrhée, la dysménorrhée, l'hypoplasie utérine, les troubles de la ménopause, l'ovariectomie, la stérilité, l'obésité, etc., et dans certains cas de diabète ovarien résistant à l'insuline.

**Mode d'emploi.** — Une ampoule tous les jours en injection lente, intramusculaire ou 2 à 3 comprimés quotidiens, ou un ovule le soir en se couchant.

L'HORMOVARINE doit se prescrire de préférence par séries de 6 à 10 jours, dans la période qui précède immédiatement la date présumée de la prochaine menstruation.

**Les Établissements BYLA,**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

## HUILE CROLAS

de Ricin, chimiquement pure

Obtenue par des procédés purement mécaniques, sans l'intervention d'aucun produit chimique.

*Absolument sans saveur et sans odeur*, ne contient cependant que de l'huile de Ricin.

Le purgatif par excellence des enfants et des personnes délicates.

En flacons spéciaux à bouchage hermétique de 15, 30, 45, 60 grammes et flacon provision de 250 grammes.

### GIVAUDAN-LAVIROTTE

56, chemin de Combe-Blanche — LYON.

---

## HUILE GALLINA

Lipoïdes des Galli résistants au Bacille de Koch, Morhuate d'Éthyle, Cinamate de Benzyle.

### Formes :

Ampoules de 5 cc. (voie parentérale, tissus).

### Indications :

Toutes les formes de la tuberculose viscérale.

Prix, 10 ampoules de 5 cc. : 24 francs.

**Établissements GALLINA**

4, rue Candolle — PARIS (V<sup>e</sup>).

## HUILE GRISE ERCÉ

**Constitution.** — Huile grise de formule spéciale, complètement résorbable, sans huiles minérales.

**Forme.** — Ampoules-seringues auto-injectables.

**Avantages.** — 1° *Indolore*, neutralité absolue.

2° Assimilation totale. *Résorption* rapide.

3° *Dosage* absolument rigoureux.

**Posologie.** — 0,02 à 0,15 de Hg. complètement injecté.

**Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE**  
37, rue de Bourgogne — PARIS.

---

## HYDRALIN

**Antiseptique gynécologique.**

**Composition.** — Perborate de soude, Borate de Soude, Bicarbonate de Soude, Fluorure de Sodium, essences aromatiques.

**Propriétés.** — Est une source d'oxygène naissant. Donne une solution dialytique alcaline. Exalte le pouvoir défensif des muqueuses. Evite la pullulation des germes pathogènes. Dissout les sécrétions et les mucosités.

**Indications.** — Leucorrhées, métrites, vaginites. Antiseptique idéal pour les soins intimes et hygiéniques de la femme.

**Présentation.** — Sachets de poudre agréablement parfumée et immédiatement soluble.

**Mode d'emploi.** — Prescrire pour une injection chaude, un sachet pour 1 litre d'eau.

La boîte de 30 cachets : 10 francs.

**Laboratoires CAILLAUD**

37, rue de la Fédération — PARIS (XV°).

Téléphone : Invalides 12-63.

## HYDRORRHÉOL

(Ancien Hydrastol)

Sous forme de cachets.

**Composition.** — Terpentol et Hépatine sans aucun toxique.

**Propriété.** — Désensibilisateur de la Muqueuse nasale.

**Indications.** — Écoulement nasal, Hydrorrhée nasale, Rhinite spasmodique, Rhume au début.

**Mode d'emploi.** — 3 à 4 cachets par jour.

Laboratoire Laryngologique

**VOCALDOP ET HYDRORRHÉOL**

222, faubourg Saint-Martin — PARIS (X<sup>e</sup>).

## HYDROXYDASE

Anti-toxine naturelle vivante, eau minérale naturelle du Breuil et du Broc (Puy-de-Dôme).

**Composition.** — *Eau minérale naturelle* chlorurée, bicarbonatée sodique, magnésienne et ferrugineuse; jusqu'ici *unique en hydro-minéralogie*, donne des réactions oxydasiques.

**Mode d'action.** — Grâce à ses nombreux colloïdes naturels, elle fixe l'oxygène intérieur et le rétrocède aux toxines et déchets de l'organisme, les brûle, les détruit et les élimine. Augmente le pouvoir d'oxydation du système endocrinien, et supplée aux sécrétions des glandes déficientes.

**Indications.** — Intoxications endogènes (rhumatismes, goutte, diabète, eczéma, obésité, etc.).

Intoxications exogènes (convalescences difficiles, arthritismes, uricémie, indicanurie, urobilinurie).

**Mode d'emploi.** — Cure normale : un verre le matin à jeun et un verre une heure avant chaque repas pendant 20 jours (souvent renforcée par des injections sous-cutanées ou intramusculaires).

L'Hydroxydase, embouteillée au griffon sans contact avec l'air, doit être consommée aussitôt débouchée. Elle est livrée en caissettes de 20 petites bouteilles de la contenance d'un verre, et en ampoules de 10 cent. cubes.

**Compagnie de l'HYDROXYDASE.**

Siège social, 10, rue Blanche — PARIS. — Tél. : Trinité 08-21.

## HYOL

(Norwegian Essence).

**Composition.** — A base de menthol, gaïacol, et de plantes aromatiques (Cedrus, Ablès, Epicéa, Pinus, Larix).

**Indications.** — Asthme, Bronchites, Coryza, Coqueluche, Grippe, Laryngites, Toux spasmodique, etc...

**Mode d'emploi.** — Inhalations, évaporations à froid, Pulvérisations, Gargarismes.

Le flacon : 16 francs.

Echantillons et littérature :

**Laboratoire NEUVILLE**  
239, faubourg Saint-Honoré  
PARIS.

---

## HYOSCYAMINE HOUDÉ

Granules titrés à 1 milligramme.

**Hyoscyamine Houdé.** — Produit pur cristallisé, extrait de l'*Hyoscyamus Niger*.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antispasmodique, calmant, hypnotique, d'un emploi très répandu dans le traitement des séquelles de l'encéphalite léthargique où elle donne des résultats surprenants.

Produit stable, d'action certaine et constante.

**Doses et mode d'emploi.** — 2 à 6 granules *pro die* ; les prendre avant les repas.

**Laboratoires HOUDÉ**  
9, rue Dieu — PARIS.

## HYPALÈNE

**Composition.** — Combinaison de l'acide Cyclopenténylallylbarbiturique avec le Phényl-diméthyl-diméthylamino-pyrazolone.

**Action.** — Analgésique, Sédatif, Hypnogène.

**Indication.** — Traitement de l'insomnie douloureuse, algies diverses, angoisse pré-opératoire, et douleurs post-opératoires.

**Force pharmaceutique.** — Comprimés divisibles permettant de graduer les doses. Ne contenant pas de toxique du Tableau B.

**Dose.** — Angoisse pré-opératoire, 1 à 2 comprimés d'Hypalène quelques minutes avant l'intervention.

*Algies diverses, douleurs post-opératoires :* 1 à 4 comprimés dans les 24 heures au moment des douleurs.

*Dose hypnogène :* 1 à 2 comprimés le soir au moment de se coucher, 1 heure ou 2 après le repas.

Prix : 13 francs.

**Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND**  
15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).

---

## HYPERSAN

*Médication hypotensive-diurétique*

**Composition.** — Association d'extraits fluides de Gui, cratœgus, Stigmates de maïs et Cascara.

**Action.** — Le gui diminue la tension par action vasomotrice périphérique et action excitante sur la sécrétion rénale (Chevalier, Gaultier). Selon Leclerc, le Cratœgus équilibre la pression sanguine en diminuant l'éréthisme vasculaire.

**Indication.** — L'hypertension sous toutes ses formes.

**Doses.** — XXV gouttes, 3 fois par jour.

**Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.**  
12, rue du Téléphone — BRUXELLES.



## HYPNOSEDINE

### Pilules et Suppositoires.

Hypnotique, Sédatif.

**Composition.** — Chloralose chimiquement pure 0 gr. 05, Extrait frais de Valériane, de Passiflora et Cratægeus 0 gr. 05. Bromure de Camphre, 0 gr. 03 par pilule glutinisée.

**Indications.** — Hypnotique, antispasmodique, sédatif, Neurasthénie, névroses, excitabilité nerveuse ; Syndrome solaire, troubles para-hystériques, coliques périodiques. Toutes douleurs.

**Posologie.** — 1 pilule avant les 2 repas. Comme Hypnotique, 2 au moment de se coucher.

*Suppositoires* : même formule, 0 gr. 15 de Chloralose et 0 gr. 01 d'Extrait de Belladone en plus.

Remplace la Morphine dans bien des cas : douleurs post-opératoires, avant et après les accouchements.

Cystites aiguës, prostatites, gynécologie.

**Laboratoires R. DEROUBAIX**

11, Chaussée de la Muette — PARIS.

---

## HYPOCHLORINE POURTAL

**Composition.** — Solution aqueuse d'hypochlorite de magnésium, au titre de 8 gr. de chlore actif par litre.

**Action.** — Antiseptique, désodorisant, cicatrisant.

N'irrite pas les tissus, indolorité absolue.

**Indication.** — Plaies, Angines, Hygiène de la femme, Gynécologie, Petite chirurgie.

**Mode d'emploi.** — 2 à 5 cuillerées à soupe par litre d'eau.

**Crème Hypochlorine Pourtal :** Cicatrisations de toutes plaies atones, brûlures, engelures, gerçures, ulcères même variqueux en consolidation.

Prix :

Flacon :	1 000 gr.....	15 fr. »
—	500 gr.....	10 fr. »
—	250 gr.....	3 fr. 50
Crème :	50 gr.....	7 fr. 50
—	25 gr.....	5 fr. »

« **L'ANTISEPTIQUE** »

48, rue de Londres — PARIS.

Tél. : Europe 45-68. R. C. Seine 374-586.

## HYPOPHÉDRINE

**Ephédrine française végétale corrigée.**

### Composition :

Ephédrine végétale.....	0 gr. 03
Hypophyse totale.....	0 gr. 05
Ext. de Lobélie.....	0 gr. 01
par dragée.	

**Indications.** — **Asthme**, Etats dyspneïques, Bronchites chroniques. **Rhume des Foies.**

**Avantages.** — Ne provoque ni tachycardie, ni troubles urinaires, ni insomnie.

**Posologie.** — 3 à 4 dragées par 24 heures, sucer avant d'avaler.

**Laboratoires DEPRUNEAUX**  
18, rue de Beaune — PARIS (VII<sup>e</sup>).

## HYPOTAN

**Le Régulateur du débit Artériel.**

Dérivés de la choline hypotenseurs par voie digestive, associés à une faible dose de chloral et présentés sous la forme de comprimés.

**Propriétés thérapeutiques.** — L'Hypotan constitue une synergie hypotensive par dilatation artériolaire et sédation des spasmes. Il améliore la circulation périphérique si profitable à l'état clinique des hypertendus. L'Hypotan réalise une véritable prophylaxie des accidents graves de l'hypertension. Il excite en outre les organes à musculature lisse.

**Indications.** — Thérapeutique d'entretien des hypertendus, Hypertension, Spasmes vasculaires (même sans hypertension rencontrés souvent à la ménopause). Cure complémentaire de l'**Acécoline**, Hypovagotonie.

4 à 6 comprimés par jour avant les repas.

Innocuité absolue. Tolérance parfaite.

**Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT**  
52, rue La Bruyère — PARIS.

Adresse tél. : Chevrematte, 90 — PARIS.

## HYRGANOL

Ethers éthyliques des acides gras  
de l'huile de chaulmoogra.

**L'absence d'effets irritants à l'égard des tissus et des organes digestifs permet d'administrer l'Hyrganol soit en injections intramusculaires, soit par la voie buccale.**

*Indications :*

**Traitement de la lèpre.**

*Posologie et mode d'emploi.* — Voie intramusculaire : injections hebdomadaires à doses progressives, de 1 à 6 cc. Voie buccale : capsules à 1/2 cc. 1 à 4 par jour, progressivement.

*N. B.* — L'*Hyrganol iodé* comporte l'addition de 0 gr. 50 p. 100 d'iode.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

**« SPÉCIA »**

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**

86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## « I. A. M. »

Iodo-méthyl, Arsinat de Manganèse.

**Propriétés thérapeutiques.** — Composé organique, réalisant sous une forme optima l'action synergique de :

*L'ion iode* histotrope, leucopoïétique, lymphagogue.

*L'ion arsenic* stimulant de la nutrition et agent d'épargne.

*L'ion manganèse* vecteur d'oxygène, facteur capital d'oxydation cellulaire (*Thèse de Bordeaux* 1928).

**Indications.** — *Lymphatisme*. Affections ganglionnaires, Anorexies, Etats anémiques, Bronchites, Asthme, Convalescences.

**Posologie.** — Gouttes « I. A. M. » (*adultes*) XV à XX gouttes matin et soir.

Sirop « I. A. M. » (*enfants*), 1 cuillerée matin et soir.

**Littérature et échantillons**

**Docteur LAVOUÉ — RENNES.**

---

## ILOGLANDOL « ROCHE »

Solution aqueuse stérilisée des principes actifs des îlots de Langerhans.

1 cc. = 15 unités internationales.

Titration conforme aux décisions prises par la Convention de Genève.

Activité correspondant à l'activité de l'étalon officiel de Londres.

### Indications thérapeutiques :

*Toutes celles de l'insulinothérapie.*

### Doses et modes d'emploi.

**N. B.** — Le médecin traitant est seul juge de la posologie et des modalités d'application de l'ILOGLANDOL « ROCHE », car le traitement insulinién est toujours conditionné par l'état général (poids) du malade et par les examens systématiques répétés de son sang et de ses urines (glycosurie, glycémie, acidose, réserve alcaline du plasma).

### Doses d'urgence (Coma diabétique).

*Voie endoveineuse* : 1/2 à 3 cc. en 1 fois, puis 1/2 à 1 cc. toutes les heures.

*Voie intramusculaire* : 2 à 4 cc. en 1 fois, puis 1 cc. toutes les heures.

*En même temps* : Sérum glucosé, sérum physiologique et bicarbonate de soude (par voies buccale, rectale, intramusculaire, endoveineuse) et tonicardiaques.

### Doses habituelles (Tous autres cas).

*Voie intramusculaire (intrafessière)* : 2 cc. par jour (un quart d'heure à une demi-heure avant les repas) pendant 21 jours.

*En même temps* : Chez les diabétiques, régime alimentaire aussi riche en hydrates de carbone, graisses et albuminoïdes, que le permettra l'état du malade.

### Iloglandol « Roche »

Boîtes de 6 ampoules de 1 cc.

### PRODUITS

**F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>.**

21, place des Vosges — Paris (III<sup>e</sup>).

# **IMMUNIPHAGES GRÉMY**

## **Bactériophages polymicrobiens**

### **Immuniphage STAPHYLO n° 10 :**

Affections à staphylocoques, furoncles, anthrax, panaris, ostéomyélites à staphylocoques, suppurations profondes, etc.

### **Immuniphage ENTÉRO n° 11 :**

Affections intestinales : entérites, colites, appendicites, diarrhées infectieuses non spécifiques, syndrome entéro-rénal.

Diarrhées des nourrissons.

### **Immuniphage COLI n° 26 :**

Colibacilluries, pyélonéphrites, colibacillaires, cystites et toutes affections dues aux germes du groupe colibacille, métrites, vaginites, etc.

### **Immuniphage PYO n° 31 :**

Infections pyogènes, abcès, phlegmons, plaies suppurées, brûlures, pyodermites etc.

Prévention des suppurations au niveau des plaies, des fractures ouvertes.

### **Mode d'emploi :**

- 1° Par voie sous-cutanée (sur indication spéciale du médecin).
- 2° En pansements humides, lavages ou instillations.
- 3° En inoculations dans les cavités closes purulentes.
- 4° En ingestion.

En boîte de 10 ampoules de 2 cc.

Prix au public : 25 fr.

14, rue de Clichy — PARIS.

**IMMUNIZOLS****Vaccins****I. Ampoules**

- 10. Furonculose, Ostéomyélite.
- 11. Entérite, Appendicite.
- 13. Asthme, Asthme des foin.
- 15. Eczéma, Psoriasis.
- 16. Bronchites chroniques.
- 17. Rhumatismes.
- 18. Urétrites.
- 19. Acné.

**II. Bouillon-Vaccins****A. — Non Gélosés.**

- 10. Furonculose, Toutes staphylococcies.
- 24. Streptococcies.
- 25. Pneumococcies.
- 26. Colibacilloles.
- 31. Abscess chauds.
- 35. Ulcères variqueux.
- 36. Brûlures infectées.
- 41. Métrites.
- 50. Otites, Rhino-Pharyngites.

**III. Hivébé-**

Concentré polyvalent à diluer pour obtenir :

**IV. Comprimés**

*Avec pilules Adjuvantes de bile.*

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 10. Furonculose-Ostéomyélite. | 22. Typhoïde.                  |
| 11. Entérite-Appendicite.     | 31. Abscess, plaies infectées. |
| 13. Asthme, Asthme des foin.  | 40. Cystites, Pyélonéphrites.  |
| 15. Eczéma, Psoriasis.        | 41. Métrites.                  |
| 18. Urétrites.                | 70. Pyorrhée alvéolo-dentaire. |



# GRÉMY

## Microbiens

### Injectables.

- 22. Typhoïde.
- 23. Grippe.
- 31. Abscès chauds et froids, plaies suppurées.
- 34. Gangrène.
- 40. Cystites, Pyélonéphrites.
- 41. Métrites, Salpingites.
- 50. Otites, Sinusites, Rhino-Pharyngites.
- 70. Pyorrhée alvéolo-dentaire.

### Pour pansements.

#### B. — Gélosés.

- 10. Furonculose et toutes staphylococcies.
- 31. Abscès chauds, Plaies infectées.
- 35. Ulcères variqueux.
- 36. Brûlures infectées.
- 41. Métrites. OVULES pour pansements gynécologiques.

### Bouillon-Vaccin.

1/2 litre de bouillon-vaccin normal.

### V. Immuniperos.

(Vaccins liquides pour vaccination buccale simple ou associée au bactériophage).

- 10. Furonculose.
- 11. Infection intestinale.
- 15. Dermatoses.
- 22. Fièvre typhoïde.

### VI. Immuniderm.

Pommade à l'Antivirus et au Bactériophage.

— PARIS (IX<sup>e</sup>).

R. C. Seine. 48.556

## IMMUNOVACCIN ANTIRHUMATISMAL

(Formule du D<sup>r</sup> L. Bertrand d'Anvers).

**Composition.** — Emulsion du diplostreptobacille isolé de l'organisme des malades atteints de rhumatisme articulaire aigu. (Achalme, Thiroloix, G. Rosenthal, Bertrand, Triboulet, Leyden, Wassermann, de Vecchi et R. Lautier).

**Présentations.** — 1<sup>o</sup> Forme injectable : 5 séries d'ampoules de 5 à 425 millions ; 2<sup>o</sup> Forme à ingérer : ampoules dosées à 500 millions.

### Indications et mode d'emploi :

**Forme injectable.** — Rhumatisme articulaire aigu : débiter par série II. — Complications du rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme cardiaque, rhumatisme chronique : débiter par série I.

**Forme à ingérer.** — Formes bénignes du rhumatisme chronique, douleurs arthritiques ; troubles intestinaux, syndromes entéro-hépatiques, entéro-rénaux, entéro-génitaux des arthritiques, hypertension : 1 ampoule par jour, 20 jours par mois.

### Laboratoires IMMUNOS

8, avenue des Sources — NICE (A.-M.).

## INDHAMÉLINE LEJEUNE PLURIGLANDULAIRE

Médications végétale et opothérapique associées.

### Composition.

Principes végétaux de l'Indhaméline Lejeune simple associés aux sucs glandulaires de : Hypophyse, ovaire, surrénale et thyroïde.

### Indications.

Cette forme de l'Indhaméline Lejeune est plus particulièrement indiquée dans les troubles de la ménopause et de la puberté, dans les métrites, salpingites non suppurées, ovarites chroniques, sclérose utérine, etc.

### Mode d'emploi.

XX à XXX gouttes dans un peu d'eau avant chaque repas (20 jours par mois).

Prix : 15 francs.

**Laboratoires A. LEJEUNE**  
142, rue de Picpus — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## INDHAMÉLINE LEJEUNE SIMPLE

(Médication exclusivement végétale.)

**Composition.** — Principes actifs d'Hamamelis, marron d'Inde, condurango viburnum, anémone, séneçon, piscidia (Alcaloïdes et principes vitaux de la plante fraîche stabilisée).

**Propriétés thérapeutiques.** — Régulateur de la circulation générale. Décongestif par vaso-constriction périphérique. Analgésique par action sur les terminaisons nerveuses sensibles. Tonivasculaire et sédatif utérin précieux dans la dysménorrhée. Décongestionnant ovarien, régulateur des menstrues.

**Indications.** — Troubles circulatoires, ménopause, varices, hémorroïdes.

**Mode d'emploi.** — XX à XXX gouttes dans un peu d'eau avant chaque repas (20 jours p. mois).

Prix : 12 francs.

**LABORATOIRES A. LEJEUNE**  
142, rue de Picpus — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## INFANGYL CARLIER

**Composition :**

Thiocol, antipyrine, tolu .....	0 gr. 02
Benz. de Na, Eau de laur. cerise .....	0 gr. 04
Teinture de Droséra.....	0 gr. 08
Sirop de Desessartz pour 1 cuillerée à café.	

**Indications.** — Traitement des affections des voies respiratoires des *enfants*, toux, bronchites, trachéo-bronchites, coqueluches, laryngites aiguës et stridulentes.

**Propriétés.** — Expectorant puissant, Calmant de la toux, Laxatif léger.

**Posologie.** — 4 cuillerées à café avant 5 ans (nourrissons ; demi-dose), 4 cuillerées à dessert après 5 ans.

Echantillons et Littérature :

**Laboratoires René CARLIER**

Grande-Rue, à SAINT-FLORENTIN (Yonne).

## INFRA-ROUGES

- 1° *Plaies et ulcérations atones, infections cutanées et sous-cutanées ;*
- 2° *Troubles circulatoires (œdèmes, cellulite, stase veineuse, troubles de la circulation artérielle, engorgements ganglionnaires) ;*
- 3° *Rhumatismes chroniques, arthralgies et myalgies ;*
- 4° *Douleurs abdominales : entéro-colite, périviscérites, séquelles douloureuses post-opératoires, affections douloureuses du foie, de la vésicule biliaire, des organes génitaux ;*
- 5° *Névralgies et névrites.*

Vente et location de tous appareils et accessoires à

**La Verrerie Scientifique**

12, avenue du Maine — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Tél. : Littré 94-62 et Littré 01-63.

## INHALATION LANCOSME

**Composition.** — Essences naturelles à pouvoir antiseptique élevé (girofle, citron, thym, etc.) associées à la créosote de hêtre pure.

**Présentation.** — Liquide.

**Propriétés.** — Aseptise la muqueuse de l'arbre trachéobronchique et des alvéoles pulmonaires, diminue les sécrétions et l'expectoration.

**Indications.** — Coryza. Rhinite. Ozène. Laryngites aiguë et chronique. Trachéite. Bronchite aiguë. Emphysème pulmonaire. Grippe. Tuberculose pulmonaire.

**Contre-indications.** — Tuberculose aiguë à forme éréthique avec tachycardie et dans les formes congestives et fébriles avec hémoptysies.

**Emploi.** — Avec un inhalateur : verser la valeur de 2 à 3 compte-gouttes, goutte à goutte, dans l'eau chaude, mais non bouillante, deux à trois inhalations par jour.

**LANCOSME**

71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## **INHALO-BOL**

### **Cornet pour inhalations**

(en papier parcheminé),  
Simple,  
pratique,  
bon marché.

### **Indications thérapeutiques :**

Toutes affections bronchiques ou rhinolaryngologiques nécessitant une inhalation.

Prix : 5 fr.

### **Laboratoire de l'INHALO-BOL**

32, rue de l'Ouest — PARIS.

P. TAVERNIER, Docteur en pharmacie.

---

## **INHALOL**

Médication  
des voies aériennes supérieures.

**Composition.** — Association d'essences volatiles (Isopropylmétacrésolmenthol et Cajeputol) sans alcool.

**Action thérapeutique.** — Antiseptique, anticongestif, analgésique.

**Indications.** — Coryzas, rhinites, pharyngites, laryngites, sinusites, trachéites, bronchites.

**Mode d'emploi.** — IV à V gouttes dans un verre d'eau bouillante en inhalations, ou quelques gouttes sur le mouchoir à titre préventif.

Prix : 12 francs.

### **Laboratoires BOUVELOT**

62, rue d'Antibes — Cannes (A.-M.)

## INHALONE

Inhalation *solide* à l'état pulvérulent.

**Exempt d'alcool.**

**Formule :**

Cupressol, hydrure de naphthyle, essence de thym, goménol, benjoin en milieu carbo-gazeux.

Donne des résultats surprenants, dans tous les cas d'inflammation des muqueuses buccales et rhinopharyngiennes. Diminue rapidement l'intensité des quintes et leur fréquence, dans la coqueluche.

Modifie nettement les sécrétions nasales. N'irrite jamais, ne dessèche jamais les muqueuses. Jouit vis-à-vis d'elles de propriétés antiseptiques inégalables.

Prix : 12 fr. la boîte.

Echantillons et littérature sur demande.

**AUX LABORATOIRES CH. DEHAY**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, licencié ès sciences.

58, rue Saint-Géry — ARRAS.

---

## INHALO-SEL

**Composition.** — Comprimés pour inhalations à base de menthol et d'essences volatiles.

**Avantages thérapeutiques.** — Peu de menthol, pas d'alcool, donc pas d'irritation.

**Indications thérapeutiques.** — Laryngites, bronchites, rhino-pharyngites, sinusites.

**Mode d'emploi.** — 1 ou 2 comprimés dans un demi-bol d'eau bouillante en inhalation.

Prix : 5 fr. 50.

**Laboratoire de l'Inhalo-Bol**

32, rue de l'Ouest — PARIS.

P. TAVERNIER, docteur en pharmacie.

## INHALOXYL

**Comprimés pour inhalations.** Permet une inhalation complètement exempte d'alcool et pauvre en vapeur d'eau, sans menthol.

**Composition.** — Les essences ont été choisies en s'inspirant des travaux de Morel et Rochaix sur le pouvoir antiseptique de chacune d'elles vis-à-vis des différentes bactéries pathogènes.

**Mode d'emploi.** — Dans un demi-bol d'eau tiède, mettre 1 ou 2 comprimés et respirer les gaz qui se dégagent entraînant les vapeurs antiseptiques.

**Indications.** — Coryza, Laryngites, trachéites, bronchites aiguës et chroniques.

Se fait aussi en huile pour instillations et pulvérisations.

**Prix :** 9 fr. 75 et 12 francs.

**Laboratoires G. WARIN**

4, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

---

## INJECTION ET GOUTTES CLIN

### Strychno-phospharsinées.

**Composition.** — Solution stable renfermant du glycérophosphate de soude, du cacodylate de soude et du sulfate de strychnine à différentes doses.

Cette préparation évite d'allier le glycérophosphate de soude au cacodylate de strychnine, le dosage de la strychnine dans cette association réduisant l'élément arsenical à une proportion trop faible pour lui conserver un rôle thérapeutique. Le cacodylate de strychnine est, en outre, un sel trop instable pour le faire figurer utilement dans une solution qu'on doit pouvoir stériliser et conserver. *L'injection Clin Strychno-Phospharsinée* possède effectivement l'avantage d'une action thérapeutique des trois composants.

**Formes.** — *L'injection Clin Strychno-Phospharsinée* est délivrée en boîtes de 6 ou 12 ampoules de 1, 2 et 5 cc.

**Mode d'emploi et posologie.** — L'injection pratiquée en plein muscle n'est pas douloureuse. L'injection sous-cutanée se montre plus souvent indolore. On injectera 1 centimètre cube, soit le contenu d'une ampoule, chaque jour ou tous les deux jours, selon l'indication et l'urgence.

### GOUTTES :

**Composition.** — XX gouttes de cette formule correspondent à :

Glycérophosphate de soude.....	}	à 10 centigr.
— de potasse.....	}	

Métharsinate Clin..... 4 centigr.

Sulfate de strychnine..... 0 mmgr. 25

De V à XV gouttes deux fois par jour dans un peu d'eau, dix minutes avant les repas.

**Laboratoires CLIN**

PARIS.



## “ INNERCLEAN ”

**Composition.** — Algue de Java, Thé de santé, Herbes aromatiques.

**Indications ou Propriétés.** — Espèces *laxatives* aromatiques pour le traitement spécial de la constipation.

**Posologie ou mode d'emploi.** — Un tiers de cuillerée à café. Augmenter graduellement cette dose si nécessaire.

Pour le prendre, la meilleure façon est de le déposer sur la langue et de l'avaler à l'aide d'un peu d'eau fraîche.

Pour les Enfants et les Bébés, commencer par une très petite quantité, en tenant compte de leur âge.

Prix, en France : 15 fr.

Dépôt général pour la France :

« EVANS DRUG STORE »

**J.-M. RICARDOU, Docteur en Pharmacie**

46, rue Pierre-Charron — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## INOLÈNE

Solution concentrée de Coaltar de *savueur agréable*.

**Propriétés.** — Antiseptique puissant. Décongestionnant, cicatrisant rapide. Innocuité absolue. Réactions alcalines.

**Indications.** — Gingivites, stomatites, pharyngites, amygdalites, angines, abcès, fistules dentaires, soins post-opératoires. Hygiène de la bouche, soin de toutes les muqueuses, injection, pansements.

### Mode d'emploi :

*Lavages* : 2 à 4 cuillerées à café par litre d'eau.

*Gargarismes* : *Bains de bouche* : XX à XXX gouttes dans un verre d'eau chaude.

*Badigeonnages* : pur ou au demi.

*Dentifrice* : X à XX gouttes dans un verre d'eau.

*Injections, pansements* : une cuillerée à café par litre d'eau.

**Laboratoire ODILIA**

**E. LACOMBE, Pharmacien**

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

## **INOTYOL**

Eczémas, Ulcères, Prurits, Brûlures et toutes Lésions ou Irritations de la Peau.

## **INOSEPTA**

Pommade anti-virus strepto-staphylococcique. Acné, Furonculose, Anthrax, Pyodermites.

## **INOXEMOL**

Pommade réductrice.

Eczémas rebelles, Psoriasis.

**Laboratoire de l'INOTYOL**

80, rue de Prony — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

---

# INSTITUT PASTEUR

## SÉRUMS :

Antidiphthérique, antitétanique, antistreptococcique, antiméningococcique, antidysentérique, anticharbonneux, antipneumococcique, antipesteux, antigrangréneux.

## Sérums desséchés :

Antidiphthérique, antitétanique.

## Sérums purifiés et concentrés :

Antidiphthérique, antitétanique.

## Sérums antivenimeux :

E. vipères d'Europe ; A. N. serpents africains ; A. O. serpents Afrique occidentale et équatoriale ; C. serpents Inde et Egypte.

## VACCINS :

Antidiphthérique, antitétanique, antipesteux, anticholérique, antityphoïdique et antipara (T. A. B.), antigonococcique, antistaphylococcique (furonculose), antistaphylococcique (ostéomyélite), antipyogène, antipneumonique, antiméningococcique, B. C. G., B. C. G. = S. C.

*Extrait d'antigène tuberculeux méthylique. Tuberculine.*

Les sérums et vaccins ne sont délivrés qu'aux Droguistes et aux Pharmaciens.

C'est à ces derniers que doivent s'adresser exclusivement les Médecins et le Public.

**Institut PASTEUR**

**22, rue Dutot — PARIS.**

## INSULANOL

Pommade à l'Insulyl du Dr Roussel.

**Mode d'action.** — Agit en applications locales par l'Insuline qu'elle renferme, que les malades soient ou non diabétiques.

**Indications.** — 1° Ulcères variqueux et plaies atones ;

2° Prurits de toute nature ;

3° Hémorroïdes ;

4° Brûlures.

**Mode d'emploi.** — En onctions sur les parties malades.

Recouvrir les plaies d'un pansement aseptique.

**Laboratoires des PROXYTASES**

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).

R. C. 18.000.

Tél. : Littré 68-22, 23, 24.

## INSULINE

Voir **ENDOPANCRINE**

Page 337

Voir **POUDRE ET POMMADE**

**D'INSULINE PHYLOZE**

Page 819

**Laboratoire**

**de Thérapeutique Générale**

48, rue de la Procession — PARIS (XV<sup>e</sup>).

# **INSULINE - BUCCALE FORNET**

## **Principe actif :**

Extrait des îlots de Langerhans du Pancréas.

## **Présentation :**

Concentration III (Pilules rouges : 4 unités par pilule).

Concentration I (Pilules vertes : 1 unité par pilule).

## **Posologie :**

3 pilules 3 fois par jour une demi-heure avant les repas.

## **Indications :**

Tous les cas justiciables de l'Insuline (cas graves exceptés). (Glycosurie, anorexie, amaigrissement, vomissements incoérables, acétoniques, etc...)

## **Observations :**

Avoir *toujours* recours à la concentration forte au début du traitement.

Prix : 49 fr. et 25 fr.

Service de Vente et Échantillonnage :

## **Laboratoires**

23, rue du Caire — PARIS (II<sup>e</sup>).

Service d'Étude et de Fabrication

**Institut de Microbiologie**

**SARREBRUCK (Sarre).**

## INSULINE BYLA

*Autorisée par l'Académie de Médecine.*

*Adoptée dans les hôpitaux.*

Purifiée, débarrassée des matières salines et protéiques de la glande.

Présentée sous deux formes injectables :

1° *Insuline Byla* (poudre) soluble dans l'eau, enfermée dans des ampoules stériles de 15 unités internationales (enfants, 5 unités). Chaque ampoule est accompagnée d'une ampoule de 2 cc. sérum physiologique, dans laquelle on la fait dissoudre.

2° *Insuline Byla liquide*, en flacon de 6 cc., soit 120 unités internationales. Chaque cc. = 20 unités.

**Indications.** — Traitement du diabète et de toutes ses manifestations.

**Possologie.** — 1 à 5 ampoules, ou 1 cc. à 6 cc. de solution, par jour, suivant avis du médecin.

Traitement des plaies atones :

**Pommade à l'insuline Byla**

**Poudre à l'insuline Byla**

*L'Insuline Byla* est titrée en unités internationales, conformément à la décision du Comité d'Hygiène de la Société des Nations.

Envoi sur demande de la notice détaillée.

**Les Établissements BYLA,**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

## INSULYL DU D<sup>r</sup> ROUSSEL

Autorisé par l'Académie de médecine.

Adopté dans les Hôpitaux.

Produit de la sécrétion interne du pancréas.

**Action.** — Abaisse la glycémie, permet l'utilisation des hydrates de carbone ingérés.

**Indications.** — 1° Diabète et ses complications ; 2° Athrepsie des nourrissons ; 3° Acidose ; 4° Cure d'engraissement.

**Forme.** — Boîte de 10 ampoules de 1 cc. environ. Chaque ampoule renferme 20 unités.

**Doses.** — En moyenne une ampoule en injection intramusculaire avant chaque repas.

Il est nécessaire d'associer la cure diététique à la cure d'Insulyl.

**Laboratoire des PROXYTASES**

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).

Tél. : Littré 68-22, 23, 24.

## INTRAIT DE MARRON D'INDE DAUSSE

Préparation conservant intacts les principes actifs de la semence fraîche (stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*). Vaso-constricteur veineux, spécifique des *Hémorroïdes*, *varices*, *phlébites*.

**Forme.** — *Solution d'Intrait de marron d'Inde* : X gouttes = 0 gr. 01 d'Intrait.

**Mode d'emploi.** — *Usage interne* : V gouttes matin et soir de *solution d'Intrait de marron d'Inde Dausse*.

## INTRAIT DE STROPHANTHUS

Préparation de *Strophanthus gratus* conservant intacts tous les principes actifs de la semence fraîche. (Stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*). Toni-cardiaque puissant.

**Formes.** — *Solution d'Intrait de Strophanthus* : X gouttes renferment un milligr. d'Intrait.

*Ampoules d'Intrait de Strophanthus* dosés à un milligr. d'Intrait par cc.

**Indications.** — Dans tous les cas d'insuffisance cardiaque, chez les cardiaques vrais, chez les cardiorénaux et toutes les fois que la Digitale ne réussit pas.

**Posologie.** — **SOLUTION D'INTRAIT** : *Dose d'entretien cardio-tonique* : V gouttes par jour pendant 15 jours.

*Dose antiasystolique.* — XX à XXX gouttes en une fois.

**AMPOULES D'INTRAIT** — Exclusivement par *voie intramusculaire* ; 1/2 à 1 ampoule, en cas de collapsus cardiaque imminent.

## INTRAIT DE VALÉRIANE DAUSSE

Préparation dépourvue d'odeur et conservant intacts les principes actifs de la racine fraîche ; (stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*).

**Antispasmodique,  
sédatif du système nerveux.**

**Forme.** — *Solution d'Intrait de Valériane Dausse*.

**Indications.** — *Insomnie* d'origine nerveuse due à un éréthisme sensoriel ou cérébral.

*Nervosisme*, *irritabilité nerveuse*, *affections spasmodiques*, *dermatoses prurigineuses*, *chorée*, *tics*, *convulsions infantiles*.

**Posologie.** — *Solution d'Intrait de Valériane* : 2 à 3 cuillerées à café par jour. Doubler la dose si nécessaire.

**Laboratoire DAUSSE**  
4, rue Aubriot — PARIS (IV<sup>e</sup>)

## IODA

Iode organique entièrement assimilable.

**Composition.** — Hexosane iodé (C 6 H 10 O 5)<sup>40</sup> I<sup>6</sup>, nouveau composé organique défini, stable, soluble dans l'eau, *assimilable seulement en milieu alcalin* (intestin).

Absolument inoffensif, parfaitement toléré, permet *le traitement iodé intensif sans iodisme*.

**Indications.** — Celles de l'iode et des iodures.

**Posologie.** — Un comprimé correspond à :  
2 centigrammes d'iode métalloïdique.

XX gouttes de teinture d'iode iodurée Codex.

Doses quotidiennes à prendre aux repas :

*Enfants* : 1 à 4 comprimés selon l'âge.

*Adultes* : 4 à 10 comprimés et plus selon nécessité.

Prix en France : 12 francs.

**Laboratoires A. CESBRON**

63, rue de la Faisanderie — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## IODALOSE GALBRUN

Gouttes titrées renfermant 6 centig. d'iode par centim. cube. Première combinaison directe de l'iode avec la peptone. Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès international de médecine de Paris (1900).

Remplace Iodes et Iodures dans toutes leurs applications internes sans iodisme.

**Arthritisme.** — **Goutte.** — **Rhumatisme.**  
— **Artério-sclérose.** — **Maladies du cœur et des vaisseaux.** — **Affections glandulaires.** — **Rachitisme.** — **Goitre.**  
— **Fibrome.** — **Syphilis.** — **Obésité.**

Pour les adultes : XX à LX gouttes par jour.

Pour les enfants : V à XX gouttes par jour.

Prix de vente au public : 14 fr. 50.

**Laboratoire GALBRUN**

8 et 10, rue du Petit-Musc — PARIS (IV<sup>e</sup>).



# IODAMÉLIS LOGEAIS

## Formule :

Véritable combinaison définie, en gouttes concentrées, d'*Hamamelidine* (extrait glyciné total d'hamamélis sans alcool) et d'*Iodo-Iodure de Potassium* (forme la plus active de l'Iode thérapeutique). Cette combinaison, découverte par M. Logeais, exalte considérablement l'activité pharmacodynamique du produit.

## Propriétés :

### Spécifique cardio-vasculaire total :

*Par son Hamamélidine*, chez les hypertendus veineux, cyanotiques, variqueux ;

*Par son Iodo-Iodure de Potassium*, chez les artérioscléreux, uricémiques, hypervisqueux.

L'Iodamélis diminue la viscosité sanguine, combat les stases, stimule le tissu lymphoïde, abaisse la tension artérielle, oxyde les toxines organiques, favorise la circulation en retour.

## Indications.

### Toutes les affections vasculaires, artérielles et veineuses :

Artério-sclérose, Pléthore des hypervisqueux, Cyanose des hypotendus, Obésité, Jambes en poteau, Varices, Hémorroïdes, Asthme, Emphyseme, Troubles circulatoires de la Puberté et de la Ménopause. etc...

## Posologie :

50 gouttes d'Iodamélis =  $\begin{cases} 0,03 & \text{Iode.} \\ 0,20 & \text{Iodure de Potassium.} \\ 0,20 & \text{Hamamélidine.} \end{cases}$

## Doses :

De 20 à 40 gouttes aux deux principaux repas, dans un peu d'eau, 3 semaines par mois.

Tolérance parfaite, pas d'iodisme.

Prix : un flacon = 1 mois de traitement = 18 fr.

## Laboratoires J. LOGEAIS

22 bis, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE  
près Paris. Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.

# IODARSENIC GUIRAUD OU GOUTTES PAIDOPHILES

du Docteur Guiraud  
Ex-Pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux

**Formule.** — Solution stable au centième (procédé spécial) de triiodure d'arsenic, chimiquement pur, dans l'eau distillée.

**Indications.** — Tous engorgements ganglionnaires, Lymphatisme, Rachitisme, Scrofule, Emphysème, Asthme, Bronchites à répétition, Adénopathie, Trachéo-bronchite, Adénites en général, Kératites phlycténulaires, Affections de la peau (Eczémas, Impetigo, Psoriasis, Urticaire...). Enfin, toutes les fois que la médication iodée ou iodurée est mal supportée.

**Posologie.** — Enfant de 6 mois à 2 ans II à X gouttes par jour  
— 2 ans à 8 ans IV à XX —  
— 8 ans à 15 ans IV à XXX —  
Adultes X à XL —

à prendre en se conformant à la notice jointe à chaque flacon, dans un peu d'eau, ou de lait sucré, au moment des deux principaux repas.

**Présentation.** — Flacon compte-gouttes 45 gr.

Prix : 14 francs,

Echantillons et littérature :

**Laboratoire de l'IODARSENIC GUIRAUD**

10, impasse Milord — PARIS (XVIII<sup>e</sup>). — Tél. : Marcadet 37-98.

## IODASCLÉRINE

Combinaison organique d'Iode directement assimilable par voie digestive sans dommage pour l'estomac.

**Formule.** — Iode 3 — INa, IK, BrNa, chimiquement purs à à 1 gr. substratum peptoné 94 gr., soit 0,05 par 1 cc.

**Champ d'action.** — 1° Affections cardio-vasculaires, artérites, douleurs angineuses, hypertension chronique, artériosclérose, phlébosclérose, hémorroïdes.

2° Goitre exophtalmique, arthritisme, goutte, rhumatisme chronique, obésité, maladies de la ménopause, etc.

3° Lymphatisme, adénopathies, scrofule, etc.

4° Bronchites chroniques, asthme, emphysème, etc.

5° Maladies spécifiques, hépatites et acquises, infections, mycoses etc.

Dans l'intervalle des médications toni-cardiaques, l'Iodasclérine est le traitement de fond des scléroses vasculaires et viscérales (une seule contre indication commune à toutes les préparations iodées : l'œdème du poumon).

Par son action sur les glandes endocrines et la nutrition, l'Iodasclérine est le spécifique de la goutte, de l'obésité, du rhumatisme chronique. Dans le lymphatisme, les affections chroniques des voies respiratoires, dans les vieilles affections syphilitiques et mycosiques, l'Iodasclérine est antiscclérosante, antiseptique et résolutive.

**Dose.** — Adultes de X à L gouttes dans un peu d'eau au milieu des repas. Enfants de IV à X gouttes suivant l'âge.

Prix : 18 francs.

Produits SANOVA

41, rue d'Amsterdam — PARIS (VIII<sup>e</sup>) — Tél. : Central 24-47.

## IODASEPTINE CORTIAL

**Composition.** — Iodobenzométhylformine contenant 42 % iode, soluble dans l'eau, dialysable, injectable, sans réaction locale ou générale. Tolérance sans réserve.

**Propriétés thérapeutiques.** — Dérivées de la nature de ses composants ; iode et antiseptiques (Formol de l'Hexaméthylène tétramine et groupe Phényl des corps benzoylés). Antiseptique général des infections chroniques ou parasitaires : Rhumatismes, Tuberculose (jamais d'hémoptysie), Adénopathies, Paludisme, Spirillose. Puissant tonique du cœur.

**Prép. Pharm. Posologie.** — *Ampoules* : A. 2 cc., B. 5 cc., C. 10 cc., par voie intraveineuse ou intramusculaire à doses progressives.

*Tuberculose* (doses faibles) : 2 à 5 cc.

*Rhumatismes chroniques* (doses fortes) : 5 à 20 et même 25 cc. *pro die*.

*Gouttes* : XX à C par jour (*enfants* : X à XXX).

### Iodaseptine salicylée.

Dans les rhumatismes aigus ou subaigus en injections intraveineuses, joint à l'effet Iodaseptine l'action salicylée. Tolérance parfaite. Supplée le traitement salicylé à haute dose qui ne peut être continué longtemps.

*Ampoules* de 5 cc.

**Doses.** — Une ampoule matin et soir en injection intraveineuse.

### Laboratoires CORTIAL

15, boulevard Pasteur — PARIS.

## IODASSIUM

**Composition.** — Solution iodo-iodurée répondant à la formule du Lugol d'une stabilité parfaite, édulcorée, anisée et préparée avec de l'iodé et de l'iodure de potassium de tout premier choix. Pas d'inconvénients d'iodisme.

**Propriétés thérapeutiques.** — Toutes les indications de l'iodé et de l'iodure de potassium : bronchite chronique et emphysème pulmonaire ; tuberculose osseuse, ganglionnaire ; syphilis à toutes les périodes ; artério-sclérose ; vertiges ; insuffisance thyroïdienne ; maladie de Basedow ; obésité ; troubles circulatoires de la ménopause ; asthme ; ulcères variqueux ; maladies mycosiques : sporotrichose, actinomycose, trichophyties cutanées, kérion ; lymphogranulome suppuré ; angines de toutes natures (badigeonnages et *per os*).

**Posologie.** — Une cuiller à café de cette solution contient 5 cgr. d'iodé métalloïde et 10 cgr. d'iodure de potassium.

### Adultes :

*Dose faible* : 2 cuillerées à café par 24 heures.

*Dose moyenne* : 2 à 6 cuillerées à café par 24 heures.

*Dose forte* : 6 à 12 cuillerées à café par 24 heures.

### Enfants :

De X à L. gouttes matin et soir, c'est-à-dire de X gouttes à une demi-cuillerée à café matin et soir, et plus suivant tolérance.

**Mode d'emploi.** — A prendre dans n'importe quel liquide, mais de préférence dans du lait sucré, immédiatement avant les repas.

### Laboratoire G. WARIN

4, chaussée de la Muette — PARIS (XVI<sup>e</sup>). Tél. : Auteuil 18-30

## IODÉINE MONTAGU

(Iodhydrate de Codéine.)

**Propriétés.** — Action calmante de la toux, régularisateur du rythme respiratoire, anti-dyspnéique, facilite l'expectoration.

**Indications.** — Toux, Emphysème, Asthme.

**Formes pharmaceutiques :**

*Sirop.* — 0,03 cgr. d'Iodéine par cuillerée à soupe. 15 francs.

Dose : 1 à 3 cuillerées par jour.

*Gouttes.* — X gouttes = 0,01 cgr. d'Iodéine crist. 15 francs.

Dose : X à XL gouttes, 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée.

*Pilules.* — 0,01 cgr. d'Iodéine par pilule. 12 fr. 50.

Dose : 4 à 8 pilules par jour.

*Ampoules* (0,02 cgr.) : 2 à 3 par jour. 15 francs.

**Laboratoire MONTAGU**

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

---

## IODENTÉROL

Iode métalloïdique et iodure de potassium en *solution* alcoolique, et *poudre* iodophile (substances amylacées et calcifiantes) assurant : 1° la tolérance parfaite de l'iode pur par la voie stomacale ; 2° la calcification simultanée de l'organisme.

**Indications.** — Toutes les manifestations de la bacillose extra-viscérale : adénopathies, synovites, ostéites, etc...

**Formes et doses.** — *Gouttes* administrées par la voie entérale ou digestive, selon un régime progressif jusqu'à quantités massives.

**Prix** n° 1 : 20 francs. — N° 2 : 28 francs.

**Établissements GALLINA**

4, rue Candolle — PARIS (V<sup>e</sup>).

## IODE ORGANIQUE BOISSY



Comprimés de 10 centigrs, glutinisés et dragéifiés.

**Propriétés.** — L'*Iode organique Boissy* (Iodéthyl-hexaméthylènetétramine) est un corps cristallisé, blanc, renfermant 43 p. 100 d'iode. Très soluble dans l'eau, il donne des solutions neutres, incolores, très dialysables. Ne provoque jamais d'iodisme. Se dissocie dans l'organisme avec mise en liberté d'*iode naissant*, puissamment *antitoxique* et *antiseptique*. Abaisse la tension artérielle et provoque une diurèse surtout manifeste au début de son emploi.

**Indications.** — Plus actif que l'iode et les iodurés, les remplace avec avantage. Particulièrement efficace contre Hypertension, Angine de poitrine, Artériosclérose, Asthme, Emphysème, Rhumatisme, Goutte, etc.

**Doses moyennes.** — 2 à 8 comprimés par jour.

Prix : 12 francs le flacon de 60 comprimés.

**Laboratoire BOISSY**

49, rue Hoche — COURBEVOIE, près Paris.

---

## IODEX

Toutes les propriétés thérapeutiques de l'iode libre, aucun des inconvénients de la teinture d'iode.

### **Iodex simple.**

Pommade renfermant 5 p. 100 d'iode éminemment absorbable. Excellent résolutif, exempt d'iodures alcalins et de substances irritantes. Ses principales indications : adénopathies, oreillons, goitres, impétigos, trichophyties, furoncles, blessures.

Prix : 12 francs.

### **Iodex au Salicylate de Méthyle.**

Iodex combiné à 5 p. 100 de salicylate de méthyle. Analgésique et résolutif. Préconisé dans les douleurs articulaires, rhumatismes scarlatins, pleurites, points de côté, névrites, lumbagos, entorses.

Prix : 12 francs.

### **Iodex liquide.**

Formule non irritante d'iode à 2 p. 100 pour la médication externe. Efficacité et sécurité en oto-rhino-laryngologie (pulvérisations ou badigeonnages), en gynécologie (tamponnements vaginaux, instillations intra-utérines), et en chirurgie (pansements de plaies opératoires, brûlures).

Prix : 12 fr. 50.

Échantillons et Littérature :

**Laboratoires RISSA**

46, rue Claude-Lorrain — LILLE.

## IODHÉMA

Iodo-alcoylate-méthyle-benzyle d'hexaméthylène tétramine, en solutions aqueuses (43 p. 100 d'iode assimilable).

### Indications :

*Toutes les formes du rhumatisme chronique.*

### Formes :

- 1<sup>o</sup> *Ampoules* de 5 cc. (16 fr.) et de 10 cc. (30 fr.) ;  
1 ou 2 par jour (veines et tissus), en boîtes de 10 ;
- 2<sup>o</sup> *Flacons* (30 fr.) (voie entérale ou digestive), 1 ou 2 cuillerées à café par jour dans de l'eau sucrée entre les repas.

Mêmes présentations pour :

- 1<sup>o</sup> *Iodhéma M* (Méthyle pur) indiqué dans la goutte aiguë et chronique (14 et 28 francs) ;
- 2<sup>o</sup> *Iodhéma B* (Benzyle pur) utilisé dans les infections urinaires et hépatiques (20 et 35 francs).

### Établissements GALLINA

4, rue Candolle — PARIS (V<sup>e</sup>).

---

## IODINE MEDOL

**Pommade pour pansement :** désinfecte et guérit les plaies, les coupures, les brûlures et toutes les affections de la peau.

**Composition.** — Les principes actifs de l'*Iodine Medol* sont l'*Iode* et la *Créoline* dans un excipient spécial miscible aux sécrétions en donnant une émulsion qui pénètre dans la peau et atteint les tissus profonds.

**Indications.** — Traitement de toutes les dermatoses et pansement de toutes les plaies.

**Présentation.** — En tube d'étain.

**Établissements Pharmaceutiques**

**JACQUES MIDY**

41, rue de Courbevoie — LA GARENNE (Seine).

Tél. : Charlebourg 09-80.

## **IODINJECTOL JAMMES**

Médication iodée intensive indolore.

**Composition.** — Iodure de formine benzosodique :  
20 cgr. par ampoule de 3 cc.

**Indications.** — Celles de l'iode et des iodures :  
Arthritisme, Hypertension artérielle, Affections  
glandulaires, Septicémies.

**IODINJECTOL salicylé** (Iodinjectol + 20 cgr. de  
salicylate de soude).

Action rapide et énergique sur les crises aiguës de  
tous Rhumatismes. Sciatique.

**Posologie des deux formes :**

Une injection intramusculaire par jour.

Prix au public : 18 francs.

**Laboratoires JAMMES**

86, rue Michel-Ange — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## **IDO-BISMUTHATE DE QUININE FRAISSE**

**Composition :**

Iodo-Bismuthate de Quinine : 0 gr. 20;  
huile d'olive : 4 cc.

**Indications :**

Dans toutes les formes de la syphilis.  
Traitement ordinaire : 30 à 35 ampoules,  
dont une tous les trois jours.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 18 francs.

**Laboratoires FRAISSE**

8, rue Jasmin — PARIS.



## iodo-BISMUTH ERCÉ

Iodo-bismuthate de quinine.

**Forme.** — Ampoules-seringues auto-injectables, pour injections intramusculaires.

**Avantages sur les préparations analogues.**

- 1° Trois fois *moins* d'excipient à injecter.
- 2° Suspension *stable* permettant d'éviter une agitation longue et pénible.
- 3° Suppression du transvasement toujours difficile d'une suspension huileuse.
- 4° *Résorption parfaite.*

**Indications.** — Syphilis à toutes ses périodes.

**Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE**  
.37, rue de Bourgogne — PARIS.

---

## IODOCALCIUM

LA FORME MODERNE  
DU SIROP IODOTANIQUE

D'un goût agréable, ne contient ni arsenic, ni phosphore. Epargne le tube digestif.

**Composition.** — Par XX gouttes : Chlorure de Calcium, 0 gr. 20 ; iode, 0 gr. 01.

**Indications.** — Toutes celles de l'iode et du calcium : états de fatigue physiologique de l'enfance et de l'adolescence, prétuberculose, tuberculoses osseuses et ganglionnaires, micropolyadénopathie, etc. ,

**Forme.** — Flacon de 45 grammes pour 20 à 25 jours de traitement.

**Posologie.** — A partir de 2 ans : XX gouttes et plus (jusqu'à L gouttes) deux fois par jour dans un peu d'eau sucrée au début des repas.

**Laboratoires Biologiques de l'Île-de-France.**  
3, rue Laugier — ARGENTEUIL (Seine-et-Oise)

## IODOGÉNOL PÉPIN

Peptone iodée spéciale.

Gouttes titrées. Supérieur à tous les produits similaires, aux iodures métalliques et aux vins et sirops iodés.

S'en différencie par : 1° L'absence d'acide iodhydrique libre ; 2° La grande stabilité des iodures organiques et la nature de leurs bases ; 3° La très grande proportion d'iode substitué (25 p. 100) de l'iode total au lieu de 0 à 8 p. 100 ; 4° La très grande activité pharmacodynamique de l'iode sous cette forme.

Saveur agréable. Tolérance absolue.

Les études clinique et physico-chimique montrent que c'est la meilleure forme d'administration de l'iode et des iodures.

**Posologie.** — *Enfants* : X à XXX gouttes par jour. *Adultes* : XL à LX gouttes par jour, dans un peu d'eau, aux repas, en 2 fois. (Syphilis : C à CXX gouttes par jour.)

**Laboratoires PÉPIN et LEBOUCC**  
à COURBEVOIE (Seine).

---

## iodo-maïsine

### Globules.

Combinaison directe de l'*Iode* d'une *Albumine* d'origine strictement *végétale*.

**Propriétés particulières.** — Absence d'albumoses ou de peptones d'origine animale. Aucune toxicité. Tolérance absolue même à hautes doses. Suppression complète de l'iodisme. Aucune désagrégation dans l'estomac. Action directe par solubilité uniquement intestinale.

**Indications.** — Maladies infectieuses, tuberculose, affections parasitaires, syphilis, affections cardio-vasculaires, artériosclérose, arthritisme, obésité, carence organique d'iode, tumeurs, insuffisance thyroïdienne, goîtres, asthme, emphysème, engorgements ganglionnaires, lymphatisme, rhumatisme, goutte. Puissant adjuvant des médications reminéralisantes.

**Posologie.** — Chaque globule contient un cgr. d'iode actif. Quatre globules correspondent comme effet thérapeutique à un gramme d'iodure alcalin. *Enfants* : 4 à 6 globules par jour. *Adultes* : 6 à 10 globules et au delà par jour en deux fois, avant les repas.

## iodo-maïsine

### Pommade

Iodo-Maïsine incorporée à un excipient spécial totalement exempt de vaseline ou de lanoline inabsorbables.

**Propriétés particulières.** — Pénétration intradermique complète. Teneur élevée en principe iodé actif. Absence de toxicité. Suppression de l'iodisme et de l'irritation locale. Efficacité 15 à 20 fois plus grande qu'une pommade iodée ou iodurée au même titre. Aucune coloration des téguments.

**Indications.** — Adénites, engorgements glandulaires, goîtres, sporothricoses, arthrites, lymphangites, ostéites dermatoses sèches, eczémas secs, psoriasis, affections rhino-pharyngiennes. Toutes affections justiciables d'un traitement iodé ou ioduré local.

**Mode d'emploi.** — Frictions (ou onctions) matin et soir sur la région choisie pendant deux ou trois minutes jusqu'à absorption complète. Aucun pansement consécutif.

L'*Iodo-Maïsine pommade* est présentée en *tube*. Une section de deux centimètres de longueur sortant du tube correspond à un centigramme d'iode complètement assimilable.

Laboratoire R.-J. SOUDAN

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

Ex-interne des hôpitaux de Paris.

6, rue Rosenwald — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## IODOMÉTINE

Solution concentrée et titrée d'iodhydrate d'hexaméthylène tétramine.

Combinaison organique d'iode soluble et assimilable, V gouttes représentent 1 centigramme d'iode ; XX gouttes agissent comme 1 gramme d'iodure alcalin.

**Propriétés thérapeutiques.** — Excitateur puissant des fonctions lymphoïdes, déterminant une hyperleucocytose intense. Agent anti-infectieux énergique par son radical hexaméthylène tétramine.

**Indications.** — Toutes affections glandulaires. Adénites, Végétations adénoïdes, Scrofulides, etc., Maladies de la nutrition, Goutte, Rhumatismes chroniques, Sciatique, Asthme, Emphysème, etc.

**Posologie.** — *Adultes* : XX à LX gouttes par jour.  
*Enfants* : V à XX gouttes par jour.

Prix : 12 francs.

**Laboratoire E. HAUTDIDIER**

37, rue Galilée — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## IODONE ROBIN

Combinaison physiologique d'iode et de peptone de viande de bœuf.

Gouttes : XX gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1gr. d'iodure de potassium.

**Doses et mode d'emploi.** — X à XL gouttes à prendre en 2 fois aux repas dans un peu de boisson.

**Propriétés thérapeutiques.** — Dépuratif, reconstituant assimilable, non toxique, tolérance parfaite, jamais d'iodisme.

**Indications.** — Maladies par ralentissement de la nutrition ; artério-sclérose ; obésité ; polysarcie ; dégénérescence graisseuse ; intoxications chroniques ; asthme ; emphysème, rhumatisme ; arthritisme ; goutte ; tertiarisme.

**Laboratoires M. ROBIN**

13, rue de Poissy — PARIS.

## IODONUCLÉOL

Iode organique soluble (orthoïodobenzoate de soude).

**Forme.** — Gouttes.

Odeur et saveur agréables. Pas de manifestations d'iodisme.

**Indications.** — Hypertension, Artériosclérose, Emphysème, Asthme, Obésité, Adénites, etc.

**Doses.** — XX gouttes avant chaque repas dans un peu d'eau, 2 ou 3 fois par jour.

**Laboratoire P. MAUCHANT**

14, rue de Birague — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## IODOSTARINE « ROCHE »

Acide diiodo-6-7 élaïdique ou taririque diiodé du Professeur Arnaud (Communication à l'Académie des Sciences, Paris, CXLIX, page 220), 47, 56 p. 100 d'iode organique complètement assimilé, sans aucune saveur. Absorbé seulement dans l'intestin.

### Indications thérapeutiques.

Remplace KI aux mêmes doses.

### Posologie et mode d'emploi :

*Iodostarine « Roche »* cachets dosés à 0,25 cgr. *Adultes* : 1 à 4 par jour, selon les cas.

*Iodostarine « Roche »* comprimés, dosés à 0,125 mgr. *Adultes* : 2 à 8 par jour, selon les cas ; *Enfants* : 1 à 4 par jour, selon l'âge. Les comprimés peuvent être absorbés très facilement avec un peu de liquide (eau, vin, thé ou café), au choix du malade.

*Iodostarine « Roche »* granulé, dosé à 0,25 cgr. par mesure (intérieur de la capsule en aluminium). *Adultes* : 1 à 4 mesures par jour, selon les cas ; *Enfants* : 1/2 à 2 mesures par jour, selon l'âge.

Toutes ces préparations sont d'une blancheur immaculée.

N. B. — On prend l'Iodostarine « Roche » de préférence à la fin des repas.

### Produits

**F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**

21, Place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

# iodo-THYROÏDINE CATILLON

## Forme :

Tablettes de Catillon à 0,25 de Corps Thyroïde, titré, stérilisé.

## Indications :

Obésité, Goitre, Myxoedème, Dermatoses.

## Doses :

1 à 2 contre Myxoedème ; 2 à 8 contre Obésité, Goitre, Herpétisme, Ostéogénèse.

## Laboratoire CATILLON

3, boulevard Saint-Martin, PARIS (III<sup>e</sup>).

## iodo-VITASINE

Iodo-protéine à formule organique nettement définie. Attaquée en milieu *intestinal* par la *trypsine* (digestion). Libère son code naissant seulement à ce niveau. Pas de troubles gastriques, pas d'iodisme (iode naissant à dégagement constant mais *non brutal*).

Avantages de l'iode et des iodures sans leurs *inconvenients*. Cinq fois plus actifs.

**Pesologie.** — 1<sup>o</sup> Solution : XX à XXX gouttes par jour ;

2<sup>o</sup> *Pilules* : 4 à 8 par jour.

*Enfants* : dose moitié.

Ces doses peuvent être augmentées.

Pommade à l'Iode-Vitasine (antiseptique et ne tachant pas le linge).

Son action résolutive la fait employer avec efficacité dans les métrites du col.

Echantillon et littérature au Corps médical.

## Laboratoires H. SALLE

4, rue Elzévir — PARIS (III<sup>e</sup>).

## IODURAL NOVAT

**Formule.** — Comprimés contenant chacun 25 centigr. d'iodure de potassium très pur. Chaque comprimé contient également 25 centigr. de bicarbonate de soude alcalin qui, neutralisant dès leur formation dans l'estomac les acides iodique et iodhydrique, permet d'administrer l'iodure de potassium pur sans les inconvénients habituels (iodisme, pyrosis, etc....).

Ces comprimés doivent être absorbés avec un liquide sans y être dissous.

**Laboratoires BOMEL**

ANNONAY (Ardèche) — France.

---

## IODURASE

**Description.** — Capsules kératinisées contenant :

Iodure de potassium pur ...	0 gr. 50
Levurine extractive .....	0 gr. 10

**Action thérapeutique.** — La même que celle de l'iodure, mais sans iodisme, grâce à l'action spécifique de la levurine et à l'enrobage qui ne libère l'iodure que dans le milieu alcalin de l'intestin. Dosage rigoureux, conservation indéfinie et facilité d'absorption.

**Indications.** — 1 à 6 capsules par jour dans l'artériosclérose, l'asthme, l'emphysème, l'arthritisme, la syphilis, le goître, l'obésité, le saturnisme.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS.



# IODURE D'AMIDON LUMIÈRE

**Antiseptique énergique**

dépourvu de toute action irritante et de toute toxicité.

**Propriétés.** — Pouvoir antiseptique élevé, réalise une antiseptie douce et continue, due à sa faculté de dégager lentement, au contact des sécrétions humorales, de l'iode à l'état naissant.

**Infections gastro-intestinales** (Dyspepsies, Entérites, Entéro-Colites, Flatulences, Diarrhées, Dysenterie).

**Formule.** — 1 flacon pilules Iodure d'amidon Lumière.

**Dose.** — *Adultes* : 6 à 12 pilules par jour.

**Usages externes.** — *Pansements et chirurgie* : La Pâte et la Poudre possèdent un pouvoir antiseptique prolongé, par dégagement lent de l'iode à l'état naissant.

**Pansement Lumière** : L'usage combiné de l'Iodure d'Amidon Lumière (pâte ou poudre) et *Tulle gras* Lumière, constitue un pansement dit Pansement Lumière, adopté par beaucoup de chirurgiens, l'Iodure d'Amidon Lumière entretient un état prolongé d'antiseptie. On obtient ainsi des cicatrisations d'une rapidité surprenante.

**Formuler.** — 1 tube de Pâte Iodure d'Amidon Lumière. 1 flacon de Poudre Iodure d'amidon Lumière.

**LABORATOIRES LUMIERE**

23, cours de la Liberté — LYON.

## IODURE PHILIPPE

**Forme.** — En *pilules kératinisées* : elles évitent les maux d'estomac, suppriment réellement l'iodisme. — *Plus de 30 ans de pratique et de succès.*

Prière de prescrire :

**Pilules Philippe** à l'iodure de potassium  $\left\{ \begin{array}{l} \text{à } 0,50 \\ \text{à } 0,20 \\ \text{à } 0,10 \end{array} \right.$

Sans indication spéciale, ce sont les **Pilules Philippe** à 0,20 centigr. d'iodure qui sont délivrées.

**Pilules Philippe** à l'iodure de sodium à 0,20.

**Indications.** — Artério-sclérose, Adénopathies, Tension artérielle, Goitre, Obésité, Syphilis, etc.

**Dose.** — 2, 4, 6 et même 8 pilules par jour, en deux ou trois fois.

Prix au public : 14 fr.

Littérature et Echantillons :

**Laboratoire du Dr H. PHILIPPE**

14, rue Palais-Grillet — LYON.

## IODURES PACHAUT

chimiquement purs

Tubes dosés d'Iodure de potassium à faire dissoudre au moment de l'emploi. — Conservation parfaite.

### Présentation :

Tubes dosés à 0 gr. 25, 0 gr. 50, 1 gr., 2 gr. et 3 gr.

### Laboratoires PACHAUT

130, boulevard Haussmann — PARIS.

## IODURES SOUFFRON

Chimiquement purs, titrés inaltérables, ne provoquant jamais d'intolérance.

### Composition :

Iodure de potassium.

Solution à 1/15 } 1 cuill. à soupe contient  
Sirop à 1/20 } 1 gr. d'iodure.

Iodure de sodium. — Dragées à 0,25 d'iodure.

Gouttes : 1 goutte = 1 cgr.

Bi-iodure de Mercure. — Solution KI., 1 gr.

+ Hg. I<sup>2</sup> 0,01 par cuillerée à soupe ; Dragées

KI. 0,25 + Hg. I<sup>2</sup> 0,0025 par dragée ; gttes

HgI<sup>2</sup> 1 milligramme par goutte ; Ampoules

aqueuses à 0,01 ou 0,02 par cc. ; huileuses, 0,01 par cc.

Indic. habit. des iodures et du bi-iod. de merc.

Société Générale  
d'Applications Thérapeutiques  
THERAPLIX

Pierre BRÉTEAU, Pharmacien  
Membre de l'Académie de Médecine  
157, rue de Sèvres — PARIS.

## IONYL

Médication bio-énergétique complète.

**Composition.** — Complexes phospho-marins, Acide phosphorique physiologique, Magnésium et Manganèse glycéro-phosphoriques activés et vitalisés par solution et combinaison en milieu marin.

**Action thérapeutique et indications :**

- 1° Stimulant, réparateur et neurotonique (Surmenage physique et intellectuel, Asthénies, Dépressions fonctionnelles, Usure sénile.
- 2° Oxydant et modificateur de la nutrition (Troubles alcalosiques, Arthritisme, Phosphaturie, Scléroses, Anoxémie.

Action immédiate. Innocuité absolue.

**Posologie.** — XX gouttes (dose moyenne) au milieu des deux principaux repas, en dilution dans un verre de boisson quelconque.

Littérature et échantillons gratuits.

**Laboratoires LA BIOMARINE**  
DIEPPE (Seine-Inférieure).

## IOSORBINE

Onguent ioduré (10 p. 100 KI) caractérisé par son absorption totale.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action kératolytique, kératoplastique, résolutive, sédative, analgésique.

Désinfectant de la peau.

Pas d'accident d'iodisme, pas d'irritation ni de coloration locale.

**Indications.** — 1° *Adénites* ; entorses, foulures, plaies traumatiques.

2° *Algies* : névralgies, névrites, rhumatismes, courbatures, contusions.

3° *Dermatoses sèches* : dermites squameuses et kératosiques, psoriasiformes, eczémas secs, dermo-épidermites, pyodermites, dermites staphylococciques, Réactions cutanées d'ordre anaphylactique (urticaire). brûlures, coups de soleil, radiodermites.

4° Désinfection de la peau (emploi journalier comme crème prophylactique).

**Mode d'emploi.** — Friction légère jusqu'à absorption. Faire plusieurs applications de suite.

**Présentation.** — Crème blanche en pots de deux dimensions :

Le pot : 12 francs. — Le double pot : 20 francs.

Echantillons et littérature :

**LABORATOIRES VANDA**  
16, rue Ficatier — COURBEVOIE.

## IRENINE GONNON

**Composition.** — Cachets dosés à 0 gr. 71, à savoir : 0 gr. 53 d'Irénine proprement dit (combinaison fixe cristallisable de pyramidon, analgésine, phénacétine). 0 gr. 13 de sulfate de quinine, 0 gr. 05 de caféine.

**Indications.** — Spécifique des douleurs violentes et rebelles, névralgies, maux de tête, rages de dents, migraines, crises de rhumatisme, fièvres, grippe, influenza, douleurs périodiques, accès de goutte, etc...

**Posologie.** — 1, 2 ou 3 cachets par jour.  
Toujours toléré par l'estomac, pas de vertiges.

Prix : 8 fr. la boîte de 12 cachets.

### Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

## IRRASTÉRINE

### Vitamine D. Standardisée.

Ergostérine irradiée par les rayons ultra-violets.

Adoptée par les Hôpitaux.

Solution — Dragées.

**Composition.** — Ergostérine pure irradiée aux rayons ultra-violets, en solution dans l'huile d'olives, sans aucune addition de cholestérine.

**Propriétés thérapeutiques.** — Véritable catalyseur du calcium et du phosphore, l'Irrastérine peut être considérée comme la médication spécifique du rachitisme et de tous les troubles du métabolisme phospho-calcaïque.

**Indications.** — Traitement spécifique du rachitisme, de la tétanie et de tous les états spasmophiles. Troubles de l'ossification, Caries dentaires, Ostéomalacie, Prétuberculose et tous états de déminéralisation.

**ose et mode d'emploi.** — *Solution huileuse* (1 goutte = 200 unités antirachitiques) jusqu'à 1 an, X gouttes ; de 1 à 10 ans, XX gouttes ; adolescents, adultes, XXX gouttes. — *Dragées* (1 dragée chocolatée = 1 200 unités antirachitiques) 2 à 4 par jour.

### Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

## ISACÈNE « ROCHE »

Laxatif synthétique nouveau.

**Action thérapeutique.** — L'Isacène « Roche » est la diacétyldioxyphénylisatine, insoluble dans l'eau et l'acide chlorhydrique, soluble seulement dans le milieu alcalin du côlon, où se constitue la constipation. Il est absolument atoxique, sans odeur, sans saveur, sans aucun effet nocif ; il agit d'une manière douce, constante, certaine, sans coliques, sans épreintes et sans ténésme. Il n'est pas absorbé au niveau de l'intestin, il ne passe pas dans l'organisme, et il est éliminé en totalité avec les matières fécales.

**Indications thérapeutiques.** — Tous les cas de constipation (sans aucune exception), adultes bien portants ou malades, alités, opérés, rénaux, vieillards, intoxiqués, femmes enceintes, enfants, etc.

**Posologie et mode d'emploi :**

*Adultes :*

Dose laxative légère . . . .	2 granules.
— moyenne .	2 à 4 granules.
— forte . . . . .	4 à 8 granules.

*Enfants.*

1/4 ou 1/2 dose, selon l'âge et le cas.

**ISACÈNE « ROCHE »**

Flacon de 40 granules.

**Produits**

**F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**

21, Place des Vosges — Paris (III<sup>e</sup>).

## ISOTONYL BOURET

(Poudre de Lausanne.)

### Action.

L'Estomac dilue ou concentre son contenu de façon à lui faire atteindre toujours le point cryoscopique de 0,38, nécessaire pour que le chyme franchisse le pylore.

L'Isotonyl Bouret aide l'estomac à remplir cette condition. Il stimule la fonction sécrétrice des glandes gastriques, neutralise le suc gastrique hyper-acide, assure l'évacuation gastrique.

### Formes et mode d'emploi.

Paquets, 1 pour 1 litre. Discoïdes, 2 pour 1 verre.

*Adultes* : 2 à 3 verres par jour.

*Enfants* : 1/2 verre à Bordeaux à 2 verres par jour.

Après les repas, au moment des douleurs ou pesanteurs et le matin à jeun, 1/2 heure avant le petit déjeuner.

Prix au public : 13 francs.

**Pharmacie CHAUMEL**

87, rue Lafayette — PARIS (IX<sup>e</sup>).

---

# IVULA PEARSON

## 1<sup>o</sup> OVULES IVULA.

**Composition.** — *Ovules Capsules creux*, constitués par une mince enveloppe glyco-gélatineuse à fusion rapide, renfermant, à l'état liquide, le principe actif : *Solution Ivula*, à base de Créoline (2 p. 100) et additionnée de 0,25 de camphre.

Cette solution donne avec les sécrétions une émulsion très fine, d'où pénétration profonde. En outre, on n'introduit dans la cavité vaginale que le minimum de matière inerte (sinon nuisible).

**Indications.** — Prophylaxie et traitement de toutes les gynécopathies infectieuses en particulier de celles d'origine gonococcique. Prévention des complications infectieuses consécutives à l'accouchement.

**Présentation.** — Boîte de 12 ovules. (Il existe également une boîte de 50 ovules exclusivement réservée au corps médical, hôpitaux et cliniques).

**Prescrire.** — Un ou deux ovules par jour.

## 2<sup>o</sup> SOLUTION IVULA.

**Composition.** — Identique au contenu des ovules. (1 cuillerée à café = 1 ovule).

**Indications.** — Les mêmes que celles des ovules. Hygiène et soins gynécologiques intimes.

**Présentation.** — Flacon gradué de 60 gr.

**Prescrire.** — 1 cuillerée à café pour 2 litres d'eau bouillie tiède en injection vaginale.

## 3<sup>o</sup> ONGUENT IVULA.

**Composition.** — Solution Ivula incorporée dans un excipient consistant soluble, miscible aux sécrétions, dans lesquelles il s'émulsionne de lui-même.

**Indications.** — Prophylaxie et traitement des gynécopathies infectieuses externes chez la femme (comme complément du traitement aux ovules).

Prévention des maladies vénériennes chez l'homme, grâce à son excipient soluble permettant une pénétration parfaite de la muqueuse et une large diffusion en surface comme en profondeur.

**Présentation.** — Tube de 20 gr. avec petite canule urétrale se vissant sur l'embout.

**Prescrire.** — Q. S. En onction sur les organes génitaux, ou introduite dans le méat au moyen de la canule spéciale.

Etablissements Pharmaceutiques

JACQUES MIDY

41, rue de Courbevoie — LA GARENNE (Seine).

Tél.: Charlebourg 09-80.

## IXIUM BUISSON

**Solution isotonique stérilisée de Thorium X pour usage médical.**

(Injections intramusculaires profondes ou intraveineuses.)

**Principales utilisations et posologie du Thorium X**

<i>Affections traitées.</i>	<i>Doses de thorium X employées.</i>	<i>Marche et durée du traitement</i>
<b>Rhumatismes chroniques</b>	Commencer par 50 à 80 microgrammes et augmenter progressivement de 20 jusqu'à la dose de 200 micros, dose à maintenir jusqu'à la fin de la série.	8 à 10 injections, au rythme d'une injection par semaine.
<b>Goutte</b>	Débuter par des doses légères, en dehors des crises douloureuses, — de 50 à 200 micros — par augmentations progressives de 20.	10 injections consécutives, au rythme d'une par semaine.
<b>Psoriasis</b>	1 <sup>re</sup> injection : 50 mgr. 2 <sup>e</sup> injection : 100 mgr. les 6 dernières : 150 mgr.	3 injections, au rythme d'une par semaine.
<b>Névrite Sciatique</b>	Débuter par 50 à 80 microgrammes et augmenter progressivement de 20 jusqu'à la dose de 200 micros, dose à maintenir jusqu'à la fin de la série.	3 à 10 injections, au rythme d'une injection par semaine.
<b>Anémie Chlorose Neurasthénie</b>	De 25 à 75 microgrammes, par augmentations successives.	3 à 10 injections, au rythme d'une injection par semaine.
<b>Blennorrhagie chronique</b>	25 à 50 microgrammes dans une solution de 5 cmc.	1 à 2 injections urétrales par semaine.
<b>Leucémies Maladie de Hodgkin et Tumeurs</b>	Commencer par 100 microgrammes pour arriver à 350 par augmentations successives de 25 microgrammes.	5 à 10 injections, au rythme d'une injection par semaine.

Il est bien entendu que les doses ci-dessus peuvent être modifiées au gré du médecin et que les séries peuvent être renouvelées après un intervalle d'environ 2 mois de repos.

Toutes les doses sont exprimées en microgrammes de bromure de radium.

Prix de vente au public : 0 fr. 40 le microgramme.

Prix médical : 0 fr. 30 le microgramme.

L'Ixium est préparé à Paris tous les mardis par la

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**

**THERAPLIX**

*Pierre BRETEAU, Pharmacien*

Membre de l'Académie de Médecine

157, rue de Sèvres — PARIS (XV<sup>e</sup>).



## IXOGYNE

### Antiseptique gynécologique

(Usage externe.)

**Composition.** — Association de formaldéhyde, aldéhyde trichlorée, excipient spécial au baume benjoin de Siam. Parfum très agréable.

**Action.** — Antiseptique, antiprurigineux, décongestionnant, cicatrisant, désodorisant.

**Indications.** — Affections gynécologiques : vaginites, bartholinites, métrites, salpingites, prurit vulvaire, hygiène quotidienne de la femme. Soins obstétricaux.

**Mode d'emploi.** — 1 cuillerée à café dans un litre d'eau chaude pour une injection, deux par jour.

Prix au public : 12 fr. 50.

**LABORATOIRE CHIMICO-  
THERAPIQUE DE PARIS**

12, rue des Apennins — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

---

## JÉCOL

### Régulateur entéro-hépatique.

La déficience du foie étant la cause initiale de nombreux états morbides, l'effort thérapeutique doit porter sur la cellule hépatique qu'il convient de stimuler afin d'en rétablir le délicat fonctionnement.

Par son action progressive et douce, le Jécol se classe au premier rang des médicaments destinés à traiter l'hépatisme sous toutes ses formes :

*Congestion et Insuffisance du foie, Gastro-entérite, Entérite muco-membraneuse, Auto-intoxication, etc.*

**Formule.** — *Combretum* (extrait spécialisé de kinkélibah).

*Boldo* (extrait aqueux).

*Evonymus* (extrait titré).

**Forme.** — Petits cachets.

**Prescription.** — 2 à 4 cachets par jour fin des repas, 3 à 6 semaines.

Cette dose pourra être augmentée ou diminuée chaque semaine, suivant les résultats constatés, par le médecin traitant, chez le malade.

**LABORATOIRE DU JÉCOL**

3, rue Watteau — COURBEVOIE (Seine).

## JEMALT WANDER

A base d'huile de foie de morue  
et d'extrait de malt à l'état de paillettes.

**Composition.** — Huile de foie de morue, 30 p. 100,  
Extrait de malt, 64 p. 100 ; Cacao, 6 p. 100 ;  
Essences aromatiques, Q. S.

**Indications.** — Le jemalt réalise la médication à  
l'huile de foie de morue renforcée des éléments  
nutritifs et digestifs (diastases) de l'Extrait de  
malt, Anémie en général, Croissance des enfants.

**Doses.** — Enfants jusqu'à 2 ans, 1 à 2 cuillerées à  
café par jour.

Enfants plus âgés, adolescents et adultes : 3 à  
6 cuillerées à café par jour.

Se prend le matin, le soir, ou entre les repas tel  
que (il fond rapidement dans la bouche), ou dilué  
dans du lait tiède ou infusion.

La boîte : 12 francs.

### Établissements WANDER

151 bis, route de Joinville — CHAMPIGNY (Seine).

---

## JUGLANE

**Composition.** — Principe actif du noyer sauvage.

**Indications.** — Toutes les formes du diabète  
et ses complications : acidose, acétonémie, en  
particulier les diabètes gras, arthritiques, hépa-  
tiques. Aucune contre-indication, tolérance par-  
faite, innocuité absolue, aucune incompatibilité.

**Mode d'emploi.** — 3 à 4 pilules avant chacun des  
trois repas. Cette dose peut être doublée sans  
inconvenient. Continuer progressivement le trai-  
tement jusqu'à complète disparition du sucre  
dans les urines.

Prix en France : 15 fr. la boîte de 150 pilules

### Produits Euthérapiques

Camille CONS, Anc. Int. des Hôpitaux de Lyon.  
12, rue des Ecoles — CHAMBÉRY (Savoie).

## JURAISIN DE MACON

**Forme.** — Jus *concentré blanc ou rouge*, obtenu par le traitement à froid dans le vide de raisins frais blancs ou rouges.

**Composition.** — *Naturelle* sans aucune addition ni antiseptique.

**Conservation.** — Illimitée même en flacons débouchés.

**Indications.** — Constipation, arthritisme, goutte, auto-intoxication, infection, gastro-entérite, insuffisance hépatique et rénale, urologie, néphrite, hypertension, hémorroïdes, migraine.

*Boisson de régime* pour les enfants, les vieillards, les opérés, les convalescents.

*Vente exclusive en pharmacie.*

25 fr. la bout. représentant 8 kilos de raisin frais.

14 fr. la 1/2 bout. représentant 4 kilos de raisin frais.

8 fr. 50 le 1/4 bout. représ. 2 kilos de raisin frais.

**Établissements œnologiques de Bourgogne**  
MACON (Saône-et-Loire).

---

## KALMOBROL

(Spécialité absolument française.)

**Composition.** — Extrait de bouillon bromuré à base de bromure de sodium très pur.

**Doses.** — 1 cuillerée à café : 1 gr. de bromure de sodium.

**Indications.** — Tous les cas les plus divers d'Excitation nerveuse (Insomnie, Neurasthénie, etc., etc.).

**Mode d'emploi.** — Verser dans une tasse d'eau très chaude le nombre prescrit de cuillerées à café. On obtiendra immédiatement un délicieux bouillon que l'on absorbera bien chaud, soit au début du repas, soit à n'importe quel moment de la journée.

( Laboratoires R. NIEL

60, rue Auguste-Comte — LYON (Rhône).

---

## KAOBROL

**Composition.** — Bromure de sodium et Poudres absorbantes. Kaolin, carbonate de magnésie, carbonate de chaux, gomme pour homogénéiser la poudre.

Poudre blanche de saveur agréable, sucrée et aromatisée à la menthe.

**Indications.** — Toutes les dyspepsies, plus spécialement hyperchlorhydriques et nerveuses. Troubles digestifs de la femme enceinte. Gastro-entérites. Aérophagie.

Sédatif puissant de toutes douleurs gastriques.

**Posologie.** — Une cuillerée à café après les repas et au moment des crises douloureuses.

Littérature et Echantillons à Messieurs  
les Docteurs.

Laboratoire du KAOBROL

J. LAROZE, Pharmacien

54, rue de Paris — CHARENTON (Seine).

## KAOLINASE

Pour pansements gastriques.

Kaolin purifié, en poudre fine très adhésive, lavé et stérilisé.

**Dose et mode d'emploi.** — 1 ou 2 paquets le matin à jeun (mode d'emploi sur prospectus).

**Propriétés thérapeutiques.** — Le KAOLIN constitue le médicament de choix pour le *plâtrage* de l'estomac (Prof. Hayem, A. M., 13-5-1920).

**Indications.** — Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Ulcères et ulcérations de l'estomac, Colites, Fermentations gastro-intestinales, etc.

La boîte de 20 paquets de 10 gr. : 12 fr.

Echantillons gratuits :

**Laboratoires G. BEYTOUT**

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X<sup>e</sup>).

## KENOL

**Compensateur intestinal**

Extrait duodénal total .....	0 gr. 045
— biliaire total purifié ..	0 gr. 045
— Gladiolus ceruleus....	0 gr. 019
— Evony. atropur.....	0 gr. 019
Hyd. de soufre purifié .....	0 gr. 035
pour un comprimé-dragée.	

**Propriétés thérapeutiques.** — Rétablit l'équilibre des sécrétions intestinales. Agit sur le péristaltisme. Action antiseptique puissante.

**Indications.** — **Constipation**, Affections hépatiques, Cholécystites, Dermatoses, Auto-intoxication.

**Doses.** — 1 à 3 dragées au repas du soir ou 1 à 2 à chaque repas. Avaler sans croquer. Action évacuante douce, activité constante. Pas d'accoutumance.

**A. MILLET et CH.-O. GUILLAUMIN**

5, rue Ambroise-Thomas — PARIS.

## KINECTINE

Spécifique de la Fièvre des Foins  
et du Coryza aigu.

**Indications.** — Fièvre des foins, Coryza aigu.

**Forme.** — Comprimés.

**Posologie.** — *Adultes.* — 3 comprimés par jour.

*Enfants.* — Moitié dose.

**Établissements MOUNEYRAT**

12, rue du Chemin-Vert

VILLENEUVE - LA - GARENNE  
près Saint-Denis (Seine).

---

## KIPSOL

(En pilules).

Cacao pulv. et tannates actifs d'alcaloïdes.

(Avantages curatifs des préparations belladonnées et opiacées, à l'exclusion de leurs inconvénients.)

**Doses et mode d'emploi.** — 2 à 7 pilules par jour, espacées au moins de deux heures. — Ces pilules, très petites, s'avalent facilement avec une gorgée d'eau et même sans aucun véhicule liquide.

**Propriétés thérapeutiques.** — Spécifique des Coryzas accidentels ou chroniques, des toux, bronchites, coryza des iodures, grippe, etc.

**Indications.** — Préservatif et curatif des rhumes.

Prix : 5 francs.

**BERTAUT-BLANCARD Frères**

64, rue de La Rochefoucauld — PARIS.

## KLUCHOL REMEAUD

à base de Benzoate d'Anéthol Solubilisé.

**Forme.** — Sirop d'un goût très agréable, bien accepté des enfants. — Non toxique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antispasmodique puissant, calmant et curatif de la coqueluche, des toux coqueluchoïdes ou nerveuses, asthme, etc...

**Posologie.** — *Adultes* : 3 à 5 cuillerées à soupe par jour.

### *Enfants.*

Moins d'un an .....	2 à 4 cuill. à café par jour.		
1 à 5 ans .....	4 à 8	—	—
5 à 10 ans .....	5 à 10	—	—
Au-dessus de 10 ans .....	8 à 10	—	—

### **Nota.**

L'innocuité absolue permet d'augmenter progressivement, et même de doubler les doses ci-dessus, jusqu'à l'obtention rapide de l'effet désiré.

### **LABORATOIRE REMEAUD**

38, avenue J.-Baptiste-Clément — Boulogne-sur-Seine.

Téléphone : Molitor 04-59.

Dépôt général O. C. P.

71, rue du Temple — Paris.



## KOCH-I-CIDE LEISYN

Complexe métallo-organo-végétal pour la Chimiothérapie intensive des Tuberculoses de toutes natures.

**Composition.** — Métaux précieux, Hg, Terres rares, Organates, Thymolates, Terpènes et Sulfonates polyvalents, Bornéine, Chlorure de tétraméthylamino-diphénylpentthiazimium, Phénylacétyle d'acétyle.

**Action.** — Médication extrêmement diffusible dissolvant l'enveloppe cirograisseuse du B. K. et créant autour du bacille un milieu où il ne peut subsister. Hyperantiseptique à l'égard du B. K.

**Indications.** — Tuberculoses fermées. T. ouvertes des 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> degrés, même présentant des cavernes très étendues. T. caséuses, intestinales, ganglionnaires, cutanées, osseuses chirurgicales. Aucune contre-indication même dans les cas fébriles ou hémoptoïques. Jamais d'inconvénients ni d'incidents.

**Présentation.** — Pilules kératinisées (3 à 15 *pro die*). Ampoules de 2 cc. et 5 cc. environ pour injections intrapleurales, intratrachéales, intramusculaires ou hypodermiques (1 à 4 par semaine). Ampoules suractivantes de 2 cc. par voie hypodermique (2 à 4 par semaine.) Suppositoires : 1 à 2 par 24 heures.

Innocuité absolue. Non toxique.

Pas de contre-indication.

**Les Laboratoires LEISYN**

1 bis, rue Molitor — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## KOLA GRANULÉE ASTIER

**Composition.** — Extrait de Kola granulé contenant tous les principes actifs de la noix fraîche: caféine, théobromine, combinaisons tanno-caféiniques, rouge de Kola et tanins actifs.

**Propriétés thérapeutiques.** — Régulateur du cœur. Excitant musculaire. Reconstituant du système nerveux. Tonique général des forces intellectuelles et physiques.

**Indications.** — Neurasthénie, adynamie cardiaque, troubles fonctionnels cardiaques, grippe, convalescence des maladies infectieuses et maladies graves, asthénie, surmenage physique et intellectuel. Entraînement à tous les sports.

**Posologie.** — Dose moyenne: 2 cuill. à café par jour, à prendre tel que dans le creux de la main, ou en dissolution dans tout liquide aqueux.

Prix: 12 francs.

**Laboratoires P. ASTIER**

41, 42, 43 à 47, rue du Doct-Blanche — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

---

## KOLA MONAVON

### Présentation et composition :

*Elixir* (26°) : 0 gr. 30 extrait de kola par verre à liqueur (30 cc.).

*Vin* (21°) : 0 gr. 30 extrait de kola par verre à bordeaux (75 cc.).

*Granulée* : dosée à 6 p. 100 d'extrait de kola.

*Pastilles* : 0 gr. 035 extrait de kola par pastille.

L'Extrait de Kola rentrant dans la composition de la Kola Monavon renferme tous les principes actifs de la noix de kola fraîche : Caféine libre et combinée, théobromine, kolatine et rouge de kola, qui, sous l'influence des liquides digestifs, se dédouble en glucose, kolatannin et caféine à l'état naissant.

**Propriétés thérapeutiques.** — Aliment d'épargne sans égal. Agent de conservation et d'augmentation des forces musculaires et nerveuses. Régulateur de la circulation. Stimulant du système cérébrospinal. En un mot : **Excitant tonique général.**

**Indications.** — Œdèmes, anasarques et la plupart des troubles fonctionnels du cœur, migraine, céphalagie, névralgie d'origine circulatoire, neurasthénie, surmenage, asthénie grippale, convalescences, dyspepsie, diarrhées chroniques et diarrhées des pays chauds.

### Posologie :

*Elixir* : 1 à 2 verres à liqueur par jour, avant ou après les repas.

*Vin* : 1 à 2 verres à bordeaux par jour.

*Granulée* : 2 à 4 cuillerées à café par jour, pure, dans du café, du thé ou de l'eau.

*Pastilles* : 10 à 15 par jour.

### Prix :

Elixir et Vin : 18 francs. — Granulée : 13 francs. — Pastilles : 8 francs.

### Produits GONNON

J. et C. GONNON, pharmaciens.

14, rue Victor-Hugo — LYON.

## KOLATINÉS

Tonique sédatif.

Kola à Kolatine inaltérée, traitée vivante sur place avant toute formation de caféine par oxydation diastasique, et solubilisée avec élimination de tout agent excitant.

**Action.** — Active la nutrition et les échanges cellulaires. Augmente l'énergie nerveuse sans coup de fouet ni dépression consécutive. Calme l'irritabilité de dépression par effet toni-nervin. Renforce les réactions de défense contre l'infection.

**Avantages.** — Tolérance parfaite à tout âge (nourrissons, vieillards) ainsi que chez les nerveux, les cardiaques, les hypertendus et tous ceux qui ne peuvent supporter les excitants. Action rapide et continue sans accoutumance ni nécessité d'interruption. Facile à prendre en infusions.

**Indications.** — Fatigue physique et intellectuelle, toutes asthénies et dépressions irritables : cérébrales, nerveuses, cardiaques, digestives. Insomnies, inappétence, états dyspeptiques, entériques, infectieux. Diarrhées infantiles, grippe, pneumonie, tuberculose, etc., anémie, lymphatisme, suites de couches, allaitement, convalescences : infectieuses, traumatiques, post-opératoires.

**Présentation et emploi.** — Poudre soluble en sachets. Boîte simple : 10 sachets ; boîte triple : 30 sachets, avec réduction de prix sensible (cure).

*Adultes et enfants* : 1 à 3 sachets par jour.

*Nourrissons* : 1/4 à 1/2, en plusieurs tétées.

Dissoudre à chaud, dans aliments liquides à prendre en rations normales : lait, cacao, café, thé léger, infusions, bouillons, tisanes, eau sucrée.

Littérature et échantillons

**PRODUITS ET PROCÉDÉS CHALAS, S. A.**

12, rue du Helder — PARIS (IX<sup>e</sup>).

Tél. : Provence 81-44 et 75-45.

## KREPTOL

**Granulé.**

**Composition.** -- Kola, méthylarsinate de soude, phosphure de zinc, glycérophosphate de chaux, soude, magnésie.

**Doses.** — Une cuillerée à café, sec ou dans un peu d'eau, avant le repas de midi et du soir.

### DOCTEUR

*Si vous avez des malades fatigués, déprimés, neurasthéniques, ayant besoin d'un coup de fouet rapide, prescrivez du KREPTOL.*

Echantillons sur demande :

**Laboratoire LOUINET**, Pharmacien

39, rue de l'Arcade — PARIS.

Tél. : Central 60-77.

---

## KYMOSINE ROGIER

A base de Ferment lab et sucre de lait purifiés. — Poudre blanche.

Rend le lait de vache absolument digestible, facilite la digestion du lait de femme chez le nouveau-né.

**Dose.** — Une cuillerée-mesure dans 200 cc. de lait tiède à 40°.

Une pincée dans une cuillerée à café d'eau avant chaque tétée.

Le flacon : 12 fr. 50.

**Henry ROGIER**

Docteur en Pharmacie

56, boulevard Péreire — PARIS.

## LAB LACTO FERMENT MIALHE

Digestion du lait.

**Indications.** — Diarrhées vertes des nourrissons et dans tous les cas de mauvaise digestion du lait, troubles gastro-intestinaux, régime lacté où le malade doit absorber une forte quantité de lait.

**Dose.** — Pour *adultes et enfants* : une cuiller-mesure par verre de lait. *Nourrissons* : une demi-cuiller-mesure par biberon ou par tétée.

**Mode d'emploi.** — Mettre la dose indiquée dans 1 à 2 cuillerées d'eau, puis ajouter le lait, froid ou tiède.

**Laboratoire du Dr MIALHE**

8, rue Favart — PARIS.

## LACCODERMES

Vernis semi-gras, soluble à l'eau.

Pansement dermatologique.

*Laccoderme à l'oxyde de zinc* : Affections légères de la peau.

*Laccoderme sulfo-cadique* : Eczematides-Impetigo.

*Laccoderme au goudron de houille* : Dermatoses suintantes.

*Laccoderme à l'ichtyol* : Eczema-Ecthyma.

*Laccoderme ichtyol-stovaïne* : Dermatoses prurigineuses.

**Mode d'emploi.** — Nettoyer la peau au savon Denisol. Étendre le Laccoderme. Laisser sécher et saupoudrer avec l'Anytal Brisson.

**Laboratoires P. BRISSON et Cie.**  
157, rue Championnet — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

## LACHÉSINE

Extrait du venin  
du *Trigonocephalus lachesis*.

**Forme.** — Comprimés solubles dans l'eau.

**Mode d'emploi.** — Deux à quatre comprimés par jour en dehors des repas. Résultat rapide.

**Indications.** — *Troubles de la ménopause naturelle ou chirurgicale.* (Bouffées de chaleur, sueurs, vertiges, congestion céphalique, dyspepsie, mélancolie, etc.)

S'abstenir pendant les règles.

Prix : 12 francs le tube de 40 comprimés.

**Laboratoire RENAUD**

2, rue Demours — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Téléphone : Wagram 83-97.

## LACPININE

**Forme.** — Liquide blanc.

**Composition.** — Emulsion d'essence de pin naturelle.

**Indications.** — Pour vaporisation, douches vaginales, bains de siège contre hémorroïdes, bains complets en cas de neurasthénie.

**Mode d'emploi.** — Lavages et douches vaginales : 1 à 3 cuillerées à café par 1 à 2 litres d'eau.

Vaporisation et désodorisation des locaux : 5 cuillerées à soupe par litre.

Frictions : pure ou diluée de moitié.

Pour un bain complet ou partiel, la Lacpinine s'emploie à raison de 1 cuillerée à soupe pour 100 litres d'eau.

Prix.	{	Flacon de	60 gr. :	5 fr. 80
		—	150 gr. :	13 fr.
		—	750 gr. :	43 fr. 80
		—	1 000 gr. :	50 fr.

**Laboratoires FISCH et C<sup>ie</sup>**

4, rue d'Illzach — MULHOUSE (Haut-Rhin).

Dépôt à PARIS, 49, rue de Paradis.

Tél. : Provence 30-32.

## LAC-SER

**Composition.** — Lactosérum desséché.

**Propriétés.** — Provoque dans l'intestin des fermentations acides qui s'opposent aux putréfactions albuminoïdes toxiques. A, en outre, une action diurétique et cholagogue.

**Indications.** — Auto-intoxications intestinales, entérites des nourrissons, affections hépatiques.

**Formes et posologie.** — Paquets : 5 gr. de lactosérum desséché par paquet correspondant à 100 gr. de lactosérum liquide.

**Dose :** 3 à 4 paquets par jour dans un liquide (3 à 400 gr.).

Prix : 15 francs (boîte de 30 paquets).

**Laboratoire MONTAGU**

49, boulevard de Port-Royal — PARIS (XIII<sup>e</sup>).

---

## LACTARIS

**Médication lactique entièrement nouvelle**

par sédiment massif de cultures lactiques vivantes.

**Présentation.** — Ampoules-flacons à boire.

**Composition.** — Par dose : environ 2 000 000 000 de plusieurs anaérobies facultatifs.

**Indications.** — Chez l'enfant et l'adulte : diarrhées, entérites aiguës, hyperintoxication intestinale.

**Prix :** 25 francs la boîte de 18 ampoules-flacons.

**Laboratoire CENTRAL**

125, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

M. MASSON,

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.



## LACTICHOLÉINE TULIVET

**Composition.** — Ferments lactiques sélectionnés.  
Extrait de fiel de bœuf.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Propriétés thérapeutiques.** — Spécifique infail-  
lible dans les affections du tube digestif, dans les  
affections intestinales et cutanées, dans l'insuf-  
fisance biliaire et la désinfection intestinale.

**Mode d'emploi.** — A prendre 10 minutes avant le  
repas dans de l'eau sucrée ou du lait.

*Adultes* : 3 à 8 comprimés par jour.

*Enfants* : 2 à 5 comprimés par jour.

*Nourrissons* : 1/2 comprimé 2 fois par jour.

### Laboratoire TULIVET

52, rue de Poissy — Saint-Germain-en-Laye.

---

## LACTIMASE

**Description.** — Comprimés de ferment  
lactique de 0 gr. 50 ; par flacons de 40 com-  
primés.

**Action thérapeutique.** — La *Lactimase*  
détruit les microbes pathogènes de l'intes-  
tin par accaparement du milieu, action  
renforcée par la symbiose du bacille Bul-  
gare et d'une levure spéciale.

**Indications.** — 4 à 8 comprimés par jour  
dans les intoxications intestinales, diar-  
rhées vertes des nourrissons, constipation,  
dysenteries, entérites.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS.

## LACTOBACILLINE

Comprimés de ferments lactiques  
sélectionnés.

**Doses et mode d'emploi.** — 3 à 9 comprimés par jour, avant ou après les repas. Aucun inconvénient à augmenter ces doses.

**Propriétés thérapeutiques.** — Remplacement de la flore intestinale nocive par une flore bienfaisante.

**Indications.** — Auto-intoxication intestinale, entérites, diarrhées, dermatoses.

**Laboratoires DARRASSE**

7 à 13, rue Saint-Maurice  
NANTERRE (Seine).

---

## LACTOBYL

**Composition :**

Sels biliaires.

Poudre de muqueuses intestinales.

Charbon poreux hyperactivé.

Ferments lactiques sélectionnés.

Extrait Cytoplasmique de *Laminaria flex.* (Pan-créine.)

**Forme.** — En comprimés de 0 gr. 25.

**Propriétés thérapeutiques.** — Rééducateur intestinal.

**Indications.** — Toutes les modalités de la constipation.

**Doses et mode d'emploi.** — De 2 à 6 comprimés par jour. Commencer le traitement par 2 comprimés 10 minutes avant ou après les repas. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit. Avaler sans mâcher.

Prix de vente au public : 10 francs.

**LE « LACTOBYL ».**

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## LACTOCHOL

**Composition.** — Ferments lactiques. Sels biliaires.

**Forme.** — Comprimés et granulés (enfants et nourrissons).

**Propriétés thérapeutiques.** — Infections intestinales, entérite. Adultes et nourrissons, Insuffisance biliaire.

### Dose et mode d'emploi :

*Adultes :* Comprimés : 2 à 6 par jour avant les repas dans de l'eau sucrée (avalé sans mâcher).

*Enfants :* 2 à 6 comprimés par jour dans miel, confiture, 1 cuillerée à café avant les repas.

*Nourrissons :* 1 cuillerée à café de granulé avant une tétée, ou un biberon, matin et soir.

Prix de vente au public : 12 francs

Laboratoires « **LOBICA** »,  
46, avenue des Ternes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

---

## LACTOFERMENTINE THEVENOT

**Description.** — Comprimés de ferments lactiques sélectionnés.

**Propriétés.** — Combat les fermentations microbiennes, intestinales par l'introduction de microbes antagonistes.

**Indications.** — Entérite muco-membraneuse, diarrhée estivale, gastro-entérite infantile.

**Doses.** — 4 à 6 comprimés par jour de préférence après les repas. *Enfants :* 1/2 dose.

Prix :

La boîte de 4 tubes de 15 comprimés : 11 fr.

Laboratoires **THEVENOT**  
DIJON.

## LACTOLAXINE FYDAU

Ferments lactiques laxatifs.

**Composition.** — Ferments lactiques sélectionnés, sels biliaires, agar-agar, ph-phthaléine.

**Forme.** — Comprimés.

**Propriétés thérapeutiques.** — Supprime la constipation, les intoxications gastro-intestinales, les fermentations putrides, rétablit les fonctions normales de l'intestin sans la moindre irritation.

**Doses.** — 1 à 3 comprimés pour adultes pris le soir avec un peu d'eau sucrée.

*Enfants* : 1/2 comprimé suffit.

Se vend par boîtes de 6 tubes de 6 comprimés.

Prix au public : 14 francs.

**Laboratoires Biologiques**

**André PÂRIS**

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## LACTO-SÉRUM LAVRIL

**Sérum physiologique**

et Plasma intégral du Lait coagulé, désalbuminé.

Excite tous les Parenchymes

**Cholagogue, Diurétique, Antitoxique**

Laxatif, Equilibre les fonctions, Cicatrisant.

*Foie, Rein, Intestin* : Affections, infections, déficiences, séquelles, Constipation, Troubles séniles. Médication infantile très indiquée.

**Deux préparations :**

- a) *Isotonique* pH : 6,5. 1° Diététique substitué au régime lacté. Premier aliment des opérés (élim. d'anesth.); 2° Cures de désintoxication : 2 verres à jeun à 20 min. d'interv. ; 3° Cholagogue 2, 3, 4 verres à jeun à 20 min. addition possible de sulfate de magn. ; 4° diurétique dose massive ; 5° adjuvant de traitement ou véhicule médicamenteux.
- b) *Hyperacide* pH : 4,5. Spécial pour désinfection urinaire. Colibacillose, Leucorrhées, Pansements.

**Laboratoires ST-AQUILIN DE PACY**

PACY-SUR-EURE (Eure).

Bureaux : 15, rue Clapeyron PARIS. Tél. : Europe 43-23.

## LAIT DE MAGNÉSIE PHILLIPS

Combinaison chimique définie de magnésie et d'eau (hydroxyde de magnésium) ne contenant aucun excipient destiné à maintenir la magnésie en suspension.

**Propriétés thérapeutiques.** — Anti-acide, sédatif gastrique, Laxatif, Dentifrice.

**Indications.** — Gastralgies, Dyspepsies acides et nerveuses, Eructations, Etats bilieux, Constipation, Coliques, Diarrhées d'origine dyspeptique, toutes les affections dues à l'acidité buccale.

**Posologie.** — *Anti-acide.* Adultes. — D'une cuillerée à café à une cuillerée à soupe dans un verre d'eau froide, 2 heures après les repas. Enfants : 1/2 à une cuillerée à café. Nourrissons : X à XX gouttes suivant l'âge.

*Laxatif.* Adultes. — D'une à quatre cuillerées à soupe dans un verre d'eau ou de limonade, une heure et demie avant le petit déjeuner du matin. Enfants : de une à deux cuillerées à café. Bébés : une demie à une cuillerée à café, suivant l'âge.

*Dentifrice.* — Après s'être brossé les dents, bien se rincer la bouche avec une cuillerée à soupe de lait de magnésie Phillips. Il se forme sur les dents et les gencives une pellicule alcaline qui dure plusieurs heures et les protège contre les attaques de l'acide.

**Présentation :** flacon de 120 cc., triple-flacon de 360 cc. environ.

---

Echantillons et littérature sur demande à

**IGEPHARMA**

47 bis, avenue Hoche — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## LAIT EN POUDRE GUIGOZ

Préparé avec le lait pur de la Gruyère (Suisse). Est mis à la disposition du Corps Médical sous trois formes :

Lait complet, lait demi-écrémé, lait complètement écrémé.

Traité par un procédé tout à fait spécial, à une température n'excédant jamais 50°, conserve toutes ses vitamines et peut alimenter un nourrisson *sans adjonction de jus de fruit*.

Par sa coagulation, par la petitesse de ses globules gras, par sa facilité de digestion, se rapproche du lait maternel.

**Indications.** — Lait sucré spécialement préparé pour l'alimentation des nourrissons et des personnes ne supportant pas le lait frais.

**Dose.** — Une partie du lait Guigoz pour six parties d'eau. Ne pas ajouter de sucre.

Littérature et échantillons :

**Le Lait GUIGOZ**

19, rue J.-J.-Rousseau — PARIS (1<sup>er</sup>).

Tél. : Gutenberg 73-00.

---

# LAIT MONT BLANC

## 1° CONCENTRÉ SUCRÉ.

### Composition moyenne :

Eau.....	24	p. 100.
Matière grasse (beurre).....	10,20	—
Matières azotées (caséine).....	9,80	—
Lactose (sucre de lait).....	13,40	—
Saccharose (sucre raffiné).....	40,75	—
Cendres .....	1,85	—

**Nature et caractéristiques.** — Lait de vache pur et intégral condensé en vase clos et à basse température, après pasteurisation, additionné de sucre raffiné de premier choix. — Riche en vitamines et en beurre.

**Propriétés et indications.** — Allaitement mixte ou artificiel. Spécialement indiqué chez les nourrissons atteints de troubles de la digestion ou de la nutrition, d'arrêt de croissance et de rachitisme, indiqué également chez l'adulte en cas d'entérites, de dyspepsies, de tuberculose intestinale ou pulmonaire.

**Présentation.** — Boîtes de fer-blanc serties, de 75, 200 et 400 grammes net de contenance.

**Mode d'emploi.** — Suivre les indications portées sur l'étiquette des boîtes. Pour l'allaitement des nourrissons utiliser de préférence le biberon gradué « MONT BLANC » en vente dans toutes les pharmacies, ou demander à la Compagnie générale du Lait son barème de dosages normaux.

## 2° CONCENTRÉ NON SUCRÉ.

### Composition moyenne :

Eau.....	73	p. 100.
Matière grasse (beurre).....	8	—
Matières azotées (caséine).....	8	—
Lactose (sucre de lait).....	9,5	—
Cendres.....	1,5	—

**Nature et caractéristiques.** — Successivement concentré, homogénéisé, mis en boîtes hermétiques et enfin stérilisé, ce lait est rigoureusement pur, c'est-à-dire exempt de germes saprophytes et pathogènes. Il se conserve indéfiniment et se digère parfaitement.

**Propriétés et indications.** — A peu près les mêmes que pour le lait sucré mais en ne perdant pas de vue que ce lait est stérile. Il est donc recommandé — lorsque son emploi est exclusif et prolongé — de faire absorber journellement aux nourrissons une à deux cuillerées à café de jus de fruit frais : (orange, citron ou raisin), de façon à compenser l'absence de vitamines.

**Présentation.** — Boîtes de fer-blanc serties, de 170 et 450 grammes net de contenance.

## 3° LAIT NATUREL STÉRILISÉ.

### Composition moyenne :

Eau.....	87,60	p. 100.
Matière grasse (beurre).....	3,50	—
Lactose (sucre de lait).....	4,70	—
Matières azotées (caséine, albumine).....	3,50	—
Cendres .....	0,70	—

**Nature et caractéristiques.** — Les mêmes que celles du lait concentré non sucré, la *concentration en moins*. S'emploie comme du lait ordinaire.

**Propriétés et indications.** — Lait de sécurité, rigoureusement aseptique, tout spécialement recommandé comme aliment de fond des bébés. Précieux au moment du sevrage, pendant les chaleurs et chez les nourrissons constipés.

**Présentation.** — Boîtes de fer-blanc serties de 165 et 420 grammes net de contenance.

Echantillons, littérature et prix spéciaux sur demande à la

**COMPAGNIE GÉNÉRALE DU LAIT,**

RUMILLY (Haute-Savoie).

Société anonyme au capital de fr. : 10.000.000.

R. C. Annecy n° 2.946. — C. C. P. Lyon 106-83.

## LAIT SEC LO-LO

Lait en poudre demi-écrémé.

**Composition approximative.** — Matières grasses : 12 p. 100. — Lactose : 44 p. 100. — Protéine : 33 p. 100. — Cendres : 7 p. 100. — Eau : 4 p. 100.

Provient de la dessiccation du lait frais. Ce lait, aussitôt recueilli, est soumis à l'action des rayons ultra-violets et ensuite évaporé dans le vide à basse température. Il ne subit pendant cette opération aucune transformation ni altération. Tous les principes du lait sont rigoureusement conservés.

**Lait vivant**, très riche en vitamines, digestibilité parfaite, conservation de longue durée.

**Indications.** — Alimentation du nourrisson et des personnes ne supportant pas le lait frais. Particulièrement recommandé dans les cas d'intolérances lactées. Evite les troubles gastro-intestinaux.

Deux autres formes : Lait complet (24 p. 100 de matières grasses) et lait écrémé (supprime, par un usage de quelques jours seulement, les vomissements et les diarrhées).

Littérature et échantillons :

**Établissements LO-LO**

123, rue de Paris — SAINT-DENIS (Seine).

---



## LAMINIODE

### AMPOULES DE LAMINIODE ET COMPRIMÉS DE LAMINIODE

#### Composition :

Contiennent le principe iodé vivant, intact, à l'état naturel, tel qu'il se trouve dans les algues marines de fond, de l'espèce « *Laminara flexicaulis* »

#### Indications :

Toutes les affections où l'iode est indiqué.

#### Avantages :

Jamais d'intolérance, ni d'iodisme.

#### Posologie et Prix :

**Ampoules de Laminiodé à 1 co.**

Boîte de 10 ampoules : 24 francs.

*Adultes* : 1 à 2 ampoules par 24 heures.

*Enfants* : 1 ampoule par 24 heures.

**Comprimés de Laminiodé.**

Tube de 50 comprimés : 12 francs.

*Adultes* : 1 comprimé après chaque repas.

*Enfants* : 1 comprimé deux fois par jour.

### SELS POUR BAINS DE LAMINODE

#### Composition :

Contiennent le principe iodé vivant, les sels et les autres principes actifs, intacts, à l'état naturel, tels qu'ils se trouvent dans les algues marines de fond, de l'espèce « *Laminaria flexicaulis*. »

#### Indications :

Toutes les affections où l'iode est indiqué.

#### Posologie et prix :

Paquet de 250 grammes : 6 francs.

Pour un *grand bain chaud* 38° C., 1 paquet (1 bain tous les 1 à 3 jours).

Pour *bains partiels*, bains de pieds, et pour la toilette, 1 cuillerée à dessert pour 10 litres d'eau.

Pour *bains pour enfants*, 1 cuillerée à dessert pour 10 litres d'eau.

Littérature et échantillons.

**Laboratoires OCÉANA**

**Paul GLOESS, Pharmacien,**

29, avenue de Saint Mandé — PARIS (XII°).

## LANSOYL

### HUILE DE PARAFFINE ROBERTS

**Deux formes.** — Liquide et gelée.

**Liquide :** Huile de paraffine chimiquement pure, très visqueuse et de densité très élevée. Sans goût ni odeur.

**Gelée :** Contient 90 p. 100 de Lansoyl liquide et 10 p. 100 de sucs de fruits et d'agar-agar. Goût, odeur et aspect agréables. Parfait pour enfants, vieillards et personnes à estomac délicat.

**Propriétés thérapeutiques.** — Lubrifie l'intestin, le décongestionne, régularise ses fonctions.

**Indications.** — Constipation chronique, Inflammations, Entéro-Colite, Flatulences, Coliques, et en général toutes les affections ayant pour cause la constipation.

**Doses.** — *Adultes :* Une cuillerée à soupe le matin et le soir.

*Enfants :* Une cuillerée à café trois fois par jour.

*Nourrissons :* Une demi-cuillerée à café trois fois par jour.

**Prix :** *Liquide :* G. M., 20 fr. ; P. M., 12 fr.

*Gelée :* 18 fr. 50.

**ROBERTS et C<sup>ie</sup>, Pharmaciens**

5, rue de la Paix — PARIS.

Tél. : Central 69-86.

## LANTOL

**Description.** — Complexe colloïdal électrique à base de rhodium à 0 gr. 20 par litre ; en ampoules de 3 cc. par boîtes de 4 ampoules, et en capsules kératinisées pour la voie gastrique en flacons de 60 capsules.

**Action thérapeutique.** — Colloïde isotonique, non toxique et indolore. Provoque la baisse de la température, une sensation de bien-être notable et une hyperleucocytose considérable, suivie de la destruction des agents infectieux localisés ou disséminés dans l'organisme.

**Indications.** — 1 à 4 ampoules par jour en injections intramusculaires ou intraveineuses, dans toutes les septicémies, pneumonies, péritonites, scarlatines, typhoïdes et tous états infectieux. Les capsules servent à compléter et achever le traitement tout le temps nécessaire.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS.

## **LAROSAN « ROCHE »**

Caséine-Calcium

Spécifique de la Diarrhée infantile.

**Avantages.** — Alcalinisation du milieu intestinal. Suppression du petit lait. Apport minimum de sucre. Taux élevé de caséine.

**Indications.** — Diarrhées infantiles et troubles dyspeptiques des nourrissons (Diarrhées simple, lentérique, verte, infectieuse, cholériforme. Diarrhées de dentition et de sevrage. Athrepsie, etc.)

Diarrhées toxiques des enfants et des adultes. États dyspeptiques des adultes. Ulcère de l'estomac, etc.

### **Modes d'emploi et doses :**

On prépare des mélanges : Eau bouillie, Lait, Larosan contenant 2 cuillerées à soupe et plus de Larosan « Roche » par litre. L'administration de ces mélanges et la conduite de la cure sont variables selon les cas.

Littérature et échantillons sur demande.

### **Produits**

**F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**

21, Place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

## LAURÉNOL MÉDICINAL

Chloro-aluminate de zinc sulfo-cuprique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique, désodorisant, ni toxique, ni caustique.

**Indications.** — En chirurgie, gynécologie, obstétrique, brûlures, dermatologie, hygiène médecine générale.

**Mode d'emploi.** — Pansements, injections vaginales. Puissance antiseptique absolue (solution 3 p. 100).

**Doses.** — Suivant les indications.

Le litre : 10 fr. — Le demi-litre : 6 fr. 25.

**Formes actives.** — SAVON LAURÉNOL (antiseptie, toilette). — SAVON DENTIFRICE au Laurénol (asepsie buccale, 24 h.). — OVULES au LAURENOL (métrites, vaginites, perles, etc.). — POMMADE au LAURENOL (affections de la peau).

LAURENOL n° 2, désinfectant, sans odeur, ni mercure.

Savon Laurenol : 4 fr. — Savon dentifrice : 6 fr.

Ovules Laurénol : 12 fr. — Pommade : 10 fr.

Laurénol n° 2 :

Le litre : 10 fr. — Le demi-litre : 6 fr. 25.

**Laboratoires BELIERES**

19, rue Drouot — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## LAXADONAL

**Composition.** — A base d'oxyde de magnésium hydraté, forme dans l'estomac en s'associant à l'acide chlorhydrique un

**Chlorure de magnésium**

le plus physiologique, le plus naturel, le plus assimilable. Additionné de peroxyde de magnésium, de lactose et de Saccharure d'anis, il désinfecte le tube digestif et constitue une boisson laxative, cholagogue agréale, dépurative diurétique

**Indications.** — Effets remarquables dans les engorgements du foie et de la vésicule biliaire, la constipation, les accidents arthritiques, migraines, rhumatismes chroniques, médication magnésienne, stimulant biologique, augmente les défenses de l'organisme contre les intoxications chroniques et l'envahissement des tumeurs.

**Doses.** — Dans la constipation : deux cuillerées à café dans un demi-verre d'eau, 2 à 3 fois par semaine le soir au coucher. Augmenter les doses selon les cas.

Dans les engorgements du foie et de la vésicule biliaire, migraines, accidents arthritiques, prophylaxie des tumeurs : une cuillerée à café le soir, au coucher 12 jours par mois.

Echantillons sur demande

**Laboratoire LOUNET** Pharmacien

39, rue de l'Arcade — PARIS. — Tél. : Central 60-77.

## LAXAMALT

50 % huile de paraffine, 50 % extrait de Malt.

**Poudre cristalline d'un goût très agréable.**

**Posologie :**

*Nourrissons* : 1 cuillerée à dessert administrée le soir dans le dernier biberon ou dans un peu d'eau bouillie.

*Enfants* : 2 cuillerées à soupe par jour avant ou après les repas ou le matin à jeun et le soir avant de se coucher.

*Adultes* : 3 ou 4 cuillerées à soupe le soir avant de se coucher.

Laxatif physiologique dépourvu de toute action irritante sur l'intestin.

Particulièrement indiqué chez les entéritiques, les nourrissons, les femmes enceintes et les opérés.

**Laboratoires LICARDY**

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS.

Téléphone : Maillot 17-75.

---

## LAXAMER

*(Laxatif amer)*

**Composition.** — Extrait fluide sucré à base de : Cascara sagrada, noix vomique, badiane, gentiane fraîche, écorces fraîches d'oranges amères.

**Propriétés thérapeutiques.** — Celles des amers et laxatifs doux n'irritant pas l'intestin ; cholagogue énergique, s'emploie dans la constipation. Il peut être prescrit aux femmes enceintes et aux nourrices, car il n'a pas de contre-indication.

**Mode d'emploi.** — Une à deux cuillerées à café par jour, avant le repas.

Prix : 12 francs.

Echantillons :

**Laboratoire du Docteur C. LEFEVRE**

52, rue Decamps — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## LAXATIFS MIRATON CHATEL-GUYON

**Pastilles Miraton Châtel-Guyon.** — Laxatif hydrominéral aux sels de la source Miraton Châtel-Guyon, stimulant idéal du peristaltisme intestinal, non irritant.

**Dose.** — 1 à 2 pastilles le soir au coucher.

**Grains Miraton Châtel-Guyon.** — Sels de la Source Miraton Châtel-Guyon associés à l'extrait total des glandes intestinales, à l'extrait biliaire et aux ferments lactiques, Régulateur physiologique de l'intestin, non irritant, sans accoutumance.

**Dose.** — 1 à 2 grains au repas du soir.

Littérature, Echantillons :

**Laboratoire R.-J. SOUDAN**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

Ex-interne des Hôpitaux de Paris.

6, rue Rosenwald — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## LAXAUL

Sirop laxatif au Suc de Pommes de Reinette de Normandie.

Produit exclusivement végétal, convenant à tous les âges et à tous les tempéraments.

**Composition.** — Infusé de Séné lavé à l'alcool dans le Suc de Pommes de Reinette Normandes. Manne, Miel, Tamarins.

**Doses.** — Jusqu'à deux ans : 1/2 cuillerée à café une ou deux fois par jour.

De deux à cinq ans : 1 cuillerée à café une ou deux fois par jour.

Au-dessus de cet âge : Par cuillerées à café ou à dessert répétées autant de fois qu'il est nécessaire.

**Adultes :** Par cuillerées à bouche.

**Indications.** — Embarras gastrique, Constipation et toutes affections qui en dépendent.

**LABORATOIRES**

Place Guillaume-le-Conquérant

FALAISE (Calvados).

## **LAXOCHOLÉINE TULIVET**

**Composition.** — Extrait de fiel de bœuf  
0 gr. 20.

**Forme.** — Ovoïdes glutinisés.

**Propriétés thérapeutiques.** — Lithiase biliaire, Coliques hépatiques, Ictères, Cholémie, Constipation, Entéro-colite.

**Dose et mode d'emploi.** — 4 à 8 par jour avant les repas.

### **Laboratoires TULIVET**

52, rue de Poissy — Saint-Germain-en-Laye.

---

## **LAXOGELOSE TULIVET**

**Composition.** — Agar-Agar et Extrait de Rhamnées.

**Forme.** — Cachets.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action laxative. Agit mécaniquement par augmentation du bol fécal et massage intestinal. Sans action irritante sur la muqueuse intestinale.

**Mode d'emploi.** — Un cachet au début du repas. 1 à 3 par jour.

### **Laboratoires TULIVET**

52, rue de Poissy — Saint-Germain-en-Laye.

## LAXOPEPTINE GIRARD

Laxatif pour Enfants.

Poudre à base de ferments de céréales, de citrate de soude et d'eupeptiques divers.

**Mode d'emploi.** — 1 ou 2 cuillerées à café dans du lait ou de l'eau bouillie, le matin au réveil ou le soir au coucher. Doubler la dose pour les enfants de 2 à 7 ans.

**Propriétés thérapeutiques.** — La Laxopeptine combat la constipation, régularise les fonctions digestives en assurant une bonne antisepsie intestinale.

**Indications.** — Gastro-entérites, ballonnement, gros ventre, vomissements, maladies aiguës, fébriles et toutes les affections ayant pour cause la constipation.

**Laboratoire A. GIRARD**  
48, rue d'Alésia — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

---

## LAXOR

### SIROP LAXATIF AU JUS D'ORANGE

**Composition.** — Jus d'orange stabilisé associé aux extraits végétaux et à la manne. Ne contient aucun produit chimique. De goût très agréable, particulièrement apprécié des enfants. A gardé les vitamines de l'orange.

**Indications.** — Laxatif doux, toutes constipations et troubles digestifs.

**Posologie.** — Nourrissons : 1 cuillerée à café et plus suivant besoin.

Enfants : 1 cuillerée à dessert et plus suivant besoin.

Adultes : 1 cuillerée à soupe — —

**Laboratoires Biologiques de l'Île-de-France**  
3, rue Laugier — ARGENTEUIL (Seine-et-Oise)



## LÉCITHINE VACHERON

Granulé dosé à 0 gr. 10 de lécithine par cuillerée à café.

**Propriétés thérapeutiques.** — Elle accélère les échanges nutritifs, accroît les forces, augmente très rapidement le poids du corps et le nombre des globules rouges du sang, tonifie la cellule nerveuse.

**Indications.** — Phosphaturie, neurasthénie, affections du cerveau et de la moelle ; Chlorose, diabète, rachitisme ; Convalescences longues et pénibles.

**Mode d'emploi :**

*Adultes* : 3 à 5 cuillerées à café par jour.

*Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Prix : 15 francs.

**Produits GONNON**

**J. et C. GONNON, Pharmaciens**

14, rue Victor-Hugo — LYON.

---

## LÉNIFORME

**Composition.** — Huile à 5 ou 10 p. 100 d'Essences végétales antiseptiques.

**Indications.** — Coryza, Rhinites, Sinusites, Laryngites, Trachéites.

**Forme et mode d'emploi.** — Se vend en flacons pour instillations à l'aide d'un compte-gouttes ou mieux avec le « Jectolix ». (Compte-gouttes spécial). Est également présenté sous forme de **Rhino-Capsules** en gélatine pour auto-injections nasales.

**L. E. V. A.**

26, rue Pétrelle — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## LEUCAGINE

*Médication radioactive et bactéricide des infections utérines aiguës et chroniques.*

**Application.** — Pansements utérins, 2 formes :

### 1° — CRAYONS

**Présentation.** — Crayons stérilisés à base d'organate d'argent et de bromure de radium, dosés à 1, 3, 5 et 10 micros.

**Indications.** — Métrites, Affections du col et du corps : 2 applications par semaine (Consulter la Notice).

N.-B. — Utiliser pour l'application notre appareil « *Porte-pansement* » spécial.

### 2° — OVULES.

**Indications.** — Tous les cas d'infections des voies génitales. Un ovule tous les jours.

Le crayon à 1 micro : 12 fr. ; 3 micros 18 fr.  
à 5 micros : 25 fr. ; à 10 micros : 35 fr.

La boîte de 5 ovules : 40 fr.

**Laboratoires pharmaceutiques**

**L.-G. TORAUDE**, O.  O. I. .

Docteur en Pharmacie, Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

---

## LEUCOSEPTYL

**Thérapeutique anti-infectieuse  
rationnelle.**

**Composition.** — Le *Leucoseptyl* est un extrait leucocytaire total injectable de l'Institut biologique Mérieux de Lyon. Il est obtenu à l'aide des globules blancs de cheval éclatés par congélation. C'est une véritable préparation opothérapique spécifique, contenant les endo-ferments, les exo-ferments et le stroma leucocytaires.

**Propriétés thérapeutiques.** — Le *Leucoseptyl* stimule la leucopoïèse, active la phagocytose, exalte les moyens de défense de l'organisme contre les infections, constitue la base biologique de toute thérapeutique anti-infectieuse.

**Indications.** — Toutes les infections aiguës ou chroniques, localisées ou généralisées, attribuables à des agents pathogènes identifiés ou méconnus.

**Forme.** — Le *Leucoseptyl* se présente en boîtes de 5 ampoules de 2 centimètres cubes.

**Emploi.** — Injection sous-cutanée ou intramusculaire. Ne jamais recourir à l'injection intra-veineuse. L'injection n'est pas douloureuse et ne provoque pas de choc.

Le *Leucoseptyl* peut être employé seul ou en association avec la Vaccinothérapie, la Sérothérapie ou la Chimiothérapie.

Injecté en même temps que les vaccins, il en décuple l'action.

**Doses.** — *Adultes et enfants* de plus de 3 ans.

Infections aiguës : 1 à 3 ampoules par 24 heures.

Infections chroniques : 1 ampoule tous les jours ou tous les deux jours.

*Enfants en bas âge ou nourrissons.* — 1 à 2 centimètres cubes par jour.

Littérature et échantillons sur demande.

Dépositaire exclusif :

**Laboratoire de l'Opocalcium**

**A. RANSON**, Docteur en pharmacie.

121, avenue Gambetta — PARIS.

Tél. : Mémilmontant 62-80 62-81.

## LEVURE B-17

de H. BOULARD

*Levure vivante, rigoureusement pure* de ferments étrangers. *Isotherme* (vit et se développe à 37° C).

Livrée en boîtes de 6 ampoules de 3 cc. 5, contenant la levure en *milieu isolonique* où elle reste vivante plusieurs années.

**Propriétés.** — Elimine les ferments pathogènes de l'intestin par concurrence vitale, sans produire d'acidité notable.

**Indications.** — Diarrhée infantile, Diarrhée banale des adultes, Dysenterie amibienne ou bacillaire, Entérites, Furonculoses et Dermatoses, Colibacilloses intestinales et urinaires.

**Posologie.** — 1 à 2 ampoules par jour dans un liquide sucré, froid ou tiède.

**Laboratoire des Ultra-Levures,**

6, rue de Naples — PARIS (VIII<sup>e</sup>)

et tous grossistes.

---

## LEVURE DE BIÈRE ADRIAN

Pure et sélectionnée. Obtenue par un procédé spécial conservant à la cellule mycodermique, malgré la dessiccation, sa forme et sa vitalité premières.

**Présentation.** — Poudre, granulé : 3 gr. représentent environ 2 cuillerées de levure fraîche. Comprimés dragéifiés contenant 25 cgr. de levure de bière sèche. Cachets dosés à 25 cgr.

**Action thérapeutique.** — Traitement spécifique des affections à staphylocoques. Furonculose, psoriasis, lichen et toutes les maladies parasitaires de la peau. Renferme les ferments totaux, diastases, vitamines et l'ergostérine.

**Posologie.** — *Poudre et granulé* : 2 cuillerées à café par jour. *Cachets et comprimés* : 2 à 6 par jour.

**ADRIAN et Cie**

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III<sup>e</sup>).

## LEVURE FRAICHE MYCÉTA

### Composition :

La *Levure fraîche Mycéta* est une levure pure fraîchement essorée, appartenant au type *Saccharomyces cerevisiae*, sélectionnée et active, sans aucune addition de matières étrangères.

### Propriétés :

Par son action fermentaire, ses diastases et ses vitamines, la levure Mycéta régularise les fonctions digestives, entrave le développement des putréfactions intestinales, agit sur les troubles de la nutrition, désintoxique le sang et augmente la résistance de l'organisme aux infections microbiennes.

### Indications :

Infections microbiennes, troubles digestifs et maladies de la nutrition, en particulier : états arthritiques, insuffisance hépatique, goutte, diabète, et maladies de peau (urticaires, furoncles, orgelets, etc.).

### Mode d'emploi :

Une dose par jour, de 15 gr. environ, en une ou deux fois, une demi-heure au moins ou une heure avant les repas. La livraison est faite par le Laboratoire tous les deux jours.

### Laboratoire ZYMA

4, rue Bellart — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

## LEVURINE EXTRACTIVE

**Description.** — Comprimés de 0 gr. 30 d'extrait sec de levure de bière en flacons de 50 comprimés.

**Action thérapeutique.** — Contient sous un poids 35 fois moindre tous les principes actifs de la levure fraîche, en particulier les vitamines et les corps anti-infectieux, auxquels celle-ci doit son activité, car ils agissent comme poisons vis-à-vis des microbes et surtout des staphylocoques. Conservation parfaite et facilité d'absorption.

**Indications.** — 4 à 12 comprimés par jour dans les cas d'abcès, anthrax, acné, eczéma, furoncles, herpès, phlegmons et toutes affections de la peau.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS.

## LIMOL CHURCHILL

(Hypophosphite de chaux : 0 gr. 20 par dose).

Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable. Préparation de *chaux* et de *phosphore* au minimum d'oxydation et, de ce fait, complètement assimilable. Recalcifiant idéal.

**Indications.** — Recalcification, phosphaturie, tuberculose, asthénie, bronchites, rachitisme, dentition, allaitement.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* :

**Sirop.** — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

**Comprimés.** — 2 comprimés absorbés, mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.

**Ampoules.** — 1 injection intra-musculaire chaque deux jours.

*Enfants* :

**Sirop.** — A partir de 7 ans par cuillerée à dessert. Au-dessous de cet âge par cuillerée à café.

**Comprimés.** — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

**Ampoules.** — Suivant indication du médecin traitant.

Exiger la signature du docteur Churchill.

3 formes : sirop, comprimés, ampoules. — Prix 15 francs.

**Laboratoire CHURCHILL**

12, rue Castiglione — PARIS (1<sup>er</sup>).

## LIMONADE GODFRIN

Limonade purgative concentrée  
au *Citrate basique de Magnésie*.

**Avantages.** — Seule limonade liquide au citrate de Magnésie, pouvant être conservée.

De saveur agréable, elle ne possède aucun arrière-goût médicamenteux et n'occasionne ni nausées, ni coliques.

**Formes.** — Flacon pour adultes de 100 cc. ; flacon pour enfants de 50 cc.

**Mode d'emploi.** — Vu sa concentration, elle ne doit pas être prise pure, mais étendue de une à deux fois son volume d'eau. A dose réduite (1 cuillerée à café ou à soupe, suivant le cas, dans un demi verre d'eau) elle constitue un parfait laxatif salin.

Prix au public : flacon pour adultes : 5 fr. 50 ;  
flacon pour enfants : 3 fr. 50.

**Laboratoires P. GODFRIN**

5, avenue Watteau — NOGENT-SUR-MARNE  
(Seine)

## LINADÉLINE

### POUDRE DU BON DOCTEUR

**Composition.** — Silicate de magnésie retamisé spécial. Stéarates secs de magnésie et de zinc.

**Propriétés.** — Spéciale pour la toilette des bébés.

Evite rougeurs et démangeaisons.

**Indications.** — Feux du rasoir, Gerçures, Hâle, Transpiration, Prurits.

Recommandée aux obèses, aux malades couchés, aux marcheurs.

**Mode d'emploi.** — En applications locales.

**Présentation.** — En boîte poudreuse.

La boîte : 5 fr. 50.

**Laboratoires J. VARIOT**

151 bis, Grande-Rue — VILLEMOMBLE.

O. C. P. — C. N. P.

---

## LIN-TARIN

**Graine de lin officinale** (mucilage naturel).

*préparée par les procédés de M. Tarin,*

*Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ancien chef de Laboratoire  
du professeur Trousseau.*

Phytothérapie de l'intestin.

Traitement intégral de la constipation.

**Préparation.** — C'est grâce à une sévère sélection dans le choix des graines spécialement cultivées, ainsi qu'au mode scientifique de criblage et de préparation, qu'est due l'efficacité réelle et reconnue depuis de longues années du Lin-Tarin.

Après criblage et dépoussiérage par les procédés mécaniques les plus techniques et les plus modernes, la graine est soumise à un traitement physico-chimique ayant pour but d'augmenter ses vertus mucilagineuses, carminatives, digestives, et d'y incorporer un parfum la rendant agréable à absorber.

**Indications.** — Le Lin-Tarin doit être prescrit dans tous les cas de constipation opiniâtre, d'atonie intestinale ou digestive, d'insuffisance de sécrétion biliaire, de difficultés d'évacuation rénale. Ses propriétés diurétiques le font recommander dans les maladies de la vessie : son emploi n'engendre jamais de douleurs.

Le Lin-Tarin est spécialement indiqué chez les futures mères et nourrices, dont l'état ne permet pas l'absorption de purgatifs ou laxatifs drastiques.

Le Lin-Tarin doit être ordonné à titre de régime pour l'entretien des voies digestives et intestinales. C'est un lubrifiant de premier ordre, son usage constant prévient l'obésité.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à bouche matin et soir, dans un demi-verre d'eau naturelle ou de Contrexéville, ou de lait chaud. Laisser macérer l'eau et la graine le plus longtemps possible. Absorber ensuite l'eau et la graine *sans la mâcher*.

**Laboratoires de PHYTOTHÉRAPIE**

6, rue Dombasle — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Tél. : Vaugirard 15-86



## LIPIODOL LAFAY

Huile iodée à 40 p. 100  
contenant 54 centigrammes d'iode par cc.

### Emplois en thérapeutique.

Générale : Toutes les indications de l'iode et des iodures sans iodisme.

Locale : Sciatiques, Lumbagos, Algies diverses, etc...

**Emplois en radiologie.** — Lipiodo-diagnostic de Sicard et Forestier. Exploration du système nerveux, des voies respiratoires, de l'appareil génital de l'homme et de la femme, des abcès, des fistules, etc.

**Présentation.** — Flacons de 20 cc, 22 fr. ; boîtes d'ampoules, 12 amp. de 1 cc., 23 fr. ; 8 amp. de 2 cc., 23 fr. ; 6 amp. de 3 cc, 25 fr. ; 4 amp. de 5 cc., 25 fr. ; 1 amp. de 10 cc., 11 fr. Flacons de capsules, 20 centigr. d'iode par capsule, 50 capsules, 20 fr. ; 25 capsules, 11 fr. Etuis de comprimés chocolatés, 4 centigr. d'iode par comprimé, 50 comprimés, 12 fr.

**André GUERBET et C<sup>ie</sup>**

22, rue du Landy — SAINT-OUEN (Seine).

---

## LIPOCÉRÉBRINE CHEVRETIN

Extrait éthéré de substance cérébrale.

Ampoules de 2 cc. contenant 0 gr. 20 d'extrait.

Dragées dosées à 0 gr. 05 d'extrait.

**Propriétés thérapeutiques.** — Agit par ses phosphatides, lipoïdes et antitoxines. Contient 50 p. 100 de lécithines (soit 2 p. 100 de phosphore actif) et 25 p. 100 de cholestérine. Antitoxique, Sédatif, Anticonvulsivant, Tonique.

**Indications.** — *Etats dépressifs du système nerveux, Neurasthénie, Anémie cérébrale, Convalescences, Hystérie, Psychoses.*

**Dose.** — Une injection sous-cutanée de 2 cc. tous les jours pendant 12 jours ou 2 dragées avant chaque repas. Dans les cas graves, doubler les doses.

**Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT**

52, rue La Bruyère — PARIS.

Télégr. : Chevrematte-90 Paris.

## LIPODÉTERPÉNOL

**Composition.** — Le Lipodéterpénol est un composé d'huiles essentielles déterpénées, de camphre, de lipoïdes et d'huiles purifiées. Il est utilisé sous deux formes : en *pommade* et en *injections* sous-cutanées.

**Propriétés.** — Le Lipodéterpénol injectable possède une action à la fois antigénique, antinémolytique, antitoxique, leucogénétique et auto-protecteur de l'organisme.

**Indications.** — *Toutes les infections graves chroniques* : larges phlegmons, septicémies, pleurésies purulentes, hématomes infectés, etc. spécialement chez les malades manquant de réaction (37°5 à 38° de température). On obtiendra des résultats encore plus nets, notamment dans le traitement des affections graves et de l'ostéomyélite, en associant le traitement par la *Themsaline* au Lipodéterpénol. Il n'y a guère de contre-indications que dans l'hypercholestérinémie.

**Mode d'emploi.** — Une *injection* sous-cutanée tous les deux jours dans la région du flanc ou de la cuisse. Frictions journalières de 10 minutes avec la *pommade*, alternativement sur la poitrine, le dos, l'abdomen, les reins et les membres.

**Laboratoire ZYMA**

4, rue Bellart — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

## LIPOÏDES ISCOVESCO

Extraits éthero-alcooliques imputrescibles  
de tous les organes.

Les Lipoiïdes H. I. par eux-mêmes, ainsi que par les vitamines lipo-solubles qu'ils contiennent, représentent dans certains cas la totalité et dans d'autres la partie la plus importante des substances actives des organes dont ils proviennent.

### Formes :

1° Pilules.

2° Ampoules huileuses, stérilisées à 110° pour injections hypodermiques, indolores.

### Posologie :

6 à 9 pilules par jour ou une injection hypodermique.

### Nomenclature :

*Adrénol Cortex*

(Partie corticale des glandes surrénales).

*Adrénol total*

(Glande surrénale totale) sans adrénaline.

*Androcrinol* (Testicule).

*Cérébrocrinol* (Cerveau).

*Gynocrinol* (Contient la folliculine).

*Gynolutéol* (Corps jaune).

*Hépatocrinol* (Foie).

*Mammol* (Mamelle).

*Néphrocrinol* (Rein).

*Splénocrinol* (Rate).

*Afatyl* (Thyroïde iodée):

etc., etc... Lipoiïdes de tous les autres organes.

## LIPOÏDES ASSOCIÉS

*Andro-Polycrinol*

(Testicule, Thyroïde, Hypophyse, Surrénale).

*Gyno-Polycrinol*

(Gynocrinol, Thyroïde, Hypophyse, Surrénale).

*Gyno-Hypophysol*

(Hormone ovarienne, Hormone hypophysaire associées).

Le tube de 60 pilules : 20 francs.

La boîte de 12 ampoules : 30 francs.

### Laboratoire ISCOVESCO

107, rue des Dames — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Téléphone : Galvani 07-90.

Adresse télégraphique : Lipoiïdes — PARIS, 54.

## LIPOIODINE CIBA

Iode organique assimilable.

**Diiodo-brassidate d'éthyle**, 41 p. 100 d'iode. D'une élimination plus lente que les iodures de potassium et de sodium, la lipoiodine remplace avantageusement ces deux médicaments à dose moindre, avec une tolérance meilleure et sans accidents d'iodisme.

**Indications.** — Celle de l'iode et des iodures : Artériosclérose, hypertension artérielle, Angine de poitrine. Affections des voies respiratoires, Rhumatisme chronique, Obésité, Goffre, Scrofule, Adénopathies, Syphilis, etc.

**Doses.** — *Adultes* : 1 à 6 comprimés par jour, une ampoule tous les 2 jours. — *Enfants* : 1/2 à 3 comprimés (aux repas principaux).

Le tube de 20 comprimés : 14 francs.

La boîte de 6 ampoules : 20 francs.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**

109-113. de boulevard de la Part-Dieu — LYON.

---

## LIPOSEPTINE

Antitoxine polyvalente du professeur Lemoine.

**Composition.** — Extrait éthéré de levures de saccharomycès. Possède les propriétés curatives des vaccins les plus actifs.

**Indications.** — Toutes les maladies infectieuses, principalement celles qui sont dues au streptocoque : fièvres éruptives : scarlatine, rougeole; oreillons, érysipèle, fièvre puerpérale, fièvre typhoïde, paralysie infantile aiguë, ostéomyélites, etc., etc.

**Mode d'emploi.** — Faire l'injection d'une ampoule sous la peau, chaque jour : matin et soir dans les cas graves. L'injection ne provoque ni choc ni réaction locale.

**Laboratoires de la LIPOSEPTINE**

2, place des Vosges — PARIS.



## LIPOSPLÉNINE DU D<sup>r</sup> GROG

Opothérapie splénique spécifique (Soula).

### Références scientifiques :

Communications à l'Académie de médecine :  
18 janvier 1927 ; 18 juillet 1928.

Communications à la Société de biologie :  
22 décembre 1928, 16 février 1929, 21 décembre 1929.

Communication au XX<sup>e</sup> Congrès de médecine de Montpellier, 18 octobre 1929.

Communication au II<sup>e</sup> Congrès du Paludisme (Alger, 19-21 mai 1930).

Communication à la Société de Thérapeutique (Paris, 12 novembre 1930).

Thèses : D<sup>r</sup> E. Cauquil, *Rate et Rachitisme* (1928) ; D<sup>r</sup> Fau, *Action des Extraits Lipidiques d'organes* (1928) ; D<sup>r</sup> Radji, *Contribution au traitement des Anémies avec splénomégalie* (1929).

**Composition.** — 1<sup>o</sup> Lipides insaponifiables contenus dans la pulpe splénique, dont le cholestérol, extraits par un procédé spécialement établi par le Pr L.-C. Soula ; 2<sup>o</sup> l'Insaponifiable X partiellement soluble.

**Indications.** — 1<sup>o</sup> *Médication spécifique* des :

- a. Anémies (quelles qu'en soient la cause et la nature).
- b. Amaigrissements graves et persistants
- c. Grossesses et retours de couches pénibles et difficiles.
- d. Retards de croissance, débilité infantile, tous états rachitiques, déminéralisations.

Surmenage, Convalescence, Dépression nerveuse, Neurasthénie, Faiblesse et fatigue générale, tous états de déchéance organique.

2° *Puissant modificateur du terrain dans* : Prétuberculose, Tuberculose pulmonaire, osseuse et viscérale.

**Présentations.** — 1° *Comprimés* dosés à 3 centigr. de principes actifs. Six à huit par jour, en deux fois, *au milieu* de chacun des deux principaux repas. Ne pas croquer les comprimés, les avaler avec une gorgée d'eau. Par séries de 80 (soit une boîte : 10 à 12 jours de traitement, 18 fr.) séparées par un repos de trois jours.

2° *Ampoules* de un cc. titrées à 2 centigr. de principes actifs.

Une injection *sous-cutanée, indolore*, tous les deux jours. Repos de six jours après la huitième injection ; puis reprendre et continuer le traitement selon le rythme jusqu'à la guérison ou une amélioration nettement consolidée.

(La boîte de huit ampoules : 20 fr.)

3° *Sirop*, dosé à 4 cgr. de principes actifs, par cuillerée à café. *Spécialement réservé aux enfants*. Avant un an, 2 cuillerées à café par jour dans l'intervalle des repas ; après un an, 4 cuillerées à café par jour. (Prix : 18 fr.)

**Approvisionnement  
médical et littérature :**

**40, rue d'Enghien — PARIS (Xe).**

**Tél. : Provence 37-13.**

**Vente en gros : J. OLIVE, Ph<sup>1er</sup>  
14, rue des Minimes — PARIS (III<sup>e</sup>).**

## LIQUEUR LAVILLE

**Composition.** — Quino-colocynthine et principes actifs de convallaria maialis, gentiane, scille, hermodactyle et fraxinus excelsior.

**Propriétés thérapeutiques** — Spécifique de l'accès de goutte; exerce une action sédative sur la douleur; augmente l'élimination de l'acide urique.

**Forme.** — Vin médicamenteux.

**Dose et mode d'emploi.** — Ces aigus graves: 1 cuillerée à café dans une tasse de thé 2 heures avant ou 4 heures après le repas. Recommencer quelques heures après s'il est nécessaire. En cas de douleurs modérées, 1 cuillerée à café le matin à jeun pendant 3 jours.

### PILULES LAVILLE

A base de baies d'alkékenge et de silicate de soude, les pilules Laville sont prises dans les périodes intercalaires des accès, à la dose de 6 à 10 pilules par jour.

**Laboratoires CLIN — PARIS.**

---

## LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

A base d'acide phosphorique associé à la peptone de viande et aux principes volatils de l'orange amère et de l'orange douce.

**Présentation.** — Liqueur agréable contenant par cuillerée à café 25 cgr. d'acide phosphorique anhydre. Grand flacon, demi-flacon.

**Action thérapeutique.** — Liqueur préparée spécialement pour l'application de la médication de Joulie, créatrice d'énergie et de force musculaire. Spécifique de l'asthénie nerveuse.

**Posologie.** — *Adultes*: 4 à 6 cuillerées à café par jour, aux repas. *Enfants*: demi-dose ou quart de dose suivant l'âge. Se prend diluée dans un peu d'eau sucrée.

**ADRIAN et Cie**

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III<sup>e</sup>)



## LITA

(Séro-médicament du Dr DUFOUR.)

**Composition.** — Mélange de sérum de lapin immunisé à la tuberculine (1 partie) et d'Iodaseptine (2 parties).

**Présentation.** — Se présente sous forme d'ampoules de 3 cc. qui peuvent être injectées par voie intramusculaire ou intraveineuse.

**Mode d'emploi. Doses.** — Deux injections par semaine d'une façon continue ou par séries de 20 injections. Ne pas arrêter le traitement après amélioration ; continuer jusqu'à guérison.

Les injections seront faites de préférence *intramusculaires profondes*. On peut associer l'action hémotherapique en prélevant 3 cc. de sang dans la veine du pli du coude que l'on mélange dans la seringue à 3 cc. de Lita. On injecte immédiatement le tout dans la masse musculaire.

**Indications.** — Toutes formes de Tuberculose à toutes les périodes. Pas de choc, pas d'intolérance, pas d'accidents (hémoptysies ou autres).

**Laboratoires CORTIAL**

15, boulevard Pasteur — PARIS.

---

## LOBULINE

Insuline " per os ".

**Composition.** — Extrait des îlots de Langerhans du pancréas associé à une levure glycolytique pure.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés pour administration *par voie buccale*.

**Indications.** — Diabète.

**Avantages.** — Innocuité absolue. Simplicité d'emploi. Action très persistante.

**Mode d'emploi.** — 2 à 6 comprimés par jour, suivant la glycosurie.

**Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE**

37, rue de Bourgogne — PARIS.

## LORAGA

### Traitement rationnel de la constipation.

Emulsion stable et homogène, sans goût, sans arôme artificiel, *miscible à tous liquides* (lait, eau sucrée, infusions, potages).

### Composition :

Huile de Paraffine neutre et de haute viscosité, Agar-Agar, Phénolphtaléine (45 mgr. par cuillerée à café).

Ne contient ni alcool, ni sucre, ni saccharine, ni alcalis.

### Indications :

Toutes formes de constipations, auto-intoxications ; utile aux atoniques, femmes enceintes, nourrices ; constipations post-opératoires. Absence totale d'inconvénients.

### Action Physiologique :

Lubrifie l'intestin, pénètre et ramollit le résidu alimentaire, active le péristaltisme sans provoquer l'irritation ou la constipation secondaire consécutive à l'usage des purgatifs usuels.

Ne trouble nullement les fonctions de la digestion — ne cause ni nausées, ni coliques. Absence complète de suintement. Aucune accoutumance.

### Dose et mode d'emploi :

*Adultes* : De 1 à 4 cuillerées à café, soit pur, soit dilué, le soir, au coucher ; si nécessaire, répéter la dose le lendemain matin.

*Enfants* : 1/2 à 2 cuillerées à café, suivant l'âge, pur ou dilué.

### Deux modèles :

210 cc. : 17 fr. 50 — 420 cc. : 30 francs.

Prière d'adresser toutes demandes de renseignements et d'échantillons aux :

**Laboratoires SUBSTANTIA S. A.**

**F. Guillemoteau, pharmacien**

13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

## LUCODAL

Se présente sous forme de perles, contenant chacune rigoureusement dosés à l'état le plus actif : Bromoforme, Codéine, Aconit, Belladone, Drosera.

**Propriétés thérapeutiques.** — La perle de Lucodal permet d'administrer son contenu sans aucune intolérance gastrique.

Elle s'adresse à toutes les formes spasmodiques, quinteuses, sèches de la toux. Toux émétisantes des tuberculeux, Toux des hépatiques, des diabétiques, etc. Toux post-grippales.

*Adultes* : 3 à 4 perles par 24 heures.

*Enfants* (seulement au-dessus de 5 ans) : 1 à 3 perles par 24 heures.

Prix : 10 fr. 50 l'étui (sans impôt).

Echantillons :

**Laboratoires CARESMEL**

2, quai Paul-Bert — TOURS — Tél. : 19-42.

---

## LUDIN

Traitement Arséno-Mercuriel dissimulé.

### Formes :

*Sirop. — Granules.*

### Composition :

1 cuillerée à soupe de sirop ou 3 granules contiennent 1 cgr. Hg. + 1 milligr. As.

*Sans iodure, sans alcool.*

### Doses moyennes :

#### *Sirop :*

*Adultes :* de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants :* par cuillerées à café.

#### *Granules :*

*Adultes :* 6 à 12 granules par jour.

*Enfants :* 2 à 3 granules par jour.

*Nota. —* Prendre ces doses de préférence pendant les repas.

### Propriétés thérapeutiques :

Tolérance parfaite, sécurité absolue. Beaucoup plus actif que le bismuth sans en présenter les inconvénients (stomatites, etc.). Activité égale à celle des arséno-benzols sans en avoir la toxicité.

### Indications thérapeutiques :

Enfants hérédos, Prophylaxie pendant la grossesse, Traitement d'épreuve, Syphilis larvée, Dysenterie amibienne relevant des Hématozoaires, Eczémas, Dermatoses, etc.

*Peut être prescrit aux enfants en bas âge en diluant le sirop dans eau ou sirop simple.*

Prix : Granules, 15 francs. Sirop, 16 fr. 80.

**Laboratoires REY — DIJON.**

## LUSOFORME

Formol saponiné, liquide :

**Lusoforme médical.** — Antiseptique général de 1/4 à 1 p. 100.

**Lusoforme brut.** — Désinfectant et désodorisant de 2 à 5 p. 100.

Le Lusoforme est un savon légèrement alcalin contenant 20 p. 100 de formol et fabriqué à l'autoclave.

**Indications.** — Gynécologie, Obstétrique, Hyperhydroses, Pansements d'urgence.

Prix de vente au public :

Lusoforme médical, flacons de 100, 250 et 500 gr., à 3 fr. 50, 7 fr. et 12 fr.

Lusoforme brut, bidons de 2, 5 et 10 kilos, à 10 fr., 9 fr. 50 et 9 fr. 25 le kilo.

**Laboratoires CARTERET**

15, rue d'Argenteuil — PARIS.

---

**LYSAXINS L. M. L.**

Vaccins de corps microbiens formolés et de bactéries lysées en milieu peptoné.

**Caractéristiques :**

- 1<sup>o</sup> Polyvalence considérable (souches non repiquées et sélectionnées).
- 2<sup>o</sup> Lyse partielle (présence du B. Pyocyanique et par un PH spécialement étudié).
- 3<sup>o</sup> Avantages de l'atténuation par la formaline.

**Indications :**

*Lysaxin antipyogène.* — Suppurations dues aux Pyogènes communs, furoncles, érysipèles, otites, panaris, pleurésies purulentes.

*Lysaxin abdominal.* — Suppurations digestives, appendicites, cholécystites, pyélonéphrites, salpingites.

*Lysaxin antigonococcique.* — Uréthrites anciennes, prostatites, vaginites, métrites, etc...

**Posologie.** — Première injection : 1/2 cc. et augmenter ensuite jusqu'à 2 cc., en 4 injections.

Faire au minimum 3 injections de 2 cc.

**Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE**  
37, rue de Bourgogne — PARIS.

## MAGBROMYL

Solution de Bromure de sodium cristallisé pur, renforcé par le Chlorure de Magnésium.

*Seule préparation au goût vraiment agréable masquant totalement la saveur désagréable des Bromures.*

**Avantages.** —  $MgCl^2$  augmente l'activité thérapeutique des Bromures tout en supprimant la dépression et la torpeur.

Emploi facile en médecine infantile.

**Indications.** — Toutes celles des Bromures.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 cuillerées à café par jour chacune prise dans 1/2 verre d'eau ou de lait tiède, sucré ou non.

Dose variable.

Une cuillerée à café contient : 0 gr. 50 de Bromure de Sodium et 0 gr. 30 de  $Mg Cl^2$ .

**Laboratoire DELISS**  
ANTONY (Seine).

---

## MAGIODYL

Solution d'Iodure de Sodium cristallisé pur, renforcé par le Chlorure de Magnésium.

*Seule préparation au goût vraiment agréable masquant totalement la saveur insupportable des iodures.*

**Avantages.** — Le Chlorure de Magnésium augmente l'activité thérapeutique des iodures, supprime les accidents d'iodisme. Emploi facile en médecine infantile et chez les personnes délicates.

**Indications.** — Toutes celles des iodures.

**Mode d'emploi.** — 2 à 6 cuillerées à café par 24 heures, chacune prise dans 1/2 verre d'eau ou de lait tiède, sucrés ou non.

Dose variable.

Une cuillerée à café contient : 0 gr. 25 d'iodure de sodium et 0 gr. 20 de  $Mg Cl^2$ .

**Laboratoire DELISS**  
ANTONY (Seine).

## MAGNECYTHINE

Agent spécial de la minéralisation cellulaire.

Le rapport du magnésium au calcium est particulièrement intéressant. Calcium minéral = charpente, et magnésium minéral = activité en entretien.

Quand le magnésium s'use et disparaît, la cellule vieillit. Et quand l'âge ou la fatigue arrivent, le magnésium et ses dérivés disparaissent. Il y a rapport de cause à effet dont on constate les résultats. La déficience magnésienne est souvent cause chez les affaiblis de l'inaction des toxiques normaux : fer, manganèse, arsenic, etc...

La diminution progressive de la vitalité cellulaire en fonction du retrait magnésien, est acquise scientifiquement. La cellule morte cause la déchéance générale ou locale quel que soit le nom qu'on lui donne. Et on constate que le taux magnésien est excessivement bas. Les chlorures seuls ne sont pas supportés sans inconvénients. Le *Magnécythine* à ce point de vue n'est comparable à aucun autre produit.

### Mode d'emploi et dose.

*Comprimés* : de 1 à 6 par jour, généralement, 2 dans un petit verre d'eau avant ou après les repas.

*Granulés* : 1, 2, ou 3 cuillerées par jour, croqués dissous dans de l'eau, thé, tisane ou lait.

**Laboratoire du Docteur TISSOT**

24, boulevard de Clichy — PARIS.

## MAGNÉSIE BISMURÉE

(Contre l'acidité stomacale).

**Indications de la magnésie bismurée.** — La magnésie bismurée donne d'excellents résultats dans la plupart des troubles digestifs. Elle peut être considérée comme le médicament-type de la douleur et de l'hyperacidité stomacale.

Elle sera donc particulièrement recommandée dans les affections suivantes :

**DYSPEPSIE, GASTRITE AIGUE ET CHRONIQUE, GASTRITE ETHYLIQUE, DOULEURS ET SPASMES GASTRIQUES, HYPERCHLORHYDRIE, HYPERSECRETION, ULCERES DE L'ESTOMAC.**

**Forme.** — Poudre, comprimés, cachets.

**Posologie.** — Une demi-cuillerée à café de poudre dans un peu d'eau chaude ou 3 à 4 comprimés ou 1 cachet, à prendre au moment des malaises ou des douleurs, mais en général il est préférable de la prendre immédiatement après les repas.

Littérature, Echantillons :

**SCOTT et fils, Pharmaciens**

348, rue Saint-Honoré — PARIS (1<sup>er</sup>).



## MAGNÉSIE LOURDE DE DUREL

Magnésie anglaise calcinée.

Cette Magnésie présente les avantages suivants :  
Elle ne possède aucun goût et se mêle facilement à tous les liquides.

Elle est éminemment active et ne provoque jamais de coliques.

Elle agit, suivant la dose, comme un simple laxatif ou comme un purgatif énergique.

Elle ne provoque pas l'accoutumance ni la paresse consécutive intestinale, de sorte qu'elle peut être employée indéfiniment.

Cette qualité la rend précieuse dans toutes les affections hépatiques où son emploi journalier permet l'élimination régulière de la bile.

**Posologie.** — Une cuillerée à café le soir.

Le flacon : 9 francs.

**Laboratoire DUREL**

7, boulevard Denain — PARIS.

## MAGNÉSIUM HARDY

Ses deux formes : { **TABLETTE - BOUILLON**  
**SIROP**

pratiques, économiques, répondent à tous les goûts.

**LE SEUL CHLORURE DE MAGNÉSIUM  
VRAIMENT AGRÉABLE**

Une **TABLETTE-BOUILLON** } contiennent  
ou } 1 gr. 20 Mg Cl<sup>2</sup>  
une cuillerée à soupe de **SIROP** } pur, sec.

Dose journalière recommandée par M. le Professeur Delbet.

**SOUTIEN ET PROLONGATION DES CANCÉ-  
REUX INOPÉRABLES.**

**DÉFENSE DES CANCÉREUX OPÉRÉS.**

**ASTHÉNIE NERVEUSE.**

**RÉGULATEUR HÉPATIQUE.**

**DERMATOSES, PRURITS, VERRUES.**

**VIEILLESSE PRÉMATURÉE, PROSTATISME.**

**Laboratoires Paul HARDY**

42, boulevard Saint-Marcel — PARIS (V<sup>e</sup>).

## MAGNESO-TUBES ROBINET

Chlorure de magnésium associé à des acides phosphoriques organiques : glycérophosphates et anhydrooxyméthylène diphosphates de chaux et de magnésie.

**Présentation.** — 30 tubes d'une poudre où se trouve masqué le goût si désagréable du chlor. de magnésium.

**Emploi.** — Un tube deux fois par jour (aux repas), mélangé au café, au lait, au potage, à la boisson, aux purées, etc...

**Posologie.** — 15 jours tous les deux mois comme reminéralisant, reconstituant, préventif du cancer, etc... Presque sans arrêt, dans les cas de lésions précancéreuses, tumeurs déclarées, et après une intervention chirurgicale.

**Indications.** — Amélioration des troubles du système nerveux végétatif : nerfs sympathiques. — Régulateur du tonus vago-sympathique et du fonctionnement défectueux des glandes endocrines. — Troubles ovariens de la puberté et de la ménopause (Syndromes pluriglandulaires). — Séquelles post-opératoires. — Asthénie. — Fatigue générale. — Rhumatismes, constipations, prostatites, cholécystites, etc... — Affections de la peau : acné, psoriasis eczéma. — Lutte contre les tumeurs en général. — Prophylaxie du cancer. — Donne une sensation de grand bien-être.

**Laboratoires ROBINET**

MORET-SUR-LOING (S.-et-M.).

« **TERRAINS MAGNÉSIENS ET CANCER** », par L. Robinet. (Présenté à l'Académie de Médecine par M. le Professeur P. Delbét (avril 1930) et conférence à l'Association française pour l'étude du Cancer (avril 1930).

# MAGNÉTONE-SÉLAMON

**MAGNÉTONE** Cholagogue léger.

**Composition.** — Sulfate de magnésie anhydre. Extrait biliaire. Peptone.

**Présentation.** — Comprimés glutinisés.

**Dose et mode d'emploi.** — 2 à 3 comprimés le matin à jeun. Boire aussitôt une tasse d'un liquide chaud (tisane, eau sucrée).

Agit comme cholagogue léger en provoquant le drainage de la vésicule.

Aide puissamment à l'action de l'Entéroxin avant lequel on doit le prendre à un quart d'heure de distance.

## SELAMON

Chlorure d'ammonium pur en comprimés à 50 centigr., 3 à 6 comprimés par jour aux repas.

Modificateur de la réaction des urines.

Aide puissamment à l'action de l'Entéroxin dans les coli-bacilluries.

Prix : 15 francs chacun.

**Etablissements T. LECLERC**

D<sup>r</sup> P. Lemeland, pharmacien.

10, rue Vignon — PARIS (IX<sup>e</sup>).

# MAGOL CHURCHILL

(Hypophosphite de manganèse : 0 gr. 20 par dose.)  
Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable.

Préparation assimilable de *phosphore* et de *manganèse*.  
Métal-Ferment grand Catalyseur, Agent et Cause de toutes les oxydations qui régissent le Substratum vital.  
Remplace avantageusement le Fer.

**Indications.** — Anémie, troubles de l'ovulation, croissance difficile, insuffisances hépatique et mitrale, diabète, chlorose.

**Sirop.** — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

**Comprimés.** — 2 comprimés absorbés, mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.

**Ampoules.** — 1 injection intra-musculaire chaque deux jours.

**Sirop.** — A partir de 7 ans, par cuillerée à dessert. Au dessous de cet âge par cuillerée à café.

**Comprimés.** — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

**Ampoules.** — Suivant indications du médecin traitant.

3 formes : sirop, comprimés, ampoules. — Prix : 15 francs.

**Laboratoire CHURCHILL**

12, rue Castiglione — PARIS (1<sup>er</sup>).

## MAGSALYL Mg.

Solution de Salicylate de soude cristallisé pur, renforcé par le salicylate de magnésie et le chlorure de magnésium cristallisé pur.

*Seule préparation au goût vraiment agréable masquant totalement la saveur insupportable du salicylate de soude.*

Possibilité de traitement prolongé. Activité intense.

**Indications.** — Toutes celles du Salicylate de Soude.

**Mode d'emploi.** — De 2 à 20 cuillerées à café en 24 heures par dose de 1 à 2 cuillerées prises dans 1/2 verre d'eau, d'eau de Vichy ou de lait tiède, sucré ou non.

Une cuillerée à café contient : 0 gr. 50 de *Salicylate de soude cristallisé*, 0 gr. 05 de salicylate de magnésie et 0 gr. 05 de  $Mg\ Cl^2$ .

**Laboratoire DELISS**

ANTONY (Seine).

## MALARSAN

Sel de quinine de l'acide acétyl-amino-oxyphényl-arsinique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Traitement par voie buccale : du **Paludisme** (*Plasmodium vivax* et *Plasmodium malarie*) et des **Parasitoses intestinales** à protozoaires (diarrhées rebelles à amibes, spirilles ou lamblas).

**Présentation.** — Tube de 30 pilules vernies et inaltérables à 0 gr. 20 de sel actif.

**Posologie.** — 3 pilules par jour, pendant 10 jours. Activité remarquable, tolérance parfaite. Action sur l'état général.

Prix au public : 16 francs.

**Laboratoires P. AUBRY**

54, rue de la Bienfaisance — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

Tél. : Laborde 15-26.

Belgique : Agent général, Ch. SCHOEFFER

34, rue du Canada — BRUXELLES.

## MALTEA MOSER CRISTALLISÉE

Extrait de Malt sec, absolument pur.

Aliment-ferment vitaminé, pour tous les âges.

**Indications.** — Alimentation rationnelle (suralimentation et adjuvant des régimes). Saveur agréable.

Régulateur des fonctions digestives (entérites, entérococolites infantiles et des adultes).

Galactagogue efficace.

Préparation rapide des bouillies maltosées pour alimentation infantile.

Reconstituant général anticonstipant.

**Mode d'emploi.** — Se prend pure ou mélangée à toute boisson.

*Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants* : 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix : 14 francs le flacon (usage 15 jours).

**MOSER et C<sup>ie</sup>**

8, chemin de Montbrillant — LYON (Monplaisir).

## MALT FRANÇAIS DEJARDIN

(Extrait de)

Bière de santé extrêmement concentrée additionnée de glycérophosphates.

**Indications.** — Les nourrices défaillantes, les dyspeptiques, les anémiques et les chlorotiques.

Aliment des faibles, des délicats, des épuisés.

Remède des arthritiques, scrofuleux et lymphatiques.

**Posologie.** — *Pour les adultes* : Pur, un verre à bordeaux un quart d'heure avant les repas et mélangé comme boisson, en mangeant, dans la proportion de 1 pour 3, à une eau naturelle très légèrement alcaline.

*Pour les enfants* : Le quart ou la moitié de ces doses.

Prix : 3 fr. 30 verre compris.

**Etablissements DÉJARDIN**

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## MALTOSAN

Soupe maltée en poudre.

**Composition.** — Maltose, 30 p. 100. Dextrines, 25 p. 100. Céréales, 40 p. 100. Sels minéraux, 2 p. 100. H<sup>2</sup>O, 3 p. 100. Diastases.

**Indications.** — Affections gastro-intestinales de la première et seconde enfance : diarrhée estivale, dyspepsies diverses, etc. Réussit dans les cas les plus rebelles. Rend aisé le sevrage et en évite les périls.

**Doses.** — 2 cuillerées à café par repas de 100 gr. (lait et eau). Augmenter de 1 cuillerée nouvelle par 50 gr. de liquide supplémentaire.

Cuire rapidement sans cesser de remuer.

Retirer du feu avant le premier bouillon.

La boîte : 9 fr. 50.

### Établissements WANDER

151 bis, route de Joinville — CHAMPIGNY (Seine).

---

## MALT PAILLETÉ

**Composition.** — Extrait de malt cristallin garanti pur. Reconstituant diastasique vitaminé.

Préparé par évaporation dans le vide des liqueurs extractives du malt. Renferme la totalité de la diastase, du malt du maltose des phosphates naturels, de la lécithine des peptones et des vitamines.

**Propriétés.** — Aliment très concentré de digestibilité parfaite.

**Indications.** — Convalescents Anémiés, Surmenés, Opérés, Dyspeptiques, Cardio-Rénaux, Hépatiques.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour, soit tel quel, soit dans de l'eau ou dans une infusion.

*Enfants* : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, à faire prendre de la même façon.

Prix : 16 francs la boîte de 300 grammes environ.

### Laboratoires PROGIL

6, boulevard de Strasbourg — PARIS (X<sup>e</sup>).



## MALT WANDER ou GLOMA

### GLOMA PUR

(*Extrait de malt sec.*)

**Composition.** — Matières azotées 5,87 p. 100  
Hydrates de Carbone (maltose et dextrine), 89,17 p. 100 ; Substances minérales, 1,56 p. 100 ; Eau, 3,40 p. 100 ; Acide phosphorique en pour cent des substances minérales, 9 p. 100.

**Forme.** — Paillettes.

**Indications.** — Aliment végétal nutritif et digestif. Asthénie générale, Convalescence, Dyspepsie, Entérocolite chronique par insuffisance amyloïdique. Scorbut et maladies par avitaminose. Permet la préparation des bouillies maltées.

Le grand flacon : 15 fr. Le flacon : 10 fr.

### IODO-GLOMA

(*Gloma à l'iodure de fer.*)

**Composition.** — 1 cuillerée à soupe = 0 gr. 12 de proto-iodure de fer.

**Indications.** — Répond aux indications du fer et de l'iodure. Chez les lymphatiques, les chloro-anémiques, les adénoïdiens dans le traitement interne des dermatoses remplace avec avantage et agréablement l'huile de foie de morue. L'extrait de malt évite les inconvénients de la médication ferrugineuse et de l'iodisme.

Le flacon : 10 francs.

### GAYA-GLOMA

(*Gloma au carbonate de gaïacol.*)

**Composition.** — 1 cuillerée à soupe = 0 gr. 35 de Carbonate de gaïacol.

**Indications.** — Médication de bronchites et pneumopathies diverses, en particulier de la tuberculose. Répond aux nombreuses



indications de la créosote, sans en avoir ni sur les voies digestives, ni sur la circulation pulmonaire, les inconvénients redoutés.

Le grand flacon : 15 francs.

### **GLYCERO-GLOMA**

(*Gloma aux glycérophosphates.*)

**Composition.** — 1 cuillerée = 0 gr. 40 de Glycérophosphates combinés de chaux, de soude, de fer, de magnésie.

**Indications.** — Convalescence des maladies aiguës (grippes, bronchites, typhoïdes, etc.). Surmenage, déminéralisation, anémie, tuberculose. L'extrait de malt facilite la digestion et favorise l'assimilation des médicaments qui lui sont, ici, associés.

Le flacon : 10 francs.

### **CALCIO-GLOMA**

(*Gloma au Phosphate de chaux.*)

**Composition.** — 1 cuillerée à soupe = 0 gr. 15 de chlorhydrophosphate de chaux.

**Indications.** — Contribue par son phosphore à la nutrition du système nerveux, par sa chaux à celle des tissus osseux (rachitisme, scrofule, etc.). Permet la cure de récalcification dans la tuberculose. Utile aux femmes enceintes et à celles qui allaitent.

**Doses.** — *Enfants* : 1-3 cuill. à café 3-4 fois par jour. *Adultes* : 1-3 cuill. à soupe 3-4 fois par jour.

Au début des repas pur ou dissous dans de l'eau ou du lait.

Le flacon : 10 francs.

**Établissements WANDER**

151 bis, route de Joinville  
CHAMPIGNY (Seine).

## MANGAÏNE

Polyoxyde de Manganèse  
chimiquement pur.

### Forme et Dose :

Tablettes 0,10 de Polyoxyde de Manganèse.

### Propriétés thérapeutiques :

Elles constituent la préparation la plus rationnelle pour l'assimilation rapide et efficace des sels de manganèse.

### Indications thérapeutiques :

Dyspepsies gastro-intestinales, Anémies.

### Dose :

4 à 6 tablettes par jour.

Prix : 12 francs.

### Pharmacie SCHMIT

71, rue Sainte-Anne — PARIS.

---

## MANGANEOL

**Propriétés thérapeutiques.** — Action synergique de l'acide nucléinique et du manganèse, fluorure, glycéro.

Reconstituant puissant recommandé dans tous les cas.

**Indications thérapeutiques.** — Anémie, fatigue, surmenage, débilité, convalescence, croissance.

**Formes.** — Elixir et granulé.

**Posologie.** — *Adultes* : Une cuillerée à bouche 3 fois par jour.

*Enfants* : Une demi-cuillerée à bouche.

Prix : 15 francs.

### USINES DU BLOSSET

MOULINS-SUR-YEVRE (Cher).

## MANGANESIA

Solution permanganique arsenicale

### Traitement du Diabète.

**Propriétés thérapeutiques.** — Le Manganésia diminue la soif, diminue la quantité des urines et celle du sucre qu'elles contiennent, favorise les échanges nutritifs, tonifie le système nerveux, rétablit les fonctions de la peau et rend au sang son alcalinité normale.

**Dose et mode d'emploi.** — XX gouttes au commencement de chaque repas dans du vin.

Continuer pendant trois semaines, se reposer une semaine, puis reprendre.

En cas d'intolérance, commencer par X gouttes par repas, puis augmenter progressivement.

On doit compter dans le diabète moyen sur un traitement d'environ 3 mois.

Les diabétiques qui font usage du Manganésia peuvent s'alimenter comme en état de santé.

**Laboratoires des Produits DANNEC'H**

**BRUN et MARTINEAU**

64, rue des Tournelles — PARIS (III<sup>e</sup>).

R. C. Seine 218.670.

---

**MANGANO PHOSPHAL****Julien****(GOUTTES)****Sans aucun toxique.****Composition :****XX gouttes contiennent :**

Acide phosphorique offic. pur . 0 gr. 50

Magnésium et polyglycéroph .... 0 gr. 45

Sels de manganèse ..... 0 gr. 10

En solution sans alcool et sans sucre.

**Propriétés et Indications :**

**Puissant reconstituant.** Sans aucun toxique, convenant à tous.

**Médication mangano-phosphorée intensive.**

*Enfants.* — Manque d'appétit, Retards de la dentition et de la marche, Rachitisme, Insuffisance du poids et de la taille, Troubles de la nutrition.

*Adultes.* — Anémie, Faiblesse, Neurasthénie, Surmenage intellectuel et physique, Convalescences, Carie dentaire, Phosphaturie, Grossesse, Allaitement.

*Vieillards.* — Dépression, Faiblesse, Troubles nerveux, Fatigue avec hypertension.

**Posologie :**

*Enfants :* II gouttes par jour, par année d'âge dans un peu d'eau sucrée.

*Adultes :* XX gouttes à chacun des repas de midi et du soir dans 1/3 de verre de liquide.

Aucune contre-indication.

**Prix : 15 francs. — Flacon gratuit sur demande.**

**Louis JULIEN**

Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris  
105, rue de Rennes (angle de la rue d'Assas)  
PARIS (VI°).

## MANGARSENIC

Composé organique d'Arsenic et de Manganèse,  
Activité intense, Toxicité nulle.

**Propriétés thérapeutiques.** — Possède les propriétés classiques de l'ion As, complétées et exaltées par le catalyseur de choix qu'est l'ion Mn. Agit comme un catalyseur intense des réactions d'oxydation.

**Indications.** — Tous les états de dénutrition, Tuberculose à tous les degrés, Anorexies, Amaigrissements, Athrepsies, Hypotrophies, Diabète.

**Posologie.** — Deux comprimés midi et soir au début des repas (4 par jour).

*Enfants* : 1 comprimé midi et soir.

**Echantillons :**

**Docteur LAVOUÉ — RENNES.**

---

## MANGRATINES

**Composition.** — Nucléinate de manganèse, Extrait splénique, Sérum de cheval.

**Propriété.** — Tonique. Cytoplasmique par excellence.

**Indications.** — Toutes dépressions, anémie, chlorose, troubles de la puberté et de la ménopause. Convalescences, rachitisme, paludisme.

**Doses.** — 2 à 4 dragées par jour 1/4 d'heure avant les repas.

Prix : 16 francs l'étui de 40 dragées.

**Laboratoire E. VERGELOT**

163, rue de Flandre — PARIS (XIX<sup>e</sup>).

## MARCYNASE

**Dépuratif. Reconstituant.**

Deux organes semblent, dans tout processus infectieux, devoir retenir plus particulièrement l'attention du praticien :

- 1° Le *Foie* par son action antitoxique, sa fonction biliaire et l'influence heureuse qu'elle exerce sur la digestion et la nutrition ;
- 2° Le *Rein* qui, en sa qualité de filtre, doit pouvoir assurer une élimination totale, rapide et facile des déchets du sang.

**Composition.** — Répondant à ce double but, la Marcynase est composée, d'une part : d'extraits scientifiquement dosés et contrôlés de bardane stabilisée, de cinq racines, de cascara sagrada, de boldo, de salsepareille, de *bile* et de *foie*, et d'autre part : de soufre.

**Indications.** — Etats infectieux et post-infectieux, grippe, staphylococcies, auto-intoxications et tous troubles du tube digestif et annexes, dermatoses, rhumatismes, états pléthoriques, artério-sclérose, affections des voies respiratoires, etc.

**Mode d'emploi.** — 1° *Adultes.* a. *Dose moyenne* : 6 à 10 dragées par jour, avant ou après les repas.

b. *Dose forte* : 8 à 12 dragées et plus par jour, selon l'avis du médecin, avant ou après les repas.

2° *Enfants.* Avant 3 ans : consulter le médecin. De 3 à 16 ans : de 1 à 5 dragées ou plus par jour, selon l'âge et l'avis du médecin.

**Nota.** — Avaler les dragées sans les croquer.

Dépôt général : **RAVIN, Pharmacien,**  
7, rue Princesse — PARIS (VI<sup>e</sup>) (France).

## MARIMINE

**Le Médicament des Enfants.**

**Forme.** — Granulé irradié, à base de Vitamine D et de Parathyroïde.

**Indications.** — Insuffisances pluriglandulaires, affections ganglionnaires et osseuses. Rachitisme, Déformations osseuses. *Adénopathies trachéo-bronchiques*, anémies diverses de l'enfance. *Anorexie* de l'enfance et du nourrisson.

**Formule.** — Hémoglobine, glycérophosphate de chaux, magnésie, fer. Nucléinate de manganèse, parathyroïdes et Ergostérine irradiée.

**Doses.** — *Enfants* au-dessous de 3 ans : 1 cuillerée à café rase aux repas ou dans un des biberons.

*Enfants* au dessus de 3 ans : 1 cuillerée à café aux deux repas.

La **Marimine** se prend dissoute dans l'eau ou croquée.

Prix : 22 francs la boîte de 125 grammes.

Littérature et échantillons :

**Laboratoires HOCQUETTE**

191, faubourg Saint-Antoine — PARIS.

## MARINOL

Reconstituant marin physiologique.  
Inaltérable. De goût agréable.

**Composition.** — Eau de mer captée au large. Iodalgol (iode organique). Phosphates calciques en solution organique. Algues marines iodifères. Méthylarsinate disodique.

**Particularités.** — Seul succédané naturel de l'huile de foie de morue. Permet seul l'administration de l'iode organique marin dans son véhicule normal, l'eau de mer. Tolérance absolue.

**Indications.** — Lymphatisme. Anorexie. Tuberculose. Anémie. Convalescences.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 à 3 cuillerées à soupe.  
*Enfants* : 2 à 3 cuillerées à dessert. — *Nourrissons* : 1 à 3 cuillerées à café.

Avant ou après les repas. Pur ou dilué.  
Littérature et échantillons

**Laboratoires LA BIOMARINE**  
DIEPPE (Seine-Inférieure).

---

## MARRUBENE

Principes actifs végétaux du Marrube et de l'Aunée en association synergique avec la Terpène et le Benzoate de soude.

**Propriétés.** — Possède la triple action : *Fluidifiante, Expectorante, Aseptisante*, sur les produits d'expectoration. Facilite l'expectoration, calme la toux.

**Indications.** — Rhumes, Bronchites, Catarrhe des bronches, suites de Grippe, Dilatation des bronches, Tuberculose.

**Mode d'emploi.** — Prendre chaque jour en moyenne 4 cachets, ou 6 dragées, ou 4 cuillerées à café.

**Laboratoires de la LIPOSEPTINE**  
2, place des Vosges — PARIS.

## MARRUBIASE

Extrait de plantes « incisives » et surtout de Marrube blanc.

**Formes.** — Dragées et sirop.

**Propriétés.** — Diarrhée rapidement jugulée sans constipation. Suppression presque immédiate du sang et des glaires. Retour à bref délai de la selle moulée quotidienne. Aucune toxicité. Pas de contre-indication.

**Indications et Posologie.** — *Diarrhée infantile* (nourrissons) : 1 cuillerée à café toutes les 2 heures (pure ou dans un peu d'eau sucrée).

*Intoxications, Dysenteries* (selles nombreuses) : 2 cuillerées à soupe ou 4 dragées toutes les 2 heures. Réduire dès résultat obtenu.

*Entérite chronique* : Progressivement 2 à 5 cuillerées ou 4 à 10 dragées par jour avant les repas et au coucher.

Prix : 14 francs.

**COMTE, Pharmacien,**

60-62, rue Saint-Guilhem — MONTPELLIER.

## MARUBOR

Sirop à base d'extrait hydro-alcoolique total de Marrube blanc.

**Propriétés.** — Modificateur des sécrétions bronchiques, expectorant énergique, antithermique.

**Indications.** — Bronchites chroniques, toux rebelles, catarrhe, asthme, tuberculose.

Aucune contre-indication.

Antithermique de choix chez les bacillaires.

**Posologie.** — Agréable malgré sa haute teneur en principes amers de Marrube blanc, ce sirop se prescrit à la dose moyenne de 4 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 14 francs net d'impôt.

Littérature et échantillon sur demande aux :

**Laboratoires du Marubor**

1, rue d'Arras — BETHUNE (Pas-de-Calais).



## MATÉ DOUGLAS

au Maté du Paraguay

**Indications.** — Nutritif, fortifiant, stimulant. Développe les facultés intellectuelles. Tonifie le système nerveux. Détermine une sensation de bien-être et de vigueur sans amener de dépression, ni d'inconvénient quelconque après son emploi.

**Composition.** — Vin : Muscat de Samos et Maté. Prix : 20 fr.

Elixir : Crème de Cacao et Maté. Prix : 18 fr.

Granulé : Maté glycérophosphaté composé. Prix : 12 fr.

Littérature et échantillons au Dépôt Général :

### PHARMACIE ANGLAISE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

62, avenue des Champs-Élysées Paris (VIII<sup>e</sup>).

Téléph. : Élysées 22-52.

---

## MÉNATOL

**Forme.** — Dragées.

**Composition.** — Poudre d'ovaires, Marron d'Inde, Genêt, Rhamnus, Viburnum, Capsicum, Hydrastis, Hamamélis.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Vaso-constricteur utérin. Sédatif et hémostatique, Tonique et décongestif du réseau veineux.

**Indications.** — Troubles de la ménopause. — Règles douloureuses. — Régulateur des fonctions utéro-ovariennes.

**Mode d'emploi.** — Deux à six dragées par jour, au début des repas.

L'étui : 15 fr. (en France).

**Laboratoires A. BAILLY et C<sup>ie</sup>**  
15 et 17, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## MÉNOSÉDINE

Extraits végétaux associés à calmants minéraux et substance protéidique tirée de l'ovaire. Sans toxicité.

**Indications.** — 1° Sédatif utérin. Calme les phénomènes douloureux et malaises qui accompagnent et précèdent les règles.

2° Aménorrhée, flux menstruel trop peu abondant, règles espacées.

**Deux formes : Comprimés. Liquide.**

**Comprimés.** — 3 comprimés dès le début des malaises occasionnés par la menstruation avec une infusion chaude ou dans un peu de confiture. — 3 comprimés une demi-heure après, si besoin est.

**Liquide.** — Une cuillerée à bouche, une deuxième une demi-heure après, si la première n'a pas suffi (de préférence dans une infusion chaude).

Prix : 10 francs.

**LABORATOIRES DEMASLES**

à VIENNE (Isère).

---

## MENOVARINE

Principes extractifs végétaux sélectionnés, renforcés par un catalyseur : le Manganèse.

**Deux indications :**

Maladies veineuses ; troubles congestifs de la fonction ovarienne.

**Posologie.**

Deux dragées à chaque principal repas.

Prix au public : 14 fr. 85 pour dix jours de traitement.

**Laboratoires MONDOLAN**

41, rue Étienne-Marcel — PARIS (1<sup>er</sup>).

## MENSUOSÉDYL

(Cachets)

Sédatif spécifique des douleurs périodiques.

### Composition :

Intrails de valériane et d'anémone stabilisés, Pyramidon, Théobromine, Guarana. (Procédé spécial de conservation.)

### Avantages :

La tolérance du *pyramidon* analgésique est parfaite en présence de *théobromine*, qui, de plus, décongestionne le rein, toujours hyperémié pendant les règles.

L'action antispasmodique et sédative des *intrails* est immédiate.

Le *guarana*, caféique végétal, évite toute dépression. La fonction ovarienne n'est pas influencée.

### Indications :

Malaises menstruels et douleurs des suites de couches. Troubles nerveux de la vie génitale. Adjuvant à tout traitement de la dysménorrhée.

### Posologie :

1 cachet dès l'apparition des douleurs.  
3 cachets par 24 heures. (Aucune contre-indication).

**PAUL AUGIER, Pharmacien**

Ex-Interne des hôpitaux de Paris

2-4, rue des Lombards — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## MESOFORME

### BACTÉRICIDE PUISSANT

Désodorisant — Antiseptique — Désinfectant.  
Non caustique, non irritant, non toxique.  
(Ne tache pas le linge.)

**Composition.** — Solution saponifiée de thymol et de paraldéhyde, avec adjonction de sels alcalins supprimant toute causticité.

**Indications.** — *Gynécologie* : Hygiène de la femme. Leucorrhée, Métrite, Salpingite, *Accouchements*. — *Laryngologie* : Angines, Amygdalites, Abscès. — *Stomatologie* : Gingivites, Carie.

**Mode d'emploi.** — *Action prophylactique* : 1 cuillerée à dessert pour 2 litres d'eau bouillie, chaude. — *Accouchements et Gynécologie* : 1 ou 2 cuillerées à dessert pour 2 litres d'eau bouillie chaude. — *Laryngologie* : 2 cuillerées à dessert pour 1 litre d'eau bouillie chaude. — *Stomatologie* : XXX gouttes dans 1 verre d'eau.  
Littérature et échantillon gratuit à MM. les Docteurs pour leurs essais cliniques.

Prix : 12 francs.

**Laboratoires DORANTOWICZ**  
17 bis, avenue Parmentier — PARIS

## MESOGASTRINE

Μησος (milieu). γαστρικ (estomac).

Normalement, le chyme possède au moment de passer dans l'intestin une concentration moléculaire constante répondant au degré cryoscopique  $\Delta = 0,38$ .

**La MESOGASTRINE** en solution (1 cuill. à café de poudre dans une tasse à thé d'eau ou d'infusion non sucrée) possède ce même degré cryoscopique. Elle servira à diluer le contenu gastrique pour ramener à « un juste milieu » ses écarts de concentration moléculaire ; assurer l'évacuation normale et supprimer toute douleur liée à un trouble de cette évacuation.

**Action.** — Physique, sur la fonction musculaire.

Ne trouble en rien le chimisme gastrique.

(Evite les gastrites médicamenteuses secondaires.)

**Indication.** — Véritable traitement « omnibus » pour tous syndromes douloureux gastriques, qu'ils soient liés à un fonctionnement hyper ou hypo de l'estomac.

**Composition.** — Poudre composée soluble (Phosphate de soude + Citrate de soude + Lactose).

**Mode d'emploi.** — 1 cuill. à café dans une tasse à thé d'eau ou d'infusion non sucrée (1 tasse à thé = 120 cc. ou 8 cuill. à soupe d'eau).

Bien respecter ces proportions pour obtenir une solution à degré cryoscopique  $\Delta = 0,38$ .

**Laboratoires du Dr BAREY**  
37, avenue J.-Coutant — IVRY-SUR-SEINE.

# MÉSOTHORIUM BUISSON

Solution de bromure de mésothorium pour injections intramusculaires, intraveineuses ou intratumorales.

1<sup>o</sup> Solution faible (concentration A): dosée à 1/4 de micr. par cc. Injecter de 1 à 3 cc. par jour, pendant une ou deux semaines. Observer des intervalles de repos d'environ une semaine entre chaque série.

**Indications.** — Artério-sclérose, états asthéniques et anémiques, pré tuberculose.

2<sup>o</sup> Solution moyenne (concentration B): dosée à un micr. par cc.

**Indications.** — Rhumatisme chronique, rhumatisme blennorragique, anémie. Séries de 12 piqûres, au rythme d'une piqûre tous les jours ou tous les deux jours, intervalles de repos d'une semaine entre deux séries. Dans l'adénite tuberculeuse, une à deux injections intratumorales par semaine.

3<sup>o</sup> Solution forte (concentration C): dosée à 2 micr. par cc.

**Indications.** — Rhumatisme chronique, rebelle et déformant, rhumatisme infectieux, sciatique, névrites, leucémie, cancers inopérables, tumeurs de la prostate et de la vessie. Séries de 12 piqûres, au rythme d'une piqûre tous les jours ou tous les deux jours, intervalles de repos d'une semaine entre deux séries.

4<sup>o</sup> Solution forte spéciale (concentration D): 2 micr. par cc. en ampoules de 5 cc.

**Indications.** — Tumeurs malignes, cancers de la vessie. — Plus spécialement réservée aux instillations vésicales.

		Prix vente au public	Prix médical
Concentration A.	Boîte de 6 amp. 1 cc.	16,50	11,15
—	B. Boîte de 3 amp. 1 cc.	22 »	14,85
—	C. Boîte de 6 amp. 1 cc.	55 »	37,15
—	D. Boîte de 2 amp. 5 cc.	82,50	55,70

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**

**THERAPLIX**

*Pierre BRETEAU, Pharmacien*  
Membre de l'Académie de Médecine  
157, rue de Sèvres — PARIS (XV°).

## MÉTACUPROL

Puissant antiseptique gynécologique et dermatologique. Ni caustique, ni irritant. Peut s'employer sans eau bouillie.

**Propriétés.** — Efficacité certaine dans toutes Streptococcies et Staphylococcies.

**Indications.** — *Gynécologie* : Leucorrhées, Métrites, Démangeaisons, Hygiène intime.

*Dermatologie* : Furonculose, Impétigo, Eczémas, Brûlures, Affections suintantes.

**Forme.** — Comprimés effervescents de 1 gramme.

**Posologie.** — *Gynécologie* : 1 à 2 comprimés par litre d'eau. Position couchée.

*Dermatologie* : 1 comprimé par litre d'eau.

Prix de vente au public : 10 francs.

**Laboratoire du MÉTACUPROL**

5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Téléph. : Auteuil 35-25.

## MÉTA-TITANE

Pomme introduisant le titane en thérapeutique.

**Indications.** — *Prurits, Erythèmes* : Eczémas, Intertrigo, Brûlures du 1<sup>er</sup> degré, Coups de soleil, Engelures, Piqûres d'insectes, Erythèmes des nourrissons, Croûtes de lait, Gerçures des seins, etc.

**Propriétés et Avantages.** — Donne des résultats encore jamais atteints jusqu'ici par aucun autre topique (Cf. Thèse Delahaye, Prof. Nicolas, Tourneux, Juster etc.).

Aucune toxicité. — Antiseptique, Epidermisant, Antiprurigineux à action durable. *Absolument aucun similaire.*

**Remarque.** — Les sels de titane utilisés ne se trouvent pas dans le commerce. D'ailleurs, ils sont obtenus par un procédé tout particulier qui n'est pas encore publié. Ils sont *rigoureusement purs.*

**Présentation :**

Pot : 20 fr. — tube : 15 fr. — tube d'essai : 7 fr.

**Laboratoires METADIER  
TOURS.**

## MÉTA-VACCIN

Vaccin en pommade aux antiviruses de Besredka.

**Indications.** — Toutes les suppurations : Plaies, Furoncles, Anthrax, Impétigo, Abscès, Panaris, Pyodermites, Sycosis, Ulcères, Ecorchures, Brûlures, Orgelets, Blépharites, tous pansements après accouchement.

**Avantages.** — 1° Activité due à l'origine des souches, directement extraites de malades et jamais repiquées ; 2° Polyvalence extrême ; 3° Essai avant mise en vente, d'où garantie d'activité ; 4° Absorption parfaite ; 5° Commodité ; 6° Aucune réaction ; 7° Innocuité absolue.

### Emploi :

1. *Immunisation locale* : Bien faire pénétrer par un léger massage, si possible ; sinon, mettre sur gaze, et faire pansement habituel. Renouveler deux ou trois par jour.
2. *Immunisation générale* : Dans les cas de furonculose générale ou de phlegmons avec lymphangite, il est recommandé de faire faire des frictions aux plis des aines et aux aisselles, et même d'introduire du Meta-Vaccin dans le rectum.

**Présentation.** — En tubes grand modèle : 18 fr., et en tubes d'essai : 7 fr.

**Laboratoires MÉTADIER  
TOURS.**

## MÉTHYLARSINATES BOUTY

Tous les produits arsénicaux présentés par les LABORATOIRES BOUTY sont à base d'acide méthylarsinique remplaçant avantageusement, dans tous les cas, l'acide cacodylique.

<b>Gaïarsol Bouty.</b>	1° ampoules de 1 cc. renfermant 0,05 de sel. 2° solution renfermant 0,05 de sel par XX gouttes. 3° sirop renfermant 0,04 de sel par cuillerée à soupe.	Tuberculose. Affections pulmonaires.
(Méthylarsinate de Gaïacol.)		
<b>Sérosthényl Bouty.</b>	1° ampoules de 1 cc. renfermant 0,001 de méthylarsinate de strychnine et 0,10 de glycérophosph. de soude. 2° solution dosée par XX gouttes comme une ampoule.	Asthénie. Faiblesse constitutionnelle.
(Méthylarsinate de strychnine glycérophosphaté.)		

**Laboratoires BOUTY**

3, rue de Dunkerque — PARIS.  
Téléphone : Nord 32-52, 32-53.

## MÉTRITOLS

Comprimés Gynécologiques effervescents, antiseptiques alcalins, astringents.

**Composition.** — Acide picrique, oxyquinoline, oxycyanure de Hg, thymol, bicarbonate, amidon, formaldéhyde. Parfum agréable des essences de labiées alpestres associées à l'essence de cèdre.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antisep-tiques, alcalins, astringents, les Métritols donnent des résultats certains dans les leucorrhées de toute nature et les vaginites.

**Mode d'emploi.** — Injections vaginales. Un comprimé dans un litre d'eau bouillie chaude 40° à 45°. Position couchée, hoch très bas.

Prix : 12 francs.

**Laboratoire LEES**

18, rue Pierre-Curie — PARIS (V<sup>e</sup>).

---

## MIALBAINE

Solution d'ouabaïne Mialhe à 1/1000,

XXV à C gouttes par 24 heures.

---

**Laboratoire du Docteur MIALHE**

8, rue Favart — PARIS.





**MICELLIODE**

IODE EN MICELLES

ou

IODE EN GRAINS

**IODE COLLOIDAL MICELLAIRE  
ELECTRO-POSITIF**

préparé à partir de foies frais

pour

**IDO-COLLOIDOTHÉRAPIE MICELLAIRE**

et

**OPOTHÉRAPIE HÉPATIQUE**

associées.

PRODUIT MÉDICINAL FRANÇAIS*exempt de tout principe irritant ou toxique.*CONSTITUTION**LIQUIDE AQUEUX SYNTHÉTIQUE**

à

grains ultramicroscopiques inégaux

polymoléculaires

animés de vifs mouvements browniens

passifs et irréguliers

en suspension permanente

dans toute l'étendue de la masse fluide

DÉNOMINATIONS SCIENTIFIQUES

d'après sa structure moléculaire

**COLLOIDE MICELLAIRE****FAUSSE SOLUTION — PSEUDO SOLUTION****SOL COLLOIDAL**CONDITIONS DE RÉALISATION**RÉALISÉ PAR " ADSORPTION "**

sans combinaison iodée

STABILITÉ

stabilité assurée durant plusieurs années.

COMPOSITION

Iode métalloïdique libre.....	0 gr. 15
Extrait hépatique déprotéiné .....	2 gr. 50
pour 100 gr. de pseudo-solution aqueuse.	

soit 0 gr. 0015 (1 milligr. 1/2) d'iode libre par gr. ou cc.

CARACTÈRES PHYSIQUES DISTINCTIFSStructure moléculaire nettement distincte  
de celle des autres formes de l'iode médicina

**EFFETS PHYSIOLOGIQUES**

ceux de l'iode libre à faibles doses prolongées.

**PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES**

**DÉPURATIF — TONIQUE — DÉCONGESTIF**

Anti-infectieux — Antiscléreux — Antipyrétique.

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES**

Toutes les indications de l'iode.

**AVANTAGES**

**RÉSULTATS CLINIQUES SURPRENANTS**

à doses infinitésimales d'iode libre.

**JAMAIS D'IODISME****PRÉSENTATION**

Deux formes pharmaceutiques

**FLAcons-GOUTTES — AMPOULES INJECTABLES**  
(pour la voie buccale). (médication intensive).

**MODE D'EMPLOI ET DOSES**

Le « **Micelliodé** »-gouttes se prend dans un peu d'eau, de lait ou de vin rouge, de préférence le matin à jeun et le soir au coucher, ou à la fin de chacun des deux principaux repas.

Le « **Micelliodé** »-ampoules s'injecte dans les veines ou dans les muscles suivant la technique habituelle.

**— GOUTTES —**

(Doses moyennes pour 24 heures, en 2 fois.)

Adultes : C gouttes. — Adolescents : LXXX gouttes.  
Enfants : L gouttes. — Nourrissons : XX gouttes.

*tous les jours pendant 3 mois consécutifs*

*2 fois l'an : printemps et automne — ou encore*

*20 jours de suite par mois durant une année.*

**— AMPOULES —**

(Doses moyennes pour 48 heures, en une fois.)

Adultes : 2 cc. — Adolescents : 1 cc. 1/2.  
Enfants : 1 cc. — Nourrissons : 1/2 cc.

*tous les 2 jours jusqu'à concurrence de 10 injections consécutives.*

*Plusieurs séries de 10 injections s'imposent parfois.*

N. B. — Pour doses supérieures, prendre l'avis du médecin

**PRIX DE VENTE IMPOSÉ**

Le flacon de 50 gr. (modèle unique) : 30 fr.

L'étui de 10 ampoules de 2 cc. (modèle unique) : 25 fr.

**LABORATOIRE DU MICELLIODE**

Produits médicaux spécialisés.

*Fabrication française.*

A. ROLLAND, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
31, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (IV<sup>e</sup>).

**DÉPOT GÉNÉRAL**

Service commercial, — Service médical

88, rue de la Villette — PARIS (XIX<sup>e</sup>).

Tél. : Botzaris 34-32.

## **MICTASOL**

### **DÉCONGESTIF PELVIEN**

#### **Composition.**

**Comprimés :** Bromure de Camphre 0,02, Formine 0,05, Noix de Malva purpurea 0,25.

**Suppositoires :** Stovaine 0,01, Ext. de Jusquiame 0,05, Ichtyol 0,25, Malva purpurea 0,50.

#### **Propriétés thérapeutiques.**

Décongestif pelvien, antiseptique urinaire, sédatif génital. Tolérance parfaite. Innocuité absolue, Sans contre-indication.

#### **Indications thérapeutiques.**

Prostatisme vasculaire. Rétention. Incontinence, Cystites, Séquelles de blennorragie. Néphrites. Pyélonéphrites. Métrites, Salpingites. Vaginites. Hémorroïdes.

#### **Mode d'emploi.**

**Comprimés :** 6 à 10 comprimés par jour, matin, midi, soir, avec un peu d'eau.

**Suppositoires :** 1 ou 2 par jour.

Prix sous les deux formes : 12 fr.

#### **Laboratoires du MICTASOL**

**COUDERC**, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
28 et 30, rue du Four — PARIS (VI<sup>e</sup>).

Téléphone : Littré 17-42.

## MICTOSEPTOL

(Antiseptique urinaire liquide).

**Composition.** — Synthèse nouvelle diurétique, antiseptique et balsamique de benzoate d'Hexaméthylène-tétramine et d'*Arbutine* dans un excipient légèrement stomachique.

**Indications.** — Toutes les affections et infections urinaires : Lithiases, Pyélonéphrites, Cystites, Prostatites, Urétrites, Blennorrhagie à toutes ses périodes ; maladies infectieuses : Grippe, Rougeole, Scarlatine.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à café dans un peu d'eau ou de tisane avant ou entre les repas.

**Doses.** — *Adultes* : 3 à 5 cuillerées à café par jour ; *Enfants* : par demi-cuillerée à café.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires B. C. L.**

29, faubourg de Bourgogne — ORLÉANS.

Dépôt général : Office commercial pharmaceutique, 71, rue du Temple; PARIS (III<sup>e</sup>) — et ses succursales.

## MICTUALINE

**Antiseptique, Sédatif, Décongestif.**

**Composition :**

Collargol à 80 p. 100 Ag. pur.....	0 gr. 02
Urotropine recristallisée.....	0 gr. 10
Bleu de méthylène pur.....	0 gr. 01
Bromure de camphre.....	0 gr. 02
Extrs. d'Uva-ursi et seneçon, q. s. p. 1 pil.	
1/2 molle enrobée de.....	0 gr. 50

**Indications.** — 1° *Maladies des voies urinaires* (Urétrites, Cystites, Pyélonéphrites, Prostatites, Hypertrophie de la Prostate, etc...

2° *Maladies des voies génitales* des deux sexes.

3° *Maladies intestinales* dans leurs rapports avec le Tractus Génito-Urinaire (Syndrome *Entéro-Rénal*, colibacilloses), etc...

**Posologie.** — 6 à 9 dragées par jour avec un peu de liquide.

**Laboratoire H. CLUZEL**

60, cours Emile-Zola — LYON-VILLEURBANNE.

## MINERGIL

**Médication minérale sous forme organique assimilable.**

**Propriétés.** — Apporte tous les éléments minéraux indispensables à la constitution des tissus comme au bon fonctionnement de l'organisme. Donne toutes les vitamines qui, directement ou indirectement, sont ou peuvent être intéressées à l'utilisation des matières minérales.

**Indications.** — Tous les cas de menace de déminéralisation de l'organisme (grossesse, lactation, tuberculose, diabète). Croissance, convalescence, anémie. Rachitisme, dépression nerveuse, etc.

**Conditions d'emploi.** — Avant chaque repas, matin, midi et soir : *Enfants* : 1 comprimé. *Adultes* : 2 comprimés. Ces doses pourront être augmentées suivant avis du médecin. Elles seront doublées et triplées dans les cas de rachitisme.

Prix de la boîte : 16 fr. 50.

**Laboratoires PROGIL**

6, boulevard de Strasbourg — PARIS (X<sup>e</sup>).

---

# MIROXYL

## FORME SIROP

**Propriétés thérapeutiques.** — Calmant de la toux. Expectorant d'action antiphlogistique certaine. Phagocytogène. Puissant modificateur de toutes les bronchites aiguës ou chroniques.

**Principes actifs.** — Action synergique du Méthylarsinate de Codéine et de l'Oxygaïacolate de potasse.

Une cuillerée à bouche contient :

Méthylarsinate de Codéine.....	3 centigr.
Oxygaïacolate de Potasse.....	75 —
Iodure de Codéine .....	1/2 —
Cinnamate de Soude .....	20 —

Préparation agréable au goût, pas d'intolérance, pas de constipation.

**Posologie.** — *Affections aiguës* : 3 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures éloignées des repas.

*Affections chroniques* : 1 cuillerée à soupe matin et soir.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes affections des bronches. Bronchites sous toutes ses formes, Tuberculose, Toux rebelles et émétisantes, Grippe, Asthme, Emphysème.

Prix : 15 francs.

## FORME GOUTTES

**Composition.** — Méthylarsinate de Codéine associé à l'éther de Kay. Action renforcée par l'adjonction de teinture de serpolet, thym, gelsemium, grindelia, drosera, ballote, aconit et belladone.

**Indications thérapeutiques.** — Toux spasmodique et quinteuse en général. Coqueluche. Grippe. Toux rebelles et nerveuses, Asthme, Toux émétisante, Toux laryngées, Adénopathie trachéo-bronchique Dysménorrhée.

**Mode d'emploi.** — A absorber loin des repas dans un liquide tiède sucré de préférence. Tisane béchique, eau, grog ou lait.

**Doses moyennes par jour, en 4 fois.** — *Adultes* : CCXL gouttes.

*Enfants* : XII gouttes par années d'âge.

**Dans les coqueluches: doses fractionnées et croissantes.** —

**Doses initiales :** *Adultes* : CXX gouttes.

*Enfants* : VIII gouttes par année d'âge.

A prendre en 3 à 4 fois par jour, après une quinte. Augmenter progressivement pendant les huit premiers jours.

Consulter la posologie détaillée par âge, dans la notice jointe au flacon. En cas de somnolence accentuée, interrompre le traitement pendant 24 heures.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires TAVERNIER**

32, rue de l'Ouest — PARIS

## MOLENE

**Indications.** — Tuberculose pulmonaire à toutes périodes (action d'autant plus rapide que le traitement est appliqué à une période plus précoce de l'infection tuberculeuse); adénites tuberculeuses évolutives, à tendance suppurative; tuberculose pleurale; tuberculoses cutanées diverses.

**Contre-Indication.** — Néphrite avec albuminurie abondante.

**Mode d'emploi.** — Voie intraveineuse. La dose moyenne est de une injection d'une ampoule de 1 cc. tous les 2 ou 3 jours; chez les grands fébricitants, espacer les injections de 4 ou même 5 jours; dans les lésions torpides, injecter de 1 à 5 cc. tous les 3 jours.

**Présentation.** — En boîtes de 12 ampoules de 1 cc. (1 centimètre cube correspond à 0,05 centigrammes d'anhydride Molybdique pur).

*Prix de vente au public :* 25 fr. la boîte de 12 ampoules.

**Laboratoire LECOQ et FERRAND**

14, rue Gravel — LEVALLOIS-PERRET (Seine).

## MORANYL

309 Poulenc — 205 Bayer.

Urée symétrique du Métaminobenzoyl-métaminoparaméthylbenzoyl-1-naphtylamino-4-6-8 trisulfonate de sodium.

Produit très soluble dans l'eau, dépourvu d'effets irritants; action trypanocide très énergique.

*Indications :*

**Maladie du Sommeil.**

*Posologie et mode d'emploi.* — Injections sous-cutanées ou intraveineuses hebdomadaires à doses progressives de 0 gr. 50 — 1 gr. et 1 gr. 50. Repos de 15 jours entre les séries.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>)



## MORÉTHYL DAUSSE

Morrhuate d'Ethyle : solution huileuse à 25 p. 100  
(Ampoules de 2 cc.)

*Traitement de la tuberculose pulmonaire.*

**Indications.** — L'action du Morhétyl se fait sentir sur toutes les formes de la tuberculose pulmonaire, où il relève l'état général, fait baisser la courbe thermique en même temps qu'il diminue l'expectoration bacillaire et fait rétrocéder les lésions. Les formes rapides de la maladie et la granulie ne semblent, par contre, nullement influencées.

Le Moréthyl ne comporte aucune contre-indication et ne provoque dans aucun cas de réaction locale ou générale.

**Posologie.** — 20 injections quotidiennes successives par voie sous cutanée ou intra-musculaire. Laisser un repos intercalaire de 10 jours et pratiquer de la sorte plusieurs séries d'injections. Durée du traitement : 3 mois au minimum.

**Laboratoires DAUSSE**

4, rue Aubriot — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## MORISLAND IRRADIÉ

(Granulé lipoidique, Ergostérine Vitamine D.)

**Composition.** — Ergostérine irradiée, Lipode de Foie de Morue, Iode, Tanin, Lécithine, Cholestérine, Glycogène, Acide nucléinique, Distéaro-glycérophosphate de Choline.

**Indications.** — Engorgements ganglionnaires, tous états de Faiblesse générale, Rachitisme, Bacillose.

**Posologie :**

*Adultes :* 2 cuillerées à dessert par jour.

*Enfants :* 2 cuillerées à café par jour.

Prix : 18 fr.

Echantillons sur demande.

**Laboratoire CHEVILLON**

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-Oise).

## MOROÏDOL CH. GAUTIER

Chlorhydrate d'Ethocaïne, Suprarénine, Carbonate de Bismuth, Goménol.

Traitement des affections hémorroïdaires et de tous les états fissuraires des régions ano-périnéale, périnéo-scrotale et périnéo-vulvaire.

Action analgésique, décongestionnante, vasoconstrictive.

Onctions 2 ou 3 fois par jour après lavage soigneux de la région avec coton bouilli et assèchement. Quand défécation douloureuse, une application 1/4 d'heure avant et une autre de suite après.

Prix au public : 13 fr. 50.

**Laboratoires Ch. GAUTIER**  
13, rue Dorian — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## MORRHUALÈNE GAUTIER

Médication leucogène organique phospho-ferro-iodo-arséniée (entièrement assimilable).

**Forme.** — Sirop (saveur agréable sans action nocive, ni irritante pour les muqueuses gastro-intestinales).

**Compos.** — Iode physiologique stable et inaltérable ; fer organique d'origine protéique, entièrement assimilable ; sel sodique de l'acide phospho-glycérique : méthylarsinate disodique, rhamnus frangula.

**Action physiol.** — Stimulant des organes lymphoïdes et des séreuses ; modificateur vaso-moteur ; excitant des organes hématopoiétiques ; reminéralisateur puissant ; tonique général ; excitant de la nutrition.

**Indicat.** — Lymphatisme (adénopathies de la scrofule et de la tuberculose, végétations adénoïdes, impétigo), Hypoglobulie (anémie vraie, chlorose, diminution de la proportion d'hémoglobine, débilité générale). Maladies de la nutrition (rhumatisme chronique, artériosclérose, rachitisme, infantilisme). Convalescence de toutes les maladies.

**Posologie.** — De 2 à 5 ans, 3 cuillerées à café par jour ; de 5 à 10 ans, 2 à 3 cuillerées à dessert par jour ; adultes, 2 à 3 cuillerées à potage par jour. (Avant les repas dans un peu d'eau).

Echantillons et littérature :

**Laboratoires DORANTOWICZ**  
Avenue Parmentier — PARIS (XI<sup>e</sup>).  
Téléphone : Roquette 14-12.

# MORRHUÉTINE JUNGKEN et MORRHUÉTINE JUNGKEN VITAMINÉE

**Forme et Composition.** — Liqueur à base de glycérine pure contenant : Iode métallique, 15 mgr. Hypophosphites composés (Nao, Cao, Manganèse), en tout 15 cgr. par cuillerée à soupe. Phosphate de soude : 15 cgr.

Produit de composition fixe et stable, de goût très agréable ; pas d'irritation des muqueuses ; pas de troubles des fonctions gastriques. Très bien toléré en toutes saisons.

**La Morrhuétine Jungken Vitaminée** est le même produit avec, en plus, toutes les Vitamines d'huile de foie de morue.

**Propriétés.** — Dépurateur, Tonique, Reconstituant.

**Indications.** — Anémie, Lymphatisme, Tuberculose, Convalescences des maladies infectieuses, d'opérations et blessures.

**Doses et Mode d'emploi.** — *Enfants* : 1/2 ou 1/3 de verre à liqueur. — *Adultes* : 1 ou 2 verres à liqueur, après les repas, pure ou étendue d'eau au début des principaux repas.

**BRACQUEMOND et C<sup>ie</sup>**

105, rue de Normandie — COURBEVOIE (Seine).

R. C. Paris 207-767 B.

## MORRHUOL

**Composition.** — Principes actifs de l'huile de foie de morue isolés de la matière grasse.

Chaque capsule correspond à 5 grammes d'huile de foie de morue dont le Morrhuol supprime le goût désagréable et la mauvaise digestibilité.

**Indications.** — Lymphatisme, débilité, scrofule, rachitisme, affections chroniques de l'appareil respiratoire sous toutes leurs formes.

**Action.** — Reprise rapide de l'appétit et des forces, augmentation du poids, diminution de l'expectoration et de la toux.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 4 à 8 capsules par jour, à prendre au début des 2 principaux repas. — *Enfants* : 2 à 4 capsules par jour.

**LABORATOIRE**

**DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE**

**D<sup>r</sup> PH. CHAPELLE**, 8, rue Vivienne — PARIS.

## MORRHUXINE

**Composition.** — Iode organique. — Brome. — Glycérophosphates alcalins et arrhéнал à raison de un demi-centigr. par cuillerée à soupe. — Véhicule glycériné et sirop de fruits très agréable au goût et très assimilable.

**Propriété.** — Apéritif tonique, reconstituant anti-lymphatique.

**Indications.** — Succédané de l'huile de foie de morue ; est indispensable dans tous les cas où l'huile de foie de morue n'est pas tolérée par le malade.

**Doses.** — *Enfants* : 2 à 3 cuillerées à café par jour.  
*Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

La bouteille pour 12 jours de traitement : 12 francs.

**E. VERGELOT, Pharmacien,**  
163, rue de Flandre — PARIS (XIX<sup>e</sup>).

Tél. : Nord 48-22.

## MORUBIASE

Extrait hépatique total de morue irradiée et sans corps gras.

### Principes actifs :

Lipophosphatides, acide morrhuïque, vitamines.

### Formes :

*Pilules et granulé.* Une pilule ou une cuiller à café de granulé contient les principes actifs de 30 gr. d'huile de foie de morue.

### Avantages :

Petit volume, aucun goût, parfaite digestibilité, sans corps gras, se prend l'été comme l'hiver.

### Indications :

Celles de l'huile de foie de morue : Anémie, Lymphatisme, Rachitisme, Affections chroniques des voies respiratoires.

### Posologie :

*Adultes* : 6 à 8 pilules, par jour au début ou à la fin des repas.

*Enfants* : 2 à 6 cuillers à café suivant l'âge.

*Arrhéno-Morubiase* : Synergie thérapeutique : extrait hépatique et méthylarsinate disodique (0,005 mgr. par pilule).

*Gaiaco-Morubiase* : Extrait hépatique et 0,05 carbocinnamate de gaïacol par pilule.

**Laboratoires MEYNET-CROSNIER**  
6, rue Chanoinesse — PARIS.

# MORUXASE

Deux formules :

1° Gouttes de Moruxase concentrée : 15 fr.

XX gouttes renfermeront :

Triodure d'arsenic .. 5 centigr.	Extrait iodotannique 50 centigr.
— de manganèse 5 —	Glycérine ..... 50 —

Doses.	{	2 à 7 ans .....	XX gouttes	{	deux fois par jour.
		7 à 15 ans .....	XL —		
		Adultes.....	L —		

2° Moruxase, sirop : 12 fr.

1 cuillerée à soupe renferme :

Triodure {	de fer.....	5 centigr.
	d'arsenic .....	5 —
	de manganèse .....	5 —
Extrait iodotannique.....	50	—
Lactophosphate de chaux .....	40	—
Sirop au suc naturel de groseilles.....	20	grammes.

Doses.	{	2 à 7 ans.....	1 à 2 cuill. à café	{	deux fois par jour.
		7 à 15 ans et adultes.....	1 à 2 cuill. à soupe		

**Indications.** — Carence physiologique, Anémie, Lymphatisme, Troubles de croissance, Inflammations ganglionnaires.

Action catalytique puissante du manganèse. Le sirop fait à froid contient intactes les vitamines du suc de groseilles.

**Laboratoires ABADIE-TANZI**

3, Place Intérieure Saint-Michel — TOULOUSE (Hte-Garonne).

# MUCICARBOS

**Composition.** — Charbon animal chimiquement pur (Carbos), associé à un mucilage pur pour éviter la constipation.

**Forme.** — Granulé rond : **Mucicarbos simple** ; **Mucicarbos benzo-naphtolé**.

**Indications.** — Diarrhées avec hypersécrétion avec lésions ou avec infection de la muqueuse, Entérites, Entérocolites, Diarrhées des tuberculeux, Dyspepsies gastro-intestinales avec constipation et flatulences, Colites avec fermentations, Colites avec putréfactions.

**Posologie.** — 1 à 3 cuillerées à café avant ou après les repas.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires E. MILLET**

RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).

## MUCILAXINE

**Composition.** — Huile d Paraffine de haute viscosité et neutre, associée à un mucilage pur sans cellulose (*action purement mécanique sans aucune addition de produit laxatif*). *Suppression du suintement.*

**Forme.** — Crème-émulsion facile et agréable à prendre.

**Indications.** — Rééducation et pansement de l'intestin. Constipation. Colite. Entérocolite muco-membraneuse. Constipation des opérés, des accouchées, des enfants, des nourrissons, etc.

**Posologie.** — 1 à 3 cuillerées à soupe, à dessert ou à café par jour, suivant l'âge et au début des repas.

Prix : 14 francs.

**Laboratoires E. MILLET**  
RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).

---

## MUCINUM (Comprimés de)

**Composition.** — Association de nombreux produits végétaux ou organiques (à l'exclusion de tout drastique), dont chacun à la dose utilisée serait sans action, mais dont l'ensemble réalise une véritable synergie laxative.

**Propriétés thérapeutiques.** — Laxatif doux n'irritant jamais l'intestin et ne provoquant pas d'accoutumance. Réussit dans tous les cas de *Constipation* du fait de la pluralité des éléments qui le composent.

**Forme.** — Petits comprimés très friables, sans saveur, pouvant être croqués ou avalés.

**Posologie.** — 1/2 à 2 comprimés par jour selon l'âge et la réaction individuelle (généralement au repas du soir).

**Laboratoires CHANTEREAU**  
26 bis, rue Dombasle — PARIS.

## MUCOSODINE

Antisepsie des muqueuses  
Bouche, Nez, Gorge, Oreilles.

**Composition.** — Bicarbonate de soude, Hyperborate de soude, Chlorure de sodium, Borate de soude.

**Propriétés.** — Donne un sérum boraté, alcalinisé et oxygéné. Elle déterge la muqueuse pituitaire et la décongestionne. Elle dissout les mucosités et les sécrétions.

**Indications.** — Coryza, aigu et chronique, Rhinites, Rhume des Foins, Sinusite, Ozène. — Amygdalites, Angines, Laryngites, Otites.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à café pour un verre d'eau chaude.

Bain nasal, douche nasale, Gargarismes, Bains de bouche, Irrigation.

Le flacon : 8 francs.

**Laboratoires CAILLAUD**

37, rue de la Fédération — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Téléphone : Invalides 12-63.

## MUSCULOSINE BYLA

**Suc de Viande crue** hyperactivé par les oxydases et la catalase du sang et les vitamines musculaires.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antibacillaire, Toni-nutritif, Excitant physiologique.

**Indications.** — Convalescence, Anémie, Tuberculose, Neurasthénie.

**Dose et mode d'emploi.** — 1 à 2 cuillerées à bouche aux repas, dans la boisson préférée, toujours froide ou tiède, gazeuse ou non.

Voir page 1165.

**ZOMO-MUSCULOSINE BYLA**

(Sèche).

**Les Établissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

## MUTHANOL

Hydroxyde de Bismuth radifère porphyrisé.

**Indications.** — Syphilis à toutes ses périodes.

Dose normale : Ampoule de 2 centimètres cubes renfermant 13 centigrammes de Bismuth métal.

Boîte de 10 ampoules : 30 francs.

Double dose : Ampoule de 3 centimètres cubes renfermant 26 centigrammes de Bismuth métal.

Boîte de 10 ampoules : 40 francs.

Dose infantile : Ampoule de 1 centimètre cube renfermant 2 cgr. 6 de bismuth métal.

Boîte de 10 ampoules : 20 francs.

**Mode d'emploi.** — Une ampoule tous les 2 jours ou 2 ampoules tous les 5 jours. Dans les cas rebelles : 2 ampoules tous les 2 jours.

Traitement de sécurité. Suppositoires Muthanol, adultes et enfants.

**Laboratoire du MUTHANOL : G. FERMÉ**

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X<sup>e</sup>).

R. C. Seine 143.981.

---

## MYCOLYSINE

du Docteur DOYEN.

Solution colloïdale phagogène polyvalente. — Stimule la phagocytose.

**Formes et doses :**

Mycolysine buvable, 4 à 12 cuillerées par jour.

Extrait de Mycolysine, 1 à 4 cuillerées par jour.

Mycolysine injectable, ampoules de 10 cc.

Pastilles de Mycolysine, 15 à 20 pastilles par 24 h.

**Indications.** — Action thérapeutique rapide dans les affections aiguës des voies respiratoires, dans les phlegmons profonds, les lymphangites infectieuses, les fièvres éruptives et la grippe, la méningite cérébro-spinale, etc.

**Laboratoires LEBEAULT**

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III<sup>e</sup>).



## MYODEN

**Elixir Antirhumatismal et Antigoutteux**  
au Phospho-Hexahydroparadiazine-ammonium.

**Composition.** — Phospho-Hexahydroparadiazine-ammonium, Sel de Grégory, Teinture de Narcisse, Teinture de Gantelée, Extrait hydro-alcoolique de Belladone, Ethanol à 15°.

**Indications.** — Rhumatismes, Arthralgies et Arthropathies aiguës ou chroniques, Goutte, Arthrite goutteuse, Rhumatisme polyarthritique progressif, Sciatique, Affections articulaires chroniques, Lumbago.

**Posologie.** — *Adultes* : 3 cuillerées à café par jour pur ou dans de la tisane de feuilles de frêne.

*Enfants au-dessus de 10 ans* : 2 demi-cuillerées à café par jour.

**Nota.** — Le MYODEN peut être prescrit par le Corps médical pour les Assurances Sociales.

(Formule conforme au décret du 13 juillet 1926.)

**Laboratoires E. DAUPEZ**

CAPVERN-LES-BAINS (Htes-Pyrénées).

*Dépôt général des Spécialités :*

37, rue des Lois, 37

TOULOUSE (Hte-Haronne). Tél. : 24-55.

## MYOTHERMINE

Médication externe, imprégnation par essences végétales, réaction thermogène, révulsion atténuée. Onguent non coloré en tube étain.

**Indications.** — Douleurs articulaires, Courbature, Lumbago, Torticolis, Point de côté, Engelures, Congestions de la gorge, Trachéites, Bronchites, Grippe pulmonaire, Congestion pulmonaire, Pneumonies, Broncho-pneumonies, Pleurésies.

**Mode d'emploi.** — Etendre une couche de Myothermine avec un tampon de coton, recouvrant largement le point douloureux, la gorge ou le thorax, suivant les cas.

Pour obtenir une révulsion atténuée, non pénible, couvrir avec le papier imperméable spécial contenu dans la boîte.

Prix du tube : 13 francs.

Echantillon grandeur normale sur demande.

**Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique**  
**appliquées**

47, rue de Paris — ASNIÈRES (Seine).

**NADOLOR****(Cachets.)****Propriétés thérapeutiques :**

Grippe, migraines, névralgies rebelles, névralgies dentaires, rhumatismes, lumbagos, règles douloureuses.

**Formule :**

Phénacétine, citrate de caféine, aconit, amidopyrine, belladone.

**Dose et mode d'emploi :**

1 à 4 cachets par 24 heures.

**Laboratoire HOCQUETTE**

191, rue du Faubourg-St-Antoine — PARIS.

Tél. : Diderot 04-71.

---

## NAIODINE LOGEAIS

**Formule.** — Iodure de Sodium stabilisé en solution aqueuse injectable. Ne contient aucun autre principe actif, toxique ou autre.

**Formes.** — Se présente en ampoules de 20 cc, 10 cc. et 5 cc. contenant 0,01 cgr. de sel hyperactif par cc.

Boîte 6 ampoules 20 cc. : 35 fr. net.

Boîte 6 ampoules 10 cc. : 23 fr. net.

Boîte 12 ampoules 5 cc. : 30 fr. net.

Boîtes-vrac de 50 ou 100 ampoules réservées au Corps médical. Prix spéciaux sur demande.

**Propriétés.** — **Sédatif-type de l'élément douloureux**, grâce à l'action neurophile intense de NaI stabilisé.

C'est en effet par imprégnation de la cellule nerveuse et du névrilème par l'ion iode de la Naïodine qu'est obtenue la sédation rapide et atoxique des algies les plus rebelles.

La Naïodine est inaltérable, *absolument indolore à l'injection*, immédiatement assimilable, sans réactions secondaires.

**Véritable traitement spécifique de la sciatique**, c'est en outre un précieux succédané des stupéfiants (algies rebelles, toxicomanies, etc.).

**Indications.** — **Tout syndrome douloureux, aigu ou chronique** : Sciatiques, Lumbagos, Zonas, Rhumatisme articulaire aigu, Rhumatisme déformant, Névralgies faciales, intercostales et lombaires, Névrites, Myalgies, Asthme, Emphysème pulmonaire, Toxicomanies, etc.

**Posologie.** — S'administre à doses massives : Pour obtenir un résultat rapide, ne pas craindre de frapper fort puisqu'on ne redoute ni douleur à l'injection, ni réaction locale ou générale.

20 à 30 cc. par jour jusqu'à sédation, en une seule séance quotidienne (piqûres en série facilement résorbées). Injections intramusculaires lentes, *loco dolenti* si possible. Aucune incompatibilité ni contre-indication selon l'âge ou l'état du malade. Ni iodisme, ni accumulation.

**Laboratoires J. LOGEAIS**

22 bis, rue de Silly, BOULOGNE-SUR-SEINE  
près Paris. Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.

## NAPHTOCARBINE

**Composition.** — Charbon animal pur privé de cyanogène, Urotropine, Benzonaphtol.

**Présentation.** — Granulé aromatisé friable très soluble.

**Indications.** — *Injections gastro-intestinales* : Entéro-colites, intoxications, colibacillose.

*Infections biliaires* : Lithiase.

*Infections urinaires* : Rénales et vésicales.

*Ne provoque jamais de constipation.*

**Posologie.** — 1 à 2 cuillerées à café après les repas, à croquer ou dans un peu d'eau.

Demi-doses pour les enfants.

**Laboratoire R. FAURE**

80, rue du Rocher — PARIS.

---

## NARCYL

Médicament spécifique de la Toux.

*Laryngites, Bronchites, Coqueluche.*

En particulier : *Toux de la Tuberculose.*

Sirop dosé à 0 gr. 03 ctg. de Narcyl par cuillerée à soupe (chlte d'éthyl-narcéine synt.).

Comprimés dosés à 0 gr. 02 de narcyl et 0 gr. 25 de benzoate de Na.

### Doses :

Sirop :

*Adultes* : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour.

*Enfants* : 2 à 4 ans : 1 à 3 cuill. à café par jour.

— 4 à 7 ans : 4 à 5 cuill. à café par jour.

— 7 à 15 ans : 1 à 2 cuill. à bouche par jour.

Comprimés : *Adultes* : 4 à 6 comprimés par jour.

Sirop, le flacon : 14 fr. — Comprimés : 14 fr.

**Laboratoires LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS (XI<sup>e</sup>).

## **NASO-SULFOLARSAN**

Antiseptique sulfureux sans odeur.

Non caustique, non toxique.

**Indications.** — Affections du nez et de la gorge : Coryza aigu ou chronique, Sinusites, Ozènes, Erysipèle, Otites.

**Présentation.** — Pommade en tube à embout nasal.

**Mode d'emploi.** — Gros comme un pois, 2 à 3 fois par jour.

**Laboratoires DOMERGUE**

AGEN (Lot-et-Garonne).

---

## **NATIBAÏNE**

Seule association de la DIGITALINE NATIVELLE et de l'OUABAÏNE ARNAUD

**Formes.** — Solution glycéro-alcoolique au millième renfermant 1/3 de Digitaline Nativelle et 2/3 d'Ouabaïne Arnaud.

Ampoules pour injections intraveineuses.

**Indications.** — Myocardites av. tachycardie. Hypertendus en voie d'arythmie complète.

**Doses.** — Petites doses prolongées : X à XX gouttes par 24 heures. Doses moyennes : XX à XXX gouttes par 24 heures.

**Laboratoire NATIVELLE**

27, rue de la Procession — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## NATIROSE

Dragées de Trinitrine

**A noyau liquide.**

**Composition.** — Azotate de glycéryle (Trinitrine à 1/100).

Chlorhydrate de Codéthyline (Dionine).

Sulfate neutre d'Atropine.

Essence de menthe.

**Indications.** — Angine de Poitrine, Aortite, Artérite, Asthme cardiaque, Bradycardie, Hémoptysie, Hypertension artérielle, Œdème aigu du poumon.

**Doses.** — Une à deux dragées au moment de l'accès, sans dépasser 8 à 10 dragées par 24 heures.

Prix : 20 francs.

**Laboratoire NATIVELLE**

27, rue de la Procession — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

## NATROSYL

**Forme pharmaceutique.** — Soluté.

**Composition.** — Soluté alcalin à base de baume du Pérou et d'essences antiseptiques aromatiques.

**Action.** — Antiseptique, lénitive, décongestionnante.

**Indications.** — Traitement médical des affections vagino-utérines, leucorrhée, métrite puerpérale, etc.

**Doses.** — 1 à 3 cuillerées à café par litre d'eau bouillie en injections vaginales.

Prix : 10 francs.

**Laboratoires**

**du Dr Pierre ROLLAND**

18, rue Pierre-Curie — PARIS (V<sup>e</sup>).

## NAZINETTE

(Baume Nasal.)

**Composition.** — Mélange complexe d'essences choisies d'après leur pouvoir antiseptique et d'après leur coefficient de volatilité. *Pas de menthol.* Pas d'adrénaline. Pas de toxiques. Pas de poudres insolubles. Pas de produits chimiques.

**Avantages.** — Homogénéité absolue. Consistance fluide, fusible à 36°. Laisse les narines libres. Adhère aux muqueuses (action prolongée) et partiellement absorbables par elles (action immédiate et exceptionnelle). Tient lieu d'inhalation. Usage prolongé possible. N'irrite jamais. Ne tache pas le mouchoir.

**Présentation.** — Tube d'étain pur avec une canule permettant l'introduction facile dans les narines.

**Prescription.** — Un tube de *Nazinette* : introduire gros comme un petit pois dans chaque narine.

**Propriétés.** — Calmant, décongestionnant, bactéricide. Supprime les irritations de la muqueuse.

**Indications.** — Rhumes de cerveau, rhinites et toutes inflammations de la muqueuse rhino-pharyngée, végétations, sinusites (action remarquable), ozène, surdité, etc. ; prévention des maladies infectieuses, coqueluche, etc.

Laboratoires Biologiques

E. GILBERT, Docteur en Pharmacie

6, rue du Laos — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

## NAZOPHYL DARVA

**Composition.** — A base de bleu de méthylène, huiles volatiles, camphres associés.

**Propriétés thérapeutiques.** — Spécifique des affections du nez (rhumes de cerveau, grippe, irritations des muqueuses nasales) préventif des affections des voies respiratoires, réalise l'antisepsie du rhino-pharynx.

**Mode d'emploi.** — 5 à 6 fois par jour, introduire dans chaque narine, en aspirant profondément, un peu de **Nazophyl Darva** (conserver le plus longtemps possible).

Emploi facilité par une présentation adéquate.

Littérature et échantillons sur demande  
adressée aux

**LABORATOIRES ANDRÉ NARODETZKI**

19, boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS.

## NÉOARSITE

(Liquueur de Fowler spéciale.)

**Propriétés.** — Les composés arsenicaux, tels que cacodylates, méthylarsinates, etc. ont été adoptés thérapeutiquement pour remplacer les sels arsenicaux anciens, arseniates, arsenites, mais leur efficacité n'est réelle qu'à des doses importantes, c'est-à-dire à des doses voisines de leur toxicité spécifique.

De tous les arsenicaux, seule la liqueur de Fowler a une valeur thérapeutique bien définie. Aussi le prof<sup>r</sup> Roger a-t-il étudié pour ce médicament de toute efficacité les conditions optima de son absorption sous des formes nouvelles.

### Formes :

- 1° *L'Ampoule isovisqueuse de Néoarsite*, grâce à sa viscosité qui est égale à la viscosité moyenne du Myoplasma sanguin, est résorbée presque instantanément et sans réaction.
- 2° *Les Perlules de Néoarsite*, solubles seulement dans l'intestin, suppriment les inconvénients de l'absorption gastrique. Chaque perle correspond à IV gouttes de Liqueur de Fowler et à un milligramme de quassine.

### Posologie :

*Ampoules* : 1 par jour.

*Perlules* : 1 au repas du midi. 1 au repas du soir.

Prix : Ampoules, 20 fr. ; Perlules, 15 fr.

Dépôt : **Laboratoire NOGUÈS**

11, rue Joseph-Bara — PARIS.

## NÉO-ARSYCODILE

Méthylarsinate disodique

(Syn. Arrhénal)

**Indications thérapeutiques.** — Tous les avantages de l'arsenic organique. Plus particulièrement destiné à l'usage interne par la voie gastrique. Un long emploi (depuis 1900) a établi la supériorité de cette préparation.

**Doses et mode d'emploi.** — *Pilules* à 0,01 : 4 à 5 ou plus par jour aux repas, pendant 12 jours, repos 8 jours et reprise.

*Ampoules* à 0,05, même usage que pour l'ARSYCODILE et spécialement dans le paludisme et l'anémie des pays chauds.

Prix de vente au public : pilules : 11 fr. 25 ; ampoules : 12 fr. 50.

**Laboratoires du Dr M. LEPRINCE**  
62, rue de la Tour — PARIS (XVI<sup>e</sup>).



## NÉO-COLLARGOL

Le Néo-Collargol assure au Corps médical la garantie d'un produit à teneur en argent très élevée (80 p. 100 d'argent métal).

Ni irritant, ni toxique, c'est un bactéricide des plus énergiques dont l'emploi est toujours utile pour le traitement des maladies infectieuses et pour le pansement des plaies.

Il s'emploie en :

Pommade Néo-Collargol cocaïné pour le pansement de toutes plaies opératoires, variqueuses, brûlures.

Pommade Néo-Collargol non cocaïné pour frictions dans maladies infectieuses.

Ovules Néo-Collargol réalisant le pansement continu des vaginites, métrites, ulcérations du col utérin. Les sécrétions diminuent et la guérison suit rapidement.

Suppositoires Néo-Collargol pour hémorroïdes, fissure anale et prostatites.

Pilules Néo-Collargol pour les entérites, la coli-bacillose et l'appendicite chronique.

Compte-Gouttes pour le coryza et la grippe.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> MARTINET**

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

## NEO-DMEGON

**Vaccin curatif des complications de la gonococcie.**

Stock-vaccin atoxique stabilisé constitué par des émulsions de cultures diverses de *gonocoques* et de *synocoques* traitées par le fluorure de sodium.

**Indications.** — Complications diverses de la Blennorragie (Orchi-épididymites, cystites, prostatites, arthrites, ophtalmie, etc...), dans lesquelles le Néo-Dmegon agit notoirement sur les symptômes douloureux et inflammatoires.

**Présentation et mode d'emploi.** — Ampoules de 1 cc. (boîte de 6) à étiquette blanche ou bleue (races diverses). En principe, 1 ampoule tous les 2 jours, en alternant les ampoules à étiquette blanche et bleue. Voie hypodermique ou intra-musculaire.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

**Marques Poulenc frères et Usines du Rhône,**

86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## NÉO-DMETYS

**Vaccin curatif et préventif de la coqueluche**

Stock-vaccin atoxique stabilisé constitué par une émulsion de cultures diverses de Bacilles de Bordet traitées par le fluorure de sodium.

**Indications.** — Traitement et prophylaxie de la coqueluche.

**Présentation et mode d'emploi.** — Ampoules de 1 cc. (boîte de 6) à étiquette blanche ou bleue. Une injection intra-musculaire, de préférence (ou sous-cutanée), en principe tous les 2 jours ; commencer par 1/2 ampoule pour atteindre 1 ampoule à la troisième ou quatrième injection. Chez les très jeunes enfants, s'en tenir à 1/2 ampoule. Le traitement comporte en général de 6 à 10 ampoules (soit 10 à 20 jours environ). Alternier les ampoules à étiquette blanche ou bleue.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**

86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## NÉOIACOL

**Arsénobenzol en solution stable**, préparé par l'Institut Sérothérapique de Milan (dirigé par le professeur Belfanti) spécialement et exclusivement pour injections intramusculaires.

**Activité thérapeutique maxima** égale à celle des meilleurs arsénobenzols en injection intraveineuse.

**Pratiquement inaltérable.**

**Indolore** grâce à sa constitution moléculaire spéciale et bien qu'il ne contienne aucun analgésique.

Toutes les séries de fabrication sont essayées sur l'homme.

Dépôt général :

**Laboratoires HUGUES**

105. boulevard Malesherbes — PARIS.

Tél. : Laborde 27-84.

---

## NÉOL

**Constitution.** — Préparation aqueuse peroxysulfatée, d'origine électrolytique, constituant une solution auto-génératrice d'Ozone naissant.

**Propriétés.** — Aucune toxicité, antiseptique-cicatrisant, essentiellement cytophylactique, kératoplastique et décongestif.

**Indications.** — Brûlures par le feu, le radium ou le froid. Ulcérations cutanées et muqueuses. Plaies phagédéniques. Métrites, angines, pharyngites.

**Mode d'emploi.** — L'eau néolée (*Néol*, 1 partie, eau, 4 parties) remplace avantageusement l'eau oxygénée dans toutes ses indications. — Attouchements, badigeonnages (Angines, Stomatites, Laryngites, Métrites et Endométrites) : *Néol pur*. — Pansements (Brûlures, Plaies diverses) : *Eau néolée*. — Gargarismes : *une cuill. à soupe par verre d'eau* avec une pincée de bicarbonate de soude. — Injections, grands lavages : *Quatre cuill. à soupe par injection de deux litres d'eau*.

**Laboratoires BOTTU**

Anciens Laboratoires du Néol,

35, rue Pergolèse — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## NÉO-LAXATIF CHAPOTOT

### LAXATIF

**Composition.** — Suc d'orange et manne.

**Forme.** — Sirop.

**Indications.** — Laxatif agréable pour les enfants, les dames et les personnes âgées ou affaiblies.

**NE RENFERME  
NI PRODUITS CHIMIQUES,  
NI PHTALÉINE DU PHÉNOL,  
NI DRASTIQUES,  
NI STUPÉFIANTS**

Peut être donné aux enfants,  
même nouveau-nés.

**Posologie.** — Enfants du premier âge : 1/3 à une cuillerée à café.

Enfants de 3 à 5 ans : une à deux cuillerées à café.

Enfants de 6 à 14 ans : une à deux cuillerées à entremets.

Adultes : une à deux cuillerées à soupe.  
S'il y a lieu, augmenter les doses jusqu'à effet actif, pour revenir ensuite à des doses moindres mais suffisantes.

**Laboratoires CHAPOTOT**

56, boulevard Ornano et 31, rue du Poteau  
PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

R. C. 231 917 B.

*Agent général pour la Belgique*

**A. CHOCAT,**

86, rue du Méridien — BRUXELLES

## NÉOLYSE et NÉOLYSE RADIOACTIVE

Préparations à base de sels silico-magnésiens.

**Indications thérapeutiques.** — Traitement des affections cancéreuses par les composés magnésiens.

**Propriétés thérapeutiques.** — La Néolyse est établie d'après les observations du Prof. Robin et les arguments cliniques de MM. Richet, Delbet et J. Regnault (*Acad. de méd.*, avril 1918).

**Formes usuelles :**

Néolyse : *Cachets* (en boîte de 60). — 20 fr.

*Ampoules* (en boîte de 4). — 10 fr.

*Compresses* (en boîte de 10). 15 fr.

Néolyse radio-active : *Ampoules* (boîte de 4).

Prix : 20 fr..

**Laboratoire G. FERMÉ**

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X<sup>e</sup>).

---

## NEO Mg FEVRE

### Forme :

Comprimés bouillon agréables.

### Composition :

Chlorure de Magnésium 1 gr. 20, extrait sec de bouillon q. s. p. 1 comprimé.

### Actions thérapeutiques :

Hyperminéralisateur, Antidéperditeur.  
*Stimulant énergétique de tout l'organisme.* Facilite l'activité cérébrale.  
*Digestif, Cholagogue.* Antitoxique,  
Préventif des Néoplasmes.

### Indications :

Asthénies nerveuses, Convalescences, Anémies, Fatigues cérébrales, Crampes douloureuses, Vieillesse prématurée, Constipation, Entérite, affections des voies biliaires, Arthritisme sous toutes ses formes, Verrues, Dermatoses diverses, Prostatisme.

### Posologie :

Un comprimé le soir dans une tasse d'eau chaude ou de préférence dans une assiette de potage ou de bouillon non salé.

**Laboratoire LAGOUTTE**

229, cours Gambetta. — LYON (III<sup>e</sup>).

## NEO-NEUROSINE PRUNIER

Saccharure granulé à base de :

Phospho-glycérate de calcium pur...	0,05 centigr.
Phospho-glycérate de sodium pur.....	0,10 —
Chlorure de magnésium pur.....	0,15 —
par cuillerée à café, soit 5 grammes.	

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication tonique, phosphorée, calcique et magnésienne. Prophylaxie des affections cancéreuses.

**Posologie.** — 2 à 4 cuillerées à café par jour, à prendre en nature ou dans de l'eau.

Prix du flacon en France : 12 fr. 75.

Dépôt général :

**CHASSAING, LE COQ ET Cie**

(Anc. M<sup>on</sup> Chassaing-Prunier)

1, quai Aulagnier — ASNIÈRES (Seine).

## NÉOPANCARPINE

*Extrait total* hydro-alcoolique étheré de *Jaborandi*.

**Formes.** — Gouttes et Granules.

**Indications thérapeutiques.** — Les altérations de la sensibilité organique et les maladies anaphylactiques, *traitement de fond*, ne s'adressant nullement aux manifestations paroxystiques (crises), mais à l'altération permanente qui prépare et détermine ces dernières :

Coqueluche, Toux quinteuses, Asthme, Coryzas spasmodiques, Urticaire, Névro-dermites, Eczéma.

*La meilleure thérapeutique de désensibilisation.*

**Mode d'emploi.** — *Enfants* jusqu'à 5 ans : III à X gouttes, 8 à 4 fois par jour.

*Adultes* : VIII à XX gouttes 3 à 4 fois par jour ou 1 ou 2 granules, matin, midi et soir.

Prendre toujours après les repas.

1 granule = X gouttes.

Prix de vente au public : 16 francs.

**Laboratoire de Pathologie Générale de Paris,**  
5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Téléph. : Auteuil 35-25.

## NÉOPHAGE

Traitement médical des cancers et des états précancéreux.

Néophage n° 1. — Levure injectable travaillant à 37°.

Néophage n° 2. — Extraits glandulaires : Thymus, Thyroïde, Hypophyse, Pancréas. Métaux colloïdaux : Cu, Fe, Se, Mn, Mg.

Injections intramusculaires tous les 2 jours du contenu total d'une ampoule n° 1 et de 1/3 d'une ampoule n° 2 ; augmenter progressivement les doses de n° 2.

Prix public : 100 fr. la boîte de 12 ampoules.

**Laboratoires JAMMES**

86, rue Michel-Ange — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Admis dans les Hôpitaux de Paris

## NÉO-PHYSIOSTHÉNINE

— Toutes infections de moyenne intensité. —

**Indications thérapeutiques.** — Grippe, Angine, Broncho-Pneumonie, Fièvre typhoïde, Fièvre puerpérale et toutes les infections.

**Forme.** — Boîtes de 8 ampoules de 5 cc.

En injections intramusculaires :

Prix : 22 francs.

## PHYSIOSTHÉNINE

— Toutes infections graves. —

**Formes.** — Boîtes Adultes : 4 ampoules 20 cc.

Boîtes Enfants : 4 ampoules 10 cc.

Injections intramusculaires, région rétro-trochantérienne ; l'injection est indolore. Pas de réaction sérique. Pas de phénomène de choc. Toxicité nulle.

Prix : 40 francs.

**Laboratoires DROUET et PLET**  
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).



## NÉO-RHOMNOL

Rhomnol Strychno-Arsénié (Nucléinate de Strychnine défini et Cacodylate de Soude).

Injectons hypodermiques et comprimés.

**Indications thérapeutiques.** — Hypotension artérielle, Neurasthénies, Grippe, Convalescences, Intoxications, Dépressions nerveuses, Etats cachectiques, Suites d'infections, etc. (Spécificité). Corps nouveau défini, à effets réguliers et constants.

**Mode d'emploi.** — *Ampoules* : Tous les jours une ampoule (en injections intramusculaires de préférence), deux dans les cas graves. Habituellement, la boîte de 12 étant terminée, on institue un repos d'une semaine, suivi de la reprise des piqûres, si c'est nécessaire.

*Comprimés* : Un comprimé à chaque repas, avaler sans croquer.

Prix de vente au public : 18 francs.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> M. LEPRINCE**  
62, rue de la Tour — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## NÉO-RIODINE



**Composition.** — Dérivé sodique à 40 % d'iode organique en solution aqueuse injectable.

**Forme.** — Ampoules de 2, 3, 5 cc.

En boîtes de 10 et de 50 ampoules.

**Propriétés thérapeutiques.** — *Résorption complète et rapide facilitant les injections intraveineuses. Action immédiate et intensive sans iodisme.*

Par voie buccale : voir **Riodine** ; mêmes applications, *action lente et prolongée.*

**Indications.** — Artério-sclérose, cardio-sclérose, myocardites chroniques, hypertension. Emphysème pulmonaire, bronchites chroniques, asthme. Obésité, rhumatisme chronique, maladies spécifiques et dans tous les cas où la médication iodée ou iodurée est indiquée.

**Doses.** — En injections intraveineuses ou intramusculaires de 2, 3, 5 et 10 cc. suivant les cas.

Prix : 18 francs.

**LABORATOIRES P. ASTIER**

41, 42, 43 à 47, rue du Docteur-Blanche. PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## NÉOSPASMINE "VELY"

**Composition.** — Dragées glutinées à base de : Salicyl. Amidopyrine, Phénylethylmalonurée, Camphre brom., Extrait Crataegus, Extrait de Belladone, Extrait de Valériane.

**Indications.** — Régulateur neuro-végétatif, instabilité nerveuse, angoisse, éréthisme cardiaque, Nervosisme prémenstruel, Angor pectoris, spasmes vasculaires, Menstruations douloureuses. Déséquilibre du vague et du sympathique.

**Posologie.** — 1 à 3 dragées avant chacun des deux principaux repas, pendant 12 à 15 jours, et après un repos de 8 jours, nouvelle cure.

**Laboratoire des Produits Vely**

132, avenue Victor-Hugo — PARIS.

Tél. : Passy 87-85.

---

# NÉOTHORIUM MILLOT

## Traitement des MÉTRITES CHRONIQUES et des Ulcérations du Col.

Les sels de terres rares (Néodyme, Thorium, etc.) possèdent, en applications externes, de remarquables qualités antiseptiques, topiques et cicatrisantes.

Ces propriétés ont été mises à profit par divers auteurs (A. FROUIN, L. HUDELO, GUÉNOT, GRENET, DROUIN et MUFFAT), dans le pansement des plaies atones, et principalement dans le traitement des ulcérations du col de l'utérus, et des métrites chroniques.

Les sels de terres rares réalisent la médication idéale de ces affections, en effet :

Energiquement antiseptiques et antivirulents, ils amènent rapidement le tarissement de la suppuration.

Décongestionnants et astringents, ils suppriment en quelques jours les phénomènes douloureux et fluxionnaires.

Kératoplastiques, ils stimulent énergiquement la cicatrisation des ulcérations les plus tenaces.

Dépourvus de toute toxicité et de toute causticité, ils sont absolument inoffensifs.

Incolores et inodores, leur emploi est aussi discret qu'on peut le souhaiter à un traitement de ce genre.

Soucieux de rendre pratique cette intéressante médication, les LABORATOIRES MILLOT mettent à la disposition du Corps Médical les quatre préparations suivantes :

### Ovules Néothorium Millot.

*Métrites* : un tous les jours, puis tous les deux jours.

Prix médical : la boîte de 6 ovules : 9 francs.

### Crayons Néothorium Millot.

*Endométrites* : 2 à 3 par semaine.

Prix médical : la boîte de 8 crayons : 12 francs.

### Comprimés Néothorium Millot.

*Leucorrhée et Hygiène quotidienne* : 1 ou 2 dans de l'eau chaude en irrigation.

Prix médical : la boîte de 36 comprimés : 8 francs.

### Tampons Néothorium Millot.

*Ulcérations du col* : un tous les jours, puis tous les deux jours. Prix médical : la boîte de 6 tampons : 12 francs.

**Nota.** — Le prix médical ne peut être accordé qu'aux commandes adressées directement à nos Laboratoires.

### Laboratoires MILLOT

54, rue de la Bienfaisance — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

Tél. : Laborde 0-69.

## NÉO-TRÉPOL

Traitement de la syphilis par le bismuth métalloïdique pur.

Médication spirillicide intramusculaire dosée à environ 96 p. 100 de Bi élément en milieu aqueux isotonique. (Ampoules de 2 centimètres cubes.)

Adopté par le Ministère de l'Hygiène, l'Assistance et tous les services publics.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 20 fr.  
— 12 — : 36 fr.

Pour tous renseignements sur le mode d'emploi, la technique et la littérature de cette préparation, s'adresser aux

**Laboratoires pharmaceutiques**

**L.-G. TORAUDE, O. , I. ,**

Docteur en Pharmacie, Lauréat de l'Institut  
et de l'Académie de Médecine.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V<sup>e</sup>).

## NÉOTROPHÈNE

Tablettes au Chlorure de Magnésium d'un goût agréable.

**Composition.** — 0 gr. 20 de Chlorure de Magnésium cristallisé par tablette. Excipient : Q. S.

**Posologie.** — 6 tablettes en moyenne par jour, après les repas de préférence. Action laxative à jeun.

**Indications.** — Dermatoses, Eczéma en particulier, Prurits, Acné, Reconstituant très efficace dans les asthénies nerveuses. Facilite le travail. Convalescence. Cholagogue, régularise les fonctions digestives. Laxatif. Prophylactique du cancer. Nourriture de la cellule.

**Prix :** La boîte de 44 tablettes, 12 fr. 50.

« **Laboratoire de CHIMIE APPLIQUÉE DE  
NANTERRE** »

22, boulevard du Couchant — NANTERRE (Seine)

## NEPTAL

Hydroxymercuripropanolamide de l'acide orthoacétyloxybenzoïque.

Diurétique mercuriel peu toxique et d'action rapide. Les injections intramusculaires sont bien tolérées. Teneur en Hg : 0 gr. 035 par cc.

### *Indications :*

**Oligurie des affections cardio-rénales**  
**Œdèmes, Anasarque, Ascites, Épanchements pleuraux.**

*Posologie et mode d'emploi.* — Injection hebdomadaire du contenu d'une ampoule (1,5 cc.). En cas d'épanchement, ponction préalable. S'abstenir chez les cachectiques et les fébricitants.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
**« SPÉCIA »**

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## NERGINE HEUDEBERT

**Composition.** — La **Nergine** apporte le phosphore organique, les éléments minéraux combinés et les vitamines du germe de blé naturel et constitue un reminéralisant précieux et un stimulant des sécrétions glandulaires.

**Indications.** — A recommander aux enfants en voie de croissance et dans tous les troubles de la nutrition accompagnant les affections aiguës ou chroniques : neurasthénie, anémie, tuberculose, typhoïde, surmenage et convalescence.

Excellent complément des farines lactées préparées à l'eau.

**Mode d'emploi.** — Pour le nourrisson, délayer dans un peu de lait, à la dose de 1 à 2 cuillerées à café par jour. Pour les adultes, à prendre en plusieurs fois 4 à 6 fortes cuillerées à café par jour, dans une infusion tiède ou mélangée aux aliments habituels.

### **Produits de Régime HEUDEBERT**

85, rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine).

2 et 4, chemin Feuillat — LYON.

## NERVOCITHINE TISSOT

**Composition et formes.** — Ampoules, Dragées et Sirop.

*Ampoules de 2 cc. :*

Fluorure de sodium.....	0,001
Nucléinate de fer.....	0,02
Méthylarsinate de soude.....	0,03
Glycophosphate de soude.....	0,07
Sulfate de strychnine.....	0,001

*Dragées :* Mêmes composition avec addition de 0 gr. 05 de Nte de manganèse.

*Sirop :* Hémoglobine fraîche activée par sels organiques (très actif et bien supporté).

**Propriétés thérapeutiques.** — Sérum histogénique. Traitement reconstituant intensif le plus puissant.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes fatigues. Toutes anémies.

**Doses.** — 1 ou 2 ampoules par jour ; 1 ou 2 dragées à chaque repas.

**Laboratoire du Docteur TISSOT**  
34, boulevard de Clichy — PARIS.

## NESTOSYL

Association anesthésique par contact.

**Caractéristiques.** — Association d'éthers des séries phthalique et paraaminobenzoïque. Aucun produit des tableaux A et B. Antiseptique.

**Indications.** — Suppression infaillible et immédiate de la douleur ou démangeaison provoquée par les plaies, inflammations, irritations, éruptions, et, d'une façon générale, par toute affection qui a modifié l'intégrité de la peau, ou qui a son siège sur une muqueuse.

**Présentations.** — *Pommade au Nestosyl* (Voir à cette rubrique).

*Solution huileuse au Nestosyl* (Voir à cette rubrique)

*Suppositoires au Nestosyl* (Voir à cette rubrique).

**Laboratoires du NESTOSYL,**

P. BAUDE, Pharmacien,

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII<sup>e</sup>).

Tél. : Ségur 96-46. — Adr. télégr. : Nestosyl 27 PARIS

## NEUBRYNE

**Uricolytique, cholagogue, antithermique, analgésique.**

Acide phénylquinolique carbonique : 0 gr. 50 par cachet. Toxicité nulle sur le foie, le cœur et les reins.

**Dose :**

6 à 8 cachets par jour *au milieu des repas.*

**Indications.** — Toutes manifestations de la Goutte (Arthrites inflammatoires, Rhinites, Entérite gouteuse), Tophi, Arthrites déformantes, Mialgies, Rhumatisme aigu et chronique de toute origine (infectieux, blennorragique, a frigore, etc.), Lumbago, Névralgies, Myalgies, Sciatique, Coliques néphrétiques et hépatiques, Insuffisance hépatique, Uricémie, Glycémie, Glycosurie, Erythème noueux, Urémie, Dermatoses avec prurit, Infection puerpérale, Grippe, Hyperthermies, Néphrites, Cystites, Syndrome entéro-rénal.

**CLERAMBOURG-D<sup>r</sup> BRUNERYE**

10, rue Saint-Antoine — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## NEURÈNE

**Solution et Comprimés.**

Bornéol soluble, principe actif inodore de la valériane associée au principe actif antispasmodique du serpolet.

**Doses et mode d'emploi.**

Le Neurène, Valériane + Serpolet, se présente sous deux formes :

1<sup>o</sup> La *solution*, aromatisée au parfum de pêche, agréable à prendre.

*Adultes* : 3 à 6 cuillerées à café, prises en 3 fois, entre les repas, dans un peu d'eau sucrée froide.

*Enfants* : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

2<sup>o</sup> Les *comprimés* : 3 à 6 comprimés par jour. Avaler chaque comprimé avec une gorgée de liquide. Ni sucrer, ni croquer.

Chaque comprimé représente la valeur exacte, en principes actifs, d'une cuillerée à café de la solution.

**Propriétés thérapeutiques :**

Toutes les affections nerveuses.

**Laboratoires A. DANIEL-BRUNET**

8, rue de la Source — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Tél. : Auteuil 11-86.

## NEURÉOL

**Présentation et composition.** — Association soluble de Véronal, Pyramilon, Valériane, Cratægus, Extrait de Coca.

**Propriétés thérapeutiques.** — Analgésique, antispasmodique, sédatif et hypnotique.

**Avantages.** — En solution aqueuse, bien toléré, pas d'accoutumance, aucune action nuisible sur le cœur, les reins, la mémoire.

**Posologie et mode d'emploi.** — Deux cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée, avant le dîner ou de se coucher.

Prix : 14 francs.

**Laboratoires LAFARGE**  
6, boulevard Arago — PARIS.

---

## NEURINASE

Solution ou comprimés à base de Valériane fraîche renforcée par une faible dose de Diéthylmalonylurée soluble. Renferme 0 gr. 15 de Diéthylmalonylurée pure par comprimé ou cuillerée à café de solution.

**A. Dose et mode d'emploi.** — 1° Sédatif : 1 cuill. à café, ou 1 comprimé matin et soir dans de l'eau sucrée. — 2° Hypnotique : de 1 à 4 cuill. à café ou de 1 à 4 comprimés le soir au coucher. Enfants : 1/2 dose.

**B. Propriétés thérapeutiques.** — Régulateur du système nerveux contre Insomnies, Mélancolie, Hystérie, Troubles névropathiques de la Ménopause, Maladies de Basedow, Tics, Délires toxiques, Palpitations, Surmenage, Prurit, etc.  
Contre-indication : Néant.

Prix : Solution : 16 fr. — Comprimés : 10 fr.

**Laboratoire A. GENEVRIER**  
45, rue du Marché — NEUILLY-PARIS.



## NEUROBORE

**PUR.** — *Solution.*

**Composition.** — Solution inaltérable de tartrate borico-potassique pur. — 1 gr. par cuill. à café.

**Prop. therap.** — Spécifique des affections nerveuses. Calmant antispasmodique.

**Indications thérapeutiques.** — Agitation, Insomnies, Convulsions, Troubles névropathiques, Epilepsie, etc.

**G. ASSOCIÉ.** — *Cachets.*

**Composition.** — Tartrate borico-potassique, 1 gr. Phényléthyl-malonylurée, 0,05 ; correctif, par cachets.

*Médication d'Attaque.*

Après effet obtenu, substituer le *Neurobore pur*.

**Laboratoire E. BOUTEILLE**

23, rue des Moines — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## NEUROCALCIUM

**Présentation.** — Sirop aromatisé agréable au goût.

**Composition.** — Associe aux vertus sédatives connues depuis longtemps du Bromure de Calcium, les qualités antispasmodiques plus récemment mises en évidence du Chlorure de Calcium.

**Indications.** — Toutes les excitations nerveuses, spasmophilie, troubles de la dentition, convulsions, insomnies.

Formule { Chlorure de Calcium. 0,10 } par cuille-  
{ Bromure de Calcium. 0,05 } rée à café.

**Posologie.** — Nouveau-nés : 2 cuillerées à café par jour.

Près 1 an : 2 à 5 cuillerées à café par jour.

**Laboratoires Biologiques de l'Île-de-France**

3, rue Laugier — ARGENTEUIL (Seine-et-Oise).

# NEURO-MOKA

CAFÉ TONIQUE  
DÉCAFÉINÉ ET VITAMINÉ

POUR

NERVEUX — CARDIAQUES — RÉNAUX  
DÉPRIMÉS HYPERSENSIBLES

PRODUIT MEDICINAL FRANÇAIS

**MOKA DE CHOIX EN GRAINS TORRÉFIÉS**

*exempt de toute autre variété de café*

**REMARQUABLE PAR SON AROME**

CONSTITUTION

GRAINS NATURELS DU CAFÉIER  
chimiquement décaféinés à l'état vert  
et rationnellement vitaminés après torréfaction  
par imprégnation cellulaire de  
vitamines hydrosolubles d'origine végétale

**LE NEURO-MOKA N'EST PAS UN ERSATZ**

LIMITE DE DÉCAFÉINATION

La décaféination du « Neuro-Moka », réalisée par un procédé chimique industriel tout à fait spécial, est poussée jusqu'à l'*extrême limite d'épuisement possible* de la caféine à l'aide de meilleurs solvants de cet alcaloïde choisis absolument inoffensifs pour l'organisme et complètement éliminés des grains avant la torréfaction.

La *caféine résiduelle* contenue dans les grains non torréfiés de « Neuro-Moka » représente environ 2 à 4 p. 100 en poids de la *caféine initiale* trouvée dans les mêmes grains avant la décaféination, soit 0 gr. 02 à 0 gr. 04 de *caféine résiduelle* pour un gramme de *caféine initiale*.

*Remarque importante.* — Une tasse d'infusion de « Neuro-Moka » contient au maximum 0 gr. 005 de caféine (dose médicalement négligeable).

VITAMINES DU NEURO-MOKA

Les grains de « Neuro-Moka » sont très sensiblement plus riches en vitamines que ceux des meilleures céréales.

Deux séries de Vitamines sont à considérer dans le « Neuro-Moka ».

- 1° Les vitamines développées avec les germes des grains en partie détruites par la torréfaction opérée à une température voisine de 200 degrés.
- 2° Les vitamines d'imprégnation cellulaire des grains, toutes solubles dans l'eau et d'origine végétale.

**PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES****FAVORISE LA DIGESTION ET L'ASSIMILATION**

= conséquence du rôle des vitamines dans l'économie =  
par

action excito-sécrétoire sur les glandes exocrines  
(salivaires, gastriques, pancréatique, intestinales)  
et

action excito-motrice sur l'appareil digestif.

**TONIFIE L'ORGANISME TOUT ENTIER****INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES**

Asthénies digestives, physiques, psychiques  
et multiples cas où la caféine nuit à la santé.

**AVANTAGES****DÉNUÉ DE TOUTE ACTION EXCITANTE ÉLECTIVE**

sur le système nerveux, le cœur et les reins.

Aucune crainte de CAFÉISME aigu ou chronique.

Peut être donné aux jeunes enfants et aux vieillards.

**PRÉSENTATION**

délivré

**SOUS LA SEULE FORME DE GRAINS TORRÉFIÉS**

en flacons de verre à fermeture hermétique

en vue d'une très longue conservation en tous lieux.

**MODE D'EMPLOI ET DOSES**

Se prend en infusions chaudes très agréables au goût  
préparées à l'aide de filtres ordinaires aux doses de  
2 à 3 cuillerées à café de Neuro-Moka moulu par tasse.

**PRIX DE VENTE IMPOSÉ**

Le flacon : 30 fr.  
(modèle unique).

**LABORATOIRE DU 'MIGELLIODE**

Produits médicinaux spécialisés.

Fabrication française.

A. ROLLAND, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
31, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (IV<sup>e</sup>).

**DÉPOT GÉNÉRAL**

Service commercial,

—

Service médical,

88, rue de la Villette — PARIS (XIX<sup>e</sup>).

Tél. : Botzaris 34-32.

## NEUROPLASMA FORT

**Composition.** — *Ampoules de 1 cc.*

Cacodylate de soude .....	} aa 0.0025
— de magnésie .....	
Glycérophos. de soude .....	
Caféine .....	0.01
Cacodylate de strychnine....	0.0005

**Indications.** — Neurasthénie. Dépression physique. Convalescences. Asthénie. Faiblesse circulatoire.

**Avantages.** — Piqûre indolore. Synergie pharmacologique.

**Doses.** — Une ampoule tous les deux jours.

**Emploi.** — Injection sous-cutanée ou, de préférence, intramusculaire.

Prix : 15 fr.

**MICHEL DELALANDE**

16, rue Henri-Regnault  
COURBEVOIE (Seine).

## NEUROPLASMA MASSIF

**Composition.** — *Ampoules de 5 cc. contenant* cacodylate de soude, 0,25 ; cacodylate de magnésie, 0 05 ; glycérophosphate de soude, 0,10 ; caféine, 0,01 ; cacodylate de strychnine, 1/2 milligr.

**Indications.** — Etats cachectiques, convalescences, tuberculose et prétuberculose, anémie, etc.

**Avantages.** — Piqûre indolore. Tonique immédiat, relèvement rapide du malade.

**Doses.** — Une ampoule tous les 2 jours ; après un repos de huit jours une nouvelle série de 12 ampoules.

**Emploi.** — Injection intramusculaire.

Prix : 20 fr.

**MICHEL DELALANDE**

16, rue Henri-Regnault  
COURBEVOIE (Seine).

## NEUROPLASMINE FORT

**Composition.** — Pour une ampoule de 1cc. Méthylarsinate de fer, 0,0125 ; cacodylate de soude 0,025 ; Glycérophosphate de soude, 0,05.

**Indications.** — Chloro-anémie, Névrose et insomnies nerveuses. Surmenage. Entraînement sportif. Suites opératoires et anémies post-hémorragiques. Troubles de la circulation.

**Doses.** — Une ampoule tous les jours pendant les 6 premiers jours, puis une tous les deux jours pour la fin de la série.

**Emploi.** — Injection *intramusculaire* de préférence.

Prix : 15 fr.

**MICHEL DELALANDE**

16, rue Henri-Regnault  
COURBEVOIE (Seine).

---

## NEUROPOL

**Composition.** — Glycérophosphate de Calcium, Fer et Magnésie associés au Nucléinate de Manganèse et à des extraits opothérapiques nécessaires pour assurer la fixation des éléments minéraux et rétablir le jeu normal des fonctions endocriniennes.

**Propriétés thérapeutiques.** — Tonique, reconstituant protecteur de la cellule nerveuse. Mordance du tissu nerveux, lors des traitements hydrargyriques, bismuthiques et arsenicaux.

**Présentation.** — Comprimés solubles.

Deux formes :

Sexe masculin (testicule), — Sexe féminin (ovaire)

**Indications** — Toutes les dépressions, déminéralisation, maladies nerveuses, impuissance, amenorrhée, rachitisme, pré tuberculose, frigidité, tétanie.

**Doses.** — 3 à 9 comprimés par jour.

**Laboratoire R. FAURE**

80, rue du Rocher — PARIS.

## NEUROSINE PRUNIER

(*Phospho-Glycérate de Chaux, Procédé G. Prunier*).

**Propriétés thérapeutiques.** — Reconstituant du Système nerveux.

**Mode de présentation.** — La « Neurosine Prunier » est présentée sous trois formes : granulé, cachets, sirop.

**Indications.** — Neurasthénie, Phosphaturie, Rachitisme, Débilité, Surmenage, etc.

**Posologie.** — 2 à 3 cuillerées à café par jour de granulé ; 2 à 3 cachets par jour ; 2 à 3 cuillerées à bouche par jour de sirop. Chaque cuillerée à café de granulé, chaque cachet et chaque cuillerée à bouche de sirop contiennent 0 gr. 30 de Glycérophosphate de chaux (Procédé G. Prunier).

**Dépôtaires généraux :**

**CHASSAING, LE COQ et C<sup>ie</sup>**

(Anc. Maison Chassaing-Prunier)

1, quai Aulaguier — ASNIÈRES (Seine).

## NEUROTROL

(Sérum neurotrophique).

Médication strychno-cacodylique.

**Composition.** — Cacodylate soude : 0,05 ; glycérophosphate soude : 0,10 ; cacodylate strychnine : 0,001 ; sérum isotonique : Q. S. p. 1 cc.

**Indications.** — Asthénie, Neurasthénie, Dépression nerveuse, Diabète, Prétuberculose, Paludisme, Convalescence.

**Doses.** — *Deux formes.*

1° En ampoules de 1 cc. ; 1 à 3 injections sous-cutanées par jour et progressivement. Les injections sont *absolument indolores*. — 18 francs la boîte de 12 ampoules.

2° En gouttes : de XX à LX gouttes par jour et progressivement. — 15 francs le flacon.

**Laboratoires ABADIE-TANZI**

8, Place Intérieure Saint-Michel — TOULOUSE  
(Haute-Garonne). — Tél. : 1306.

## NEUROTROPHOL BYLA

*Elixir, Granulé, Dragées.*

A base de nucléorquine Byla, d'acide nucléinique, de glycérophosphate de soude et de méthylarsinate disodique.

**Doses et mode d'emploi.** — *Elixir* : 1 verre à liqueur *après* chaque repas, pour les adultes ; 1 cuillerée à dessert ou à café pour les enfants.

*Granulé* : 1 cuillerée à bouche *avant* chaque repas, pour les adultes ; 1 cuillerée à café pour les enfants.

*Dragées* : Adultes : 4 à 8. Enfants : 2 à 4 par jour,

**Propriétés thérapeutiques.** — Tonique neuromusculaire. Excitant de la nutrition.

**Indications.** — Neurasthénie, Surmenage, Dépression, Sénilité, Asthénie musculaire, Epuisement, Psychoses génitales, Chlorose.

**Les Établissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

---

## NEUTRALCAOL

### Composition.

15 0/0 de carbonate de bismuth chimiquement pur.

10 0/0 de Magnésie hydratée chimiquement pure.

10 0/0 de Talc flotté électrolytique.

65 0/0 de Kaolin colloïdal.

**Avantages.** — *Le plus efficace des pansements gastriques bismuthés. Le plus facile à prescrire parce que meilleur marché qu'une prescription.*

**Indications.** — Traitement type du syndrome hyperchlorhydrique (régurgitations acides, brûlures, douleurs, vomissements, sialorrhée, flatulences, etc.).

Aérophagie, Ulcus de l'estomac, du pylore et du duodénum.

**Prix :** la boîte : 15 fr., contient 100 gr. de poudre, soit 12 à 15 jours de traitement.

**Laboratoires BENDERITTER et C<sup>ie</sup>**  
VENDOME (Loir-et-Cher).



# NEUTRALISINE BUREAU

**Poudre de saturation  
de l'Office antituberculeux.**

Antigastralgique et antidyspeptique, la Neutralisine donne un soulagement rapide : elle sature l'hyperacidité, sans donner naissance à des produits de transformation nuisibles à l'estomac.

## **Composition :**

Sous-carbonate de bismuth .....	0 gr. 60
Bi-carbonate de soude.....	0 gr. 40
Silicate alumine.....	1 gr.
Silicate magnésie.....	1 gr.
Carbonate de chaux.....	2 gr.
Cacao en poudre.....	1 gr.
Miel et Sucre pour 10 comprimés.	

**Posologie.** — Croquer ou sucer **2 à 4 comprimés** après les repas, matin, midi et soir, suivant avis du Médecin.

**Laboratoires des Produits J. BUREAU,  
Louis LAURIN**  
86, boulevard Port-Royal — PARIS.

---

## NEVORAL RAFEY

Le NÉVORAL est parfaitement toléré par les estomacs délicats ; c'est en même temps un fortifiant, un tonique et un fébrifuge. Il ne contient aucun composé ou dérivé de l'opium, ni aucun hypnotique. Les actions des divers produits pharmaceutiques qui le composent se multipliant l'une par l'autre lui donnent un pouvoir thérapeutique considérable, quelles que soient l'origine et la cause de la douleur.

**Indications thérapeutiques.** — Névralgies, Rhumatismes, Migraines, Maux de tête et de dents, Courbatures, Fièvre grippale, Sciatique, Lumbago, Zona.

Le **NEVORAL** supprime la douleur, tandis que d'autres médicaments ne font que l'endormir.

**Dose et mode d'emploi.** — Adultes, 1, 2 ou 3 cachets par jour. Si 1 cachet n'a pas suffi en prendre un second 1 heure après le premier. Enfants, le  $\frac{1}{4}$ , le  $\frac{1}{3}$  ou la moitié du contenu d'un cachet à prendre dans un liquide sucré, de la confiture ou du miel.

La boîte de 12 cachets : 9 francs.

Dépôt général :

**Laboratoires RAFEY**

**Raoul FEIGNOUX, pharm. 1<sup>re</sup> classe**

95, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

## NÉVRALGOL BROSSARD

(Cachets).

Analgésiques — Antithermiques — Fébrifuges.

**Indications.** — Grippe. Toutes Névralgies : faciales, dentaires, stomacales, oculaires, intercostales, utérines, sciatiques. Rhumatismes. Migraines.

**Doses et mode d'emploi.** — Un à trois cachets par 24 heures pour les adultes.

Prix : 9 fr. la boîte de 12 cachets.

4 fr. 70 la boîte de 6 cachets.

0 fr. 80 le cachet.

Laboratoire **SOENEN et BROSSARD**  
**CORNAUD et BROSSARD, Successeurs.**  
1, rue des Cordouans — LA ROCHELLE.  
Echantillons sur demande des Docteurs.

---

## NEVROSAN

Sédatif du système nerveux.

Action élective sur le système *neuro-végétatif*.

**Composition.** — Teinture de Cratœgus, Passiflore, Alcoolature de ballote.

**Action.** — L'action bien connue du Cratœgus et de la Passiflore est renforcée par la Ballote (antispasmodique à action principalement sur l'irritabilité neuro-végétative).

**Indications.** — Insomnies nerveuses, Troubles nerveux de la vie génitale, Etats spasmodiques, Troubles fonctionnels du cœur, Psychoses fonctionnelles, etc.

**Doses.** — Action sédative : LX gouttes le soir au coucher. Action antispasmodique : XX gouttes 3 fois par jour avant les repas, dans un verre à vin d'eau pure ou sucrée.

**Pharmacie Centrale de Belgique. S. A**  
12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

## NEVROSOL

Traitement spécifique de la *douleur et de la fièvre*.  
Anti-grippal.

**Composition.** — Association rationnelle de :

Phényl-Diméthyl aminopyrazolone ; Phénacétine ;  
Chlorhydrate de quinine ; Triméthyl Dioxypurine.

**Indications.** — Névralgies de toutes natures. Ondal-  
gies, Migraines, Céphalée de la grippe et des états fébri-  
les, Courbatures, Douleurs rhumatoïdes, Sciatique,  
Lumbago, Zona, Goutte, etc.

**Avantages.** — Ne déprime pas, ne fatigue pas l'estomac,  
ni le rein. Son emploi prolongé est inoffensif.

**Posologie.** — 1 ou 2 cachets, à une heure d'intervalle,  
dans les accès de névralgie, de migraine, de maux de  
dents.

2 à 3 cachets par jour et pendant plusieurs jours dans  
les affections douloureuses fébriles.

Prix au public (10 cachets) : 8 fr. 50.

**LABORATOIRE CHIMICO-  
THERAPIQUE DE PARIS**

12, rue des Apennins — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Téléphone : Marcadet 20-28.

## NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

A base de Glycérophosphates cérébraux alcalins.

**Forme.** — Gouttes concentrées, sans sucre, chaux,  
alcool, arsenic, ni strychnine ; 20 gouttes = 0,40 cgr.  
de glycéro-phosphate composé à base de soude,  
de potasse et de magnésie. Noter l'intérêt de la  
base magnésie confirmé par de récents travaux.

**Dose.** — XV à XX gouttes à chaque repas dans le  
premier verre de boisson, sans interruption néces-  
saire jusqu'à effet obtenu.

**Propriétés.** — Reconstituant rationnel par suite  
de sa composition qui est celle même des Tissus  
nerveux. Aucune contre-indication.

**Indications.** — Neurasthénie, Paralysie générale,  
Dépression et Fatigue nerveuses, Surmenage,  
Anémie cérébrale, Vertiges, Convalescence, etc.

**Laboratoire FREYSSINGE**

6, rue Abel — PARIS.

## NIGÉRINE VINCENT

*Charbon médicinal de haut pouvoir adsorbant.*

Fixateur par excellence des toxines  
et alcaloïdes.

**Forme.** — Poudre noire sans odeur ni  
saveur.

**Indications.** — Diarrhées, gastro-entérites  
aiguës et chroniques, intoxications d'ori-  
gine gastro-intestinale, empoisonnements.

**Doses.** — 3 cuillerées à café par jour entre  
les repas dans un peu d'eau. — Dans les  
empoisonnements, 3 fortes cuillerées à  
soupe en une ou plusieurs fois.

**VINCENT, pharmacien,**  
14, avenue Mac-Mahon — PARIS.

---

## NISAMELINE de TROUETTE-PERRET

Préparation à base d'extrait de Guaco ; doit être employée « INTUS et EXTRA » — action physiologique, à l'intérieur sur les centres nerveux sensitifs et sur la sécrétion rénale ; à l'extérieur sur les terminaisons des nerfs de la sensibilité générale.

**Indications.** — Prurits, Dermatoses, Névralgies.

### *Traitement interne :*

**Pilules** Nisaméline TROUETTE-PERRET (0 gr. 10 extrait de Guaco). 2 à 5 pilules à chacun des deux repas. Prix : 16 fr.

**Sirop** Nisaméline TROUETTE-PERRET (0 gr. 20 extrait de Guaco). 1 à 2 cuillerées à soupe à chacun des deux repas. Prix au public : 20 fr.

### *Traitement externe :*

**Poudre** Nisaméline TROUETTE-PERRET. 1/2 flacons ou 1 flacon, pour un grand bain. — 1 à 4 cuillerées à café pour 1/2 litre d'eau froide ou tiède, pour lotions, compresses, etc. Prix : 16 fr.

**Pommade** Nisaméline TROUETTE-PERRET. Prix : 10 fr.

En onctions pour prurits et dermatoses localisés.

**Savon** Nisaméline TROUETTE-PERRET. Prix : 5 fr.

Pour lavages et soins hygiéniques,

Bien spécifier : **NISAMÉLINE**  
« **TROUETTE-PERRET** » pour avoir le véritable Guaco.

**Laboratoires TROUETTE-PERRET**

15, rue des Immeubles-Industriels — PARIS  
(XI<sup>e</sup>).

## NITIUM BUISSON

Bromure de radium suractivé enrichi  
en rayonnement alpha.

### **Crayon.**

Traitement des métrites chroniques et hémorragiques.  
Curettage médical.

### **Ovules.**

Vaginites, Ulcérations du col.

### **Pommades.**

Pommade A : Dermatoses, Bartholinites, Chancres mous, Lupus érythémateux, ulcérations diverses, ulcère variqueux, herpès génital, ulcères de la cornée.

Pommade B : Ulcérations étendues et infectées, ulcères variqueux rebelles.

### **Bougie : Urétrites chroniques.**

Chaque crayon, ovule, bougie ou tube de pommade contient 6 microgrammes de bromure de radium suractivé.

Prix de vente au public : 33 fr.

Prix médical : 22 fr. 30

Sous quelque forme que ce soit.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

*Pierre BRÉTEAU, Pharmacien*

Membre de l'Académie de Médecine  
157, rue de Sèvres — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## NITROYL LEISYN INJECTABLE

Symbiose de sels de terres rares  
traités photolytiquement.

### **Présentation :**

Ampoules pour injections hypodermiques et intramusculaires, en nombre proportionné au volume des articulations (Hanche, Creux cotyloïde, 4 à 6. — Epaule, Genou, Malléoles, 4. — Coude, Poignet, 3. — Phalanges, 1 à 2. — par 24 heures).

### **Indications :**

Rhumatismes aigus et chroniques, articulaires et musculaires, Ankyloses, Arthrites, Sciatiques, Lumbagos, etc., etc... Amène la disparition extrêmement rapide de la douleur et des phénomènes morbides ainsi que la réapparition de la liberté des mouvements.

**Les Laboratoires LEISYN**

1 bis, rue Molitor — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## NOCTISÉDYL

(Cachets.)

Spécifique de l'Insomnie

### Composition :

Intrails de valériane et d'anémone stabilisés, pyramidon, ac. diéthylbarbiturique, théobromine (procédé spécial de conservation).

### Avantages :

Agit efficacement sur les *causes* habituelles de l'insomnie (nervosisme-algies) en associant les effets sédatifs et antispasmodiques immédiats des *intrails*, à une action hypnotique mésodiencéphalitique s'exerçant à faible dose.

La *théobromine* assure la parfaite tolérance pour le rein, et permet, de plus, une *élimination rapide* de l'hypnogène.

### Indications :

Insomnies relevant de la douleur ou d'un état nerveux (Ethylisme, tabagisme, états anxieux, surmenage, etc.).

### Posologie :

Un cachet le soir au coucher ; 2 cachets dans les cas rebelles.

---

**PAUL AUGIER, Pharmacien**

Ex-Interne des hôpitaux de Paris

2-4, rue des Lombards — PARIS (IV<sup>e</sup>).



## **NORMACOL**

**Mucilage Évacuant  
puissant, facile à ingérer, actif.**

Possède toutes les propriétés à exiger d'un mucilage thérapeutique : pureté, pouvoir de gonflement considérable, infermentescible, inassimilable, extrême division (les grains restant indépendants même après gonflement), ingestion facile, presque agréable.

**Action.** — Laxatif mécanique.

Augmente le volume du contenu intestinal.

S'oppose à sa dessiccation excessive.

Rend sa surface onctueuse et glissante.

**Forme.** — Granulé dragéifié très menu.

**Dose (moyenne).** — 1 à 2 cuillerées à café après les repas.

### **Différentes préparations :**

Normacol (ordinaire) : avec bourdaine (constipés habituels).

Normacol pur : sans bourdaine (entéritiques, diarrhéiques).

Normacol sans sucre : avec bourdaine (diabétiques).

Normacol atropiné : Voir SPASMACOL.

### **Laboratoires NORGAN**

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien.

41, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>). Tél. Laborde 08-00.

---

## **NORMALARINE**

### **Traitement Phytothérapique de la constipation.**

#### **Composition :**

A base de sons exotiques traités selon la technique du professeur H. Salomon, de Buenos-Aires.

#### **Action :**

Augmente le bol fécal, et favorise le péristaltisme intestinal.

#### **Indications :**

Constipation, Atonie du tube digestif, Ictères catarrhaux.

#### **Avantages :**

**Sans aucun laxatif.**

**Sans accoutumance.**

**Ne fait pas engraisser.**

**N'irrite pas l'intestin.**

#### **Posologie :**

Dose maxima journalière : 6 à 8 cuillerées à soupe par jour (2 cuillerées à soupe par chaque prise).

**Laboratoires DEPRUNEAUX**

18, rue de Beaune — PARIS (VII<sup>e</sup>).

## NOVACÈTINE PRUNIER

(Saccharure à base de Sulfosalicylate de Pipérazine, Lithine et Soude).

**Antiarthritique énergique  
agréable à prendre.**

Indiqué contre les manifestations rhumatismales et gouteuses de l'arthritisme.

**Posologie.** — 3 à 4 cuillerées à café par jour (suivant les cas et l'avis du médecin), à prendre au moment des repas, dissoutes dans un peu d'eau.

Chaque cuillerée à café contient 0 gr. 30 de sulfosalicylate composé.

Dépositaires généraux :

**CHASSAING, LE COQ et C<sup>ie</sup>**

(Ancienne maison Chassaing-Prunier)

1, quai Aulagnier — ASNIÈRES (Seine).

---

## NOVANOL JACQUES MIDY

(Nouveauté 1931)

**Composition.** — Complexe électrocolloïdal trimétallique (Argent, Or, cuivre) ; Stabilisé par un balsamique qui le rend non irritant. Anti-infectieux, bactéricide, cicatrisant, antislérosant.

**Indications.** — *Traitement local externe* des urétrites infectieuses et en particulier des urétrites gonococciques.

1° *Traitement abortif* de la blennorragie (3 injections par jour).

2° *Traitement de la blennorragie confirmée* : traitement d'attaque (urétrite antérieure sans urétrite postérieure), traitement de complément associé aux lavages (dans le cas d'urétrite postérieure ou d'urétrocystite).

3° *Traitement de remplacement* lorsqu'il y a épидидymite, et qu'il faut cesser les grands lavages.

**Présentation.** — Boîte de 8 ampoules de 5 cc. — 1 ampoule = 1 injection urétrale. Chaque boîte contient une seringue spéciale et un godet pour transvasement du contenu des ampoules.

**Prescrire.** — 1, 2 ou 3 injections par jour, suivant le cas.

**Etablissements Pharmaceutiques**

**JACQUES MIDY**

41, rue de Courbevoie — LA GARENNE (Seine).

Tél. : Charlebourg 09-80.

## NOVARGYRE

Ampoules Guillaumin  
à l'oxycyanure d'hydrargyre indolore.

**Composition.** — Les ampoules de Novargyre contiennent : Oxycyanure d'hydrargyre : 1 centigr. ; Stovaïne : 1 centigr. ; Eau distillée : 1 cm. cube.

**Propriétés.** — Solution très stable, rigoureusement dosée, neutre, indolore, ne coagulant pas les albuminoïdes, d'une action très prompte et très sûre.

**Indications.** — Accidents syphilitiques.

**Mode d'emploi.** — Injections intramusculaires tous les 2 jours de 1 à 2 cc. selon l'intensité de la maladie ou la susceptibilité du sujet. Faire 8 à 12 injections et laisser reposer le malade pendant 1 ou 2 semaines. Renouveler ensuite le traitement s'il est nécessaire.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN**  
13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

## NOVARSENOBENZOL BILLON

Dioxydiaminoarsénobenzol méthylène  
sulfoxylate de soude.

Teneur en arsenic : 20 p. 100.

Donne avec l'eau distillée des solutions *neutres* injectables exclusivement par voie veineuse.

*Indications :*

**Syphilis, Symbioses fuso-spirillaires, Pian, Protozooses, Charbon, Sodoku.**

**Posologie et mode d'emploi :** — Séries d'injections intraveineuses graduées : 0 gr. 15 à 0 gr. 90. Applications en poudre ou collutoire comme topique local.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## NOVIODE

Comprimés dégageant *en solution aqueuse* 0 gr. 025 d'Iode naissant, entièrement dissous.

**Indications thérapeutiques.** — Tous usages de l'iode, Antisepsie générale, Accélération des cicatrisations, traitement curatif des plaies infectées, Préparation des champs opératoires, Chirurgie stomatologique, Injections vaginales, Révulsions, Gargarismes. etc. Stérilisation des eaux et tous usages internes de l'iode.

**Posologie et Mode d'emploi.** — Voir notice. La boîte de 2 tubes de chacun 20 comprimés, soit 40 comprimés : 12 francs.

**Laboratoire SALVOXYL**

237, rue Lafayette — PARIS (X<sup>e</sup>).

Tél. : Nord 78-07.

## NOVO-BROL

Bouillon bromuré en tablettes, avec addition de lupulin et de phosphates.  
(Bromure non spécifié.)

*Préparation et marque absolument françaises.*

Le Novo-Brol est le *seul produit utilisant* les remarquables *vertus* calmantes du *lupulin* (extr. du houblon) associé au bromure (A.-C. Guillaume et H. Leclerc).

Les phosphates du Novo-Brol entretiennent l'élément nutritif du noyau cellulaire, toujours déphosphatisé chez les névropathes.

**Indications.** — Hyperexcitabilité morale ou physique, crises nerveuses et syndrome sympathicotonique.

**Mode d'emploi et dose.** — Verser la valeur d'une tasse d'eau bouillante sur les tablettes de Novo-Brol pour obtenir un bouillon que l'on absorbe bien chaud, tel quel, ou mélangé à l'alimentation habituelle.

Na Br chim. pur 1 gr. par tablette.

Dose normale : 1 à 3 tablettes par jour.

Dose forte : 3 à 6 tablettes par jour.

Enfants nerveux : 1 à 2 tablettes (suivant l'âge).

(Enveloppement spécial des tablettes Novo-Brol dans aluminium ou étain paraffiné — dépôt de garantie.)

**Laboratoires A. DANIEL-BRUNET**

8, rue de la Source — PARIS (XVI<sup>e</sup>). Tél. : Auteuil 11-86.

## NOVOLACTOL DAGUIN

**Forme.** — Granulé agréable pour les enfants.

**Composition.** — Papaine extractive, Benzo-naphtol, Ferments lactiques, Magnésie hydratée.

**Dose.** — *Nourrissons* : 3 demi-cuillerées à café délayées dans un peu d'eau dans l'intervalle des tétées.

*Enfants de 2 à 3 ans* : 3 cuillerées à café dans l'intervalle des repas.

*Enfants de 5 à 12 ans* : 3 cuillerées à dessert.

**Indications.** — Affections gastro-intestinales et gastro-entérites des nourrissons. Intoxication alimentaire.

**Etablissements DAGUIN**  
SAINT-MAUR (Seine).

---

## NUCLÉARSITOL ROBIN

Association de la combinaison nucléo-phosphatée avec le méthylarsinate de soude, méthylarsiné.

Comprimés. Ampoules injectables.

**Doses et mode d'emploi.** — Adultes : 4 à 6 comprimés ou 1 à 2 injections hypodermiques par 24 heures.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antituberculeux. Reconstituant puissant.

**Indications.** — Cachexie des pays chauds, fièvres paludéennes, syphilis, tuberculose, scrofule, lymphatisme.

**Laboratoires M. ROBIN**  
13, rue de Poissy — PARIS.

## NUCLÉASINE

**Composition.** — Iode, Phosphore, Arsenic organique directement assimilables. Extrait hépatique, Vitamine.

**Propriétés.** — Excitant du métabolisme général. Reconstituant puissant.

**Indications.** — Croissance, Amaigrissement, Anémie, Dépression nerveuse, Surmenage, Fatigabilité.

**Doses.** — Une cuillerée à café à la fin des repas.

Le flacon de granulé : 16 francs.

**Laboratoire E. VERGELOT**

163, rue de Flandre — PARIS (XIX<sup>e</sup>).

## NUCLÉATOL ROBIN

Combinaison de glycérophosphates et d'acide nucléinique.

**Granulé :** glycérophosphate de chaux et de soude et acide nucléinique.

**Injectable :** glycérophosphate de soude pur et acide nucléinique.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes :* 4 à 6 cuillerées-mesures de granulé aux repas ou 1 ou 2 ampoules en injection par 24 heures.

**Propriétés thérapeutiques.** — Exaltant de la Phagocytose, abaisse la température en quelques heures. Effets analogues à ceux des ferments métalliques ou des colloïdes.

**Indications.** — S'emploie dans les convalescences, les débilités, les cachexies ; provoque la défervescence dans les fièvres infectieuses, puerpérales, érysipèles, typhoïdes, etc. ; s'emploie aussi préventivement dans les opérations chirurgicales.

**Laboratoires M. ROBIN**

13, rue de Poissy — PARIS.

## NUCLÉIGÈNE

Chevillon

Puissant reconstituant général.

Deux formes : €

- 1° **Granulé irradié.** — Ergostérine irradiée, Vitamine D, Nucléinates Soude et Manganèse, Glycéro de chaux Arrhéna, Ext. de Kola et vanille ; 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 18 fr.

Prescrire : Nucléigène irradié granulé.

- 2° **Elixir.** — Acide nucléinique, Arrhéna, Glycéros, Muscat, Vanilline.

Prix : 15 fr.

**Indications.** — Prétuberculose, Tuberculose, Rachitisme, Anémies.

**Laboratoire CHEVILLON**

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-Oise).

## NUCLÉOPHORINE

Reconstituant, Accélérateur de la Nutrition.

**Composition.** — Nucléinate de soude, phosphate disodique, Méthylarsinate Na, Maté, Kola, Essence spéciale.

**Indications.** — Neurasthénie, Lymphatisme, Bronchites chroniques, Convalescence de Grippe et de Maladies infectieuses.

**Formes.** — Elixir.

**Dosés :**

*Adultes :* 2 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants :* 2 cuillerées à café par jour.

Prix : 15 francs.

**Laboratoire Moderne**  
**d'Opothérapie et Biologie Médicale**  
 40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE.



## NUCLHÉMOSE

Ampoules et granulé au  
**Nucléinate de Manganèse.**

**Action.** — Hyperleucocytose, Accélération des échanges, Reprise de poids, Augmentation de la résistance organique, Reminéralisation.

**Indications.** — Anémie, Prétuberculose, Puberté, Paludisme, Chlorose, Déchéances organiques, Leucorrhée, Suite d'hémorragie, Convalescences.

### **Posologie :**

Injectable : une ampoule par jour.

Granulée : trois mesures par jour.

Prix au public : 12 fr. Granulé ou Amp.

### **LABORATOIRE DE LA NUCLHÉMOSE**

REMY et LECOQ

6, place Clichy — PARIS (IX<sup>e</sup>).

---

## NUJOL

**Huile de paraffine.**

**Description.** — Le NUJOL est une huile de vaseline parfaite, incolore, inodore et sans goût, possédant un degré exactement défini de viscosité et de densité.

**Indications.** — Le NUJOL est spécialement indiqué pour le traitement de la constipation. Il est particulièrement recommandé pendant la grossesse et la période d'allaitement. Le NUJOL peut être administré en toute confiance à tous les âges et dans toutes conditions de santé.

**Doses.** — Pour les adultes : Une cuillerée à bouche soir et matin, à jeun.

Pour les enfants : D'une demi-cuillerée à une cuillerée à café, suivant l'âge.

Préparé par le

**Service des Laboratoires du NUJOL**

STEMCO S. A., 78, Champs-Élysées — PARIS.

## NUTRO

### Lait en poudre Nutricia.

**Composition.** — Lait en poudre Nutricia, partiellement écrémé, entièrement soluble, préparé spécialement pour l'alimentation infantile, garanti rigoureusement pur.

**Avantages.** — Contient toutes ses vitamines, digestion facile, préparation instantanée.

**Indications.** — Gastro-entérites des nourrissons.

**Mode d'emploi.** — Variable suivant l'âge de l'enfant. Consulter la notice.

**Léon CLAEYS**

65, boulevard Sébastopol — PARIS (1<sup>er</sup>).

Téléphone : Central 10-11.

## NUTROBIASE, RAISIN VIVANT

**Composition.** — Extrait intégr. de raisin rouge, concentré, conservé VIVANT : *levures, diastases, vitamines*, etc.

**Forme.** — Sirupeuse. Fige par refroidissement ; réchauffer légèrement pour ramener la fluidité (+ 30°).

**Indications.** — Cure de raisin *vivant* :

Enfants : Nutrition (Estomac, Foie, Intestin), Constipation, Entérite, Reins, Débilité post-opératoire, Grossesse, Allaitement, Désintoxication.

**Doses.** — Toujours dans 4 parties d'eau. Après les repas : *Enfants* (dep. 1 mois) : 1/2 à 2 cuill. à café.

*Adultes* : 1 à 2 cuillers à dessert.

*Constipation* : 2 à 4 cuillers à soupe.

(*Se conserve entamé.*)

Prix : Flacon 200 gr., 12 fr. ; litre, 38 fr.

**A. KOEHLER, Docteur ès sciences**

10, rue Cimarosa — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## **OCRÉINE GRÉMY**

Traitement des insuffisances ovariennes  
de la puberté à la ménopause.

### **Formule :**

Principes actifs totaux purifiés et stabilisés des organes suivants pris à l'état frais :

Corps jaune de l'ovaire : 0 gr. 20.

Excipient :

Q. S. pour 1 pilule de 0 gr. 40.

### **Dose et mode d'emploi :**

Quatre à six pilules par jour, en dehors et loin des repas pendant les 8 jours qui précèdent les règles.

### **Indications :**

Règles rares, peu abondantes, douloureuses, Bouffées de chaleur, Migraine, Obésité, Rhumatisme de la ménopause, Acrocyanose et toutes les manifestations de l'insuffisance ovarienne.

4, rue de Clichy — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## ODARSOL

**Composition.** — Opiat dentifrice savonneux, parfumé aux essences de menthe et de badiane, contenant 50 centigr. p. 100 de *Sulfo-Tréparséna*n (dioxydiamo-arsénobenzène méthylène sulfonate de sodium).

**Applications.** — *Pyorrhée alvéolaire, Polylarthrite alvéolo-dentaire, Ulcérations de la bouche, Stomatites, Carie dentaire, Gingivites, Aphtes, Amygdalites.*

**Formes.** — L'Odarsol est délivré en tubes d'étain de 35 grammes.

**Laboratoires CLIN  
PARIS.**

## ODYNAL CHEVALIER

**Composition.** — Elixir à base de Diméthylamino-analgésine, Guaranine, Broméine et Chlorhydrate d'amyléine.

**Action.** — Stimulant, tonique, analgésique, fébrifuge.

**Indications.** — Migraines, Névralgies, Rages de dents, Lumbago, Torticolis, Sciatique, Fièvre, Grippe, Paludisme, Dysménorrhée, Crises d'asthme, Accès d'oppression, Zona, Coliques hépatiques et néphrétiques, Douleurs de la cystite, etc.

D'une supériorité incontestée sur le cachet, que beaucoup d'estomacs supportent difficilement.

**Mode d'emploi.** — Une à 3 cuillerées à café, au moment de la douleur, renouvelable 3 fois dans les 24 heures.

Prix de vente au public : 8 fr. 50.

Echantillon sur demande.

**Laboratoire de l'ODYNAL  
VARENNES-SUR-ALLIER (Allier).**

## ŒNOPHOS

*Acides hydro-éthylène-phosphoriques.  
Reminéralisation phospho-dolomitique.*

Méthode des Professeurs DUBARD et VOISENET  
de Dijon.

**Formes.** — Elixir, granulé, gouttes.

**Propriétés thérapeutiques.** — Neurotonique, reconstituant énergique : *fixateur électif* de la magnésie et de la chaux (voir fiche *DOLOMA*). Médication phosphorique rationnelle.

**Indications.** — Phosphaturie, neurasthénie, psychasthénies, surmenages physique et nerveux, *cancers, tuberculose*.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : A chaque repas : 1 cuill. à soupe d'Elixir ou 2 cuill. à café de Granulé ou LX gouttes dans un demi-verre d'eau ou de vin léger sucré. *Enfants* ; réduire les doses suivant l'âge. Pour la cure reminéralisante, voir « *DOLOMA* ».

Prix : La boîte granulé Œnophos. 15 fr.

Le flacon gouttes — 12 fr.

— élixir — 18 fr.

**Laboratoire général d'Etudes Biologiques**

S. A., 29, place Bossuet — DIJON.

Téléphone : 16-42.

## OLÉOCIDASE

**ACIDE OLÉIQUE PAUL THIBAUT**

**Capsules** dosées à 0 gr. 50 d'Acide Oléique pur, extrait de l'huile d'olive, procédé Paul Thibault, licencié ès sciences physiques, ancien président de la Société de pharmacie de Paris. Sous un volume très restreint l'Acide Oléique Paul Thibault réalise, avec effet rapide et constant, l'action toujours très lente et souvent incertaine attribuée à l'huile d'olive dans la désagrégation des calculs de cholestérine. La plus sûre méthode de drainage biliaire.

**Indications.** — Lithiase biliaire, Cholélithiasie, Cholécystites lithiasiques, Cholestérinémie, Ictères, Crises de Coliques hépatiques, Evacuation des calculs de Cholestérine par désagrégation.

**Posologie.** — 3 capsules le matin à jeun, 3 capsules dans le milieu de la journée et, si besoin, 3 capsules le soir dans un peu d'eau minérale bicarbonatée ou chlorurée sodique tiède (Vichy, Châtel-Guyon, Vals, etc.).

**Nota.** — Pour éviter l'emploi d'acides oléiques impurs, prescrire toujours : capsules d'Oléocidase Paul Thibault.

**Laboratoire R.-J. SOUDAN**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, Ex-Interne des Hôpitaux de Paris,

6, rue Rosenwald — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## OLÉOFORMINE CORBIÈRE

Comprimés glutinisés et dragéifiés.

### Composition :

Acide cholique.....	0,05
Oléate de soude anhydre.....	0,20
Hexaméthylènetétramine .....	0,25

**Indications.** — Lithiase biliaire, Coliques hépatiques, Cholécystite, Ictères, Cirrhoses, Insuffisance hépatique, Cholémié familiale.

**Mode d'emploi.** — Deux comprimés à avaler avec un peu d'eau, avant chacun des deux principaux repas, pendant 20 jours.

**Présentation.** — En boîtes aluminium de 40 comprimés. Prix : 12 francs.

**Laboratoires pharmaceutiques  
CORBIÈRE**

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
Téléphone : Carnot 78-11.

## OLÉO-MEL

### « LE LAXATIF DE RÉGIME »

Gelée de miel à l'huile de paraffine.

**Formule.** — Huile de paraffine extra neutre à }  
viscosité maxima et spéc. raffinée pour } P. E  
l'usage interne. — Miel surfin premier choix.

**Indications.** — L'association de ces deux substances réalise une synergie parfaite qui relève, pour le traitement de la **Constipation et des Affections gastro-intestinales**, de toutes les indications et de la posologie même de l'huile de paraffine. **Action mécanique. Innocuité absolue.**

**Préparation.** — L'Oléo-mel, préparé par un procédé spécial, se présente sous forme d'une gelée homogène, absolument stable et inaltérable; il conserve tout l'arome et toute la saveur du miel, ce qui en fait une médication des plus agréables et des plus faciles à prendre.

**Laxatif idéal des nourrissons et des personnes délicates.**

Prix : 10 francs.

**Laboratoire DELFOUR**  
à POUILLON (Landes).

## **OLIVEOL**

**Olivéol** pilules, 6 par jour.

**Olivéol** globules, 1 à 2 par jour.

**Olivéol** gouttes (pour enfants) X à XL  
gouttes suivant l'âge.

### **SPÉCIFIQUE HÉPATIQUE**

augmente la sécrétion biliaire,  
se retrouve dans la bile hypersecrétée,  
dissout le calcul de cholestérine.

#### **Laboratoire de l'OLIVEOL**

**Ed. BRUN, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**

Ancien interne des Hôpitaux de Lyon

TASSIN-LA-DEMI-LUNE (Rhône).

---

## **ONCTION Angelini**

### **Guérison de la Gale**

Sans bains,

Sans frotte — En une seule application.

Adoptée par la Marine nationale.

Traitement des maladies rebelles de la peau.

L'Onction Angelini est en usage permanent  
dans les hôpitaux maritimes de Brest,  
Cherbourg, Lorient, Rochefort, Sainte-  
Anne à Toulon.

Se trouve dans les pharmacies  
de Hanoï et Saïgon.

Prix au public : 10 francs.

**Angelini, pharmacien**

61, rue de Seine, PARIS.

Tél. : Littré 47-76.

## ONCTION LEISYN

Médicament nouveau à l'Yttrium, Samarium, Lanthane, Caesium,  
Extraits et Sécrétions bulbo-glandulaires.

Non caustique. Non toxique.

**Indications.** — Toutes les dermatoses même chroniques. Tous les Prurits, Eczémas chroniques et aigus du nourrisson. Ectymas, Sycosis, Impetigo, Psoriasis, Hémorroïdes externes et internes, Prurit anal et vulvaire, Ulcères variqueux de toutes natures, Fluxions rhumatismales, Goutte, Rhumatismes, Crevasses du sein, Brûlures, Engelures, Phlébites, Plaies atones ou suppurantes, Blessures, Radio-dermites, Lupus, Ophtalmologie, Gynécologie.

**Action.** — Efficacité et rapidité d'action inconnues jusqu'ici. Calme instantanément les prurits les plus violents et les plus rebelles. Pénètre profondément dans les tissus et les imprègne de ses principes actifs. Permet d'obtenir des guérisons souvent presque immédiates. Ne donne aucun résultat vis-à-vis de l'urticaire et des dartres.

Médicament constant, fidèle, réellement efficace et de toute sécurité, Communication à l'Académie de Médecine.

**Mode d'emploi.** — Etendre sans frotter 2 fois par jour en couche épaisse et recouvrir d'un taffetas chiffon.

Prix en France, sauf variations : Public, 15 fr. (Corps médical, 12 fr.)

**Laboratoires LEISYN**

1 bis, rue Molitor — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## OPHTHALMINE

**Indic. thérap.** — Antisepsie oculaire. Arrêt de la cataracte, par deshydratation du milieu oculaire. Conjonctivites, Blépharites, Presbytie prématurée, etc..., etc.

**Doses et Mode d'emploi.** — Pom-  
made, deux applications par jour.

Prix de vente au public : 10 francs.

**Laboratoires du Dr M. LEPRINCE**

62, rue de la Tour  
PARIS (XVI<sup>e</sup>).



## OPOBYL

**Forme.** — Dragées.

**Composition.** — Extrait hépatique, Sels biliaires, Boldo et Combretum.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Cholagogue, Rééducateur des fonctions entéro-hépatiques, Décongestif du foie et des intestins.

**Indications.** — Hépatites. — Ictères. — Cholécystites. — Lithiase biliaire. — Entérocolites, Constipation chronique. — Dyspepsie gastro-intestinale.

**Mode d'emploi.** — Une à deux dragées au début ou à la fin des repas, deux ou trois fois par jour.

L'étui : 12 fr. (en France).

**Laboratoires A. BAILLY et Cie**  
15 et 17, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## OPOCALCIUM du Dr GUERSANT

*Reminéralisation — Polyopothérapie.*

**Composition.** — Extraits totaux de glandes endocrines. Parathyroïde, surrénale, thymus, hypophyse, (ce dernier dans le granulé seulement), associés au fluorure, phosphate, glycéro-phosphate, carbonate de Ca, phosphate de Mg et nucléinate de Mn.

**Formes.** — Cachets, comprimés, poudre, granulé (recommandé pour enfants).

**Propriétés thérapeutiques.** — La décalcification et d'une façon générale la déminéralisation de l'organisme sont dues moins à un apport insuffisant des minéraux alimentaires qu'à la déficience des glandes endocrines.

Pour recalcifier et reminéraliser, il faut donc procurer à l'organisme les extraits des glandes dont l'action hormo-stimulatrice et régulatrice assure le métabolisme des minéraux.

**Indications.** — Prétuberculose, tuberculose, neurasthénie, surmenage, débilité, croissance, phosphaturie, convalescence, lymphatisme, rachitisme, fractures, carie dentaire, grossesse, allaitement.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : 3 cachets, 6 comprimés, 3 cuillerées à dessert de granulé, 2 à 3 cuillers-mesures de poudre.

*Enfants* jusqu'à 10 ans : 1 cachet ou 2 comprimés, 3 cuillerées à café de granulé, 2 cuillers-mesures de poudre.

*Enfants* jusqu'à 5 ans : 2 cuillerées à café de granulé, 1 cuiller-mesure de poudre.

**OPOCALCIUM ARSÉNIÉ** (avec un centigramme de méthylarsinate disodique), une seule forme : cachets. *Adultes* : 3 cachets par jour ; avant 12 ans : 1 ou 2 cachets par jour.

**OPOCALCIUM GAIACOLÉ** (avec sulfo-gaïacolate de potasse), antiseptie pulmonaire et reminéralisation associées.

*Adultes* : 3 cachets par jour ; avant 12 ans : 1 ou 2 cachets par jour.

**OPOCALCIUM IRRADIÉ** (voir plus loin).

**OPOFERRINE** (avec fer organique et extraits organiques).

*Adultes* : 4 à 6 comprimés par jour.

*Enfants* : 2 à 4 comprimés par jour.

**Laboratoires de L'OPOCALCIUM**

RANSON, Docteur en Pharmacie  
121, avenue Gambetta — PARIS (XX<sup>e</sup>).

Tél. : Ménilmontant 62-80 et 62-81.

# OPOCALCIUM IRRADIÉ

## du D<sup>r</sup> GUERSANT

### Composition :

**Ergostérine** activée par les rayons ultraviolets (Vitamine D), associée au Complexe endocrino-minéral de l'Opocalcium.

### Formes :

Cachets, Comprimés, Granulé.

### Propriétés thérapeutiques :

L'*Opocalcium irradié* ajoute aux principes de *Reminéralisation intégrale* les *propriétés centuplées* de l'huile de foie de morue.

### Indications :

Rachitisme, Croissance, Carence, Ossification, Dentition, Lymphatisme, Dénutrition, Prétuberculose, Tuberculose, Débilité, Asthénie, Surmenage, Phosphaturie, Infections, Fractures, Grossesse, Allaitement, Anémie, Convalescence.

### Doses journalières et mode d'emploi :

Cachets : *Adultes* : 3.

Comprimés : *Adultes* : 6.

Granulé : *Adultes* : 3 cuillerées à dessert.

*Enfants* jusqu'à 10 ans : 3 cuillerées à café.

*Enfants* jusqu'à 5 ans : 2 cuillerées à café.

### Littératures et échantillons :

### Laboratoires de l'OPOLCACIUM

A. RANSON, Docteur en Pharmacie,  
121, avenue Gambetta — PARIS (XX<sup>e</sup>).

Tél. : Ménilmontant 62-80 et 62-81.

# OPOCHOL

## Composition :

Oléate de soude, Bile dépigmentée et décholestérinée, Extrait hépatique, Extrait de Boldo, Extrait de Kinkélibah.

## Forme pharmaceutique :

Comprimés dragéifiés glutinisés.

## Indications thérapeutiques majeures :

*Affections hépato-biliaires.* — Hépatites, Cirrhoses, Petite insuffisance hépatique, Cholémie simple familiale de Gilbert et Lereboullet, Lithiase biliaire, Angiocholite, Coliques vésiculaires, Cholécystites médicales, Ictères.

*Affections intestinales.* — Constipation par insuffisance de chasse biliaire. Entéro-colite muco-membraneuse.

## Indications thérapeutiques secondaires :

*Maladies de la nutrition.* — Diabète par hypohépatie, Goutte, Obésité, Arthritisme, Hépatisme de Roger Glénard, Etats hypercholestérinémiques.

*Affections de l'appareil circulatoire avec participation du foie.* — Foie cardiaque, Syndrome d'hypertension portale, Varices et Hémorroïdes des hépatiques, hémophilie, certaines Anémies.

*Infections, Intoxications.*

*Neuro-psychiatrie.* — Psychasthénie avec signes hépatiques, Mélancolie anxieuse présénile, dépression avec troubles hépatiques.

## Mode d'emploi :

A. *En période de crise.* — 4 comprimés par 24 heures, 2 comprimés au moment des repas de midi et du soir.

B. *Dans l'intervalle des crises.* — 2 comprimés par 24 heures, 1 comprimé à midi et un autre le soir aux repas.

## Incompatibilités :

Aucune incompatibilité.

## Prescrire :

Opochol : comprimés, 1 flacon.

Prix, le flacon de 50 comprimés : 15 francs.

## Laboratoire de MÉDECINE EXPÉRIMENTALE

1 et 3, rue de Malherbe BEAUVAIS (Oise). Tél. : 4-84

Echantillons et littérature à la disposition  
de MM. les Docteurs,

## OPODERMYL

**Onguent cutané opothérapique.**

**Composition.** — Extraits embryonnaires, albumoses et sérum hémopoïétique — tous principes actifs de la régénération cutanée.

**Mode d'emploi.** — Application permanente en couche épaisse renouvelée aussi souvent que possible.

**Propriétés thérapeutiques.** — Agent spécifique de l'épidermisation en toutes circonstances.

**Indications.** — Toutes dermatoses, même aiguës, eczéma, prurigos excoriés, érythème fessier, crevasses du sein. Toutes plaies par brûlures caustiques, pertes de substance chirurgicales ou diathésiques.

Prix au public : 12 francs.

**J. BENSIMON**

36, rue des Martyrs — PARIS (IX<sup>e</sup>).

---

## OPONUCLYL IRRADIÉ TROUETTE-PERRET

Catalyseur fixant le Phosphore et le Calcium.  
Vitamine D.

Médication synergique organo-minérale.

**Composition.** — Lipoïdes médullaires et spléniques, Orchitine, Hémoglobine, Acide nucléinique, Cinnamate de manganèse et de fer, Algos-térine irradiée.

**Indications.** — Anémie, Chlorose, Convalescence, Croissance, Surmenage, Neurasthénie, Lymphatisme, Tuberculose.

**Doses.** — *Adultes* : 2 sphérules à chaque repas.

*Enfants* : 1 sphérule à chaque repas.

Prix au public : 16 francs.

Littérature et Echantillons :

**Laboratoires TROUETTE-PERRET**

15, rue des Immeubles-Industriels,  
PARIS (XI<sup>e</sup>).

## OPOTHÉRAPIE BOUTY

Extraits totaux d'organes frais desséchés dans un vide profond vers 0° et présentés en comprimés dragéifiés à froid permettant une conservation indéfinie.

<b>Thyroïdine Bouty</b>	{ 0 gr. 10 de corps thyroïde desséché par dragée. }	Obésité. Myxœdème.
<b>Ovigénine Bouty</b>	{ 0 gr. 12 d'ovaires desséchés par dragée. }	Ménopause naturelle ou artificielle.
<b>Séquardine Bouty</b>	{ 0 gr. 10 de testicule desséché par dragée. }	Insuffisance organique.
<b>Hépatine Bouty</b>	{ 0 gr. 30 de foie desséché par dragée. }	Cirrhose, Ictère, Diabète.
<b>Surrénaline Bouty</b>	{ 0 gr. 10 de capsules surrénales desséchées par dragée. }	Basedowisme, Addisonisme.
<b>Néphrine Bouty</b>	{ 0 gr. 15 de rein desséché par dragée. }	Néphrite.
<b>Biliol Bouty</b>	{ Extrait concentré de bile de porc en dragées kératinisées. }	Ictère, lithiase biliaire, etc.
<b>Gastrozymase Bouty</b>	{ Comprimés effervescents de suc gastrique de porc. }	Dyspepsie, embarras gastrique.
<b>Liquueur à la thyroïdine</b>	{ Indication infantile, 1 cuillerée à café — 0 gr. 02 de thyroïde desséché }	Myxœdème.

## ASSOCIATIONS PLURIGLANDULAIRES

<b>Triglandine Bouty</b>	{ Chaque dragée contient : Corps thyroïde desséché..... 0 gr. 08 Hypophyse..... 0 gr. 05 Ovaires..... 0 gr. 10 }	Sexe féminin.
<b>Triglandol Bouty</b>	{ Chaque dragée contient : Corps thyroïde desséché..... 0 gr. 08 Hypophyse desséchée 0 gr. 05 Testicule desséché. 0 gr. 10 }	Sexe masculin.

Tous les produits opothérapiques ci-dessus sont également présentés en ampoules de 1 centimètre cube et de 3 centimètres cubes.

**Laboratoires BOUTY**

3, rue de Dunkerque — PARIS.

Tél. : Nord 32-52 et 32-53

# OPOTHÉRAPIE BYLA

Cachets OPO - Glandes - Exolysés - Ampoules ISO

## MÉDICATION ASSOCIÉE

Formule

1	Hypophysine. 0.10 Orchitine. . . 0.60	Myxœdème. Troubles endocriniens.
2	Hypophysine. 0.10 Ovarine. . . . 0.20	Troubles de la ménopause et insuffisances glandulaires.
3	Orchitine. . . 0.60 Thyroïdine. . 0.025	Myxœdème. Insuffisances glandulaires.
4	Ovarine. . . . 0.20 Thyroïdine. . 0.025	Insuffisances thyroïdienne et ovarienne.
5	Surrénine. . . 0.10 Hypophysine. 0.10	Asthme essentiel. Myasthénies. Insuffisances surrénales. Basedowisme.
6	Surrénine. . . 0.10 Thyroïdine. . 0.025	Retards de croissance.
7	Hypophysine. 0.10 Thyroïdine. . 0.025	Syndromes pluri-glandulaires, Sclérose, Obésité.
8	Surrénine. . . 0.15 Hypophysine. 0.05 Thyroïdine. . 0.025	Asthme essentiel. Myasthénies. Insuffisances surrénales. Maladie d'Addison.
8 bis	Ovarine. . . . 0.15 Surrénine. . . 0.05 Hypophysine. 0.05	Insuffisances glandulaires. Troubles de la puberté et de la ménopause. Syndromes adiposo-génitaux.
9	Hypophysine. 0.05 Ovarine. . . . 0.20 Thyroïdine. . 0.025	Troubles de la ménopause. Syndromes adiposo-génitaux.
9 bis	Ovarine. . . . 0.20 Surrénine. . . 0.05 Thyroïdine. . 0.025	Troubles de la puberté et de la ménopause. Syndromes adiposo-génitaux.
10	Hypophysine. 0.05 Orchitine. . . 0.60 Thyroïdine. . 0.025	Développement tardif. Myxœdème. Insuffisances glandulaires.
11	Hypophysine. 0.05 Thyroïdine. . 0.025 Surrénine. . . 0.05 Orchitine. . . 0.10	Infantilisme masculin. Insuffisances glandulaires.
12	Hypophysine. 0.05 Thyroïdine. . 0.025 Surrénine. . . 0.05 Ovarine. . . . 0.10	Troubles de la puberté et de la ménopause.

## MÉDICATION PANGLANDULAIRE

contenant toutes les glandes en proportion normale.

PANGLANDULAIRES BYLA: Masculins, Féminins, Infantiles.

Exécution de toute formule sur ordonnance médicale.

Échantillons et Littérature :

Les Établissements BYLA, 26, avenue de l'Observatoire, Paris.

## OPOTHÉRAPIE BYLA

Nouvelles présentations brevetées.

SANS ODEUR, CONSERVATION INDÉFINIE  
CONSTANCE D'ACTIVITÉ

1° **Cachets « OPO »** contenant dans le même pain azyme, deux **comprimés** concentriques renfermant, l'un le substratum cellulaire sec, l'autre le lipoïde correspondant (procédé breveté).

**Posologie.** — Uniforme pour tous les Opos : 2 à 4 par jour.

Prescrire : OPO-OVARINE-BYLA, etc.

2° Les **« EXO » BYLA**, sucs totaux **inaltérables**, préparés par exolyse des organes frais, et aromatisés (procédé breveté).

Prescrire : EXO-THYROIDINE BYLA, etc.

**Posologie.** — Uniforme pour tous les Exos : 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.

3° Les **GLANDULES BYLA** (comprimés dragéifiés), enrobés de sucre, afin d'empêcher l'action de l'air sur le principe actif et d'éviter **toute odeur**.  
*Conservation indéfinie.*

Prescrire : GLANDULES DE SURRENINE BYLA.

**Posologie.** — (4 à 8 par jour).

4° Les **AMPOULES BYLA** : préparées à partir des **ORGANES FRAIS** ; amenées à un état voisin de l'isotonie et présentées en ampoules de 1 cc. correspondant à 0 gr. 25 d'organe frais.

Prescrire : AMPOULES D'HEPATINE BYLA, etc.

Pour les doses massives : AMPOULES « ISO » BYLA de 2 cc. correspondant à 1 gr. d'organe frais par cc.

Prescrire : AMPOULES ISO Rein BYLA, etc.,

**Posologie.** — 1 ampoule tous les 2 jours.

*Opothérapie simple, pluriglandulaire et panglandulaire.*

Les Établissements **BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV<sup>e</sup>)



# OPOTHÉRAPIE CHOAY

## 1° EXTRAITS TOTAUX

Poudres d'organes du **Codex**, obtenues à froid et dans le vide.

**Formes et Doses.** — *Cachets et Comprimés* en tubes hermétiques, 4 à 6 par jour.

**Prix.** — De 12 fr. à 20 fr. la boîte de 24 à 40 *cachets* ou *comprimés*, suivant la nature et le dosage de l'extrait.

### Nomenclature des principaux Extraits Totaux.

Bile, Foie, Glande mammaire, Moëlle osseuse, Ovaire.

Pancréas, Surrénale, Testicule, Thyroïde.

Hypophyse (glande totale ou lobes séparés).

## 2° EXTRAITS INJECTABLES

Solutions aqueuses, déprotéinées, stérilisées à 100°.

**Formes et doses.** — *Ampoules* de 1 à 5 cc. Sauf cas spéciaux, 1 ampoule tous les jours ou tous les 2 jours.

**Prix.** — De 15 à 30 fr. la boîte de 6 ampoules.  
De 25 à 35 fr. la boîte de 12 ampoules.

### Nomenclature des principaux Extraits Injectables.

Foie, Ovaire, Rate, Surrénale, Testicule, Thyroïde.

Hypophyse (glande entière) ou Tot-Hypophyse.

Hypophyse (lobe postérieur) ou Post-Hypophyse (5 dosages).

Hypophyse (lobe antérieur) ou Ant-Hypophyse.

Folliculine **CHOAY** : Voir ce mot.

## 3° SYNCRINES

Associations opothérapiques correspondant aux principaux syndromes pluriglandulaires.

**Formes et Doses.** — *Cachets et Comprimés* en tubes hermétiques, 2 à 4 par jour.

*Ampoules injectables.* En moyenne 1 ampoule de 1 cc. tous les 2 jours.

**Prix.** — De 15 à 25 fr. la boîte de 24 *cachets* ou de 30 *comprimés*, suivant formule.  
25 fr. la boîte de 12 ampoules de 1 cc.

### Nomenclature des principales Syncrines.

- 1 et 1 bis. Pluriglandulaires, F. et M. — 2. Surréno-Hypophysaire. — 3. Thyro-Surréno-Hypophysaire. — 3 bis. Thyro-Surréno-Ovariennne. — 4. Thyro-Ovariennne. — 4 bis. Surréno-Ovariennne. — 5. Thyro-Orchitique. — 7. Thyro-Hypophyso-Ovariennne. — 8. **Peptosthénine** (Digestive). — 9. Surréno-Hypophyso-Ovariennne. — 10. Placento-Mammaire.

### Laboratoire CHOAY

48, rue Théophile-Gautier — PARIS (XVI°).

Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.

## OPOTHÉRAPIE du D<sup>r</sup> FRAYSSE

### (Associations)

**THYRODOSE.** — Pastilles de chocolat de 1 gr. contenant : ovaire 0,10, thyroïde 0,025.

**Doses.** — *Adultes* : 2 à 3 pastilles par jour.

**Indications.** — Insuffisances thyroïdienne et ovarienne. — Troubles de la croissance, de la puberté et de la ménopause. — Obésité, etc.

Prix : 20 francs.

---

**NEURODOSE.** — Pastilles de chocolat de 1 gr. contenant, orchitine 0,20, substance grise, 0, 10.

**Doses.** — *Adultes* : 4 pastilles par jour.

**Indications.** — Epuisement nerveux sous toutes ses formes. — Impuissance sexuelle, surmenage. — Infantilisme, etc.

Prix : 20 francs.

---

**PLACENTODOSE.** — Granulés chocolatés de Placenta et de mammaire.

**Doses.** — 4 cuillerées à café par jour.

**Indications.** — Flaccidité utérine. — Métrorragies. — Insuffisance lactée. — Flaccidité et atrophie des seins. — Métrite. — Tumeurs. — Fibromes, etc.

Prix : 20 francs.

---

**SPLENODOSE.** — Granulés chocolatés de Rate. — Foie. — Thyroïde. — Hémoglobine osséine.

**Doses.** — 4 cuillerées à café par jour.

**Indications.** — Déminéralisation. — Maladies du Foie et de la Rate. — Chlorose. — Anémie. — Maladies infectieuses. — Paludisme, etc.

Prix : 20 francs.

---

**Laboratoire du D<sup>r</sup> FRAYSSE**

47, rue de Neuilly — NANTERRE (Seine). Tél. 1283.

Notices et échantillons sur demande.

## OPOTHÉRAPIE FOURNIER

Extraits totaux préparés à froid dans le vide.

### Endocrisines.

**Forme.** — 1<sup>o</sup> *Cachets et comprimés :*

**Doses usuelles** toutes préparées. — Thyroïde, 0,025 mgr., 0,10 cgr. ; ovaire, 0,10 cgr. ; orchitine, 0,20 cgr. ; surrénale, 0,10 cgr. ; hypophyse, 0,10 cgr. ; foie, 0,50 cgr. ; reins, 0, 25 cgr.

*Cachets pluri-glandulaires.*

M, sexe masculin.

F, sexe féminin.

Troubles de croissance, infantilisme, arriération.

### 2<sup>o</sup> *Ampoules :*

Thyroïde, Ovaire, Surrénale, Hypophyse, Orchitine, Rate. — Association hyposurrénale, Asthme. — Hypophyse lobepostérieur, usage obstétrical (dite **Physocrisine**).

**Formuler :** **Endocrisines-glande Fournier.**

**Solution de foie** (en ampoules buvables), amp. de 10 cc. correspondant à 150 gr. de foie par ampoule (méthode de Whipple)

**Solution de Rate** (ampoules injectables) de 3 cc. Méthode Thomas Paul. Affections eczémateuses et prurigineuses.

**Formuler :** **Splenocrisine.**

**Laboratoires FOURNIER Frères**

7, rue Biscornet — PARIS.

## OPOTHÉRAPIE HENNING

**Intestinol.** — Combinaison judicieuse des diverses sécrétions de l'intestin et des organes annexes (sels biliaires, pancréatine), dragéifiée sous enrobage de charbon animal. Active les sécrétions homologues du tube digestif, l'assimilation et l'évacuation, régularise entièrement ses fonctions.

### Lipolysine masculine et féminine.

Préparation pluri-glandulaire, à base d'Hormones pour le traitement de l'obésité plurihormonale.

**Myostone.** — Extrait du squelette musculaire de veau (procédé Prof. Schwarzmann).

**Indications.** — Angine de poitrine, sclérose coronaire, asthme cardiaque, insuffisance du muscle cardiaque, faiblesse, vieillesse, etc...

### Testogan masculin.

Pour combattre la diminution de la puissance sexuelle, neurasthénie sexuelle, troubles pendant l'âge critique de l'homme vieillesse prématurée, épuisement.  
Comprimés, Ampoules.

### Thelygan féminin.

Pour le traitement des troubles de la menstruation et de la ménopause, insuffisance sexuelle, vieillesse prématurée, épuisement.

Littératures et échantillons.

**Etablissements MERMINOD et Co**  
49, rue de Paradis — PARIS (Xe).  
Tél. : Provence 30-32.

## « OPOTHÉRAPIE MONCOUR »

En sphérulines, pilules inaltérables et toujours solubles grâce à leur enrobage spécial. A tous extraits totaux d'organes desséchés à froid, dans le vide profond.

### Dosages :

(suivants extraits) 10 centigr. et 20 centigr.

### Posologie :

1 à 6 par jour, sauf hépatiques et rénales,  
1 à 16.

### SPHÉRULINES SYNERGIQUES

(associations opothérapiques.)

Thyro-ovariennes, Thyro-orchitiques, Thyro-surrénales, Hypophyso-ovariennes, Surréno-ovariennes, Surréno-orchitiques, Surréno-hypophysaires, Entéro-pancréatiques, Thyro-surréno-ovariennes, Hypophyso-surréno-Thyroïdiennes, - Hypophyso-surréno-ovariennes, - Hypophyso-ovaro-thyroïdiennes, - Hypophyso-thyro-surréno-ovariennes, - Hypophyso-thyro-surréno-orchitiques.

**Posologie.** — 1 à 6 par jour.

### NÉO-SPHÉRULINES MONCOUR

Préparées de suite après demande médicale. Préparations datées. Tous organes, dosages et associations. Renseignements sur demande.

**Laboratoire « MONCOUR »**

49, avenue Victor-Hugo  
BOULOGNE-SUR-SEINE (Seine).

Téléphone : Molitor 08-47.

## **LES OPOTHÉRAPIQUES**

### **« MEURICE »**

Extraits de glandes fraîches. — Rigoureusement exempts de lipoides. — Teneur stable en hormone active contrôlée. — Atoxiques. — Inodores.

#### **Mamelline.**

Flacon de 50 comprimés à 0 gr. 30.

#### **Orchitine**

Flacon de 50 comprimés à 0 gr. 50.

#### **Ovarine.**

Flacon de 50 comprimés à 0 gr. 30.

#### **Ovaridine** (ovaro-thyroidine).

Flacon de 50 comprimés à 0 gr. 30.

#### **Thyroidine.**

Flacon de 50 comprimés à 0 gr. 20.

**Fabriqués dans les laboratoires de la**  
**S. A. Union Chimique Belge**  
**Division Produits Pharmaceutiques**  
**« Meurice »**

Département scientifique :

61, avenue Louise  
**BRUXELLES,**

# OPOTHÉRAPIQUES PELLISSIER

Leur doctrine : Clarté, Simplicité, Loyauté.

Le procédé Pellissier utilisé pour la fabrication des produits opothérapiques est breveté. Il a fait l'objet de communications à l'Académie des Sciences le 21 mars 1921, à l'Académie de Médecine le 15 mai 1923, à la Société de Pathologie Comparée le 11 novembre 1924.

Les appareils de fabrication sont les plus puissants qui existent dans le monde et les poudres d'organes qu'ils permettent d'obtenir, sans aucun dégraissage, sont d'une activité incomparable, d'ailleurs reconnue et de conservation indéfinie.

Deux formes pharmaceutiques :

Pour les *adultes*, le cachet et le suppositoire (Opositoire).

Pour les *jeunes enfants*, le suppositoire (Opositoire).

Exemple de prescription pour les adultes :

Ovaire Pellissier, cachets à 0,25 cgr., 1 boîte.

Glande mammaire Pellissier, cachets à 0,50 cgr., 1 boîte.

Pancréas Pellissier, cachets à 0,25 cgr., 1 boîte, etc...

Opositoires Pellissier de Prostate, à 0,25 cgr., 1 boîte.

Opositoires Pellissier d'ovaire, à 0,25 cgr., 1 boîte, etc...

Exemple de prescription pour les enfants :

Opositoires Pellissier de thyroïde, 1 milligr., 1 boîte.

Opositoires Pellissier d'hypophyse, à 0,05 cgr., 1 boîte.

Opositoires Pellissier de surrénale, à 0,05 cgr., 1 boîte.

Opositoires Pellissier de thymus, à 0,25 cgr., 1 boîte, etc...

Organe scientifique bi-mensuel, les *Consultations opothérapiques*.

Les demander, par simple carte, pour en obtenir le service régulier.

Les **Laboratoires PELLISSIER** ont introduit également dans la thérapeutique :

Les Comprimés de Silicate de soude Pellissier, à 0,25 cgr.

Les Ampoules de Silicate de soude Pellissier, pour l'injection intraveineuse, *pour le traitement de l'artériosclérose*. Communication à l'Académie des Sciences (17 août 1920).

**Laboratoires PELLISSIER**

33, avenue de Villiers — PARIS (XVII°).

Téléphone : Wagram 14-59.

Usine, 18, Grande-Rue — ASNIÈRES (Seine).

## OPOTONINE

**Composition.** — Solution stable d'un composé quinoléique iodé associé au thymus.

**Mode d'action.** — Dissociation lente et régulière du composé iodé laissant le malade sous l'influence continue de l'iode. Action de l'iode portée au maximum par la présence du Thymus qui joue le rôle de catalyseur. — Excite la mononucléose, favorise la défense de l'organisme, agit sur la croissance, influe heureusement sur le métabolisme, abaisse la tension artérielle.

**Indications.** — Lymphatisme, anémies, rachitisme, décalcification dentaire, emphyseme, bronchites chroniques, artério-sclérose, hypertension artérielle, rhumatisme chronique.

**Formes.** — Opotonine concentrée, opotonine sirop.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : Opotonine concentrée, une demi-cuillerée à café 3 fois par jour avant chacun des repas dans un peu d'eau. Opotonine sirop : 2 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants* : Opotonine concentrée, XX à LX gouttes avant chacun des deux principaux repas, dans un peu d'eau. Opotonine sirop, 1 à 2 cuillerées à café par jour.

**Laboratoires COUSSINET**

20, rue des Martyrs — PARIS (IX<sup>e</sup>),

## OPOZONES LUMIÈRE

Organothérapie moderne.

Médication des Troubles endocriniens.

**Constitution.** — Totalité des principes actifs des organes glandulaires frais, éléments chimiques, ferments organiques, albuminoïdes.

**Propriétés.** — Les dragées d'OPOZONES LUMIÈRE sont obtenues :

- 1° Sans déshydratation vraie, par un procédé de pseudo-dessiccation qui dissimule l'eau et tous les liquides de constitution en des complexes cristallins. De ce fait les OPOZONES LUMIÈRE sont les plus actifs des médicaments opothérapiques s'administrant par voie buccale. Il est, en effet, avéré qu'un organe qui a perdu 60 p. 100 de son eau de constitution est devenu inactif.
- 2° Avec rapidité (inégalisée par tout autre procédé), d'où il résulte que les pollutions et les phénomènes d'autolyse n'ont pas le temps de se produire.
- 3° La mise immédiate sous forme de dragées glutinisées et vernies protège les OPOZONES LUMIÈRE contre toute désintégration spontanée, toute oxydation, toute hydrolyse, ultérieures et contre l'action destructive d'une attaque brutale par les sucs digestifs.

Les OPOZONES LUMIÈRE, même préparées depuis fort longtemps, demeurent inodores. Ouvrez une dragée, son contenu n'a pas d'odeur.

**Doses courantes.** — Commencer avec une dragée par jour en augmentant graduellement.

**Formuler.** — Une boîte de 54 dragées d'OPOZONES LUMIÈRE, en spécifiant l'extrait désiré.

**LABORATOIRES LUMIÈRE.**

23, Cours de la Liberté — LYON.



## OPTALIDON SANDOZ

**Forme et composition.** — Comprimés dragéifiés renfermant : Isobutylallylmalonylurée, 0 gr. 050 ; Diméthylaminophénazone, 0 gr. 125 ; Caféine, 0 gr. 025.

**Propriétés.** — Association *antinévralgique*, sédative et hypnagogue. Apaise la douleur sans stupéfier. Aucun danger d'accoutumance. Bien toléré par les estomacs les plus délicats. Laisse et restitue au malade toute faculté de s'occuper, de travailler ou de se distraire.

**Indications.** — Toutes douleurs, insomnies douloureuses.

**Posologie.** — Dose antinévralgique : commencer par 2 dragées prises à la fois et continuer, s'il y a lieu, par 1 dragée, de 1/2 heure en 1/2 heure. Au maximum 8 dragées par jour. Dose hypnagogue dans l'insomnie douloureuse : 2 à 4 dragées 1/2 heure avant le coucher.

**Enfants :** 1 à 3 dragées par jour, à partir de 5 ans.

**Présentation.** — Tubes en aluminium de 10 dragées. Flacons de 25, de 100 et de 250 dragées.

### Produits SANDOZ

3 et 5, rue de Metz — PARIS (X<sup>e</sup>).

Dépôt général et Vente :

**Usine des Pharmaciens de France**  
129, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## ORARGOL AMICROS

Anti-Infectieux Général.

**ORARGOL INJECTABLE (0,05 %).**  
**AMPOULES**

Boîte de 6 amp. 5 cc. : 22 fr. Tube de 1 amp.  
10 cc. : 7 fr. 50.

**Septicémies, Grippe, Fièvres, Traite-  
ment pré et post-opératoire.**

**Posologie.** — 5 à 20 cc. intramusculaire ou intraveineux tous les jours ou tous les deux jours. Chez les enfants, 1 cc. par année d'âge. En injection dès le début d'une infection seul ou combiné à la vaccinothérapie ou à la sérothérapie.

**ORARGOL NON INJECTABLE (0,1 %).**  
**GOUTTES.** — Flacon de 60 gr. : 22 francs.

**Grippes, Fièvres, Thérapeutique infan-  
tile.**

**Posologie.** — XX à C gouttes par jour en plusieurs fois dans une boisson quelconque. Ces doses peuvent être doublées si cela est nécessaire sans inconvénient.

**Rhino-Orargol.** — Fl. 20 gr. : 15 francs.  
(Compte-gouttes et instillateur nasal.)

IV à V gouttes en instillations nasales.  
X à XV gouttes en gargarismes.

**Orargol-Collyre** (solution isotonique 0,2 %).  
Boîte de 4 ampoules 1 cc. 5 : 15 francs.

Toutes les indications de l'Argent colloïdal comme collyre.

**Laboratoire des Produits AMICROS**

6, boulevard Edgar-Quinet — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

## ORCHIDINE OPTIMA

(Comprimés correspondant chacun à 0 gr. 60 de testicules frais de bélier.)

### Indications :

Puberté insuffisante, débilité en général, insuffisance testiculaire endocrinienne, affections nerveuses, sénilité précoce.

### Doses :

4 à 6 comprimés par jour.

**Laboratoires « OPTIMA » S. A.**

78-80, Grande-Rue-au-Bois

BRUXELLES.

## ORMATOL

Contre toutes Dermatites, Dermatoses, Affections de la Peau.

**Forme.** — Tube de Pommade de 60 grammes.

**Indications.** — Eczémas, Brûlures, Impétigo, Prurits, Urticaire, Ulcères, Sycosis, Irritations, Plaies, etc.

**Composition.** — Formule nouvelle réalisant l'application de la valeur antiseptique des essences en combinaison avec des produits médicamenteux très actifs (Essences de Géranium, Origan, Thym, Verveine, Calomel, Oxyde rouge Hg, Oxyde de Zinc, Acide Salicylique, Lanoline, Vaseline.)

**Avantages.** — Odeur très agréable, pas d'irritation, cicatrisation rapide, ne tache pas.

**E. ROBINEAU, pharmacien**

80, route des Petits-Ponts — DRANCY (Seine).

## ORTHO-GASTRINE

**Formule :**

Sulfate de Soude anhydre .....	0 gr. 25
Phosphate de Soude anhydre .....	0 gr. 25
Bicarbonate de Soude.....	0 gr. 10
CITRATE de Soude .....	0 gr. 10

Pour 1 paquet; N° 30.

**Avantages.** — Sels purs et anhydres, absolument conformes au Codex. Chaque prise donne un verre à \* Bordeaux de solution limpide et facile à boire même pour les enfants, toujours stable comme goût et composition.

**Indications.** — Toutes celles de la solution alcalino-sodique dite de Bourget. Insuffisance sécrétoire du foie et de la vésicule biliaire. Dyspepsie, Gastralgie, Hyperchlorhydrie, Entérite, Intoxication alimentaire, etc.

**Posologie.** — Adultes : 2 à 4 paquets par jour.

*Enfants* (sucrer légèrement) de 6 mois à 1 an 1/2 : 1 paquet par jour dans le lait et les bouillies.

De 1 an à 3 ans : 1 paquet par jour.

Prix : 9 francs.

**Laboratoire A. LEBLOND**

Pharm. de 1<sup>re</sup> Classe, Ex-interne des Hôpitaux de Paris  
51, rue Gay-Lussac — PARIS (V°).

R. C. Seine 56049.

## ORTHOGÉNOL

Polythérapie préventive et correctrice des  
Déficiences organiques et fonctionnelles de  
l'AGE MUR et du GRAND AGE.

Formule du **Redressement Biologique** intégral  
du Dr A. VERNIER.

Réalise l'association désirable des Eléments de  
Reconstitution Cellulaire, des Modificateurs  
fonctionnels et des Catalyseurs endocrino-miné-  
raux nécessaires au Maintien ou au Rétablisse-  
ment de l'ordre Histo-physiologique et dont la  
Carence domine toute la Pathologie de l'Age.

*Réactivation physiologique, Invigoration, Désintoxi-  
cation, Dépuration urique, Déficiences séniles,  
Prophylaxie du Cancer et des Scléroses.*

Les Cures de Redressement Biologique par l'**Or-  
thogénol** sont toujours utiles après 40 ans.

Elles préparent et consolident les heureux résultats  
des Cures Créno-Hydrothérapiques. Elles pré-  
parent et complètent l'Acte Chirurgical.

**Composition.** — Bases Magnésiennes génératrices  
de Chlorure de Magnésium, Phosphore, Silice  
végétale (Prêle), Lithine, Bioxyde de Manganèse,  
Acide Thyminique (solvant Urrique physiol.),  
Théobromine, Scille, Diastases de régénération  
du Foie, Hypophyse (lobe ant.), Glande Inter-  
stitielle. Thyro-Parathyroïde, Parathyroïde.

**Indications.** — Artériosclérose, Arthritisme, Rhu-  
matismes chroniques, Hypertension, Néphroses,  
Uricémie, Hépatisme, Infections biliaires, Troubles  
digestifs, Troubles neuro-cardio-musculaires, Dé-  
pression nerveuse, Tremblements, Vertiges,  
Œdèmes, Crampes, Diabète, Dermatoses, Pru-  
rits, Age critique des deux sexes, Sénilité précoce,  
Hypertrophie prostatique, Tumeurs, Lésions de  
type pré-cancéreux.

**Posologie.** — 2 ou 3 cachets par jour, aux repas.

---

Laboratoires **BÉLIÈRES**

Pharmacie Normale, 19, rue Drouot — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## ORTHOZOMINE

Principe actif du plasma musculaire total.

*Zomine* désalbuminée selon la technique du Professeur Richet.

**L'Orthozomine** présente les propriétés stimulantes de la **Zomine** sous une forme concentrée et très agréable à prendre (sirop).

### ANÉMIES. CROISSANCE. CONVALESCENCES.

*Enfants* : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

*Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

A prendre pure ou dans un peu d'eau froide.

Le flacon : 20 francs.

**Laboratoires LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS (XI<sup>e</sup>).

---

## OSMO-VACCINS P. L.

Vaccins concentrés et isotoniques  
en ampoules de 10 cc.

**pour pansements locaux ou par voie  
buccale.**

(non injectables par voie hypodermique)

### **Osmo-Vaccins P. L. Gynécologiques. —**

Traitement des métrites, salpingites, vaginites, etc.

(Par tampons, mèches, injections intracervicales, etc.).

Existe également en **Ovules.**

### **Osmo-Vaccins P. L. Gonococciques. —**

Traitement des affections à gonocoques chez l'homme : urétrites, blennorragies, cystites gonococciques, prostatites, etc.

(Par injections urétrales.)

### **Osmo-Vaccins P. L. Colibacilles. —**

Pour la plupart des infections intestinales (colites, entéro colites), et dans les cystites, néphrites, tout particulièrement les pyonéphrites infantiles, et dans tous les cas de syndrome entéro-rénal.

(Par voie buccale-lavages-lavements.)

### **Osmo-Vaccins P. L. Staphylococciques. —**

Pour le traitement des affections à staphylocoques : furonculose, anthrax, acné, etc.

(Par pansements et par voie buccale.)

### **Osmo-Vaccins P. L. Rhino. —**

Pour le traitement des rhinites aiguës et chroniques, sinusites, otites.

(Pansements et pulvérisations).

La boîte de 8 ampoules 36 francs.

**Laboratoires BRÉANT**

4, rue de Clichy (Trinité) — PARIS.

R. C. Seine 246-946. Tél. : Trinité 28-84.

## OSTELINE

### Composition :

La première préparation standardisée de vitamine D concentrée, fabriquée par le procédé Steenbock, Br. Fr. 606984, en comprimés et en gouttes, dissoute dans l'huile d'olive.

Quatre gouttes ou un comprimé correspond à une cuillerée à café d'huile de foie de morue de première qualité.

Chaque flacon d'Osteline est l'objet d'un contrôle physiologique rigoureux qui confère au produit une efficacité constante.

Toujours parfaitement tolérée, dépourvue d'odeur ou de saveur désagréables, extrêmement active à faibles doses.

### Indications :

*Déminéralisations* de toutes natures (décalcification des tuberculeux, des femmes enceintes, de l'allaitement, décalcifications dentaires), *Troubles de la croissance*, *Etats* liés à un *métabolisme calcique défectueux* (spasmophilie, laryngospasme, hyperexcitabilité nerveuse), *Asthénies*, *Rachitisme*, *Acidose*, *Putréfactions intestinales*. (L'Osteline rend aux fèces, lorsqu'elles sont alcalines ou hypoacides, leur acidité normale et s'oppose à la *constipation* en stimulant sans irritation ni accoutumance le péristaltisme intestinal.)

### Mode d'emploi :

*Nourrissons, jeunes enfants* : IV gouttes 2 à 3 fois par jour ou plus, dans du lait ou du jus d'orange.

*Adultes et grands enfants* : 3 à 6 comprimés par jour (avalé sans croquer).

*Aucune contre-indication.*

**Laboratoires RISSA**

46, rue Claude-Lorrain — LILLE.



## OSTRÉINE BUISSON

Chaux organique silico-fluorée  
(partie centrale de l'écaille d'huître)  
et phosphates assimilables.

**Propriétés thérapeutiques.** — Reminéralisateur type, totalement et directement assimilable.

**Indications.** — Tuberculose et pré-tuberculose, Dentition, Croissance, Grossesse, Lactation, Phosphaturie, Ostéomalacie, Diabète, Dénutritons organiques diverses, consolidation des fractures.

**Forme.** — 1° cachet ; 2° poudre ; 3° granulé.

**Posologie.** — Au milieu de chaque repas : 1 cachet, une mesure d'Ostréine en poudre, ou une cuillerée à café d'Ostréine granulée délayée dans un peu d'eau sucrée.

Prix de vente au public : 16 fr. 50.

Prix médical : 11 fr. 15.

Sous quelque forme que ce soit.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

*Pierre BRETEAU, Pharmacien*  
Membre de l'Académie de Médecine  
157, rue de Sèvres — PARIS (XV°).

---

## OTALGOL

**Tube instillateur** de soluté neutre glyciné rendu adhésif au tympan par un procédé spécial.

**Composition.** — Sol. d'adrénaline, stovaïne, eau de laurier-cerise, borate de soude, glycérolé d'amidon, glycérine chimiquement pure.

**Propriétés.** — Analgésique des affections auriculaires, antiseptique et décongestionnant.

**Indications.** — Otites catarrhales, otites aiguës et subaiguës, otalgies, myringites.

**Mode d'emploi.** — Plonger le tube bien fermé dans un bol d'eau tiède pendant 2 minutes, puis instiller 3 fois par jour dans le conduit auditif IV à V gouttes en maintenant la tête inclinée vers l'épaule opposée pendant 5 minutes.

Prix du tube : 10 francs.

Dépôt général pour la France :

**Laboratoire ASEPTOR**

21, rue Feydeau — PARIS (II°).

Téléphone : Central 83-15.

## OUABAÏNE ARNAUD

Principe actif du *Strophantus Gratus* isolé  
par le procédé particulier  
du Professeur Arnaud.

**Cardio-tonique énergique,**

**Diurétique puissant.**

### Formes :

Comprimés à 1 mgr.

Solution à QUATRE pour mille.

Ampoules de 1 cc. au 1/4 de mgr., pour  
injections intraveineuses.

Ampoules de 2 cc. au 1/2 mgr., pour injections  
intramusculaires.

### Indications :

Toutes les insuffisances aiguës ou progressives  
du cœur gauche.

Toutes les insuffisances du cœur droit :  
Dilatation aiguë, Insuffisance mitrale,  
Insuffisance cardiaque droite fonctionnelle  
par lésions pulmonaires ou complications,  
Asthénie du myocarde due aux  
maladies infectieuses, Insuffisance cardiaque  
des vieillards.

*Bien spécifier sur l'ordonnance*

**« OUABAÏNE ARNAUD »**

---

**LABORATOIRE NATIVELLE**

27, rue de la Procession — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## OUATAPLASME

du D<sup>r</sup> Ed. LANGLEBERT.

Pansement humide, complet.  
Instantané, aseptique émollient.

**Indications.** — Furoncles, Anthrax, Abscess, Brûlures, Eczéma, Phlébites, Coliques, Plaies contuses.

**Mode d'emploi.** — Se prépare instantanément par simple immersion dans l'eau bouillie, chaude ou froide. Il peut être arrosé de substances médicamenteuses (Liquide de Labarraque, Eau d'Alibour, Laudanum, etc.). Conserve son humidité pendant 24 heures.

Peut facilement se **sinapiser** en étendant à sa surface une couche de farine de moutarde qu'on aura au préalable délayée dans un peu d'eau froide ; ainsi préparé, il est le cataplasme sinapisé idéal.

L'enveloppe entière, avec imperméable : 9 fr. 25.

L'enveloppe entière, sans imperméable : 6 fr. 60.

**Établissements SABATIER**

10, rue Pierre-Ducreux — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

---

## OVARINE OPTIMA

(Comprimés correspondant chacun à  
50 mgr. d'ovaire frais.)

### Indications :

Insuffisances ovariennes, troubles de  
la ménopause, naturels ou post-  
opératoires.

### Posologie :

4 à 6 comprimés par jour.

**Laboratoires « OPTIMA » S. A.**

78-80, Grande-Rue-au-Bois

BRUXELLES.

## **OVARINE TISY**

En cachets de 20 centigrammes.

---

### **Pharmacie TISY**

R. et A. FEIGNOUX, Successeurs  
95, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## **OVARO-THYROIDINE OPTIMA**

(Comprimés pluriglandulaires dosés à raison de 20 cgr. glande ovarienne fraîche et 10 cgr. glande thyroïde fraîche par comprimé.)

**Indications.** — Insuffisances endocrines, troubles de la ménopause naturels ou post-opératoires, obésité, rhumatisme chronique et déformant, troubles circulatoires relevant de la ménopause.

**Doses.** — 3 à 6 comprimés par jour.

**Laboratoires « OPTIMA » S. A.**

78-80, Grande-Rue-au-Bois  
BRUXELLES.

## OVO-LÉCITHINE BILLON

Stimulant des fonctions de la nutrition et d'assimilation ; s'oppose à la déminéralisation phosphorée.

*Indications :*

**Dénutrition, Fatigue cérébrale, Surmenage, Neurasthénie, Grossesse.**

*Posologie et mode d'emploi :*

Dragées : Six par jour.

Granulés : Trois cuillerées à café par jour.

Ampoules : Une injection tous les deux jours.

Chez les enfants, réduire la dose selon l'âge.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

**« SPÉCIA »**

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## OVULES CHAUMEL

Les Ovules à la Glycérine solidifiée, et aux principaux médicaments, constituent le mode de pansements vaginaux le plus commode.

**Indications :**

*Aménorrhée.* — Ovules Chaumel emménagogues (apiol, cannelle).

*Antisepsie.* — Ovules Chaumel acide borique.

*Congestions.* — Ovules Chaumel simples et ichthyol.

*Douleurs.* — Ovules Chaumel sédatifs (belladone-morphine).

*Inflammations.* — Ovules Chaumel résolutifs (iodure-belladone).

*Leucorrhée.* — Ovules Chaumel astringents (tannin-sulfate de zinc).

*Métrites.* — Ovules Chaumel ichthyol.

*Vaginites.* — Ovules Chaumel ichthyol.

**Établissements FUMOUCHE**

78, faubourg Saint-Denis — PARIS:

## OVULES « ROCHE »

au Thigénol.

(Voir également page « Thigénol »)

**Propriétés thérapeutiques.** — Analgésiques, antiseptiques, décongestionnants et puissamment résolutifs. On constate au bout de quelques jours du traitement par les *Ovules « Roche »* la sédation parfaite des douleurs, et, après quelque temps, l'arrêt complet des pertes. De même, les ulcérations rétrocedent rapidement et le volume des organes hypertrophiés diminue dans des proportions notables, ce qui permet de retarder, sinon d'éviter une intervention chirurgicale.

**Indications thérapeutiques.** — Vaginites, Vulvovaginites, Métrites, Paramétrites, Gonorrhée, Leucorrhée, Métorrhée, etc., etc.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**  
21, place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## OXYDOTHYRINE PÂRIS

**Composition.** — La totalité des principes actifs de la glande Thyroïde privée de toxine par un procédé spécial, Est sans action sur le cœur.

**Indications.** — Embonpoint. Obésité. Fibrome. Goître et tous les états dus à l'insuffisance thyroïdienne.

**Forme.** — Pilules renfermant 0 gr. 10 de substance active.

**Posologie.** — 1 à 2 par 24 heures prises de préférence le matin à jeun.

Prix : 20 francs le flacon de 50 pilules.

**Laboratoires Biologiques**

**André PÂRIS**

4, rue de La Motte-Picquet—PARIS (XV<sup>e</sup>).

## OXYDOVARINE PÂRIS

**Composition.** — Tous les principes actifs de l'ovaire. Corps jaune et cellules interstitielles.

**Forme.** — Pilules dosées à 0 gr. 10 de substance ovarique totale.

**Posologie.** — 2 à 6 par 24 heures aux repas.

**Indications.** — Troubles de la menstruation. Retentissements pathologiques de l'ovariotomie. Irrégularités. Insuffisance. Douleurs périodiques, accidents de la ménopause, etc.

Prix : 20 francs le flacon de 50 pilules.

**Laboratoires Biologiques**

**André PÂRIS**

4, rue de La Motte-Picquet—PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

## OXY-INJECTEUR DU D<sup>r</sup> FIALIP

Appareil pour injections sous-cutanées d'oxygène naissant.

**Indications.** — Toutes les insuffisances respiratoires : Asthme, Emphysème, en diminuant la dyspnée ; Tuberculose, Broncho-pneumonie, *Asphyxies accidentelles et cyanose des nouveau-nés*, septicémies et intoxications en oxydant et détruisant les toxines ou poisons organiques.

**Avantages de l'appareil.** — Portatif, peut se mettre dans une poche de manteau. — Fabrique son oxygène au moment de l'emploi. — Pas d'obus à recharger. — Toujours prêt à fonctionner.

Complet avec tous ses accessoires : 125 francs.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> FIALIP**

23, av. de la Motte-Picquet, PARIS (VII<sup>e</sup>).

## OXYLÉINE

**Forme.** — Flacons de 50 comprimés.

**Principe actif.** — Sulfate neutre d'oxyquinoléine, kaolin et hydroxyde d'alumine colloïdal.

### Indications thérapeutiques :

**Troubles gastro-intestinaux :** Colites, ulcérations, diarrhées, fermentations, dysenterie, flatulences, ptoses, névroses digestives, intoxications intestinales, diarrhées estivales des enfants, parasites intestinaux, excepté le ténia.

**Troubles des voies urinaires :** Toutes les infections, pyérites, cholécystites et colibacilloses.

### Mode d'emploi :

**Adultes** au-dessus de 15 ans : De 3 à 4 comprimés à chaque repas du midi et du soir.

**Enfants** de 8 à 15 ans : De 2 à 3 comprimés à chaque repas du midi et du soir.

**Enfants** de 4 à 8 ans : 1 comprimé à chaque repas du midi et du soir.

**Avaler**, ne pas croquer pour éviter le goût désagréable.

Prix: 14 francs. Durée : 8 jours.

**Laboratoires DROUET & PLET**  
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

## OXYMMENTHOL PERRAUDIN

### (Tablettes)

A base d'oxygène naissant, menthol, cocastovaline, benzoate de soude, etc.

Tablettes de goût agréable.

**Doses et mode d'emploi.** — Adultes, 6 à 10 par jour à sucer ; Enfants, 3 à 6 par jour à sucer.

**Propriétés thérapeutiques.** — Anesthésiques, antiseptiques, pectorales.

**Indications.** — Affections des voies respiratoires et de la gorge, Toux, Gripes, Pharyngites, Bronchites, Asthme, Emphyseme, Tuberculose, hygiène de la bouche et des dents.

Prix au public : 6 fr.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

**Laboratoire des Produits SCIENTIA**

D<sup>r</sup> E. PERRAUDIN, pharmacien  
21, rue Chaptal — PARIS.



## OXYMUTH SACA

**Composition.** — Hydrate d'oxyde de bismuth en suspension dans l'huile d'olive pure.

**Forme.** — Ampoules de 2 cc. renfermant 0 gr. 15 d'hydrate d'oxyde de bismuth (= 0 gr. 125 de bi-métal actif).

**Indications.** — Syphilis à toutes les périodes.

**Mode d'emploi.** — Une ampoule tous les 2 ou 3 jours en injection intramusculaire.

Prix de la boîte de 12 ampoules : 18 fr

**Usines Chimiques**

**des Laboratoires Français**

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

Dépositaire :

**Laboratoire et Pharmacie A. MILLET**

5, rue Ambroise-Thomas — PARIS (IX<sup>e</sup>).

Tél. : Provence 58-43.

---

## OZOBIASE

**Principe actif.** — Catalyseur oxydant (Facteur O de R. Monceaux. Prix Meige 1929). Communication Société de biologie, 27 février 1926 ; Société de Thérapeutique, 10 février 1926 ; Dr Moricet, Thèse de Paris 1926.

**Indications thérapeutiques.** — Nutrition du tuberculeux, Amaigrissements, Hypotrophie.

**Forme.** — *Comprimés* : Boîte de 60 et 1/2 boîte de 30.

**Doses.** — *Adultes* : 2 à 3 comprimés avant chaque repas du midi et du soir.

*Enfants* de 10 à 15 ans : 1 à 2 comprimés midi et soir.

Au-dessous de 10 ans : 1 comprimé midi et soir.

Pour les *petits* : Ecraser le comprimé et en donner la moitié, dans du lait ou des confitures.

Pour l'*adulte* : avoir soin de *casser les comprimés avant de les avaler*.

Prix : 20 francs la boîte. 12 francs la demi-boîte.

Durée : 10 à 12 jours.

**Laboratoires DROUËT et PLET**

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

## OZOBIASE OPOTHÉRAPIQUE

Principe actif : catalyseur oxydant (Facteur O de R. Monceaux — Prix Meige 1929 — et 0,03 Ext. total de glandes surrénales). Communication Société de biologie, 27 février 1926 ; Société de thérapeutique, 10 février 1926 ; Dr Moricet, Thèse Paris 1926.

**Indications thérapeutiques.** — Nutrition du tuberculeux, Amaigrissements, Hypotrophie.

**Forme.** — Comprimés. Boîte de 50.

**Doses.** — *Adultes* : 2 à 3 comprimés avant chaque repas du midi et du soir.

*Enfants* de 10 à 15 ans : 1 à 2 comprimés midi et soir ;  
au-dessous de 10 ans : 1 comprimé midi et soir. *Avoir soin de casser les comprimés avant de les avaler.*

Prix : 16 fr. la boîte.

Durée : 8 à 10 jours.

**Laboratoires DROUET et PLET**  
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

---

## PAIN ESSENTIEL

avec ou sans chlorure.

**Composition.** — Le **Pain Essentiel** est préparé avec des gruaux de blé dur, riches en gluten, additionnés de protéines du lait solubilisées.

**Présentation.** — Chaque baguette de 10 gr. représente la valeur nutritive de 16 gr. de pain ordinaire, et renferme 6 gr. d'hydrocarbures.

**Avantages.** — A été étudié pour convenir à tous les régimes. Très friable, mais oblige le malade à mastiquer ses aliments.

**Indications thérapeutiques.** — Produit de haute valeur nutritive. A recommander dans tous les cas de convalescences, surmenage et alimentation difficile ; aux dyspeptiques, entéritiques et diabétiques légers. Aux obèses : maximum 3 et 4 baguettes par repas.

Dans d'excellentes panades galactagogues.

**Sans chlorure** pour arthritiques et albuminuriques.

**Produits de Régime HEUDEBERT**

85, rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine).

2 et 4, chemin Feuillat — LYON.

---

## PAINS SPÉCIAUX HEUDEBERT

Les **Pains spéciaux Heudebert** ont été créés pour l'alimentation des malades auxquels l'usage du pain est interdit.

### **Pour tous régimes.**

Pain Essentiel avec ou sans chlorure (voir article spécial).

### **Dyspepsie, entérite.**

Pains grillés, Longuets et Gressins.

### **Constipation.**

Pain complet.

### **Obésité.**

Gressins, Pain Essentiel.

### **Diabète.**

Pain de gluten (régime très sévère, 5 à 10 p. 100 d'hydrocarbonés). Pain d'aleurone (régime sévère, 15 à 20 p. 100). Spécial diabétique (régime normal, 30 à 35 p. 100 d'hydrocarbonés).

### **Albuminurie, arthritisme.**

Pain hypoazoté, Biscottes, Longuets et Gressins sans sel.

Pain des villes d'eaux.

**Pain de Royat** (cœur, vaisseaux), **Pain de Contrexéville** (reins, voies biliaires), **Pain de Châtel-Guyon** (constipation), **Pain de St-Nectaire** (albuminurie), **Tranches de Plombières** (estomac, intestins), **Pain de Brides** (obésité), **Pain de Vittel** (arthritisme), **Pain d'Evian** (néphrites, artériosclérose).

La haute valeur nutritive de ces pains permet de régler médicalement leur consommation.

### **Produits de Régime HEUDEBERT**

85, rue St-Germain — NANTERRE (Seine).

2 et 4, chemin Feuillat — LYON.

## **Jus de raisin naturel PAMPRYL**

**Blanc et rouge.**

**Composition.** — Pur jus de raisins frais sélectionnés, préparé à Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or) par un procédé perfectionné conservant intégralement toute la saveur du raisin mûr fraîchement cueilli.

**Ne subit aucune concentration. Jus de raisin frais intégral.**

**Indications.** — **Nutritif, Antitoxique, Alcalinisant, Diurétique.**

Toutes les indications de la cure de raisin : Auto-intoxications, Entérites, Insuffisance hépatique et rénale, Urologie, Néphrites, Arthritisme, etc.

**Boisson de chevet des malades dans tous les états infectieux et fébriles.**

**Dose moyenne.** — 3 verres à bordeaux par jour, on peut augmenter sans inconvénient.

Se trouve dans toutes les Pharmacies : bouteille, 10 fr. 50 ; demi-bouteille, 6 fr. 70 ; quart, 4 fr. 75.

**Bien spécifier la marque « Pampryl ».**

**Société du PAMPRYL**

2, villa de la Terrasse — PARIS. Tél. : Wagram 33.00.

---

## PANBILINE

**Formes.** — Pilules et Solution.

**Définition.** — La Panbiline, Spécifique total des *Maladies du Foie* et des affections qui en dérivent, est la seule médication agissant simultanément sur la sécrétion hépatique et sur l'excrétion biliaire.

(Voir *Rectopanbiline*.)

**Composition.** — Elle associe synergiquement les Opothérapies Hépatique et Biliaire avec les meilleurs Cholagogues sélectionnés et réunit, en milieu glyciné : Extrait hépatique, extrait biliaire intégral, extrait de Boldo, podophyllin (traces). La Panbiline n'est ni toxique ni irritante, et ne contient ni sucre, ni alcool.

**Indications.** — Insuffisances hépatique et biliaire, Lithiase biliaire (Coliques hépatiques, Ictères), Hépatisme-Arthritisme, Cholémie familiale, Diabète par Dyshépatie, Artériosclérose, Tuberculose et Lymphatisme justiciables de l'Huile de Foie de Morue, que la Panbiline remplace. Dyspepsies, Hyperchlorhydrie, Entérite mucomembraneuse, Constipation, Appendicite, Fièvre typhoïde, Intoxications, Infections, Névroses, Troubles de la grossesse, Dermatoses par dyshépatie, Maladies des pays chauds, Congestions du foie, Hépatites et Cirrhoses (Alcool, Paludisme, Syphilis).

**Doses moyennes.** — 6 pilules de Panbiline par jour, ou 6 cuillerées à café de Panbiline liquide par jour, au début des repas. Demi-dose pour les enfants.

Prix au public :

12 francs la boîte de pilules de Panbiline.

17 francs le flacon de Panbiline liquide.

**Laboratoire de la PANBILINE**  
ANNONAY (Ardèche).

## PANCRÉANNE

**Composition.** — Association de poudre de pancréas, pancréatine, tanin, sous forme de comprimés.

**Action thérapeutique.** — Assure la digestion totale des différentes sortes d'aliments, régularise la sécrétion intestinale, excite la sécrétion interne des Ilots de Langerhans.

**Indications.** — Dyspepsie. — Entérites. — Insuffisances digestives. — Diabète (cure d'entretien et de remplacement de l'insuline injectable).

**Mode d'emploi.** — 2 à 3 comprimés à la fin des repas.

Prix au public : 15 fr. 80.

**Laboratoire des VALÉROMENTHOL**

10, rue Poncelet — PARIS.

Tél. : Wagram 37-58.

---

## PANCRÉASTASE DEFRESNE GRANULÉE

**Caractéristiques.** — Suc duodéno-pancréatique total activé maltasé à 5 p. 100. Ne contenant ni pulpe, ni déchet et présenté sous forme de granulés protégés par un enrobage spécial.

**Indications.** — Digestions difficiles et prolongées. Troubles de l'assimilation : croissance insuffisante, amaigrissement, accidents anaphylactiques, urticaire, eczéma, réactions sériques.

**Chez le nourrisson.** — Traitement de l'intolérance au lait de vache, de l'athrepsie, du rachitisme, par la technique de prédigestion du lait au moyen de la Pancréastase.

Aucune contre-indication.

**Doses.** — Enfants jusqu'à 6 ans : 2 à 6 cuillères-mesures par jour. Grands enfants ou adultes : 6 à 12 cuillères-mesures par jour.

Littérature et échantillons :

**Laboratoires DEFRESNE**

19, rue Jacob — PARIS.

## PANCRÉPATINE LALEUF

Capsules glutinisées.

**Composition.** — Extrait spécial de *Pancréas* activé par addition de *Suc hépatique* et analgésine. Chaque capsule contient 25 centigrammes de principes actifs.

**Propriétés et indications thérapeutiques.** — Opothérapie du *Diabète* par médication interne. Sous l'influence de la Pancrépatine, on remarque :

- 1° Abaissement de la Glycémie ;
- 2° Abaissement et disparition totale fréquente de la Glycosurie ;
- 3° Disparition de la Polyphagie et retour à un appétit normal ;
- 4° Disparition des troubles secondaires : soif, polyurie, prurit, etc. ;
- 5° Amélioration rapide de l'état général.

**Mode d'emploi et doses.** — Les capsules de Pancrépatine Laleuf doivent toujours être prises au cours des repas. De 6 à 12 capsules par 24 heures suivant prescription médicale.

Etui de 100 capsules : 24 francs.

**Laboratoires LALEUF**

20, rue du Laos — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## PANCRINOL DU D<sup>r</sup> DEBAT

Extraits de foie, rate,  
rein et surrénale.

*Ampoules buvables.*  
(2 à 4 par jour.)

Anémies, Convalescences, Tuberculose,  
Surmenage, Fatigue.

La boîte de 10 amp. : 18 francs.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> DEBAT**

60, rue de Prony — PARIS (XVII<sup>e</sup>).



## PANFÉBRINE

*Médicament de la fièvre et de toutes les fièvres.*

**Stimulant les fonctions hépatique, biligène et splénique, sans action déprimante sur le cœur.**

**Traitement du paludisme : Panfébrine AB.**

**Spécifique de toutes les pyrexies : Panfébrine B.**

**1° Panfébrine B (toutes fièvres).**

**Composition.** — Alcaloïdes totaux hydrogénés des Cinchonas. Opothérapie hépatique, biliaire et splénique.

**Son rôle.** — Antithermique dans toutes les *pyrexies*.

**Action.** — 1° Apyrétique énergique chez tous les tuberculeux fébricitants ;

2° Maladies infectieuses (grippe, dothiéntérie, scarlatine, etc., et phlegmasies de toutes sortes).

**Posologie.** — Un cachet-comprimé de Panfébrine B dès que la température est à 38° ou au-dessus (peut être renouvelée 2 à 4 fois en 24 heures).

**2° Panfébrine AB (paludisme).**

**Composition.** — Panfébrine A : Acide méthylarsénique  $As = O-CH^3 (OH)^2$ . Alcaloïdes totaux hydrogènes des Cinchonas. Opothérapie hépatique, biliaire et splénique.

**Panfébrine B :** Composition indiquée ci-dessus.

**Son rôle.** — Action spécifique dans le paludisme (n'occasionne jamais d'accidents quinqués).

**Avantage.** — Innocuité absolue.

**Posologie.** — Préventif : 1 cachet-comprimé A le matin, 1 cachet-comprimé B le soir. — Paludisme aigu et chronique : 3 cachets-comprimés A et 3 cachets-comprimés B par jour. — *Enfants* : 12 ans, 2 cachets-comprimés A et 2 cachets-comprimés B par jour ; de 7 à 8 ans, 1 cachet-comprimé B par jour.

Echantillons et littérature.

**Laboratoires DORANTOWICZ**

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI<sup>e</sup>)

Tél. : Roquette 14-12.

## PANGADUINE

*Extraite directement des Foies de Morue.*

Contient tous les principes actifs, alcaloïdes, phosphoglycérides, lécithines, vitamines, contenus dans l'**Huile de foie de Morue**.

Elle permet d'absorber sous une forme agréable et parfaitement assimilable les principes médicamenteux correspondant à une dose d'huile de foie de morue intolérable pour le malade.

**Elixir de Pangaduine.** — *Très agréable au goût,* contient 10 cgr. de **Pangaduine** par cuillerée à bouche. *Dose :* Un verre à liqueur avant chaque repas.

**Pangaduine granulée.** — Contient 10 cgr. de **Pangaduine** par cuillerée à café. *Dose :* Une cuillerée à café avant chaque repas.

**Ch. SOUILLARD**

2, rue du Marché-des-Blancs-Manteaux — PARIS.

## PANGASTROL

Pansement de l'Estomac.

**Composition.** — Kaolin, Bismuth, Belladone, Codéine, Carbonate de Chaux, Magnésie.

**Forme.** — Sachets de 10 grammes.

**Propriétés thérapeutiques.** — De par sa composition, le PANGASTROL réalise le pansement gastro-intestinal le plus parfait, et soulage rapidement les douleurs les plus aiguës.

**Indications.** — Hyperchlorhydries, Spasmes gastriques, Ulcères, Aérophagie, Dyspepsies, Diarrhées, Fermentations.

Prix : 14 fr.

**Laboratoire STOULS**

156, avenue Victor-Hugo — PARIS.

Téléphone : Passy 68-14.

## PANGESTYL NARTY

**Nature et action.** — Le *Pangestyl Narty* est un produit mixte qui agit : 1° Par les antiseptiques et absorbants qu'il contient, comme désinfectant remarquable du tube digestif ; 2° par l'heureuse combinaison des ferments qui en font un digestif de tout premier ordre, d'où son nom :

PANGESTYL. (*qui digère, tout*).

**Indications.** — Dyspepsies, Hypo ou Hyperchlorhydrie, Stases gastriques, Dilatations d'estomac, Désinfection intestinale, Diarrhées. Excellent désinfectant du foie et de ses voies d'excrétion ; Coliques hépatiques, Ictère ou Jaunisse, Angiocholites, Cholécystites, etc.

**Formes et Mode d'emploi.** — *Granulés ou Cachets*. Une cuillerée à café de granulé ou un cachet à la fin des repas ou au moment des malaises dans une infusion chaude, café, tilleul, thé, camomille, etc.

*Granulés* : 15 francs. *Cachets* : 12 francs.

**Laboratoires Georges TINARD**

134, boulevard Péreire — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## PANGLANDINE

**Description.** — Capsules kératinisées de 0 gr. 25 (50 par flacon) contenant une synthèse opothérapique : thymus, ovaires, rate, duodénum, hypophyse, capsules surrénales, thyroïde, pancréas, testicules, foie, prostate, en proportions physiologiques.

**Action thérapeutique.** — L'insuffisance fonctionnelle d'une glande à sécrétion interne, entraînant un surcroît de travail pour les autres, la médication opothérapique doit renforcer l'action des principales glandes en suppléant celle qui est déficiente et, par conséquent, comporter un mélange synthétique.

**Indications.** — 4 à 8 comprimés par jour dans la sénilité, l'obésité, la neurasthénie, les retards de croissance, les troubles de la puberté, le myxoedème, l'infantilisme.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS.

## « PANHÉMOL »

**Médication spécifique la plus active  
des Syndromes anémiques.**

Le « **Panhémol** » présente, au maximum de concentration et d'assimilabilité, *tous les éléments du sang vivant*, sauf l'eau de constitution évaporée par concentration dans le vide, à basse température.

**Formes.** — Sirop. — Comprimés.

**Composition.** — Chaque cuillerée à soupe de Sirop « **Panhémol** » contient :

{	Extrait hématique total obtenu par concentration dans le vide, à froid, de.....	20 cc.
	de Sérum et globules d'animaux sélectionnés.	
	Glycérophosphate de Sodium cristallisé.....	0 gr. 10
{	Sirop à l'extrait hydro-glycéro-alcoolique d'écorces d'oranges amères vanilliné.	
	Q. S. P .....	15 cc.

*Chaque comprimé contient :*

{	Extrait hématique sec total obtenu par concentration dans le vide, à froid de....	2 cc. 5
	de Sérum et globules d'animaux sélectionnés.	
{	Glycérophosphate de Sodium cristallisé....	0 gr. 05

Aucune autre préparation ne présente, à poids égal, une telle richesse en Hémoglobine (2 gr. 50 par cuillerée à soupe de sirop) et en principes actifs totaux du Sérum et des globules.

**Posologie.** — *Adultes* : une cuillerée à soupe pure ou diluée dans un peu d'eau pure ou gazeuse, immédiatement avant les repas de midi et du soir, ou 3 à 6 comprimés.

*Enfants* : Une ou deux cuillerées à café, suivant l'âge, avant les repas de midi et du soir, ou 1 à 3 comprimés.

**Indications.** — Toutes les Anémies, Convalescences, Croissances, Tuberculoses, Paludisme, Hémorragies, Rachitisme et toutes déchéances organiques.

« **Panhémol** » réalise au maximum de puissance et d'efficacité l'*Opothérapie séro-sanguine totale*.

Prix du flacon : 17 fr.

**Laboratoires R. BOUYSSOU et Cie**

90, avenue des Ternes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Téléph. : Wagram 61-42.

## PANOSTYL

Régénérateur total à base de sang pur de cheval **suractivé**.

Renferme l'hémoglobine totale à l'état naissant en solution dans le plasma sanguin.

**Anémies — Tuberculose — Dénutrition — Surmenage — Convalescences.**

**Présentation.** — Boîte de 6 ampoules voie buccale.

**Posologie.** — 2 ampoules par jour aux repas. Aucune contre-indication.

Prix de vente public : 18 francs.

Littérature et Echantillons :

**Laboratoires du PANOSTYL**

**J. GOIGOUX, Pharmacien**

199, avenue Victor-Hugo  
AUBERVILLIERS (Seine).

## PANTHÉSINE SANDOZ

Para-aminobenzoate de N. diéthyl-leucinol

Anesthésique local pour l'anesthésie par infiltration, par badigeonnage, régionale, rachidienne. Utilisé en chirurgie générale, oto-rhino-laryngologie, art dentaire, urologie, ophtalmologie.

**Propriétés.** — Rapidité, intensité et longue durée de l'anesthésie. Tolérance parfaite. Suites opératoires indolores. Anesthésie par contact aussi bien que par infiltration. Trois fois moins toxique que la cocaïne ; toxicité relative inférieure à celle de la novocaïne.

**Présentation.** *Ampoules* de 1 cc. et de 2 cc. d'une solution à 0,5 p. 100 additionnée d'une demi-goutte d'adrénaline à 1 p. 1000 par cc. et *flacons-ampoules* de 30 cc. de la même solution (art dentaire). — *Ampoules* de 2 cc. et 5 cc. à 0,5 p. 100, sans adrénaline (petite chirurgie, rachianesthésie). — *Ampoules* de 25 cc. et 50 cc. à 0,25 p. 100 avec et sans adrénaline (grande chirurgie). *Poudre* cristallisée de Panthésine pour la préparation des solutions. — *Solution* à 10 p. 100 pour l'anesthésie par badigeonnage. — *Collyre* à 2 p. 100 de Panthésine.

**Produits SANDOZ**, 3 et 5, rue de Metz — PARIS (X<sup>e</sup>).

Dépôt Général et Vente :

**Usine des Pharmaciens de France**,  
129, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

## **PANTOPON « ROCHE »**

Opium total injectable. — Tous les alcaloïdes de l'opium sous forme de chlorhydrates solubles et injectables.

0 gr. 01 de Pantopon « Roche »  
 = 0 gr. 50 ctg. de teinture d'opium,  
 = 0 gr. 025 mgr. d'extrait d'opium,  
 = 0 gr. 005 mgr. de morphine.

### **Posologie et mode d'emploi.**

Voie buccale :

### **PANTOPON « ROCHE » SIROP**

(dosé à 0,01 ctg. de Pantopon « Roche » par cuillerée à soupe.)

*Adultes* : 1 à 3 cuill. à soupe par jour et plus.

*Enfants* : 1 à 3 cuill. à café selon l'âge.

### **PANTOPON « ROCHE » COMPRIMÉS**

(1 comprimé = 0,01 ctg. de Pantopon « Roche »).

*Adultes* : 1 à 3 par jour et plus.

*Enfants* : 1/3 à 1 par jour, selon l'âge.

Voie Hypodermique :

### **PANTOPON « ROCHE » AMPOULES**

(1 ampoule = 1 cc = 0,02 ctg. de Pantopon « Roche »).

Boîtes de 3, 6 et 12 Ampoules.

*Adultes* : 1 à 2 par jour et plus.

*Enfants* : 1/4 à 1/2 ampoule selon l'âge.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes celles de l'opium, de la morphine et de leurs dérivés.

### **Produits**

**F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**  
 21, Place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

## **PAPAÏNE**

### **de TROUETTE-PERRET**

Ferment digestif, énergique, extrait du suc du Carica Papaya, digère les produits azotés, *quelle que soit la réaction de l'estomac*, acide, neutre ou alcaline.

**Indications.** — Toutes les fois que l'on digère mal.

*Pour les Adultes :*

**Elixir** « TROUETTE-PERRET » à la *Papaïne*. Prix au public : 18 fr.

Un verre à liqueur après chaque repas.

**Cachets** « TROUETTE-PERRET » à la *Papaïne*. Prix au public : 14 fr.

Un à deux cachets à chaque repas.

**Comprimés** « TROUETTE-PERRET » à la *Papaïne*. Prix au public : 14 fr.

Deux à huit comprimés à chaque repas.

*Pour les Enfants :*

### **SIROP DE PAPAÏNE** **de TROUETTE-PERRET**

Gastro-Entérite des nourrissons, Diarrhées, Vomissements.

Une demi ou une cuillerée à café avant ou après chaque repas ou tétée.

A souvent réussi après échec de toute autre médication. Prix au public : 18 fr.

Bien formuler : *Elixir, Sirop, Cachets, Comprimés de TROUETTE-PERRET*, à la *Papaïne*.

**Laboratoires TROUETTE-PERRET**

15, rue des Immeubles-Industriels, 15  
PARIS (XI<sup>e</sup>).

## PAPAVERYL

**Comprimés de Chlorhydrate de Papaverine chimiquement pur** dosés à 4 centigrammes.

**Toxicité** très minime (le moins toxique des alcaloïdes de l'opium). Contrôle physiologique. Ne fait plus partie du tableau B.

**Indications.** — *Tous les spasmes musculaires lisses.* Résultats particulièrement remarquables dans : l'*hypertension*, l'angine de poitrine, les spasmes digestifs, l'entérococolite muco-membraneuse, les coliques hépatiques, néphrétiques, la constipation spasmodique, l'asthme, les toux spasmodiques (Coqueluche), le hoquet, la dysménorrhée, etc...

**Posologie.** — 2 à 6 comprimés par jour et plus (la toxicité chez l'homme est extrêmement faible) ; chez l'enfant, 1/4 de comprimé par année d'âge (1 centigramme). Mieux supporté et plus actif que la belladone.

**Présentation.** — Tube de 20 comprimés dosés à 4 centigr. par comprimé.

**Littérature sur demande.** Thèse Baconnet 1927, Paris ; Rosenberg Mendel Wolf 1929, Paris.

**Laboratoires ORRILLARD**  
245, rue de Vaugirard — PARIS.  
Tél. : Ségur 41-59.

## PAPAVHYDRINE

**Composition.** — Papaverine standardisée au point de vue spasmolytique, additionnée de 1 milligr. Eumhydrine.

**Avantages.** — Réalise le traitement des troubles de la musculature lisse, sans aucune action secondaire, ni les inconvénients de l'atropine, des alcaloïdes (morphine) dont elle évite l'emploi.

**Indications.** — Crampes, spasmes pyloriques, spasmes intestinaux post-opératoires (voies intestinales, génito-urinaires, etc...).

**Formes.** — Boîte de 6 ampoules, de 6 suppositoires ou 6 tablettes.

**Posologie.** — 1 ampoule ou 1 suppositoire ou 1 tablette, 1 à 3 fois par jour.

Littératures et échantillons :

**Laboratoires des D<sup>rs</sup> R. et O. WEIL**  
**Établ. MERMINOD et C<sup>o</sup>, Concessionnaires**  
49, rue de Paradis — PARIS (X<sup>e</sup>).  
Tél. : Provence 30-32.



# PAPIER IODOGÈNE EYMONNET

## à l'Iode naissant

**Toute la révulsion.**

**Depuis la rubéfaction jusqu'à la vésication.**

Remplace : Vésicatoires, Sinapismes, Ventouses, Coton iodé.

Aucune contre-indication. Non toxique pour le rein.

**Mode d'emploi.** — Tremper une feuille dans un peu d'eau. L'Iode naissant apparaît. Appliquer à l'endroit voulu et recouvrir de la feuille imperméable incluse dans la pochette.

**Durée d'application.** — 2 à 5 minutes : Rubéfaction. — 5 à 10 minutes : Révulsion simple. — 10 à 20 minutes : Révulsion moyenne. — 30 à 40 minutes : Révulsion forte (légère vésication); au delà : vésication.

**Indications.** — Toutes affections pulmonaires et pleurales. Tous rhumatismes. Toutes névralgies, lumbagos, sciatiques.

La pochette, 2 feuilles. Prix : 5 fr.

**Laboratoire du Papier Eymonnet**

139, Cours Tolstoï, Villeurbanne — LYON (Rhône).

---

## PARADOLINE

Solution calmante sans Morphine ni aucun dérivé de l'Opium, Diurétique puissant.

**Composition.** — Boldo, Buchu, Uva-Ursi, Kawa-Kawa, Pichi, Piscidia, Salicylate et Bicarbonate de Soude, Glycérine, Eau distillée de Menthe.

**Indications.** — Disparition rapide de la douleur dans Coliques hépatiques, néphrétiques, Rhumatismes, Affections génitales, Spasmes des accouchées. En même temps traitement causal de ces affections.

**Posologie :**

Adultes : 1 à 4 verres à madère par 24 heures entre les repas.

Enfants : 1 à 3 verres à liqueur.

Prix du flacon de 500 cc. : 16 fr.

**Laboratoire CHEVILLON**

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-Oise).

## PARAGELOSE

**Composition.** — Emulsion pure d'huile de paraffine et de mucilages **décellulosés**.  
Goût agréable.

**Sans phénolphtaléine sans drastiques.**

**Indication.** — Toutes les constipations, spasmes, etc...

**Posologie.** — 1 à 3 cuillerées à bouche par jour, au moment des repas.

Prix du flacon : 18 francs.

**Produits PASSEUR,**  
22, rue des Martyrs — PARIS.  
R. C. 246.946.

---

## PARALACTINE BYLA

Deux formes actives :

**Comprimés sur lactose.**

**Culture pure sur lait.**

**Composition.** — La *Paralactine Byla* est constituée par une culture de ferments lactiques, d'activité et de stabilité contrôlées.

**Indications.** — Entérites aiguës et chroniques des enfants et des adultes, eczéma, urticaire, acné, herpès, toutes affections de la peau, et tous phénomènes consécutifs à l'auto-intoxication d'origine intestinale.

**Mode d'emploi.** — *Comprimés* : 1 à 3 comprimés dissous dans un peu d'eau sucrée, froide ou tiède, trois fois par jour.

**Culture sur lait.** — Quatre cuillerées à café par jour, délayées dans un peu d'eau lactosée.

**Les Établissements BYLA**  
26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

## PARALAXOL TULIVET

Paraffine liquide. Marque Française.

**Composition.** — Huile de Paraffine extra-pure entièrement exempte de dérivés phénoliques et benzéniques, de densité élevée, neutre, de goût agréable.

**Forme.** — 1° *Liquide* aux divers arômes (Anis, Menthe, Citron) ou sans arôme.

2° *Capsules.*

**Propriétés thérapeutiques.** — Lubrifie et rééduque l'intestin ; aucune action sur les muqueuses. Rendue intégralement dans les selles. Action laxative mécanique.

### Doses ;

1° **Capsules** : 3 à 6 par jour ; 1 ou 2 au début de chaque repas.

2° **Liquide** : au début du repas (1 à 3 fois par jour).

Adultes : par cuillerée à soupe.

Enfants : par cuillerée à café.

Nourrissons : par 1/2 cuillerée à café.

Se vend en flacons, demi-flacons et litres.

### Laboratoires TULIVET

G. de Saint-Stéban, docteur en pharmacie

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.

## PARATHYROCALCINE

### « MONCOUR »

#### REMINERALISATION

Fixation des SELS de CALCIUM  
par l'utilisation, comme *MORDANT*,  
de l'EXTRAIT TOTAL PARATHYROÏDIEN

**Indications.** — Prébacillose, bacillose, scrofule, convalescence, croissance, fractures, affections osseuses, décalcification dentaire, et, en général, toutes affections avec déminéralisation.

*Notre Extrait total Parathyroïdien, élément essentiel de la médication, est préparé avec des glandes soumises à un contrôle histologique régulier.*

Cachets : 1 à 3 par jour.

Comprimés : 2 à 6 —

### Laboratoire MONCOUR

49, avenue Victor-Hugo — BOULOGNE-PARIS.

Tél.: Molitor 08-47.

## PARLAX

Huile de Paraffine pure de haute viscosité.

**Description.** — *Parlax* est la reine des huiles de Paraffine. Inodore et insipide, limpide comme le cristal de Roche, sa pureté est absolue.

**Indications.** — Son onctuosité et sa viscosité remarquables lui permettent d'assurer le rythme de l'évacuation intestinale. *Parlax* doit être prescrit : Dans tous les cas de constipation, entérites, appendicite, hémorroïdes ; aux opérés, aux femmes enceintes, aux nourrissons.

**Doses.** — *Adultes* : 1 cuillerée à potage deux fois par jour.

*Enfants* : 1 cuillerée à café deux fois par jour. De préférence pendant les repas, dans les purées de pommes de terre, de légumes secs, avec les épinards, endives et salades cuites, etc. Dans la salade assaisonnée au jus de citron. Dans les confitures, compotes de fruits.

**Laboratoires F. LATOUR**

71, rue Douy-Delcupe

MONTREUIL-SOUS-BOIS (Seine).

## PAROXYL

(Gouttes spécifiques contre la coqueluche.)

Le *Paroxyl* n'est pas toxique. Il ne renferme aucune substance vénéneuse, ni stupéfiante.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action régulière et sûre.

Effet *non seulement calmant, mais curatif.*

**Indications.** → Coqueluche (nourrissons, enfants et adultes).

Pas de contre-indication.

**Posologie.** — 3 prises par jour (quel que soit l'âge du malade).

Trois prises par jour :

Enfants de moins de 1 an ....	X à XXX gouttes.
— de 1 à 5 ans.....	XX à LX gouttes.
— de 5 ans et au-dessus..	XX à C gouttes.
Adultes .....	XXX à C gout.

Prix : 11 francs.

**THIRIET et C<sup>ie</sup>**

26 et 28, rue des Ponts — NANCY.

## PASSIFLORINE

Traitement phytothérapeutique des états  
névropathiques.

**Composition.** — Une cuill. à café contient  
0 gr. 50 extrait fluide de *Passiflora incar-*  
*nata* ; 0 gr. 25 extrait mou de *Salix Alba* ;  
XX gouttes alcoolé de *Cratægus oxya-*  
*cantha*.

**Action.** — La *Passiflore* diminue la tension  
artérielle, régularise l'influx nerveux dans  
le domaine du grand sympathique et est un  
sédatif et un antispasmodique de premier  
ordre.

Son action est renforcée et prolongée dans la  
Passiflorine par le *Saule*, sédatif nervin  
que les auteurs américains ont comparé  
au bromure, et par le *Cratægus* dont l'ac-  
tion tonocardiaque et équilibrante du sys-  
tème nerveux est bien connue (Huchard,  
Renon, H. Leclerc, etc.).

**Indications.** — Tous états névropathiques :  
angoisse, anxiété, neurasthénie, etc. In-  
somnie nerveuse, troubles fonctionnels du  
cœur d'origine nerveuse (palpitations,  
tachycardie, etc.), troubles nerveux de la  
vie génitale, etc.

**Posologie.** — Comme médicament équi-  
brant du système nerveux : une cuillerée à  
café midi et soir avant les repas.

Contre l'insomnie nerveuse : une à trois  
cuillerées à café le soir.

**G. RÉAUBOURG**, docteur en pharmacie,  
1, rue Raynouard — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## PASSIVAL

### Antispasmodique nouveau

(Procédé Elzévir.)

Action *synergique* de la Passiflore et de la Valériane désodorisée. (La Passiflore renforce l'effet de la Valériane.)

Goût agréable.

Effet presque immédiat, et toujours constant.

Expérimenté et adopté dans les hôpitaux et cliniques de Paris.

### Posologie :

2 à 4 cuillerées à café par jour.

Echantillon et littérature au Corps médical.

**Laboratoires H. SALLE**

1, rue Elzévir — PARIS (III<sup>e</sup>).

## PASTILLES FAYÈS

à la Sulfocaïne.

Menthol, codéine, aconit.

**Propriétés.** — Sédatives, antiseptiques et calmantes.

**Indications.** — Toux, rhumes, gripes, amygdalites, pharyngites, irritations du larynx, enrrouement, fatigue vocale.

Leur usage à titre préventif est recommandé aux personnes obligées de fréquenter des milieux infectés (hôpitaux, magasins, métro), elles complètent l'action prophylactique du Sulfo-Rhinol Fayès dans les narines.

**Dose.** — *Adultes* : une pastille toutes les deux heures.

*Enfants* de 8 à 12 ans : une demi-pastille toutes les deux heures.

**Laboratoires des Produits Fayès**

199, rue Saint-Denis — PARIS (II<sup>e</sup>).

## PÂTE DERMOS

**Formule.** — Pâte de Lassar (amidon, oxyde de zinc, lanoline, vaseline, *ââ*) modifiée par adjonction en *faible* proportion de goudron végétal *dépuré* (5 %) et d'oxyde jaune de mercure à 1 %.

Préparation très soignée avec des produits de choix dans un laboratoire moderne comportant un outillage perfectionné.

**Indications.** — Eczémas, Psoriasis, Ulcères variqueux des adultes, Impétigos des enfants.

**Avantages.** — Topique kératoplastique. Analgésique et cicatrisant de premier ordre.

Agissant plus par ses propriétés physiques que par ses propriétés chimiques.

Efficacité garantie. Sans danger pour les enfants.

**Laboratoires NEYRET**

35, rue de la Bourse — LYON.

---

## PÂTE MIREILLE

A l'extrait concentré de Sirop Mireille.

(Voir à *Sirop Mireille*.)

Mêmes propriétés : même composition (avec en plus : cocaïne et chlorate de potasse).

Même saveur plaisante.

Prix au public : 4 fr. 50 (exempt d'impôt).

LABORATOIRES LEGENDRE et C<sup>ie</sup>.

Section D. S. — Houilles (S.-et-O.).

DÉPOT GÉNÉRAL :

*France, Colonies et Protectorats.*

O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

*Belgique* : M. Ramlot, 72, rue de l'Escaut,  
à Bruxelles-Maritime.

## PÂTE NEYRET

**Formule.** — Pâte de gomme au miel contenant exactement par chaque morceau :

Salicylate de soude ...	0 gr. 10
Menthol .....	0 gr. 01
Cocaïne .....	0 gr. 001 mgr

**Doses.** — 8 à 12 morceaux à laisser fondre lentement dans la bouche.

**Originalité.** — Emploi du salicylate de soude sous forme de pastilles, pour le traitement des Angines, Pharyngites, Trachéites, Bronchites, etc.

D'un goût agréable, la Pâte NEYRET est très faiblement mentholée.

Emploi plus pratique que celui des divers gargarismes et collutoires.

**Laboratoires NEYRET**

35, rue de la Bourse — LYON.

## PATHOLYSINE

(Traitement interne des néoplasmes.)  
Deux formes : Ampoules et Pilules.

**Composition.** — Salicyl - arséni - oxybenzénol-magnésien.

**Indications.** — S'emploie dans tous les cas où le tissu conjonctif sous-cutané est intéressé, c'est-à-dire dans tous les cas de cancer, sauf le cancroïde.

**Mode d'emploi.** — 1° Ampoules : Injecter quotidiennement une ou deux ampoules de 1 centimètre cube. En injections sous la peau de l'abdomen ou des membres ou en injections intramusculaires dans les muscles fessiers ou dans ceux de l'épaule.

2° Pilules : Quatre pilules par jour, au moment des repas.

Prix : Ampoules, 20 fr. ; Pilules, 15 fr.

**LABORATOIRES A. LEJEUNE**  
142, rue de Picpus — PARIS (XII<sup>e</sup>).



## PAVÉRON DAUSSE

(Alcaloïdes totaux de l'Opium)

*Hypnotique, sédatif, analgésique.*

Complexe alcaloïdique renfermant à l'état de chlorhydrates solubles tous les alcaloïdes de l'Opium.

0 gr. 02 de Pavéron = 0 gr. 01 de Morphine.  
Action plus douce, plus régulière et plus durable que celle de la Morphine.

**Indications.** — Toutes les indications de l'Opium, de la Morphine et de ses succédanés.

**Formes et posologie.** — *Ampoules de Pavéron* dosées à 0 gr. 02 de Pavéron par cc.  
*Dose* : 1 ampoule à la fois.

*Dragées de Pavéron* dosées à 0 gr. 01 de Pavéron. — *Dose* : 1 ou 2 dragées à la fois.

### Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## PAXENE

**Trois synergies phytothérapiques.**

**Sédatif Nervin** : Valériane et Cypripedium.

**Antispasmodique** : Chaton de saule et Passiflore.

**Cardiotonique** : Cereus grand. et Aubépine.

**Indications** : Névropathies, Cardiopathies, Insomnies nerveuses.

**Doses.** — *Insomnies nerveuses* : 2 à 3 cuillerées à café le soir, pur ou dans un peu de tisane.

*Nervosisme en général* : 1 à 2 cuillerées à café à chaque repas.

**Médication très active, agréable, non toxique et sans accoutumance.**

**A. MILLET et CH.-O. GUILLAUMIN**

5, rue Ambroise-Thomas — PARIS.

## PELÉVINE

### BAUME PELÉVINE

**Composition.** — Salicylate de Phényle, zincum oxydatum, amyllum tritici, Paramido benzoate d'éthyle, Benzoe, Calendula, Styrax, Balsamum Peruvianum, Lanovaseline, Parfum.

**Indications.** — Adoucit et calme, antiseptise, décongestionne, cicatrise, guérit : crevasses et croûtes du sein, rougeurs et érythème des nourrissons, brûlures, coups de soleil, engelures, escharres des malades, toutes les inflammations de la peau ; cicatrisation des plaies non infectées.

### POUDRE PELÉVINE

Hygiénique, minérale, antiseptique, isolante, en saupoudration.

**Composition.** — Acide orthoxybenzoïque, Acidum boricum, Zincum oxydatum, Calcium carbonicum, Silicates d'Aluminium et de Magnesium hydratés, Parfum.

**Indications.** — Toilette journalière des bébés, des dames, des obèses, des malades. Erythème des nourrissons, escharres des malades. Désodorisation et suppression de la transpiration des pieds. Toutes les inflammations de la peau en général.

**Baume et Poudre se complètent.**

**Laboratoires ÉVINE**

3, rue de la Perle — PARIS.

## PÉLOSPANINES

Sulfates de terres rares.

Traitement des Bacilloses subaiguës ou chroniques et des « Déficiences organiques ».

**Injections intraveineuses :**

Pelospanines A, ampoules de 2 cc.

Pelospanines B, ampoules de 4 cc.

**Injections intramusculaires :**

Pelospanines C, ampoules de 2 cc.  
(associat. lipoïdique).

**Pelospanines G. (gouttes) dites : Pelo G.**  
(Didyme, Calcium, Manganèse, Magnésium.)

Prix : A : 12 fr. — B : 18 fr. — C : 12 fr.

G : 15 fr.

**Laboratoires FOURNIER Frères**

7, rue Biscornet — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## PELVISÉDOL

**Sédatif génital. Antiseptique urinaire et biliaire. Décongestif pelvien.**

Chaque dragée contient :

Hexaméthylène tétramine pure recristallisé..	0,03
Chloralose .....	0,01
Bromure de sodium.....	0,12
Lupulin en poudre.....	0,06
Sucre Q. S. pour 1 dragée terminée à 0 gr. 50	

### Indications :

*Chez l'homme :* Prostatisme, Cystites, Cholécystite, Urétrites, Rectites, Orchites, Épépidymites, Inflammation des vésicules séminales, Spermatorrhée.

*Chez la femme :* Métrites, Salpingites, Néphrites, Pyélonéphrites, Vaginites, Lombalgies, Congestion utéro-ovarienne.

*Chez l'enfant :* Incontinences d'urine.

*Affections communes aux deux sexes :* Rétentions, Blennorragie aiguë et chronique. Lithiases, Ténésmes, Entérocolites, Hémorroïdes.

*Posologie :* Adultes : 2 à 3 dragées au début de chaque repas.

Enfants : doses fractionnées selon l'âge.

**Dépôt général pour la France :**

**Pharmacie Centrale de France**

21, rue des Nonnains-d'Hyères — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## PENNÈS (Produits)

### Sel de J.-A. Pennès.

Hygiénique, reconstituant, stimulant.  
Remplace les bains alcalins et ferrugineux et surtout les bains de mer.

### Vinaigre de J.-A. Pennès

Antiseptique, hygiénique.

Rapport favorable de l'Académie de médecine.

### Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS (X<sup>e</sup>).

Téléphone : Nord 32-52, 32-53.

## PEPSODIA

Comprimé saturant anti-acide.  
anti-dyspeptique et anti-gastralgique  
Régulateur de la digestion.

**Présentation et Composition.** — Comprimé friable d'un emploi très pratique, utilisant à la fois l'action neutralisante des sels alcalins et alcalino-terreux et les propriétés absorbantes des sels neutres. Ne contient aucun toxique.

**Indications.** — Pyrosis, Hyperchlorhydrie, Fermentations acides, Spasmes pyloriques, Aérophagie, Troubles nerveux d'origine gastrique (Migraine, insomnie, vertige, nervosisme), Gastrites inflammatoires et toxiques. Ulcérations de l'estomac.

**Mode d'emploi et Doses.** — Dans les cas légers, 1 à 2 comprimés délayés dans un demi-verre d'eau froide ou tiède dès le début des sensations pénibles. Peut-être croqué comme une dragée.

En cas de gastrites ou d'ulcérations 2 à 4 comprimés et plus (pansement calmant).

Aucune contre-indication.

Prix au public : 9 francs.

**LABORATOIRE CHIMICOTHÉRAPIQUE DE PARIS**  
12, rue des Apennins — PARIS (XVII<sup>e</sup>).  
Téléphone : Marcadet 20-28.

## PEPTALMINE

Peptones de Viande et de Poisson  
Extraits d'Œuf et de Lait  
Farine de blé dans l'enrobage.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication anti-anaphylactique polyvalente.

**Indications.** — Migraines, Urticaires, Troubles digestifs par assimilation défectueuse, Rougeurs de la face, Somnolences ou Pesanteurs après les repas, Colites, Asthme, Prurits, Eczémas et, en général, les diverses manifestations anaphylactiques.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : 2 dragées ou 2 cuillers à café de granulés, *une heure avant chacun des trois repas.*

*Enfants* : Moitié de ces doses.

Prix au public : dragées : 15 fr. ; granulés : 15 fr.  
Autorisé par les Assurances Sociales.

**Laboratoire des Produits SCIENTIA**

Dr E. PERRAUDIN, pharmacien  
21, rue Chaptal — PARIS.

## PEPTALMINE MAGNÉSIÉE

Peptones de viande et de poisson.

Extraits d'œuf et de lait.

Farine de blé dans l'enrobage.

Sulfate de Magnésie.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication anti-anaphylactique et cholagogue.

**Indications.** — Troubles digestifs d'origine hépatique, insuffisance hépatique, congestions du foie, cholécystites chroniques et toutes les manifestations anaphylactiques avec participation hépatique.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : 2 cuillérées à café de granulés ou 4 dragées 1 heure avant chacun des 3 repas.

*Enfants* : moitié de ces doses.

Prix au public : dragées : 15 fr. ; granulés : 15 fr.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

### LABORATOIRE

### DES PRODUITS SCIENTIA

D<sup>r</sup> E. PERRAUDIN, pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS.

---

## PEPTICOL

**Forme.** — Elixir de goût aromatique *très agréable*, absorbé sans répugnance, même par les tout jeunes enfants.

Sa forme liquide en permet une *assimilation parfaite* et une *action rapide*.

**Composition.** — Peptones de viande, de poisson, d'œuf, de lait, intégralement solubilisées.

Glycérine.

Amidon de blé prédigéré.

Alcool faible (titre 4°).

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication anti-choc complète ; spécifique des intoxications d'origine alimentaire ; excite l'appétit et facilite la digestion en augmentant et régularisant les sécrétions des glandes salivaires, des muqueuses gastriques et intestinales ; favorise les sécrétions et le péristaltisme du gros intestin.

**Indications.** — Urticaire, Manque d'appétit, Mauvaises digestions ; Intolérances stomacales ; Prurits ; Somnolences après les repas ; Flatulences ; Asthme.

**Posologie.** — *Enfants* : 1/2 cuillerée à café.  
*Adultes* : 1 à 2 cuillerées à café, 10 minutes avant les repas.

Prix au public : 15 francs.

**Laboratoire du Pepticol**  
13, avenue du Maréchal-Foch  
DAMMARIE-LES-LYS (S.-et-M.).

## PEPTODIASE

### Stimulant gastrique

**Forme.** — Gouttes.

**Composition.** — 1<sup>o</sup> Association de :

Chlorure de calcium.

— magnésium.

— sodium.

sels qui stimulent la sécrétion et la motilité gastriques et augmentent considérablement le pouvoir digestif du suc gastrique.

2<sup>o</sup> **Principes amers de la gentiane**, renforçant l'action des chlorures.

**Propriétés thérapeutiques :**

Réveille l'appétit.

Augmente la sécrétion et l'activité des sucs digestifs.

Accélère la digestion.

Favorise l'évacuation de l'estomac.

**Indications.** — Atonie gastrique.

Hypoacidité.

Hyposécrétion.

Digestion lente.

Aérogastrie.

Anorexie.

**Posologie.** — XXX gouttes dans un peu d'eau sucrée au début ou au milieu des repas.

**Enfants :** IV gouttes par année d'âge et par 24 heures.

Prix : 15 francs.

### Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie — Ex-Interne en Pharmacie —  
Lauréat des Hôpitaux, Lauréat des Fac. de  
Méd. de Paris et Bordeaux.

24-26, rue de Fécamp — PARIS (XII<sup>e</sup>).

Tél. : Diderot 28-96.

## PEPTO-FER JAILLET

**Composition.** — Combinaison organique chlorée de peptone de fer.

**Avantages.** — Le fer dans le PEPTO-FER du Dr JAILLET est *animalisé* par la peptone, ainsi l'organisme l'assimile-t-il avec une grande facilité ; le taux d'hémoglobine dans le torrent circulatoire est rapidement augmenté, sans aucune fatigue, ni pour l'estomac, ni pour l'intestin. La peptone facilite la digestion et y apporte son rôle antianaphylactique.

Le PEPTO-FER du Dr JAILLET n'a pas la saveur styptique de la plupart des préparations ferrugineuses, mais son goût agréable le fait accepter favorablement par le malade ; de plus, il ne noircit pas les dents et ne constipe pas.

**Indications.** — *Anémies.*

**Forme pharmaceutique.** — Elixir.

**Doses.** — *Grandes personnes* : 1 verre à liqueur après chaque repas.

*Enfants* : 1 à 2 cuill. à café après les repas dans un peu d'eau.

Prix : 14 francs au public.

**DARRASSE**

13, rue Pavée — PARIS.

## PEPTOGIL A. ET L.

**Peptones gastriques et pancréatiques.**

**Propriétés thérapeutiques.** — *Peptogil A.* — Médication antianaphylactique polyvalente spécifique de tous les albuminoïdes.

*Peptogil L.* — Lacto-spécifique.

**Indications.** — *Peptogil A.* — Urticaire, migraines, phénomènes congestifs qui suivent les repas, troubles du foie et de l'intestin et toutes manifestations anaphylactiques des enfants et adultes.

*Peptogil L.* — Intolérance lactée, urticaire, vomissements, diarrhée, etc. (enfants et adultes).

**Conditions d'emploi.** — *Peptogil A.* — 3 fois par jour 1/2 heure avant les repas, 2 à 4 comprimés.

*Peptogil L.* — 2 fois par jour une fois le matin au réveil, et toujours 1/2 heure avant la prise de lait, 1/2 cuillerée de granulés dissous à chaud dans un peu d'eau ou de tisane.

Prix de la boîte : 16 fr. 50.

**Laboratoires PROGIL**

6, boulevard de Strasbourg — PARIS (X<sup>e</sup>).



## PEPTO KOLA ROBIN

Type du Médicament Aliment.

Liqueur très agréable contenant des glycéro et de la Kola.

**Dose et mode d'emploi.** — 1 verre à liqueur avant chaque repas.

**Indications.** — Fatigues passagères physiques ou intellectuelles, Albumine, Diabète, etc.

**Laboratoires M. ROBIN**

13, rue de Poissy — PARIS.

---

## PEPTONAL

**Composition.** — PEPTONE de viande totale rendue inaltérable par dragéification spéciale.

**Action.** — Le meilleur préventif de la migraine par action empêchante de la crise hémoclasique ; curatif de l'urticaire par atténuation des effets de la crise.

**Indications.** — Migraine, somnolence, frissons, lourdeur après les repas (crise hémoclasique atténuée). Urticaire.

**Formes pharmaceutiques.** — Comprimés dragéifiés. — Granulé.

**Dose.** — Deux comprimés 1 heure avant chaque repas, ou une cuiller à café de granulé.

Prix : 14 francs.

**Laboratoires DURET et REMY  
et du Docteur Pierre ROLLAND  
ASNIÈRES (Seine).**

## PEPTONATE DE FER ROBIN

Combinaison définie de peptone, de glycérine et de fer.

Gouttes concentrées. Elixir. Vin.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : X à XXX gouttes ou 1 verre à liqueur d'Elixir ou de vin à chaque repas. *Enfants* : I goutte par année d'âge 2 fois par jour.

**Propriétés thérapeutiques.** — Reconstitution du globule rouge du sang.

**Indications.** — Tous les états anémiques et chlorotiques.

**Laboratoires M. ROBIN**

13, rue de Poissy — PARIS.

---

## PEPTONE VASSAL SÈCHE

Représente 12 fois son poids de viande de bœuf. Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a en outre l'avantage d'être d'un *prix modéré* qui en permet un usage prolongé.

**Dose.** — 3 cuillerées à soupe par jour dans le potage ou dans du vin de Malaga.

Chaque flacon de 50 gr. « Peptone » représente 600 gr. de viande de bœuf solubilisée.

Echantillon gratuit sur demande.

**Établissements Léon DANJOU — LILLE.**

## PEPTOZYM

### Médication opothérapique antidyspeptique

**Forme.** — Dragées à double enrobage : 1° externe, soluble dans l'estomac ; 2° interne, soluble dans l'intestin.

**Composition.** — Les dragées « **Peptozym** » sont constituées de deux parties distinctes et concentriques :

1° un noyau central	{	Extrait de Pancréas.....	0 gr. 10
constitué par		Extrait de Bile.....	0 gr. 05
		Boldine .....	0 gr. 00075

et enrobé dans du gluten.

2° une masse	{	Extrait de muqueuse gastrique.....	0 gr. 15
périphérique		Poudre de noix vomique.....	0 gr. 025

et enrobée dans du sucre.

**Indications.** — Grâce au choix de leurs principes constituants particulièrement actifs et grâce à leur double enrobage qui permet à ces principes d'agir *physiologiquement, avec le maximum d'efficacité*, les Dragées « **Peptozym** » réalisent le traitement de choix de tous les *Troubles Dyspeptiques par Insuffisance sécrétoire et Asthénie neuro-motrice.*

**Posologie.** — Deux à trois dragées, au cours des deux principaux repas, au début de l'absorption du plat principal.

Prix de l'étui de 50 dragées : 15 francs.

**Laboratoires R. BOUYSSOU et C<sup>o</sup>**

90, avenue des Ternes — Paris (XVII<sup>e</sup>).

Téléph. : Wagram 61-42.

## PERCAINE CIBA

Chlorhydrate de la diéthyléthylène-diamide de l'acide  $\alpha$ -butyloxycinchoninique.

Anesthésique local à l'action très intense et d'une très longue durée. Utilisable par injections et en surface.

La Percaïne, en raison de l'intensité de son action anesthésique, s'emploie à des dilutions très étendues (1 à 2 p. 1 000 en chirurgie), ce qui rend sa toxicité pratiquement nulle.

Médicalement, elle permet, par la durée de son action, d'obtenir l'indolence des lésions cutanées et de leur pansement, de même qu'une action analgésique précieuse dans le traitement des états douloureux les plus divers.

### Doses :

*Anesthésie par infiltration.* — Solution : de 1 à 2 p. 1000 additionnée ou non d'adrénaline, de 2 à 150 centimètres cubes.

*Anesthésie sacrée.* — Solution à 2 p. 1000, 20 à 30 centimètres cubes.

*Anesthésie épidurale.* — Solution à 1 p. 1000, 30 à 40 centimètres cubes.

*Anesthésie rachidienne.* — Ampoules de 20 cc. à 1/1500 et de 2 cc. à 5 p. 1000.

*Anesthésie des muqueuses,* par badigeonnage, solution à 1 ou 2 p. 100, adrénalinées.

*Anesthésie de l'urètre, de la vessie.* — Solution à 2 ou 3 p. 1000.

### Présentation :

*Comprimés* de 5 centigrammes pour la préparation extemporanée des solutions. Tubes de 20 comprimés : 18 francs.

*Ampoules* de diverses contenances et de titre variable (demander notices).

### Laboratoires CIBA

109-113, boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## PÉRICOLS DU D<sup>r</sup> LEGROS

**Présentation.** — Conglomérés à base de glycérine pouvant contenir tous médicaments, de forme discoïde d'élasticité parfaite.

**Avantages.** — Entre en contact parfait avec la muqueuse du col utérin, épousant la forme des culs-de-sac. Fonte parfaite.

**Composition.** — Péricols bellado-iodurés ; au thigénol ; à l'ichtyol ; au collargol ; belladostovainés ; à l'adrénaline ; ichtyol-belladonnés, etc...

Et toute formule spéciale désirée par le médecin.

**Indications.** — Toutes les affections gynécologiques.

**Laboratoire des Péricols du D<sup>r</sup> LEGROS**

G. LESOURD, Pharmacien,

18, rue Ferdinand-Flocon — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

---

## PÉRISTALTINE CIBA

Glucoside pur du *Rhamnus Purshiana* (Cascara), agissant exclusivement sur le péristaltisme, sans provoquer de coliques. Utilisable également par voie hypodermique (Ampoules de 1 cm<sup>3</sup> 1/2).

Ne produit pas d'accoutumance.

**Indications.** — Constipation chronique, formes atoniques et spasmodiques. Atonie post-opératoire : injecter préventivement 1 ou 2 ampoules après l'intervention.

*Comprimés — Cachets — Ampoules.*

**Doses.** — *Adultes* : 1 à 2 cachets, 2 à 4 comprimés, 1 à 2 ampoules. — *Enfants* : 1/2 à 1 1/2 comprimé, 1 cachet. — Injectée ou ingérée, la Péristaltine agit au bout de 10 à 15 heures.

La boîte de 20 cachets : 8 fr. 50.

Le flacon de 20 comprimés : 7 fr. 50.

La boîte de 5 ampoules : 18 francs.

La boîte de 20 ampoules : 65 francs.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**

109-113, boulevard de la Part-Dieu — LYON.

## PERLES TAPHOSOTE LAMBIOTTE FRÈRES

Perles gélatineuses contenant 0 gr. 25 de tannophosphate de créosote d'une irréprochable pureté et d'une parfaite tolérance gastrique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Asséchant bronchique, bactéricide, sclérogène, modificateur des échanges respiratoires.

**Indications.** — Bronchites aiguës et chroniques, catarrhes, prétuberculose, tuberculose pulmonaire.

**Mode d'emploi.** — 5 perles par jour prises de préférence une à une, à tout moment de la journée. Dans les affections chroniques, procéder par alternance des périodes de cure (10 jours) et de repos (5 jours).

Littérature et Echantillons :

**Produits LAMBIOTTE FRÈRES**

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

## PERSODINE LUMIÈRE

**Traitement de l'Hypo-nutrition et de l'Anorexie.**

**Constitution.** — Préparation stable à base de Persulfate alcalin pur, établie par nos procédés spéciaux, sous forme de comprimés.

**Propriétés.** — Active le métabolisme général et crée le besoin de s'alimenter.

La PERSODINE LUMIÈRE réalise l'oxygénothérapie interne par la production d'oxygène naissant qui active dans une très large mesure les échanges nutritifs, accroît très notablement l'assimilation.

Les aliments ingérés avec faim sous son influence sont assimilés parce qu'ils répondent à une sollicitation organique profonde.

**Indications.** — Toutes les fois que pour une cause quelconque l'appétit fait défaut chez une personne malade, ou simplement déprimée : tuberculose, rachitisme, convalescents de maladies aiguës, opérés, chlorotiques, neurasthéniques, hypochlorhydriques, etc.

**Éviter l'usage de la PERSODINE LUMIÈRE chez les malades présentant une hyperchlorhydrie accentuée.**

**Doses courantes.** — 2 fois par jour, un quart d'heure avant les repas, dans un quart de verre d'eau pure, non sucrée.

*Adultes* : 3 comprimés.

*Enfants de 8 à 14 ans* : 2 comprimés.

*Enfants de 2 à 7 ans* : 1 comprimé.

**Formuler.** — Flacon de comprimés de PERSODINE LUMIÈRE.

**LABORATOIRES LUMIÈRE.**

23, Cours de la Liberté — LYON.

## PERUBORE (Comprimés)

Désinfectant rationnel des voies respiratoires.

Inhalations — Gargarismes

**Composition et forme.** — Association d'essences balsamiques et de principes actifs de plantes, présentée sous forme de comprimés progressivement solubles.

Chaque comprimé contient	{	Baume du Pérou.....	0 03
		Essences aromatiques.....	0 025
		Borate de soude.....	0 6
		Bicarbonate de soude.....	0 30

**Propriétés thérapeutiques.** — Pansement antiseptique et sédatif du revêtement intérieur des voies respiratoires.

**Indications thérapeutiques.** — Rhumes, angines, toux, affection de la gorge, enrrouements, laryngites, trachéites, trachéo-bronchites, sinusites, coryza.

**Posologie et mode d'emploi.** — 1° *Inhalation* : à faire matin, midi et soir, de 1 à 2 comprimés dans un bol d'eau bouillante ou dans un inhalateur, respirer les vapeurs par le nez et la gorge pendant cinq minutes.

2° *Gargarisme* : à faire plusieurs fois par jour, un comprimé pour un demi-verre d'eau bouillie chaude.

*Pulvérisation* : dissoudre 2 à 3 comprimés dans l'eau du pulvérisateur à vapeur et faire une pulvérisation de 5 minutes.

**Laboratoires MAYOLY-SPINDLER**

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

A Bruxelles : LE MARINEL, pharm., 273, r. Victor-Rauter.

## PHAGOCYTINE BUREAU

Médication arsénico-organique phosphorée

**Indications.** — Dénutrition, Dépression psychique, Reconstituant et Fortifiant, Faiblesse générale, Tuberculose, Convalescence des maladies graves.

La Phagocytine a pour but, en accroissant le nombre et le pouvoir antitoxique des Phagocytes, de débarrasser l'économie des bactéries infectieuses.

Elle réunit, sous une forme particulièrement assimilable, l'arsenic et le phosphore organiques, les deux médicaments les plus actifs utilisés dans ce but.

Elle remédie à la Dépression et à la Dénutrition sous toutes ses formes, active la formation des Hematoblastes et empêche la Déperdition des phosphates.

### Composition :

Vanadate de soude..	0 gr. 00066	{	Lécithine.....	0 gr. 0083
Cinnamate de soude.	0 gr. 00133		Poudre réglisse....	} q. s.
Nucléinate de soude.	0 gr. 02		Sirop de sucre.....	
Cacodylate de soude.	0 gr. 02		Argenture .....	

pour une pilule.

**Posologie** : 1 pilule aux deux principaux repas.

**Traitement** : 10 jours ; repos : 10 jours.

**Laboratoires des Produits J. BUREAU**

**Louis LAURIN**

86, boulevard Port-Royal — PARIS.

## PHAGOSTHYL

Sérum neurotonique, Cytophile, Hémopoiétique, Reconstituant, phagocytaire. (*Pour adultes.*)

### Formule :

Cacodylate de soude pur.....	20 centigr.
— de magnésie pur.....	10 —
Sulfate de strychnine.....	2 milligr.
Soluté chloruré isotonique.....	5 cc.

### Indications :

Tuberculose, Prétuberculose, Anémies, Asthénie, Neurasthénie, Grippe, Convalescences, Paludisme, Dermatose, Tertiarisme, Etats cancéreux, Cachexies.

### Emploi :

Une injection intramusculaire ou sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours au niveau de la cuisse ou de la fesse. Absolument indolore. Se vend en boîtes de 12 ampoules de 5 cc.

Prix au public : 22 francs.

**Laboratoires Biologiques André PÂRIS**  
4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## PHAGOSTHYL MANGANÉ

(Exempt de strychnine.)

### Formule :

Cacodylate de manganèse .....	2 centigr.
— de soude.....	10 —
— de magnésie .....	8 —
— de calcium .....	10 —
Eau distillée.....	5 cc.

**Indications.** — Carences, Dénutrition, Décalkification, Anémies, Asthénie, Convalescence des Maladies aiguës, Anergie grippale, Surmenage, Amaigrissement, Troubles endocriniens.

**Emploi.** — Une injection intramusculaire ou sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours, dans la région fessière, en prenant les précautions aseptiques d'usage.

L'injection des Phagosthyl est absolument indolore. Se vend en boîtes de 12 ampoules de 5 cc.

Prix au public : 22 francs.

**Laboratoires Biologiques André PÂRIS**  
4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV<sup>e</sup>).



## PHAGURYL

**Forme.** — Dragées.

**Composition.** — Santalol  $\beta$ , Essence de Cédre, Térébenthine, Salicylate de Phényle, Lupulin, Formine.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Antiseptique des voies urinaires, Décongestif, Balsamique et Diurétique.

**Indications.** — Blennorrhagie, Rétrécissements, Urétrites, Cystites, Prostatites.

**Mode d'emploi.** — Six, huit à douze dragées par 24 heures.

L'étui : 15 fr. (en France).

**Laboratoires A. BAILLY et C<sup>ie</sup>**  
15 et 17, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## PHÉLAXINE

« Utile dulci », laxatif d'une innocuité absolue même chez les enfants.

**Composition et forme.** — Granulé, Effet certain, jamais de coliques.

Extr. de Belladone .....	50 centigr.
Extr. de Cascara .....	15 gr.
Extr. de Bourdaine.....	15 gr.
Phénolphtaléine.....	25 —
Résine de scammonée.....	10 —
Vanilline.....	2 —
Sucre .....	Q. S. pour 1 kilo.

**Indications.** — Constipation opiniâtre et habituelle.

**Mode d'emploi.** — Une demi-cuillerée à café, jusqu'à deux cuillerées à café, suivant le tempérament, le soir au coucher.

Granulé à prendre pur ou dissous dans un peu d'eau.

Dose purgative : 2 à 3 cuillerées à café le soir et, le lendemain matin, thé léger ou bouillon aux herbes.

Dans la constipation opiniâtre, prendre plusieurs fois de suite la dose laxative et se présenter à la selle aux mêmes heures.

Prix : 10 francs.

**J. MOULINES, Pharmacien**  
**VILLENEUVE-LA-GUYARD**  
(Yonne).

## PHIAMINE

Tuberculose. — Asthénie.

### Composition.

Aminos-acides en solution à 5 p. cent.

### Propriétés thérapeutiques.

*La Phiamine* ne contient aucun produit toxique. C'est un puissant modificateur du terrain. Son action s'exerce sur la sécrétion bronchique, la température, le poids.

### Forme.

Ampoules. — Boîtes de 12.

1 cc. = *Phiamine A*.

2 cc. = *Phiamine B*.

Injectons indolores ne donnant aucune réaction.

### Indications thérapeutiques.

Prétuberculose, Tuberculose pulmonaire  
Asthénies, Anémie, Surmenage.

Aucune contre-indication.

### Mode d'emploi.

Injectons sous-cutanées ou intra-musculaires, tous les deux jours.

**Paul COURSAGET**

Pharmacien.

9, rue Porte-Côté,  
BLOIS (Loir-et-Cher).

## PHILOGASTRINE

(Comprimés.)

Traitement dialytique des dyspepsies. Réalise la concentration optima du contenu gastrique. Assure l'évacuation pylorique.

**Forme.** — Comprimés de 2 gr. 50.

**Composition p. 100 :**

Lactobiose .....	90
Citrate de soude.....	2
Bicarbonate de soude.....	8

**Emploi.** — 2 comprimés dans 125 cc. d'eau tiède 2 heures après le repas, en une fois. Même dose, par gorgées, en cas de douleurs.

**Indications.** — Toutes dyspepsies.

Action rapide sur douleurs, aigreurs, brûlures, pesanteur, etc... Usage prolongé fait disparaître les troubles sécrétoires.

**Laboratoires REVEL**

34, rue Saint-Lazare — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## PHLÉBOGUIL

Thérapeutique nouvelle des *affections veineuses* (hémorroïdes, varices, troubles de la ménopause, etc.).

**Composition.** — 1° *Aesculus hippocastanum* et *hamamelis virginica* ; toni-veineux puissants ;

2° *Gui de pommier* : hémostatique veineux remarquable. Hypotenseur artériel (dans la diathèse veineuse est souvent associée l'hypertension artérielle).

*Vaso-dilatateur des capillaires* et, de ce fait, *lutte énergiquement contre les troubles trophiques qui accompagnent l'état veineux* (trophœdème, prurit, ulcère variqueux, etc.).

**Posologie.** — X à XXX gouttes (à dose progressive) par jour.

Expérimenté dans les hôpitaux parisiens.

Echantillons et littérature au Corps médical.

**Laboratoires H. SALLÉ**

4, rue Elzévir — PARIS (III<sup>e</sup>).

## PHLEBOTONINE

**Solution** d'extraits fluides ou stabilisés agissant sur le cœur (gui, genêt, aubépine) et les vaisseaux (hamamélis, viburnum, cupressus, etc...).

**Avantages.** — Aucun trouble digestif et aucune toxicité.

**Indications.** — Troubles circulatoires, varices, phlébites, hémorroïdes, etc.

**Forme.** — Liquide, flacon de 125 cc. pour un traitement de 10 à 12 jours.

**Dose.** — 1 cuillerée à café avant chaque repas.

Prix : 16 francs.

**G. MARTINIE, Pharmacien**

62, avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI<sup>e</sup>).

R. C. Seine 440-107 — Tél. : Roquette 86-84.

---

## PHOSOFORME

**Formes.** — Solution, Solution arsénée, Gouttes.

**Principe actif.** — Acide éther éthylorthophosphorique.  
**Bibliographie :** Professeur Gérard, Lille. — Professeur Rémond, Toulouse. — Professeur Spillmann, doyen Faculté de Nancy.

**Indications thérapeutiques.** — Etats dyspeptiques. — Neurasthénies. — Rhumatisme chronique. — Lithiases. — Convalescences : Grippe, etc. — Phosphaturie. — Asthénie. — Azotémies. — Nutrition des tuberculeux et prédisposés. — Dermatoses. — Alcaloses.

**Mode d'emploi.** — Solution et solution arsénée, dose moyenne : 2 cuillerées à soupe par jour. Chaque cuillerée dans un grand verre d'eau, de boisson, de cidre, de vin blanc ou rouge sucré, à prendre au cours des repas.

**Gouttes :** C gouttes midi et soir, prises comme ci-dessus

Prix : 20 fr. le flacon ; 12 fr. le 1/2 flacon.

Durée : 12 à 15 jours.

**Laboratoires D. DROUET et PLET**

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

## PHOSOL-QUINET

**Formes.** — Elixir phosphorique au Muscat et Granulé manganophosphaté. Fondant.

**Composition.** — *Elixir* : Acide phosphorique. — Sels de chaux et de soude. — *Kola*. — Noix vomique. — Ratanhia. — Arrhénal. — *Elixir généreux* au Muscat. — *Granulé* : Fondant de quinquina et de kola associés à des sels de manganèse et de chaux et d'acide phosphorique de saveur agréable.

**Indications.** — Asthénies diverses. — Anémie. — Surmenage. — Suralimentation. — Amaigrissement. — Croissances. — Convalescences, grippale en particulier. — Bacilliose. — Affaiblissement général.

**Propriétés.** — Double action.

1<sup>o</sup> Action reminéralisatrice.

2<sup>o</sup> Puissante et rapide action stimulante sur la nutrition.

Très bien toléré par les estomacs les plus délicats et très agréable à prendre.

**Posologie.** — *ADULTES* : 2 cuillerées à soupe par jour.

*ENFANTS* : de 9 à 12 ans 2 cuillerées à café par jour.

— 12 à 15 — 2 — dessert —

Cet élixir se prend au milieu du repas dilué dans un verre de boisson habituelle.

Prix de vente : 13 fr. (exempt d'impôt).

**LABORATOIRE DU PHOSOL-QUINET**

143, rue du Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## PHOSORINE

(Pommade nasale)

**Forme pharmaceutique et composition.**

— Pommade à base d'oxyde de Terpiène, camphre, alcool mentholique, vaseline purifiée.

**Propriétés.** — Décongestionnante, antiseptique, calmante.

**Avantages.** — Très active et nullement irritante pour la muqueuse nasale.

**Indications.** — Toutes les inflammations du nez et du pharynx. Traitement préventif de toutes les épidémies.

**Présentation.** — En tube.

**Laboratoires G. VIDAL**

46, rue de Grenelle — PARIS (VII<sup>e</sup>).

## PHOSOTE LAMBIOTTE FRÈRES

Phosphate de Créosote chimiquement pur, stable et complètement assimilable.

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant antiseptique, modificateur direct des lésions, antioxygène (met obstacle aux phénomènes d'autoxydation). Grand pouvoir asséchant. Tonifie l'organisme.

**Indications.** — Bronchite aiguë et chronique, broncho-pneumonie, grippe, prétuberculose, tuberculose pulmonaire.

**Mode d'emploi.** — 1° Injections intramusculaires profondes de 1 cc. tous les jours (ou 2 cc. tous les 2 jours, ou 3 cc. tous les 3 jours), par cures de 21 jours suivies de 9 jours de repos ; 2° Suppositoires dosés à 0 cc. 5 : 2 par jour.

S'abstenir de recourir simultanément à la médication arsenicale.

Littérature et Echantillons :

**Produits LAMBIOTTE FRÈRES**

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

---

## PHOSPHARSOL

**Composition.** — Préparation phosphoarseniée organique combinée à la strychnine.

**Indications thérapeutiques.** — Reconstituant général dans l'anémie, la neurasthénie, l'impuissance, la tuberculose, etc.

**Doses et mode d'emploi.** — De 2 à 4 tablettes, en progressant, à chacun des deux principaux repas. *Ne pas dépasser ces doses.*

Prix en France : 12 fr. 50 la boîte.

Dépôt général pour le gros :

**Laboratoires RICARDOU**

Docteur en pharmacie,

46, rue Pierre-Charron — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

Tél. : Elysées 76-48.

# PHOSPHATES DU D<sup>r</sup> PINARD

## EXTRAITS DIRECTEMENT DES OS

### Phosphate de chaux du D<sup>r</sup> Pinard.

**Dose par jour.** — 2 à 4 cuillerées à potage (*adultes*);  
2 à 4 cuillerées à dessert (*nourrissons et enfants*).

Phosphate de chaux insoluble, en molécules infinitésimales, dans un liquide isotonique, le seul obtenu en partant directement des os. 13 fr. le flacon pour un traitement de 8 à 10 jours (*adultes*); 15 à 20 jours (*enfants*).

Prétuberculose, Grossesse, Fractures, Phosphaturie, Névrose.

### Phosphate Pinard irradié.

**Doses par jour.** — 2 cuillerées à potage (*adultes*);  
2 cuillerées à dessert (*enfants*); 2 cuillerées à café (*nourrissons et enfants jusqu'à 3 ans*).

Emulsion d'ergostérine irradiée (Vitamine D) dans le « Phosphate de chaux du D<sup>r</sup> Pinard », 1 milligramme et demi de Vitamine D par cuillerée à potage, soit l'équivalent de 250 grammes d'huile de foie de morue.

17 fr. 50 le flacon pour un traitement de 10 jours (*adultes*); 20 jours (*enfants*).

Rachitisme, Troubles de croissance, Tuberculose, Allaitement, Fractures.

### Phospharsyl.

**Doses par jour.** — 2 cuillerées à potage (*adultes*);  
8 jours sur 12; 2 cuillerées à dessert (*enfants au-dessus de 4 ans*), 8 jours sur 12.

Phosphate Pinard méthylarsiné (3 centigr. de méthylarsinate de soude par cuillerée à potage).

14 fr. le flacon pour un traitement de 15 jours (*adultes*), 25 jours (*enfants*).

Inappétence, Amaigrissement, Débilité générale, Cachexies.

Sous leurs trois formes les « Phosphates Pinard » se mélangent au lait sans le décomposer, avantage capital pour la thérapeutique infantile.

**N.-B.** — Il y aura toujours intérêt à prescrire le « Phosphate Pinard simple » en alternance soit avec le « Phosphate Pinard irradié », soit avec le Phospharsyl (8 jours l'un, 8 jours l'autre).

88, boulevard Saint-Denis — COURBEVOIE.



## PHOSPHATE VITAL DE JACQUEMAIRE

Glycérophosphates très purs qui ont servi aux expériences de M. le Professeur Albert Robin (Communication à l'Académie de Médecine du 24 avril 1894).

**Formes et doses.** — *Solution gazeuse* (de chaux, de soude ou de fer) : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

*Granulé* (de chaux, de soude, de fer ou composé) : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

*Injectable* (de chaux, de soude ou de fer) : 1 à 2 injections par jour.

**Propriétés et indications.** — Double action reconstituante :

1° *Action reminéralisatrice* par l'apport du phosphore uni aux bases qui lui sont normalement associées dans l'organisme, sous la forme même — directement assimilable — adoptée par celui-ci ;

2° Puissante *action stimulante sur la nutrition*, par l'intermédiaire du système nerveux et de tout le système glandulaire.

**Établissements JACQUEMAIRE**

**M. MIGUET, \*, Docteur en Pharmacie**  
**VILLEFRANCHE (Rhône).**

---

## PHOSPHATOL VITAMINÉ IRRADIÉ

**Vitamine D, Calcium et Phosphore, Fer,**  
Granulé recalcifant, Antianémique, Anti-  
rachitique.

**Composition.** — Poudre d'os frais, phosphate et polyglycérophosphates, sels de Fer, de Calcium, de Magnésium, de Manganèse, traces de Méthylarsinate disodique.

Chaque cuillerée à café contient 1 milligramme d'ergostérine irradiée et correspond à 500 *unités physiologiques-rat* (contrôles biologique et spectrophotographique).

Chaque boîte porte la date-limite d'utilisation.

**Indications.** — 1° Anémie infantile, lymphatisme. Etats ganglionnaires, rachitisme du nourrisson et de l'enfant. Troubles de la croissance, de l'ossification et de la dentition. Débilité. Inappétence.

2° Déminéralisation de la grossesse et de l'allaitement. Douleurs dorso-lombaires. Carie dentaire.

3° Tous les cas d'anémie, asthénie, convalescence, surmenage, ostéomalacie, phosphaturie, pré tuberculose, troubles du métabolisme du calcium.

**Posologie.** — Jusqu'à 6 mois : 1/2 cuill. à café par jour.

De 6 mois à 5 ans : 1/2 à 1 cuill. à café par jour.

Au-dessus de 5 ans : 2 cuill. à café par jour.

*Adultes* : 2 à 4 cuill. à café par jour.

1 semaine d'interruption après 3 semaines de traitement.

**Présentation.** — En boîte métallique hermétiquement close.

La boîte de 200 gr. environ : 13 francs.

**Laboratoires AXAREL**

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

## PHOSPHOBROM

**Composition.** — Bromure, Phosphate, Citrate alcalins.

**Forme.** — Granulé fondant soluble de goût agréable.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour. *Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café par jour selon l'âge.

**Indications thérapeutiques.** — Névropathie. — Fatigues nerveuses. — Neuroarthritisme. — Insomnies. — Palpitations des fausses cardiopathies. — Convulsions de l'enfance. — Dyspepsies nerveuses. — Aérophagie. — Menstrues douloureuses. — Vomissements incoercibles de la grossesse.

**Laboratoire SERINDAT**

22, rue Poncelet — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

---

## PHOSPHO-FLUOR BEYNET

Reconstituant général aux phosphates organiques fluorés contenant aussi de la magnésie, du fer, de la silice dans les proportions où on les trouve dans l'économie.

**Forme.** — Granulé, cachets, comprimés.

**Indications.** — Différentes tuberculoses, rachitisme, ostéites, caries dentaires, grossesse, allaitement, anémie, convalescence, surmenage nerveux, phosphaturie.

**Dose et mode d'emploi.** — Granulé : *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour, pur ou dans un liquide.

*Enfants* de 3 à 10 ans : 1/2 dose.

*Nourrissons* : une pincée dans la bouillie.

Cachets ou comprimés : 2 à 4 par jour ; enfants 1/2 dose.

Chaque cuillerée à café de granulé de chaque cachet ou comprimé contient 0 gr. 50 de principe actif.

Prix actuel : 12 francs.

Envoi d'échantillons sur demande adressée à la

**Pharmacie SEGUIN**

165, rue Saint-Honoré — PARIS.

## PHOSPHOGAIACOL MARY

**Nature.** — A base de sels calciques assimilables, avec addition de thiocol, acide arsénieux et arséniate de strychnine.

**Propriétés thérapeutiques.** — Modification rapide des sécrétions bronchiques. Disparition de la toux, de l'expectoration, des engorgements ganglionnaires et du lymphatisme.

**Forme.** — S'emploie sous la forme de granulé très agréable au goût, à la dose de 2 à 3 cuillerées à café.

**Laboratoire  
du reconstituant MARY**

32, rue de l'Ouest — PARIS.

P. TAVERNIER, Docteur en pharmacie.

---

## PHOSPHOGENE FAVRICHON

Régime et alimentation de l'Enfance.

### Composition.

Le Phosphogène se recommande par sa richesse en phosphates assimilables. C'est un aliment très sain, très reconstituant, très agréable au goût. Il ne contient ni cacao reconnu néfaste dans l'alimentation de l'enfance, ni produit exotique échauffant. Il ne constipe pas.

### Indications.

Il convient à tous les enfants pendant leur croissance, mais particulièrement aux enfants débiles, à ceux dont la dentition est en retard, ou dont le système osseux ne se développe pas d'une façon normale.

Le Phosphogène rend de grands services aux jeunes mères pendant la grossesse et l'allaitement.

Il est également utile aux surmenés, aux convalescents dont il répare rapidement les forces en éléments phosphorés.

### Doses.

*Enfants* : Une cuillerée à café par 100 gr. de lait (à partir de 8 mois).

*Adultes* : Une cuillerée à soupe par 100 gr. de lait.

Le mode de préparation est indiqué sur chaque boîte.

**Soupe de grains grillés.** — Croissance.

**Bouillon végétal.** — Entérisme avec diarrhée.

Littérature et échantillons sur demande.

**FAVRICHON et VIGNON**

**Pharmacien-Chimiste**

**SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY (Loire).**

## PHOSPHOLÉOSE DEMASLES

Succédané de l'huile de foie de morue.

Reconstituant physiologique de goût agréable.

### Composition :

**PHOSPHOLEOSE A :** Iode organique, tannin, phosphore, glycéro-arséniate de soude (nouveau sel d'arsenic organique).

**PHOSPHOLEOSE B :** Même composition mais sans arsenic.

**Indications.** — Lymphatisme, prétuberculose, anémie, croissance, adénopathies, convalescence.

**Présentation.** — Une seule forme : liquide.

### Posologie :

De 3 ans à 6 ans : Une cuillerée à café avant les 2 principaux repas.

Au-dessus de cet âge : Une cuillerée à soupe avant les 2 principaux repas.

Prix : 14 francs.

**Laboratoires DEMASLES**

à VIENNE (Isère).

## PHOSPHOMAGNÉSIUM

**Composition.** — Hypophosphite, glycérophosphate, carbonate, citrate de magnésium.

**Mode d'emploi.** — 3 comprimés par jour.

**Indications thérapeutiques.** — Le *Phosphomagnésium* protège et fortifie la cellule. Toutes les insuffisances physiologiques dues à la carence magnésienne.

**Laboratoire SERINDAT**

22, rue Poncelet — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## PHOSPHOPINAL-JUIN

Phosphore colloïdal assimilable en combinaison organique.

**Indications.** — *Réminéralisateur* : Maladies de la nutrition, tuberculose, convalescence, anémie.

*Fixateur des sels de chaux.* — *Aliment de la cellule nerveuse* : Maladies du système nerveux, dépression mentale, neurasthénie, surmenage, fatigue cérébrale.

Pas de contre-indication.

**Formes et doses moyennes.**

*Elixir* : adultes : 2 cuillerées à café par jour.

enfants : 1 cuillerée à café par jour.

*Capsules* : adultes : 4 à 6 par jour.

enfants : 2 à 3 par jour.

*Gouttes* : adultes : 40 à 60 par jour.

enfants : 20 à 30 par jour.

Ces doses peuvent être doublées sans inconvénient.

LE PHOSPHOPINAL-JUIN se prend dans un peu d'eau ou de boisson froide.

Prix : 14 fr.

**Laboratoire du PHOSPHOPINAL-JUIN**

10, impasse Milord — PARIS.

Tél. : Marcadet 37-98.

## PHOSTYL

Reconstituant puissant du neurone.

**Composition :**

XXV gouttes : S. Strychnine : 0,001 ; Méthyl. Na. : 0,02 ; S. Manganèse : 0,10 ;  $\text{PO}^4\text{H}^3$  off. : 0,25.

**Indications :**

Anémies, Convalescences, Neurasthénie, Dépressions, Surmenage. Reminéralisation rapide et durable par fixation de Ca, Na, K, Mg. Augmente et enrichit les hématies par fixation de fer.

**Posologie :**

*Adultes* : XXV gouttes midi et soir. De 12 à 18 ans : XV gouttes ; de 6 à 12 ans, VI gouttes ; à prendre avant les repas dans eau, vin, bière, etc.

Prix : *Gouttes*, 12 fr. 50.

**Laboratoire PY**

58, boulevard Richard-Wallace — PUTEAUX (Seine).

## PHUSASMINE

Traitement de l'Emphysème et de l'Asthme.

### Forme :

Pilules de 0 gr. 30 (flacons de 40 pilules).

### Composition :

Combinaison de NaI avec antidyspnéiques, antispasmodiques, Diurétiques et expectorants actifs (Lobelia, Drosera, Belladone, Polygala, Digitale, Extrait Suc Capsules Papaver Somniferum.

### Indications :

Emphysème, Asthme, Oppressions, Catarrhe, Bronchite Chronique.

### Mode d'emploi :

*Adultes* : 3 pilules par jour, une demi-heure avant les repas, et 1 pilule la nuit si nécessaire.

*Enfants* : Ne jamais en donner aux enfants au-dessous de quinze ans.

**E. ROBINEAU**, pharmacien,

80, route des Petits-Ponts — DRANCY (Seine).

## PHYLACTONE BYLA

### Cachets et Granulé.

Peptone spéciale à polyvalence protidique viande, poisson, lait, œufs.

**Dose et mode d'emploi.** — Un cachet ou une dose, une heure avant les repas, dans un peu d'eau froide.

**Propriétés thérapeutiques.** — Anti-anaphylactique.

**Indications.** — Migraines, Céphalées, Urticaires et tous états morbides relevant d'une intoxication alimentaire d'origine anaphylactique.

**Phylactone magnésinée**  
(dragées, granulé.)

*Drainage des voies biliaires.*

**Les Établissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.



## PHYLLA DYN

**Chlorophylle Pure**  
Solubilisée — Assimilable.

### Propriétés physiologiques :

- 1° Seul le pigment chlorophyllien pur, isolé, est actif et assimilable contrairement à la chlorophylle des légumes verts crus ou cuits.
- 2° Le pigment chlorophyllien possède une action photodynamique, sa constitution chimique le rapproche du pigment sanguin.
- 3° La chlorophylle pure est un puissant agent pharmacodynamique toni-cardiaque, hypertenseur et hématopoïétique.

### Indications :

- Hypotensions artérielles* (idiopathique, permanente, symptomatique).  
*Acrocyanoses* (adynamie circulatoire). *Anémies* (la chlorophylle active les effets de l'opothérapie hépatique et apporte les matériaux de la rénovation sanguine).  
*Asthénies, Surmenage, Convalescences* (la chlorophylle n'est pas toxique pour le foie et le rein).  
*Anorexie du nourrisson, hypotrophies, Rachitisme* (la chlorophylle sensibilise l'organisme à l'action des préparations irradiées).  
**Dosologie.** — XX à XXX gouttes avant les trois repas, une quinzaine sur deux.

Le flacon compte-gouttes = 18 francs.

**Société d'Applications Pharmacodynamiques**  
5, rue Claude-Decaen — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## PHYSIOSTHÉNINE

Admis dans les Hôpitaux de Paris.

*Toutes infections graves.*

**Formes.** — Boîtes *Adultes* : 4 ampoules 20 cc.  
 Boîtes *Enfants* : 4 ampoules 10 cc.

**Indications thérapeutiques.** — Grippe, Angine, Broncho-Pneumonie, Fièvre Typhoïde, Fièvre Puerpérale et toutes les infections.  
 Injections intramusculaires, région rétro-trochanterienne ; l'injection est indolore. Pas de réaction sérique. Pas de phénomène de choc. Toxicité nulle.

Prix : 40 francs.

## NÉO-PHYSIOSTHÉNINE

*Toutes infections de moyenne intensité.*

**Forme.** — Boîtes de 8 ampoules de 5 cc.  
 En injections intramusculaires.

Prix : 22 francs.

**Laboratoires DROUET et PLET**  
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

## PHYSOCRISINE

Solutions de lobe post. d'hypophyse.  
(Opothérapie Fournier : Endocrisines.)

1° *Ampoules de 1 cc. (boîte de 5), usage obstétrical seul.*

2° *Ampoules de 10 cc. (boîte de 3).  
Injections intra-veineuses toutes préparées. Trait. des Hémoptysies.*

**Lab<sup>res</sup> FOURNIER Frères**

**7, rue Biscornet — PARIS (XII<sup>e</sup>).**

---

## PHYTINATE DE QUININE CIBA

Phosphate organique de quinine contenant 57 p. 100 de quinine à 11 p. 100 de phosphore.

Réunit l'action spécifique de la quinine à l'action tonique et reconstituante de la Phytine. Très bien toléré. Très soluble.

**Indications.** — Celles de la quinine en général et plus particulièrement : Grippe, Migraines, Névralgies, Paludisme (surtout les formes anciennes accompagnées de cachexie et d'anémie). Maladies infectieuses, Coqueluche, Diabète, etc.

**Doses.** — Les mêmes que pour le sulfate ou le chlorhydrate de quinine.

Le tube de 20 comprimés, 10 francs.

Le flacon de 50 comprimés, 20 francs.

*On trouve aussi le Phytinate de quinine en vrac, et on peut le formuler comme les autres sels de quinine.*

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**  
**109-113, boulevard de la Part-Dieu — LYON.**

## PHYTINE CIBA

Produit naturel extrait des graines végétales, contenant 22 p. 100 de phosphore en combinaison organique avec la chaux et la magnésie. Le plus assimilable des médicaments phosphorés. Tonique et reconstituant. Stimulant des échanges nutritifs et de l'hématopoïèse.

**Indications.** — Débilité constitutionnelle, Neurasthénie, Névroses, Surmenage sous toutes ses formes, Tuberculose, Chlorose, Anémie, Anorexie, Convalescences difficiles, Troubles de la grossesse et de la lactation, etc.

*Cachets — Comprimés — Granulé.*

**Doses.** — *Adultes* : 1 gr. par jour (2 cachets, 4 comprimés, 2 cuillerées à café de granulé).

*Enfants* : 1/4 ou 1/2 dose de l'adulte.

*Cachets et comprimés* : la boîte, 14 francs.

*Granulé* : le flacon, 16 francs.

On peut aussi formuler la Phytine magistralement.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**

109-113, boulevard de la Part-Dieu — LYON.

---

## PHYTOGÉNINE BYLA

**Composition.** — Complexe bio-minéral et opothérapique, intégralement assimilable : Phytosphosphine, fluorure de sodium, nucléinate de manganèse associés aux : thymus, rate, surrénales, parathyroïdes, foie, moelle osseuse et os épiphyseaire.

**Propriétés thérapeutiques.** — Reminéralisateur intensif, modificateur puissant des échanges nutritifs.

**Indications.** — Troubles de la croissance, tuberculose, rachitisme, dépression nerveuse, convalescences, phosphaturies, anémies et tous états de déchéance organique.

**Dose et mode d'emploi.** — *Granulé* : 3 cuillerées à dessert par jour, à croquer. — *Cachets* : 2 à 4 par jour. — *Comprimés* : 4 à 8 par jour. (Enfants demi-dose.)

**Les Établissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

## PHYTO-LECITHINE

Médication phosphorée organique de l'anémie, la fatigue, les troubles nerveux, les croissances lentes, etc...

**Propriétés thérapeutiques.** — A toutes les propriétés de la Lécithine de l'œuf dont elle possède une composition globale identique, mais, d'origine végétale, extraite de graines oléagineuses, elle ne contient aucune substance capable de provoquer des phénomènes toxiques ou anaphylactiques.

**Indications.** — Particulièrement indiquée dans la convalescence d'affections aiguës ayant provoqué de l'amaigrissement et laissant derrière elles de la fatigue ; dans les surmenages de tous ordres, physiques ou intellectuels, dans les périodes de puberté et de grossesse.

### Conditions d'emploi :

*Pour enfants :* 2 cuillerées à café de granulés ou 3 comprimés par jour.

*Pour adultes :* 4 cuillerées à café de granulés ou 6 comprimés par jour.

Prix de la boîte, Comprimés ou granulés : 16 fr. 50.

**Laboratoires PROGIL**

6, boulevard de Strasbourg — PARIS (X<sup>e</sup>).

## PHYTOSPLÉNOL PLÉ

Lipoides spléniques, Moelle osseuse, Poudre d'os, Polyopothérapie, Phosphore végétal, Nucléinates de fer et manganèse.

### Propriétés biologiques :

**Anti-rachitique non irradié :** contrôle sur des rats, recalcifiant puissant, anti-anémique, anti-toxique chez nourrissons, enfants, adultes.

### Présentation. Posologie :

Dragées et granulés aromatisés, inaltérables.

*Bébés :* 1 ou 2 dragées écrasées ou 1 ou 2 cuiller à café granulés par jour. *Enfants :* 4 dragées ou 4 cuiller à café. *Adolescents et Adultes :* 6 dragées ou 6 cuillers à café granulées par 24 heures, aux repas.

### Avantages sur les Stéroïdes irradiés

Pluralité d'indications thérapeutiques, inaltérabilité, innocuité, digestion aisée.

Echantillons, littérature :

**Laboratoire J. PLÉ,**

J. PLÉ, Docteur en pharmacie de l'Université de Paris  
111 bis, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

## PILULES DE BLANCARD

A l'iodure de fer inaltérable, approuvées par l'Académie de Médecine de Paris, dosées à 5 cgr. d'iodure de fer.

**Dose et mode d'emploi.** — Adultes : 2 à 6 pilules par jour aux trois principaux repas.

**Propriétés thérapeutiques.** — Agent incomparable d'Hématopoièse.

**Indications.** — Anémie, Scrofules, Lymphatisme, Chlorose, Leucorrhée, Aménorrhée, Syphilis accidentelles ou constitutionnelles, suite de Gripes infectieuses, etc.

Prix du flacon : 14 fr. Le 1/2 flacon : 8 fr. 50.

**BERTAUT-BLANCARD Frères**

64, rue de La Rochefoucauld — PARIS.

---

## PILULES DE MOUSSETTE

à l'Aconitine cristallisée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action sédative et analgésique surtout remarquable dans la zone du trijumeau.

**Forme.** — Pilules dosées à 1/5<sup>e</sup> de milligramme d'aconitine cristallisée et 5 centigrammes de quinium par pilule.

**Doses.** — 2 pilules le premier jour, une le matin et une le soir ; on prendra 3 pilules le second jour, en 3 prises espacées, si aucun soulagement ne s'est produit. On n'atteindra la dose de 4 pilules qu'exceptionnellement en surveillant la tolérance du malade (la sensation de fourmillement dans la langue, les lèvres et la face est un signe prémonitoire d'intolérance).

Après chaque ingestion de *Pilules de Moussette* prendre une infusion chaude. L'administration simultanée d'un purgatif énergique est conseillée par le D<sup>r</sup> Fuchs.

**Laboratoires CLIN — PARIS.**

## **PILULES du D<sup>r</sup> DEBOUZY**

Opothérapie biliaire.

Pilules de 0 gr. 30, extrait total de bile sélectionnée, stérilisée.

Affections hépatiques. Lithiase biliaire. Insuffisance hépatique. Entéro-colite.

**Dose.** — 4 à 8 pilules par jour, prises aux repas.

Le flacon de 100 pilules : 15 francs.

— 50 — : 8 francs.

**Laboratoires LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS (XI<sup>e</sup>).

---

## **PILULES**

**du D<sup>r</sup> SEJOURNET**

Antidiabétiques,

**Indications thérapeutiques.** — Traitement du DIABETE sans régime trop rigoureux, le guérit souvent, l'améliore toujours sans crainte d'inconvénients. Evite les complications.

**Doses et mode d'emploi.** — Complexe sous forme de pilules dosées à 0 gr. 01 de Santonine, avec excipient balsamo-résineux.

Reconstituant de premier ordre, etc.  
1 Pilule à chaque repas.

Prix de vente au public : 18 fr.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> M. LEPRINCE**

62, rue de la Tour — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## **PILULES HÉLÉNIENNES NAUD**

**Composition.** — A base d'Hélénine cristallisée. Protoxalate ferreux et quassine.

**Indications.** — D'après les essais cliniques les plus récents (thèse du Dr E. PARIZOT) l'*Hélénine* constitue le spécifique par excellence de la Leucorrhée, sans lésions anatomiques.

**Mode d'emploi.** — Sauf indication contraire du médecin, 4 à 8 pilules par jour aux repas.

*Echantillon et littérature sur demande*

**Laboratoires LACROIX**

MEROBIAN et FILS, successeurs.

37, rue Pajol — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

---

## PILULES LÉMARY

### Traitement mercuriel discret

Dans le traitement de la syphilis acquise ou héréditaire, il y a très souvent un grand intérêt pour le médecin et même pour le malade à ce que ce dernier ignore quelle est la nature du médicament prescrit, soit que le médecin traitant, mal fixé encore sur le diagnostic veuille, le fixer définitivement par un essai de médication spécifique, soit qu'il tienne à ne pas troubler la paix d'un ménage, d'une famille, par la révélation de la nature du mal, soit enfin qu'il s'attache pour une raison quelconque à une discrétion absolue. Il trouvera dans les **Pilules Lémary**, nom banal quelconque, mais **NOM DÉPOSÉ**, ce qu'il désire : le **traitement mercuriel dissimulé** ou **traitement discret**.

L'étiquette du flacon porte seulement cette inscription :

### PILULES LÉMARY

(formule A ou formule B ou formule C)

fortifiantes, dépuratives, reconstituantes.

Le prospectus placé autour du flacon n'est pas plus explicite et ne peut donner lieu à aucune indication. Le médecin a donc ainsi toute sécurité.

Pour les pilules Dupuytren Codex, dont la composition est : bichlorure de mercure 0,01 centigr. par pilule prescrire **PILULES LEMARY**, formule A. — Dose habituelle, 1 à 3 pilules par jour, aux repas.

Pour les pilules Ricord Codex qui contiennent iodure mercurieux, 0,05 centigr. par pilule, prescrire **PILULES LEMARY** formule B. — Dose habituelle, 2 par jour, 1 à chaque principal repas.

Pour les pilules au biiodure de mercure prescrire : **PILULES LEMARY** formule C.

dont la composition { biiodure de mercure 0,005 millig.  
est pour une pilule { iodure de potassium 0,25 centig.

Dose habituelle : 2 à 4 pilules par jour, selon le cas.

2 Pilules Lémary C = 1 cuill. à bouche de Sirop de Gibert.

Prix au public : 15 francs.

Littérature — Echantillons

Laboratoire du **D<sup>r</sup> H. PHILIPPE**

14, rue Palais-Grillet — LYON.



# PILULES LITHURANÉES

du Docteur BOVEIL  
Traitement du diabète

## Composition :

*Uranium* : Radio-actif, active la sécrétion des glandes.

*Helonin* : Décongestif du foie et du pancréas.

*Benzoate de lithine* : Dissolvant de l'acide urique, en excès chez les diabétiques.

*Arséniate de soude* : Tonique général. Stimulant des glandes endocrines.

*Géranium Robertianum* : Tonique et astringent.

**Indications.** — Le diabète sous toutes ses formes.

**Doses et mode d'emploi.** — 6 pilules par jour ; 2 avant chaque repas avec un demi-verre d'eau de Vichy ou de Vals.

Traitement normal : 2 mois environ.

Echantillon et littérature sur demande.

Prix : 12 fr. l'étui de 60 pilules.

**Marc PARIS, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**  
1, rue Lassalle — LYON (La Boucle) (IV<sup>e</sup>).

# PILULES PHILIPPE

Potassium — Sodium

**Forme.** — En *pilules kératinisées* ; elles évitent les maux d'estomac, suppriment réellement l'iodisme. — *Plus de 30 ans de pratique et de succès.*

Prière de prescrire :

**Pilules Philippe à l'iodure de potassium** { à 0,50  
à 0,20  
à 0,10

Sans indication spéciale, ce sont les **Pilules Philippe** à 0,20 centigr. d'iodure qui sont délivrées.

**Pilules Philippe à l'iodure de sodium..** à 0,20

**Indications.** — Artério-sclérose. Adénopathies, Tension artérielle, Goitre, Obésité, Syphilis, etc.

**Dose.** — 2, 4, 6 et même 8 pilules par jour en deux ou trois fois.

Prix au public : 14 fr.

Littérature et Echantillons

**Laboratoire du Docteur PHILIPPE**

14, rue du Palais-Grillet — LYON.

## PILULES V. E. DOUMER

### Formule :

Chaque pilule contient 5 centigr. de bleu de méthylène *chimiquement pur*.

### Doses :

De 4 à 10 pilules par jour, suivant les cas, espacées dans la journée.

### Indications :

Affections des voies urinaires, entérite bacillaire, paludisme, fièvre de Malte, grippe, angine de poitrine, sciatique, rhumatismes, etc.

### Laboratoires BOMEL

ANNONAY (Ardèche) — France.

## PIPÉRAZINE MIDY

Diéthylène Diamine,  $\text{NH} \begin{array}{c} \text{CH}_2 \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{CH}_2 \end{array} \text{NH}$ , alcalin organique du groupe des Pyridines. (Inscrit au Code Français 1908.)

*Granulé effervescent*, dosé à 0,20 cgr. de Pipérazine pure par cuillerée à café.

**Doses et mode d'emploi.** — 2 à 3 cuillerées à café par jour comme préventif. 4 à 6 cuillerées à café par jour dans les crises aiguës, dissoutes dans un demi-verre d'eau à distance des repas.

**Propriétés thérapeutiques.** — Dissout 92 p. 100 des composés de l'acide urique ; réduit les déchets uratiques en stimulant l'activité hépatique ; antiseptise les urines.

**Indications.** — Le plus actif des remèdes à prescrire dans toutes les manifestations de l'Arthritisme et de l'Uricémie : Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Calculs, Coliques hépatiques et néphrétiques, Sciatique, Artério-sclérose, Eczéma, Diabète.

Aucune contre-indication, innocuité absolue, cœur, estomac, vaisseaux.

### Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## PITULOBINE BYLA

(en ampoules).

**Composition.** — Extrait épuré de lobes postérieurs d'hypophyses, *titré physiologiquement* sur utérus de cobaye. Cinq dosages en *unités internationales* : AMPOULES : O = 10 u. i., A = 25 u. i. (1/8 lobe) ; B = 50 u. i. (1/4 lobe) ; D = 100 u. i. (1/2 lobe) : E (intraveineuses) = 50 u. i. (1/4 lobes).

**Indications.** — Inertie utérine, hémorragie de la délivrance, salpingites chroniques, métrites, etc. Hémoptysies des tuberculeux, défaillances du myocarde, constipation.

**Mode d'emploi.** — Injections hypodermiques dans tous les cas, sauf pour les hémoptysies, où l'on emploie la voie intraveineuse (ampoules E).

**Les Établissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

## PLAGÉINE SOULAS

(Ampoules, pansements)

Ni toxique, ni caustique.

Traitement de toutes les plaies.

**Composition.** — Solution aqueuse de Goudron Végétal désodorisé et décoloré, Essence de cèdre, Essence de lavande.

**Propriétés physiologiques.** — Antiseptiques, résolutives, épidermisantes, analgésiques, désodorisantes.

**Indications thérapeutiques.** — Plaies de toutes natures : Plaies aseptiques, Plaies opératoires, Traumatismes, Brûlures à tous les degrés.

Ulcères variqueux, Plaies atones : Escarres sacrées, Ulcères gangréneux diabétiques, Néoplasmes ulcérés. Plaies septiques ou souillées. Abscesses, Furoncles, Anthrax, Chirurgie conservatrice et esthétique.

**Mode d'emploi.** — Une ampoule dans un verre d'eau stérilisée ou bouillie. La solution obtenue s'emploie en pansements humides fréquents.

Echantillons et littérature sur demande :

**Laboratoire SOULAS**

119, rue de Sèvres — PARIS (VI<sup>e</sup>).

# PLASMA DE QUINTON

*Nom déposé en 1907*

**Composition.** — Eau de mer puisée dans l'Atlantique, avec des précautions spéciales, en des lieux et à des moments où la pureté de l'eau est parfaite, transportée à Paris sans délai, ramenée à un degré de concentration saline qui la rend comparable à ce point de vue au sérum du sang, stérilisée sans emploi de l'ébullition ni des agents chimiques, mise en ampoules de verre neutre et inattaquable.

**Le Plasma de Quinton** (toutes manipulations selon la méthode authentique de R. Quinton) est l'unique préparation marine du monde entier soumise à un contrôle biologique quotidien qui en garantit l'efficacité et la régularité d'action.

**Bibliographie.** — Pour les idées générales relatives à la Méthode marine, 23 p. de références in R. QUINTON. *L'eau de mer, milieu organique*, MASSON, Paris, 1912, 2<sup>e</sup> éd. Pour les applications thérapeutiques de l'eau de mer, une centaine de références in JARRICOT, *Le Dispensaire marin*, MASSON, Paris, 1921.

## Indications :

**Traitement prénatal.** Application la plus féconde en beaux résultats et celle qui possède les applications les plus nombreuses. L'Eugénique n'a pas d'armes plus puissantes. On sait qu'il a été fondé (D<sup>r</sup> ARNULPHY, 1922) une *Ligue du Traitement prénatal*.

Ce traitement a pour objet (et l'expérience montre qu'il a pour résultat) : 1<sup>o</sup> de conduire à terme le produit conçu ; 2<sup>o</sup> de s'opposer à l'athrepsie et aux états de dénutrition si fréquents chez les héréditaires (tuberculose, syphilis, paludisme) ; 3<sup>o</sup> d'améliorer la nutrition de la femme enceinte (disparition constante et rapide des vomissements, même dans les cas les plus sévères).

**Entérites des adultes et des grands enfants.** Le traitement marin est efficace, quelle que soit la forme affectée par la maladie : colite muco-membraneuse, diarrhée, constipation pure, constipation avec débâcles.

*Gastro-entérites des nourrissons.* Qu'il s'agisse des formes vulgaires ou de l'entérite aiguë (entérite cholériforme) la guérison est la règle. Le traitement doit être institué sans hésitation, même dans les cas les plus redoutables. Plus le cas est grave, plus l'indication d'agir sans délai est formelle. Il n'existe aucune raison, en aucun cas, de différer le traitement.

*Intolérance lactée, Athrepsie.* L'amélioration se manifeste dès les premières heures qui suivent la première injection. Quel que soit le retard, l'athrepsique s'accroît immédiatement avec l'intensité maxima, l'accroissement normal du premier mois de la vie, s'il est d'ailleurs nourri et réchauffé comme il se doit.

*Maladies de la peau* (Psoriasis, Eczéma, Tuberculoses cutanées); *Maladies du Système nerveux* (Névralgies, Enuresis, Algies diverses, Gynalgie, Neurasthénie); *Tuberculoses osseuses et ganglionnaires.* Les succès sont habituels; impressionnants parfois de rapidité.

**Régimes, doses d'injections.** — Pour tous ces points essentiels au succès de la cure marine au Plasma de Quinton, se reporter aux notices envoyées gracieusement, par retour, à toute demande.

**Présentation.** — Ampoules de 5, 10, 30, 50, 100, 200, 300 et 500 cc.

**Renseignements et littérature** (Renseignements oraux à Paris et renseignements par correspondance; envois de notices sur les applications et la posologie du Plasma de Quinton : DISPENSAIRE RENÉ QUINTON, 4, rue de l'Arrivée, Paris (Gare Montparnasse)).

**Commandes et ordres d'expéditions :**

LABORATOIRES DE BIOLOGIE APPLIQUÉE.

**H. CARRION et C<sup>ie</sup>,**

54, Faubourg-Saint-Honoré — PARIS.

Tél.: Elysées 36-64 et Elysées 36-45.

Adresse télégr. Rioncar-Paris-123.

## PLEXORINE VÉLY

Dragées glutinisées à base de :

Tri-bromure de sodium, ammonium, strontium,  
Codéine, Levurine extractive, Paullnia sorbilla.

**Action thérapeutique.** — Calmant du système nerveux, antispasmodique.

**Avantages.** — Elimination rapide. Pas d'action secondaire sur la tension sanguine ni sur le myocarde ; pas de dépression intellectuelle.

**Indications.** — Sédatif de l'excitabilité motrice et vasculaire. Puissant analgésique non toxique chorée, tics, hystérie, crises nerveuses. Etats sympathicotoniques.

**Mode d'emploi :**

1° Action sédatrice (émotifs anxieux), doses légères réfractées : 2 à 4 dragées par jour.

2° Action hypnotique, doses relativement massives : 4 à 8 dragées le soir, une heure avant le sommeil.

**Laboratoires des Produits VÉLY**

132, avenue Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>)

Tél. : Passy 87-85.

## PLURION COUTURIEUX

**Description.** — Complexe colloïdal d'arsenic, fer, manganèse et vanadium, isotonique, indolore, non toxique, en ampoules de 2 cc. (8 ampoules par boîte).

**Action thérapeutique.** — Le PLURION augmente l'activité des organes hématopoiétiques et fournit aux globules rouges les éléments minéraux nécessaires à leur constitution (fer), à leur accroissement (arsenic) et à leur activité (manganèse et vanadium).

**Indications.** — 2 à 4 ampoules par jour dans les ANEMIES GRAVES. 1 ampoule par jour dans les anémies des CONVALESCENTS, PALUDEENS, SYPHILITQUES, CANCEREUX. 1 ampoule tous les deux jours dans les cas plus bénins.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS

## PNEUMOGÉINE RENARD

**Composition.** — Iodure double de caféine et de théobromine (chaque cuillerée à café = 0,05 de caféine + 0,10 de théobromine combiné de l'iode et en solution dans un véhicule qui en masque le goût.

**Propriétés thérapeutiques.** — L'action de l'iode et de la caféine se trouve renforcée et complétée par l'adjonction de la théobromine « le plus fidèle, le plus constant, le plus inoffensif des diurétiques » (Huchard).

La PNEUMOGÉINE par son action **régulatrice respiratoire** assure aux poumons le maximum de rendement fonctionnel ;

**cardio-tonique**, soutient le myocarde défaillant, abaisse la tension artérielle ;

**éliminatrice**, débarrasse le sang des toxines et des déchets qui y sont accumulés, augmente la diurèse.

**Indications.** — I. Tous les états dyspnéiques : asthme, emphysème, bronchite chronique, dyspnées cardio-rénales, dyspnées névropathiques, etc.

II. Syndrome cardio-rénal.

**Posologie.** — Pendant les crises paroxysmiques, 4 à 8 cuillerées à café par jour dans de l'eau bien sucrée. Entre les crises, 2 à 5 cuillerées.

S'il est possible, verser le matin la dose prescrite dans un verre d'eau sucrée qu'on absorbe par petites gorgées dans le courant de la journée.

**J. RENARD, docteur en Pharmacie**  
35, rue de Paris — CLICHY.

Anciennement : 142, av. de Clichy — PARIS.

## PNEUMOGENOL

Affections chroniques des bronches.

**Formes.** — Sirop. Dragées.

**Formule.** — Codéine, 0,01 ; Morphine chl., 0,0025 ; Extrait Ipéca, 0,005 ; Extrait Belladone, 0,005 ; Extrait Digitale, 0,002 ; Extrait Aconit, 0,025 ; Extrait Drosera, 0,025 ; Eau de Laurier-Cerise, 0,50 par cuillerée à café et par dragées.

**Indications principales.** — Toux rebelle, Bronchites chroniques, Catarrhe, Asthme, Emphysème, Tuberculose.

**Dose et mode d'emploi.** — 4 cuillerées à café ou 4 dragées dans la journée. 1 cuillerée à soupe ou 2 dragées le soir au coucher.

Echantillons et littérature.

**Laboratoire du PNEUMOGENOL**  
EPINAL (Vosges).

## PNEUMO-LIPASE

Ampoules injectables.

Médication leucogène nutritive, antituberculeuse surtout.

Formule et technique du Docteur Victor Simon.

**Composition.** — Cholestérol, Ether benzyl-cinnamique, Huile d'olives camphrée débarrassée de ses acides. Trois concentrations (doses progressives) n<sup>os</sup> 1, 2, 3.

**Mode d'emploi et indications.**

- A. INJECTIONS EXTRA-PLEURALES, INTRA-PLEURALES, INTRA-PULMONAIRES : Pleurésies séro-fibrineuses, purulentes, Tuberculoses chroniques, évolutives, fébriles ou non. Asthme, Emphysème.
- B. INJECTIONS INTRA-LARYNGO-TRACHÉALES : Tuberculoses laryngées.
- C. INJECTIONS INTRA-MÉNINGÉES : Tuberculoses méningées.
- D. INJECTIONS INTRA-PÉRITONÉALES : Tuberculoses péritonéales.
- E. INJECTIONS SOUS-CUTANÉES ET INTRA-MUSCULAIRES : Prétuberculoses, anémies, convalescences post-opératoires, surmenage, infections grippales, bronchites chroniques, infections urinaires (prostatites, etc.).

Littérature et échantillons sur demande :

**Laboratoires H. YVRARD**, 17, rue Soufflot — PARIS (V<sup>e</sup>).  
Tél. : Odéon 56-67.



## PNEUMOSTYL DAGUIN

**Forme.** — Ampoules de 2 cc. et ampoules de 6 cc.

**Composition.** — Morrhuate d'éthyle, cholestérine, cinnamate et benzoate de benzyle, camphre, goménol, eucalytol, essences de labiées et huile d'olives neutre.

**Mode d'emploi.** — 1° Pneumostyl hypodermique (2 cc.). Boîte de 12 ampoules : 18 fr.  
2° Pneumostyl intratrachéal (6 cc.). Boîte de 7 ampoules : 24 fr.

**Indications.** — Tuberculose, prétuberculose et toutes les affections des voies respiratoires.

*Echantillons sur demande aux*

**Etablissements DAGUIN**

SAINT-MAUR (Seine).

## POLIOL CHURCHILL

(Hypophosphites composés de 0 gr. 20 par dose.)  
Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable.

Association du *phosphore* avec les bases de l'organisme dans leur proportion avec 1 milligr. de méthylarsinate de strychnine par dose. Reconstituant complètement assimilable. Reminéralisant de choix.

**Indications.** — Neurasthénie, surmenage intellectuel et physique, convalescence, déminéralisation, phosphaturie, affaiblissement.

**Sirop.** — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

**Comprimés.** — 2 comprimés absorbés mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.

**Ampoules.** — 1 injection intramusculaire chaque deux jours.

**Sirop.** — A partir de 7 ans par cuillerée à dessert. Au-dessous de cet âge par cuillerée à café.

**Comprimés.** — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

**Ampoules.** — Suivant indications du médecin traitant.  
3 formes : sirop, comprimés, ampoules. — Prix : 15 francs.

**Laboratoire CHURCHILL**

12, rue Castiglione — PARIS (1<sup>er</sup>).

## POLYBROMURE GONNON

Bromures de Sodium, potassium, ammonium et strontium.

### Forme et Posologie.

*Sirop* : 1 cuillerée à soupe avant le coucher dans une infusion aromatique (2 gr. de polybromure).

*Poudre* : 1 mesure : 1 gr. de polybromure.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication bromurée très énergique, sans bromisme et sans fatigue d'estomac grâce à la présence du bromure d'ammonium et du bromure de strontium qui est un excellent eupeptique.

**Indications.** — Toutes maladies nerveuses, toutes affections du cerveau et de la moelle épinière, états convulsifs et troubles de l'intelligence.

Prix : Sirop, 12 fr. Poudre, 9 fr.

### Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

---

## POLYFERMENTS LALEUF

### Granulé et Tablettes.

**Composition.** — Ferments digestifs totaux, associés aux Sels de Sodium et de MAGNESIUM.

**Propriétés et indications thérapeutiques.** — Stimulant de la sécrétion glandulaire. Médicament de choix des dyspepsies de toute nature et de toutes les affections du tube digestif et de ses annexes.

**Mode d'emploi et doses.** — Une ou deux cuillerées à café ou une ou deux tablettes, à croquer ou à délayer dans 1/2 verre d'eau légèrement tiède, à la fin des principaux repas, ou au moment des troubles digestifs.

L'étui de granulé ou la boîte de 50 tablettes :  
18 francs.

### Laboratoires LALEUF

20, rue du Laos — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## **POLYIODURE GONNON**

(*Iodures de Sodium, Ammonium, Strontium*).

**Forme.** — Sirop comprenant 1 gr. par cuil. à soupe d'iodures alcalins, associés aux écorces d'oranges amères et au vin de Bordeaux.

**Propriétés thérapeutiques.** — Tonique dépuratif, non toxique, action rapide, tolérance parfaite.

**Indications.** — Engorgements, tumeurs, abcès, asthme, rhumatisme, goutte.

**Posologie.** — 1 à 2 cuillerées à soupe par jour au milieu des repas.

Prix : 15 francs.

### **Produits GONNON**

14, rue Victor-Hugo — LYON.

## **POLYMINÉRAL FORT**

GRANULÉ

**Composition.** — Adréaline, fluorure de sodium, phosphate de manganèse, hydrate de magnésie, formiate de chaux, phosphate de potasse, lactate de chaux, glycérophosphate de chaux.

**Indications.** — Reminéralisateur pouvant être utilisé pendant la grossesse, l'allaitement, les périodes de croissance, etc.

**Formes et doses.** — Existe sous formes de :

**Polyminéral adultes** (Adréaline 0,001 ; Fluorure de sodium 0,02 par mesure).

Doses : 2 à 6 mesures par jour.

**Polyminéral enfants** : Adréaline 0,005 ; Fluorure de sodium 0,01 par mesure).

Doses : Bébés de 1 à 3 ans : 1/2 à 1 mesure ; enfants de 3 à 8 ans : 2 à 3 mesures ; enfants de 8 à 15 ans : 4 à 5 mesures.

**Polyminéral irradié** (ergostérine irradiée, vitamine D).

Doses : Enfants jusqu'à 5 ans : 1 à 2 cuill. à café par jour ; enfants 5 à 15 ans : 2 à 3 cuill. à café par jour ; adultes : 4 à 6 cuill. à café par jour.

Prix : 12 francs ; irradié : 16 francs.

**MICHEL DELALANDE**

16, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE.

## POLYPEPTONAL

**Composition.** — Peptonates polyvalents de magnésie associés à des digestats chlorhydropeptiques de foie total et d'albumines des principaux légumes.

**Forme pharmaceutiques.** — Comprimés dragéifiés.

**Action.** — Draine la vésicule et les voies biliaires. Préviend la crise hémoclasique. Stimule les fonctions hépatiques.

**Indication.** — Migraines, urticaires, asthme, eczémas, prurits, congestion du foie, atonie vésiculaire, troubles anaphylactiques et digestifs.

### Posclogie :

*Adultes* : 1 à 3 comprimés 1/2 heure avant les principaux repas, dissous dans un peu d'eau.

*Enfants* : 1 comprimé une demi-heure avant les repas dissous dans un peu d'eau pure ou sucrée.

Prix : 16 francs.

**Laboratoires DURET et REMY**  
**et du Docteur Pierre ROLLAND réunis**  
**ASNIÈRES (Seine).**

---

## POMMADE AU NESTOSYL

Anesthésique par contact.

**Caractéristiques.** — Association d'éthers des séries phtalique et para-aminobenzoïque.

Puissamment anesthésique par contact.

*Aucun produit des tableaux A et B.*

Antiseptique.

**Indications.** — *Suppression infaillible et immédiate de la douleur ou démangeaison provoquée par les plaies, inflammations, irritations, éruptions, et, d'une façon générale, par toute affection qui a modifié l'intégrité de la peau : Eczémas, Ulcères variqueux, Prurit vulvaire, Prurit anal, Prurit sénile, Prurit diabétique, Brûlures, Hémorroïdes, Engelures, Prurigo, Intertrigo, Escarres, Radiodermites, Fractures compliquées, Pansements douloureux, Urticaire, Herpès, Zona, Gale, Furoncles, Impétigo, Anthrax, Coups de soleil, Piqûres, etc...*

Dans les cas aigus, *guérison locale.*

**Conditions d'efficacité.** — Nécessité d'une modification de l'intégrité de la peau, soit accidentelle (érosion, ablation ou distension), soit naturelle (muqueuse) ; un épiderme absolument intact est un obstacle à l'action de la pommade.

Nécessité, pour obtenir une action prolongée, de maintenir la pommade en permanence sur la lésion sous forme de pansement.

**Posologie.** — Aucune limite ni dans les doses, ni dans la durée du traitement.

Prix : 12 fr. 50.

**Laboratoires du NESTOSYL**

P. BAUDE, pharmacien,

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII<sup>e</sup>).

Tél. : Ségur 96-46.

Adresse télégr. : Nestosyl 27 PARIS.

## POMMADE FORNET

A l'insuline Fornet.

**Principe actif.** — L'insuline, reconnue comme médication cytopoïétique remarquable, renforçant la trophicité générale de l'organisme (G.-P. Boyer) ; dans un véhicule spécial d'un pouvoir d'endosmose supérieur. Aucun adjuvant.

**Indications.** — Ulcères variqueux, Plaies atones de toute nature, Prurits, Psoriasis, Rhumatisme Diabétique, etc...

Prix : 15 francs le tube.

Service de Vente et Echantillonnage :

**Laboratoires**

23, rue du Caire — PARIS (II<sup>e</sup>).

Service d'Etude et de Fabrication :

**Institut de Microbiologie**

SARREBRUCK (Sarre).

## POMMADE LENOIR

à la Cinnamoléine.

**Traitement spécifique des *dartres chroniques* ;** s'adresse exclusivement à ces eczémats à forme sèche, desquamant sans cesse, souvent prurigineux dont la tenacité est si désespérante pour le malade et pour le médecin.

Dans le *Pityriasis* du cuir chevelu, en découpant la couche épaisse des pellicules qui enserrant et étouffent les cheveux, elle enrayer la calvitie et permet de recourir avec succès aux diverses lotions excitantes et microbicides qui, sans elle, ne pourraient atteindre le sebum-bacille enfermé dans les glandes sébacées.

Employée aussi avec succès contre les *verruës plates séborrhéiques* du visage, dites *crasse des vieillards*, les *psoriasis*, le *sycosis*, la *teigne*, le *favus*.

**Mode d'emploi.** — Onction matin et soir sur la partie malade.

Prix : 12 francs.

**Laboratoires A. LEJEUNE**

142, rue de Picpus — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## POMMADE LOGEAIS

### Composition :

Extrait d'Hamamélis.....	6 gr.
Sulfoichtyolate de Soude....	6 gr.
Lanoline .....	9 gr. 50
B. Cacao.....	9 gr. 50
Ongent populeum Q. S. pour 100 gr.	

Ni cocaïne, ni adrénaline, ni extraits opothérapiques.

**Propriétés.** — Atoxique, analgésique, décongestionnante et doucement vaso-constrictive. Sédation rapide et durable, aucune réaction douloureuse. Tolérance parfaite. Ne tache pas le linge d'une manière indélébile.

**Indications.** — Hémorroïdes externes. Prurits anal et vulvaire. Gerçures des seins.

**Mode d'emploi.** — Onction matin et soir après lavage avec le doigt enduit d'une forte couche de Pommade Logeais et jusqu'à sédation de la douleur (quelques minutes).

Nous joignons une canule à chaque tube, ce qui permet de traiter les hémorroïdes internes par la Pommade Logeais.

Prix de vente au public : 15 francs.

**Laboratoires Émile LOGEAIS**

24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE.

Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.

## POMMADE MIDY

(Adrénostyptique.)

Adrénaline .....	0 gr. 0066
Stovaïne .....	1 gr.
Anesthésine.....	1 gr.
Extrait de marron d'Inde frais stérilisé.....	2 gr. 50

Pour 100 grammes de pommade.

**Mode d'emploi.** — Une application matin et soir, et après les garde-robes.

**Propriétés thérapeutiques.** — Sédation des douleurs, arrêt des hémorragies, décongestion et vaso-constriction-antisepsie.

**Indications.** — Traitement rationnel des hémorroïdes externes et internes.

Une canule rectale s'adaptant au tube permet d'atteindre les hémorroïdes internes haut placées.

**Laboratoires MIDY**

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII°).

## POMMADE NOELLINE

**Composition.** — Pommade à base d'acide benzoïque et de tanin incorporés à un excipient à la fois gras et alcool.

**Action.** — Traitement préventif et curatif des gerçures des seins, et des rougeurs des bébés.

### Mode d'emploi :

a. Gerçure des seins. *A titre préventif* : en massage des mamelons dans les derniers mois de la grossesse.

*A titre curatif* : En pansements, après lavage antiseptique.

b. Rougeurs des bébés. Application locale recouverte de poudre Noëlline.

Prix : le tube, 6 fr.

**Laboratoire de la NOELLINE**  
GUINGAMP (Côtes-du-Nord).

## POMMADE RADINE

Brûlures, Engelures, Crevasses du Sein.

Pommade à base de principes extractifs de plantes aromatiques, antiseptiques, analgésiques et cicatrisantes (mélilot, romarin, thym, sauge, millepertuis, niaouli, etc...).

### Mode d'emploi :

*Brûlures* : Applications sur du lint ou de la toile après ouverture des phlyctènes aux ciseaux.

*Crevasses du sein* : Applications sur le mamelon entre les tétées. Lavage avant et après la tétée à l'alcool glyciné.

Cicatrisation rapide et nette, sans suppuration, suppression de la douleur.

Echantillonnage large pour hôpitaux, dispensaires, usines.

Tube p.m. : 5 fr. (25 gr.). Tube g.m. 10 fr. (100 gr.).

**Laboratoires DUCLOS**  
EVREUX (Eure).



## POMMADE RAIMOA

**Principes actifs.** — Aristol. Éther. Cicatrisants très actifs. Analgésiques.

**Indications.** — Brûlures à tous degrés. Plaies de tous genres, infectées ou non. Eczémas. Ulcères.

**Mode d'emploi.** — Avec ou sans lavage d'éther préalable, une application matin et soir.

**Laboratoire des Produits RAIMOA**

Collignon-Savers,

264, boulevard Voltaire — PARIS (XI<sup>e</sup>).

Téléphone : Diderot 54-96.

## POMMADES OPHTALMIQUES CHIBRET Optima

**Pommades** en tubes à canule dévissable et stérilisable, faites par des procédés spéciaux de fabrication à : l'Oxyde Jaune, Violet de Méthylène, Bleu de Méthylène, Aristol, Vioforme, Iodoforme, Rouge Ecarlate, Cuivre (hémocuisse), Oxyde de Zinc, Zinc Cadmium, Zinc Tuménol, Zinc Ichtyol, Calomel, Fondante (K<sub>i</sub> + CaCl<sup>2</sup>) et Ichtyol, Soufre, Tannin, Précipité Blanc, Bismuth Hydroxyde, Dermatol, Extrait thyroïdien, Ektogan, Collargol, Argyrol, Protargol, Cocaïne, Stovaine, Ethylhydrocupréine (Optochine), Rose de Bengale, Xéroforme, Orthoforme, Essence du Niaouli (Goménol), Aïrol, Bismuth Violet, Bismuth Rose, Optochine Rose, Violet rose, Colorant Composé, Eserine, Euphtalmine, Scopolamine, Atropine, Pilocarpine, Adrénaline, Dionine, Homatropine, Bétuline Hg, Bétuline Ag, Bétuline Cu.

**Radio Bleu** (Radio Active au bromure de Ra associé au bleu de Méthylène) à employer lorsque l'on veut obtenir une cicatrisation rapide des tissus cornéens et conjonctivaux.

**Ampoules fondantes chloro-iodo-calciqne** (Bains d'yeux pour cataracte).

**Éillères Chibret** à rebord caoutchouté.

**Pommade pour le nez** : Baume du Pérou, Adrénaline.

(Voir à Collyres la suite des Produits Chibret).

**LABORATOIRES CHIBRET,**

5, rue Saint-Herem — CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).

## POMMADE V. E. DOUMER

### Formule :

Bleu de Méthylène .....	1 gr.
Essence de Thym .....	0 gr. 50
Essence de Romarin .....	0 gr. 50
Essence d'Eucalyptus...	0 gr. 50
Essence de Serpolet.....	0 gr. 50
Glycérolé d'Amidon .....	30 gr.
Lanoline.....	70 gr.
Huile de Cade.....	0 gr. 25

La Pommade V. E. Doumer s'emploie en applications quotidiennes dans les brûlures, l'eczéma, les ulcères variqueux, etc... Toutefois son emploi, en raison de sa coloration, semble contre-indiqué dans les affections de la face.

**Laboratoires BOMEL**  
ANNONAY (Ardèche) — France.

## POTION ADOL

**Composition.** — Préparation à base de : Bromure d'ammonium, Amidopyrine, Iodure d'ammonium, Sulfate de Spartéine, Stovaïne, Citrate de Caféine, Intrait de Valériane.

**Action thérapeutique.** — Analgésique et antalgique extrêmement puissant.

**Avantages.** — Pas de toxicité, goût agréable, action constante. Pas de contre-indications.

**Indications.** — Douleurs aiguës, qu'elle qu'en soit l'origine. Céphalées, migraines, rachialgies, lumbago, sciatiques, névrites, coliques néphrétiques et hépatiques, douleurs rhumatismales, grippe.

**Mode d'emploi.** — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour, loin ou avant les repas.

Prix : 16 francs

**Laboratoire ADOL**

**L. GIROUD, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**  
78, cours de la Liberté — LYON.

## POTION DES CORDELIERS DE SÉEZ

### Composition :

Iodure de caféine stabilisé .....	0 gr. 40
Teinture de belladone .....	0 gr. 45
Teinture de datura .....	0 gr. 15
Teinture d'euphorbia pilulifera .....	0 gr. 10
Muriate de morphine.....	0 gr. 0015
dans excipient sucré et aromatisé.	

**indications.** — Traitement de l'asthme, de l'emphysème, du catarrhe et de toutes les maladies des voies respiratoires.

**Posologie.** — 1 cuillerée à soupe matin et soir au début du traitement, et réduire progressivement à 1 cuillerée à dessert matin et soir, et à 1 cuillerée à café matin et soir, à mesure que les crises s'atténuent et disparaissent.

### Laboratoire ÉTIENNE

19, avenue Secrétan — PARIS (XIX<sup>e</sup>).

## POUDRE ANTI-ÉPILEPTIQUE CASSARINI

### En Comprimés.

Nouvelle combinaison antitoxique bromée aux extraits végétaux.

Spécifique héroïque, des épilepsies et des affections nerveuses avec hyper-excitation du système nerveux.

Prix au public : 20 fr. la boîte (un mois de traitement environ).

### Posologie :

**Adultes :** 6 comprimés par jour. 2 avant chacun des trois principaux repas. Dissous dans un demi-verre d'eau.

**Adolescents :** 10 à 15 ans : 3 jusqu'à 4 comprimés par jour.

Un ou deux avant les trois principaux repas, dissous dans un demi-verre d'eau ou dans le potage.

**Enfants de 6 à 10 ans :** 2 jusqu'à 3 comprimés par jour, un avant le petit déjeuner, un avant le repas du soir, dissous dans n'importe quel liquide.

**Enfants au dessous de 5 ans :** Demander doses spéciales.

Littérature sur demande :

**Raoul COLUMEAU, Pharmacien spécialiste**

19, rue Saint-Bazile — MARSEILLE.

## POUDRE ESCOUFLAIRE

Poudre et cigarettes anti-asthmiques.

**Composition.** — A base de nitre et des solanées les mieux triées (récoltes de 1<sup>er</sup> choix).

**Indications thérapeutiques et formes.** — N° 2 (la plus faible). Bronchite chronique, oppressions cardiaques, etc. — N° 1 : Asthme nerveux, Asthme des foins, fins de coqueluche, etc.

**Mode d'emploi.** — Une bonne pincée ou une demi-cuiller à café de poudre, allumée sur un fond de soucoupe recouverte d'un entonnoir ou d'un cornet en papier dirigeant la fumée vers la gorge. Avaler la fumée.

Ne pas attendre les affres de la crise : la prévenir par une fumigation anticipée et surtout la fumigation préventive du soir, avant de se mettre au lit.

**Prix de vente :** 9 fr. (pour environ 30 fumigations ou 30 cigarettes).

**Laborat. ESCOUFLAIRE,** — Baisieux (Nord).  
(Echantil. grat. sur demande de MM. les Docteurs.)

---

## POUDRE ET CIGARETTES ZANI

Anti-asthmiques.

**Composition.** — Datura Stramonium, Belladone atropa, Digitalis purpurea, Croton Eluteria, Styra benzoin.

**Propriétés thérapeutiques.** — Oppression, Catarrhes, Coqueluche, Suffocation, Bronchites chroniques, Toux nerveuses, Asthme des foins.

**Mode d'emploi.** — Respirer largement la fumée. Faire brûler une cuillerée à café de poudre ou en plein air fumer les cigarettes.

4 fr. 50 la boîte.

**G. DE SAINT-STEBAN**

Docteur en Pharmacie

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.

## **POUDRE ET POMMADE D'INSULINE PHYLOZE**

**Forme et composition.** — Insuline purifiée de fabrication française en poudre et en pommade.

**Mode d'action.** — Excite la vitalité cellulaire et active la cicatrisation des plaies.

**Indication.** — Ulcères variqueux, plaies atones, fermeture rapide de la plaie.

**Mode d'emploi.** — Déterger la plaie par un pansement humide, la saupoudrer de Poudre d'Insuline Phyloze ou appliquer la Pommade d'Insuline Phyloze et recouvrir d'une gaze.

Appliquer la Poudre ou la Pommade d'Insuline Phyloze une fois par jour.

Dans les cas graves et après cicatrisation de l'ulcère, pour parachever la guérison, recourir aux injections d'Endopancrine. (Voir ce mot.)

### **LABORATOIRE DE THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE**

48, rue de la Procession — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

## **POUDRE LAXATIVE DE VICHY** **du docteur Léonce Souligoux.**

Composée de principes végétaux et aromatiques et d'un soufre spécialement traité, la Poudre laxative de Vichy s'emploie à la dose d'une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau, le soir en se couchant. Très agréable, facile à prendre. De résultat constant.

**CHASSAING, LE COQ et C<sup>ie</sup>**

1, Quai Aulagnier  
ASNIÈRES (Seine).

## POUDRE NOELLINE

### Composition :

Poudre à base de dermatol.

### Indications :

Rougeurs des bébés.

### Mode d'emploi :

En applications locales, tant à titre préventif qu'à titre curatif.

Prix : La boîte fer : 6 francs.

La boîte aluminium décorée : 15 francs.

**Laboratoire de la NOELLINE**  
GUINGAMP (Côtes-du-Nord).

## POUDRE PATERSON

### Composition :

Sous-nitrate de bismuth pur, léger (ancien Codex). Magnésie calcinée.  
Sucre pur.

### Propriétés :

Le meilleur saturant neutre. Ne constipe jamais. *Agit à faibles doses.*  
*Le seul saturant gastrique* neutre présenté en *pastilles*, obligeant à la salivation. Action inoffensive. Très supérieur au carbonate de bismuth et aux produits de substitution (kaolin).

### Indications :

**Poudre en paquets :** Pansement gastrique, Saturation. Gastropathies douloureuses. Dyspepsies. Hyperchlorhydrie. Acidités anormales. Ulcus gastrique et duodéal. Entérites et infections intestinales. Dyspepsies gravidiques. Troubles digestifs du nourrisson.

**Pastilles :** Traitement d'entretien. Troubles digestifs légers ou chroniques. Digestions pénibles. Etats nauséux de la grossesse.



### Formes et posologie :

**Paquets :** (2 gr.) 2 à 5 par jour, et plus, au moment des crises douloureuses.

**Pastilles :** 15 à 20 par jour. Laisser fondre en bouche.

Prix au public : Poudre, la boîte (40 paquets), 15 francs ; la demi-boîte (20 paquets), 8 fr. Pastilles : La boîte, 7 fr. 50 ; la demi-boîte, 4 fr.

**Laboratoires des Produits PATERSON. G. et M. Armingeat.**  
46, rue de Saintonge — PARIS (III<sup>e</sup>).

## POUDRE ROCHER LAXATIVE

### Traitement de la constipation.

Laxatif doux et agréable, agissant sûrement et sans coliques.

**Composition.** — Association en proportions convenables de substances émollientes et aromatiques.

**Posologie.** — Une ou 2 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau le soir, au coucher.

Echantillon franco à Messieurs les Docteurs.

**Laboratoires E. FERRÉ**

19, rue Grégoire-de-Tours — PARIS (VI<sup>e</sup>).

---

## POUDRE SATINE

### Composition :

Stéarates .....	12 gr.
Acide borique.....	3 gr.
Talc .....	2 gr.
Carbonate de chaux.....	3 gr.

**Propriétés thérapeutiques.** — Irritations de la peau ; rougeurs des nouveau-nés. Ne se laisse pénétrer par aucun liquide.

**Indications.** — Toilette des bébés. Irritations cutanées, escarres des malades alités.

Prix : la boîte, 7 fr.

**Laboratoires NOGUÈS**

11, rue Joseph-Bara — PARIS.

## POUDRE STOM

Mélange en proportions étudiées de Carbonate de chaux, Bicarbonate de Soude, Benzonaphtol, Ferment Lactique, Belladone Aromatisé à la Menthe.

**Indications.** — Digestions pénibles, pyrosis, Renvois, Fermentations.

**Mode d'emploi.** — 1 cuillerée à café (après les repas) délayée dans 1/2 verre d'eau.

---

**Laboratoire des Produits Français**  
**L. HERIN, Ex-Interne des Hopitaux**  
98, rue Jeanne-Mailleton  
LA MADELEINE (Nord).

---

## PRAGMOLINE

Solution stable de bromure d'Acétylcholine.  
Hypotenseur et excito-moteur des fibres lisses.

**Indications.** — Accidents de l'hypertension en général. Affections spasmodiques d'origine artérielle (artérites sténosantes des membres, maladie de Raynaud, localisations cérébrales, rétinienne, auriculaires, etc.). Hypovagotonie. Sueurs des Tuberculeux.

**Présentation et Posologie.** — Boîte de 10 ampoules. Solution A dosée à 6 p. 100 de bromure d'acétylcholine (ampoule de 1/2 cc.). Solution B dosée à 12,5 p. 100 (ampoule de 1 cc.). Injection sous-cutanée profonde. De 0 gr. 03 à 0 gr. 06 pour les sueurs des tuberculeux ; 0 gr. 25 pour les angiospasmodiques. Débuter par de petites doses.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
86, rue Vielle-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).



## PRÉVALIDINE

**Forme.** — Pommade résorbable en tube gradué.

**Composition :**

- 1° Camphre en huiles essentielles aromatiques ;
- 2° Baume du Pérou, Acide cinamique ;
- 3° Extrait opothérapique de peau animale.

**Indications.** — Grippe, Bronchite, Broncho-pneumonie, Emphyseme, Coqueluche, Tuberculose, etc.

**Mode d'emploi.** — Une onction par jour, le premier jour le dos, le second jour la poitrine, troisième jour l'un des bras, quatrième jour l'autre bras, le cinquième les cuisses.

**Présentation.** — Tube gradué par onction.

Prix : 9 francs.

**Laboratoires FISCH et C<sup>ie</sup>**

4, rue d'Ilzach — MULHOUSE.

Dépôt à PARIS : 49, rue de Paradis.

Tél. : Provence 30-32.

---

## PRÉVENTYL

Nécessaire de poche de prophylaxie  
antivénérienne.

Le premier créé en France sous le contrôle et d'après les conseils des Maîtres de la vénéréologie française.

**Composition.** — En trois tubes d'étain de couleur différente :

- 1° Pommade de Metchnikoff (calomel 33 p. 100) ;
- 2° Gelée au protargol à 3 p. 100 ;
- 3° Emulsion de savon ;
- 4° Une cartouche de ouate hydrophile.

**Présentation.** — Grand modèle (15 fr.), pour 8 à 10 applications.

Petit modèle (8 fr.), aspect et format d'une boîte d'allumettes, pour 3 applications.

Echantillons et littérature sur demande aux

**Laboratoires MARCHAND et LEROY,**

40, rue d'Enghien — PARIS (X<sup>e</sup>).

Téléph. : Provence 37-13.

## PREZYMASE

### Cure de désensibilisation.

**Composition.** — Peptone de poisson, peptone de viande, extrait sec de quinquina.

**Mode d'action.** — Prémunit l'organisme contre les accidents de la sensibilisation (Théorie de Widal, Méthode de Pagniez, et Pasteur-Vallery-Radot).

**Posologie.** — Une à deux dragées une demi-heure avant chaque repas.

### Laboratoires **LEBOIME**

32, quai Voltaire — BEZONS (Seine-et-Oise).

---

## PRISES DELQUÉ

**Composition.** — Poudre à base de sels alcalins chimiquement purs.

**Action.** — Neutralisante, sédative, eupéptique.

**Indications.** — Hyperchlorhydrie, gastrites, Gastro-entérites. Fermentations intestinales.

**Mode d'emploi.** — Une prise à faire dissoudre dans un verre à bordeaux d'eau bouillie ou faiblement minéralisée. A renouveler 3 ou 4 fois par jour.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires J. M. RICARDOU**

Docteur en pharmacie.

46, rue Pierre-Charron — PARIS.



## PROBIOS

### Thérapeutique mixte. Antivirus. Bactériophage.

La supériorité de nos produits sur les produits similaires est obtenue grâce à l'association du bactériophage aux antivirus des bactéries devenues résistantes au principe lytique (C. R. *Société de biologie*, t. CII, p. du 21 mai 1930).

### PROBIOS ANTIPYOGÈNE EN POMMADE

**Présentation.** — En tubes d'étain.

**Principes actifs.** — Antivirus et Bactériophages. Streptococciques, Staphylococciques et Pyocyaniques.

**Indications.** — Acné, Sycosis, Furunculose, Anthrax et toutes les staphylococcies. Abscès, plaies suppurées, brûlures infectées, etc.

### PROBIOS ANTIPYOGÈNE

#### Présentation :

4 ampoules incolores de 5 cc. = Bactériophage.

4 ampoules jaunes de 5 cc. = Antivirus.

**Principes actifs.** — Antivirus et Bactériophage. Streptococciques, Staphylococciques et Pyocyaniques.

**Indications.** — Infections pyogènes : Abscès, Phlegmons, Panaris, Plaies suppurées, Brûlures infectées, Pyodermites et toutes les suppurations. A titre préventif sur les plaies en chirurgie, avant, pendant et après les interventions septiques.

### PROBIOS ANTI-STAPHYLOCOCCIQUE

#### Présentation :

4 ampoules incolores de 5 cc. = Bactériophage.

4 ampoules jaunes de 5 cc. = Antivirus.

**Principes actifs.** — Antivirus et Bactériophage Staphylococciques.

**Indications.** — Acné, Sycosis, Furoncles, Anthrax et toutes les infections à Staphylocoques.

### PROBIOS VOIES RESPIRATOIRES

#### Présentation :

5 ampoules incolores de 2 cc. = Bactériophage.

5 ampoules jaunes de 2 cc. = Antivirus.

De plus, chaque boîte contient un instillateur nasal.

**Principes actifs.** — Antivirus et Bactériophage, Pneumococques, Streptococciques, Staphylococciques, Friedlander, Proteus, Antivirus Pfeiffer.

**Indications.** — Coryza, Sinusites, Rhinites, Ozène, Otites, Bronchites, Pneumonie, Broncho-Pneumonie, Grippe, certaines formes d'Asthme. Préventif dans la Grippe et le Coryza.

### PROBIOS ANTI B. COLI

#### Présentation :

4 ampoules incolores de 5 cc. = Bactériophage.

4 ampoules jaunes de 5 cc. = Antivirus.

**Principes actifs.** — Antivirus et Bactériophage B. Coli, B. Para-Coli, Friedlander et Proteus.

**Indications.** — Toutes infections se rapportant à B. Coli, Para-Coli, Friedlander et Proteus, notamment, Bactériuries, Cystites, Pyélites, Pyélonéphrites, Cholécystites, Vulvo-Vaginites, etc.

### PROBIOS INTESTINAL

#### Présentation :

5 ampoules incolores de 2 cc. = Bactériophage.

5 ampoules jaunes de 2 cc. = Antivirus.

**Principes actifs.** — Antivirus et Bactériophage B. Coli, Dysentériques, Typhiques et Para, Friedlander, Proteus, Staphylococciques, Streptococciques, Entéroccocciques, Pyocyaniques, Antivirus *Perfringenes* et *Sporogenes*.

**Indications.** — Entérites, Colites, Syndrome entéro-rénal ; Stases et tous états toxi-infectieux : Diarrhées des nourrissons ; Diarrhées des enfants ; Diarrhées saisonnières ; Dysenterie bacillaire.

### PROBIOS INTESTINAL EN COMPRIMÉS

**Présentation.** — Une boîte de 5 tubes de 10 comprimés chaque.

**Principes actifs.** — Voir *Intestinal Ampoules*.

**Indications.** — Entérites, Colites, Syndrome entéro-rénal, Stases et tous états toxi-infectieux, Dysenterie bacillaire.

### PROBIOS BUCCO-DENTAIRE

#### Présentation :

5 ampoules incolores de 2 cc. = Bactériophage.

5 ampoules jaunes de 2 cc. = Antivirus.

**Principes actifs.** — Antivirus et Bactériophage Streptococciques, Staphylococciques, Pyocyaniques, Pneumococciques, Friedlander.

**Indications.** — Préventif et curatif de toutes les manifestations suppuratives au cours du traitement des dents infectées, des Abscès, Phlegmons, Ostéites, Infections periapiculaires, Gingivites, Stomatites, Pyorrhées, Alvéolites post-opératoires, etc.

### PROBIOS BUCCO-ADHÉSIF

En extrait concentré pour pansements vaccinnants adhérents aux tissus mous.

**Principes actifs.** — Voir *Bucco-Dentaire*.

### PÂTE DENTIFRICE PROBIOS

La Pâte Dentifrice des Pyorrhéiques.

**Principes actifs.** — Voir *Bucco-Dentaire*.

### Laboratoires PROBIOS

1, avenue Pasteur — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Tél. : Invalides 25-73.

## PROPIDEX

Pommade à base de Propidon.  
Vaccination cutanée des infections superficielles.

### Indications :

**Furoncles, Plaies, Brûlures, Ulcérations, Engelures, Excoriations.**

### Mode d'emploi :

Applications deux fois par jour ; recouvrir d'un tissu souple stérilisé.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

### « SPÉCIA »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
86, rue Vieille-du-Temple, PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## PROPIDON

Bouillon stock-vaccin du professeur Pierre Delbet. L'association de cultures, atténuées à la fois par la chaleur et par le vieillissement, de streptocoques, de staphylocoques et de B. pyocyaniques, confère à ce vaccin une action très efficace dans les affections à pyogènes.

### Indications :

**Staphylococcies fébriles, Anthrax, Phlegmons, Lymphangites, Érysipèles, Affections gynécologiques, Vaccination pré-opératoire.**

### Posologie et mode d'emploi :

Injection sous-cutanée ou intramusculaire du contenu d'une ampoule (4 cc.). A renouveler, s'il est nécessaire, après 24 ou 36 heures, jusqu'à trois ampoules.

L'injection donne lieu à une forte réaction fébrile d'ailleurs bien supportée.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

### « SPÉCIA »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## PROPIDON PANSEMENT

Application du Propidon Delbet, voir page 828.

Bouillon stock vaccin du Prof. Pierre Delbet à la Bactériothérapie locale.

**Indications.** — Plaies, Absès chauds, Phlegmons, Panaris, Furoncles, Anthrax, Impétigo, Pansement des fractures ouvertes, des ostéomyélites, Pansement de l'antrotomie, Ulcères variqueux, Adénites suppurées, Gerçures du sein, etc...

**Présentation et mode d'emploi.** — Une boîte contenant 2 ampoules de propidon et 2 pansements aseptiques avec un imperméable. Suivre les instructions de la notice contenue dans la boîte pour l'application du pansement.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

**Marques Poulenc frères et Usines du Rhône**  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## PROSTAPHILE LEISYN

**Médication à action active sur la Prostate.**  
Innocuité absolue. Aucun inconvénient.  
Aucune contre-indication.

**Indications.** — Cystites, Epididymites, Hypertrophie de la Prostate, Prostatismes, Prostatites, Urétrites, Rétentions d'urine, Vésiculites et Complications ultérieures de l'Hypertrophie de la Prostate.  
Action immédiate.

**Présentation.** — Ampoules de 2 cc. environ, injectables tous les jours ou tous les deux jours, soit hypodermiquement, intramusculairement ou dans la glande elle-même.

**Les Laboratoires LEISYN**

1 bis, rue Molitor — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## PROSTHÉNASE GALBRUN

Gouttes titrées. Solution organique de fer et de manganèse combinés à la peptone et à la glycérine, entièrement assimilable.

L'association de ces deux métaux en combinaison organique renforce singulièrement leur pouvoir catalytique et excito-fonctionnel réciproque. Ne donne pas de constipation. Tonique puissant. Reconstituant énergique.

**Anémie, Chlorose, Débilité, Convalescence.**

XX gouttes de Prosthénase contiennent 1 centig. de fer et 5 millig. de manganèse.

V à XX gouttes pour les enfants,

X à L gouttes pour les adultes.

Prix de vente au public : 14 fr. 50.

**Laboratoire GALBRUN**

8 et 10, rue du Petit-Musc — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---



## PROTIODYNE

Professeurs DUBARD et VOISENET de Dijon.

**Composition.** — Sélection de noyaux aminés de Peptones et d'Albumoses iodées, et chlorure de calcium.

**Formes.** — Ampoules de 5 cc. à 0 gr. 25 de principes actifs (*Enfants*).

Ampoules de 5 cc. à 0 gr. 50 de principes actifs (*Adultes*).

Injections hypodermiques indolores.

Jamais de choc, ni de réactions anaphylactiques.

**Propriétés.** — Par ses effets préventifs et curatifs des infections fébriles et des intoxications, la **Protidyne** est une arme puissante toujours à la disposition du médecin devant une infection dont il n'a pas le sérum spécifique.

**Indications.** — Infections fébriles en général. Grippe, Pneumonies, Fièvres typhoïdes, **puerpérales**, etc. Dermatoses par auto-intoxication, Urticaires, Furunculose; désensibilisation de tout syndrome anaphylactique: Asthme vrai, Asthme des foins, Migraines, etc.

**Doses.** — *Adultes* : 1 à 2 ampoules à 0 gr. 50 à la première injection.

*Enfants* : 1 à 2 ampoules à 0 gr. 25 à la première injection.

A renouveler de 24 en 24 heures ou de 48 en 48 heures si la sédation des accidents infectieux n'a pas été obtenue ou ne s'est pas maintenue.

Chez le jeune enfant, réduire la dose suivant l'âge et le poids.

**La Protidyne ne doit être employée que sous le contrôle du médecin.**

Prix : La boîte 4 ampoules Protidyne, 18 fr.

Communications du professeur DUBARD de Dijon : Journal de médecine et de chirurgie pratique, 1919 ; La Clinique et le Scalpel, 1923.

*Littérature et Echantillons sur demande au*  
**Laboratoire général d'Études Biologiques**  
S. A., 29, place Bossuet — DIJON.

## PROTIODYNE DRAGÉES

**Composition.** — Albumoses et Peptones iodées, Sulfate de magnésie.

**Propriété.** — Désensibilisation de tout syndrome anaphylactique.

**Indications.** — Manifestations anaphylactiques, en général : migraines, urticaires, prurits, eczémas, entérocolites, asthmes, troubles digestifs par assimilation défectueuse : rougeurs de la face, somnolences, flatulences, pesanteurs après les repas, etc., etc.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés, à 0 gr. 40 de principes actifs.

**Doses et mode d'emploi.** — Une heure avant chacun des trois repas. *Adultes* : deux dragées. *Enfants* : une dragée. La dragée ne doit être ni croquée, ni sucée, mais avalée avec un peu d'eau. Prix : la boîte de 50 dragées Protiodyne : 15 fr.

Littérature et échantillons sur demande.

**Laboratoire général d'Études Biologiques.**  
S. A., 29, place Bossuet — DIJON.

## PROTOLYSINE

Ch. Gautier.

Dérivé acide de l'acide aminophénylarsinique, la PROTOLYSINE est un antiseptique interne puissant entraînant la destruction des microzoaires pathogènes du tube digestif et des circulations sanguine et lymphatique.

**Présentation.** — Comprimés dosés à 0 gr. 25 de principe actif. Présenté au public sans aucune indication pouvant attirer l'attention sur son action spécifiquement antisypilitique.

**Indications.** — Syphilis, Pian, Trypanosomiase, Amibiase, Lambliose, Paludisme, affections bucco-pharyngées.

**Posologie.** — Syphilis : 2 à 4 comprimés par 24 heures le matin à jeun par périodes de 3 à 4 jours séparés par des intervalles d'égale durée. S'arrêter dès qu'il survient de la diarrhée, ou en cas de subictère. Surveiller les urines.

**Pian et Amibiase** : 2 comprimés par 24 heures, puis un seul par la suite et enfin un tous les 2 jours.

**Autres affections.** — 1 ou 2 comprimés par 24 heures, Prix au public : 18 fr. 50.

**Laboratoires des Spécialités pharmaceutiques Ch. GAUTIER**  
13, rue Dorian — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## PROVEINASE MIDY

(Comprimés).

### Composition :

- 1<sup>o</sup> Extraits secs (desséchés dans le vide) de plantes stabilisées : Cupressus Viburnum, Marron d'Inde, Hamamélis et Genêt.
- 2<sup>o</sup> Poudres d'organes à sécrétion interne : Thyroïde, Surrénale et Hypophyse.

**Propriétés thérapeutiques.** — Synergie régulatrice de l'insuffisance veineuse. Associe les effets organothérapeutiques des glandes endocrines et les vertus vasoconstrictrices de plantes soigneusement sélectionnées.

**Indications.** — Toutes les affections du système veineux : Varices, Varicosités, Varicocèles, Ulcères variqueux, Hémorroïdes, Œdèmes post-phlébitiques, Troubles consécutifs de la Ménopause et de la Puberté.

### Mode d'emploi :

Etats chroniques : 2 à 3 comprimés par jour.  
Etats aigus : 3 à 6 comprimés par jour.

**Laboratoires MIDY**

4, rue du Colonel-Moll — PARIS.

---

## PROXYTOL

Association des Proxytases des organes de la digestion (Foie, Estomac, Intestin, Pancréas).  
Spécifique des affections gastro-intestinales.

**Mode d'action.** — Assure le fonctionnement cellulaire normal par l'apport des ferments de synthèse ; active la nutrition de l'organe, rétablit les sécrétions.

**Indications.** — 1° Les dyspepsies ; 2° les entérites ; 3° l'insuffisance hépatique ; 4° gastro-entérites des nourrissons.

**Forme.** — Boîte de 36 comprimés.

**Doses.** — *Adultes* : Croquer de 4 à 6 comprimés par jour le matin à jeun ou loin des repas.

*Enfants* : Demi-doses.

*Nourrissons* : 2 à 4 comprimés dissous dans l'eau, à prendre 3/4 d'heure avant les tétées.

## PROXYTASES

Diastases tissulaires spécifiques à chaque organe. Catalyseurs biologiques réglant l'assimilation intime, permettant à l'organe déficient de restaurer ses lésions et de recouvrer son activité physiologique.

Action rigoureusement spécifique.

**Indications.** — Les insuffisances fonctionnelles de chaque organe.

**Prescrire.** — Proxytase ovaire, Proxytase rein, Proxytase thyroïde, Proxytase foie, Proxytase testicule, Proxytase ovaire-thyroïde, Proxytase foie-thyroïde.

**Doses.** — *Adultes* : Croquer 4 à 6 comprimés par jour, le matin à jeun ou loin des repas.

*Enfants* : Demi-doses.

**Laboratoire des PROXYTASES**

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).

R. C. 18-000.

Tél. : Littré 68-22, 23, 24.

## PRUNINE SENTINI

aux Prunes d'Ente d'Agen.

**Principes actifs.** — Pruneaux d'Agen, Phtaléine, Cephaelis Ipécacuanha.

**Indications.** — Laxatif et Purgatif doux.

**Présentation.** — Délicieux bonbons d'extrait de Pruneaux d'Agen, enrobés de chocolat. Goût exquis, efficacité parfaite  
Pas d'accoutumance, pas de coliques.

*Laxatif* : Un bonbon le soir au souper.

*Purgatif* : 2 à 3 bonbons le soir au souper.

*Enfants au-dessus de cinq ans* : Demi dose.

**Laboratoires DOMERGUE**

AGEN (Lot-et-Garonne).

---

## PSORIMANGANE

Préparation colloïdale de manganèse, de très grande dispersion.

**Indications.** — Le psoriasis sous toutes ses formes. On injecte 1 cc. intramusculaire de 3 en 3 jours, puis 2 cc. suivant les symptômes secondaires.

**Avantages.** — Sous cette nouvelle forme, le manganèse agissant est absorbé très vite ; pas d'accidents, pas d'albumine dans les urines après les injections. Résultats nets dès les premiers jours de traitement.

**Formes :**

Ampoules intraveineuses ( 6 × 2 cc.)

Ampoules intramusculaires (12 × 1 cc.)

**Laboratoires des D<sup>rs</sup> R. et O. WEIL**

Établ. **MERMINOD et C<sup>o</sup>, Concessionnaires**

49, rue de Paradis — PARIS (X<sup>e</sup>).

Tél. : Provence 30-32.

## PSOTHANOL

Composé arséno-bismuthique soluble.

**Indications thérapeutiques.** — Psoriasis et toutes affections psoriasiformes.

**Présentation.** — Ampoules de 3 cc. 1/2 avec anesthésique pour injections intramusculaires.  
Ampoules de 3 cc. 1/2 sans anesthésique pour injections intraveineuses.

**Posologie.** — Une ampoule tous les 2 jours en commençant par 1/4 d'ampoule au maximum, et en augmentant la dose suivant la tolérance du malade. Série de 20 injections.

Boîte de 10 ampoules : 30 francs.

*Thérapeutique autophylactique, rénovation leucocytaire :* Psothanol en amp. de 1 cc. pour injections intramusculaires.

Boîte de 10 ampoules : 25 francs.

**Laboratoire G. FERMÉ**

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X<sup>e</sup>).

## PULMOCARDINE

**Indications.** — Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques, Angine de poitrine, maladies du cœur et des vaisseaux, etc.

**Présentation.** — Dragées faciles à prendre.

**Composition :**

**Iodure de Caféine :** fluidifie les sécrétions bronchiques, régularise le cœur et restitue l'énergie à la systole.

**Grindelia :** Expectorant et antispasmodique puissant, diminue la tachycardie et la dyspnée.

**Lobélia :** détend la contracture et supprime l'angoisse.

**Quebraco :** eupnéique, augmente l'amplitude des mouvements respiratoires.

**Doses.** — 2 dragées au début des 2 repas.

Prix : 15 francs.

Littérature et échantillons sur demande.

**Laboratoires J. PERROCHON**

57, rue Origet — TOURS.

## PULMOGYL

**Composition.** — Comprimés dragéifiés constitués par l'association de l'Aconit, la Codéine, le Benzoate de soude et le Thiocol.

Chaque comprimé contient :

Poudre d'Aconit.....	0,02
Codéine .....	0,005
Benzoate de soude .....	0,15
Thiocol .....	0,30
Sucre et gomme, q. s. pour.....	0,75

**Indications.** — Spécifique des toux spasmodiques; Asthme, Emphysème, Grippe et toutes affections des voies respiratoires.

**Doses.** — *Adultes* : 5 comprimés par jour, 7 à 8 dans les toux rebelles.

*Enfants* : A partir de 8 à 10 ans, 3 à 5 par 24 heures.

Prix : 10 francs.

**Laboratoire J. DELORME**

33, rue Lauriston — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
Téléphone : Passy 14-86 R. C. Seine 4358.

## PULMOSERUM

**Forme.** — Solution.

**Composition.** — Infusion de Pulmonaire. — Infusion de Carragahen. — Phospho-Gaïacolate de Codéine. — Acide phosphorique.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Antibacillaire. — Réminéralisant. — Histogénique. — Hyperphagocytaire. — Anticonsomptif.

**Indications.** — Grippe. — Toux catarrhale. Laryngites. — Bronchites. — Congestions pulmonaires. — Séquelles de Coqueluche et de Rougeole. — Bacillose.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à soupe, matin et soir, ou au milieu des repas, dans un peu d'eau.

Le flacon : 14 fr. (en France).

**Laboratoires A. BAILLY et C<sup>ie</sup>**

15 et 17, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## PULSAMONE

Phytothérapie antispasmodique.

Médication exclusivement végétale associant pour la première fois la **Pulsatille** (*Anemone Pulsatilla*), excellent modérateur de l'excitabilité nerveuse et douloureuse, à trois autres plantes également douées de propriétés antinerveuses : **gui**, **saule blanc** (châtons) et **passiflore**.

C'est donc le prototype de l'*anti-spasmodique végétal*, sans stupéfiant, ni toxique dont l'action n'est jamais suivie de dépression.

La **Pulsamone** ne comporte pas de contre-indication et n'offre aucun danger d'accoutumance. C'est pourquoi elle peut être conseillée aux moins résistants : vieillards, enfants, etc., ainsi qu'aux malades particulièrement susceptibles : cardiaques, hépatiques, etc.

**Indications.** — Véritable médication équilibrante du système nerveux, la **Pulsamone** sera prescrite dans : Neurasthénie, Irritabilité, Angoisse, Anxiété, Psychonévroses, Insomnies, Troubles nerveux de la menstruation et de la ménopause, Troubles cardiaques d'origine nerveuse, Insomnie des biliaires, Excitation nerveuse des hépatiques, Aérophagie.

**Posologie.** — Une à deux cuillerées à café, dans un peu d'eau, avant chaque repas ; et, dans les *insomnies*, deux à trois cuillerées à café, dans une infusion chaude, au coucher.

**Laboratoires de la PULSAMONE**

6, rue Dombasle — PARIS (XV<sup>e</sup>).



## PULVÉOL

(Poudre et pastilles.)

réalisant l'antisepsie du carrefour aéro-digestif.

Antiseptique volatil, dénué de causticité, à base de menthol, eucalyptol, terpinol, essences volatiles, acide borique et borate de soude.

**Indications.** — *Oto-rhino-laryngologie et stomatologie courantes.* —

Sinusites, rhinites, pharyngites, trachéites, affections du *cavum*, angines, stomatites, gingivites. Calme toutes les dysphagies.

**Affections respiratoires.** — Trachéo-bronchites, gripes à forme respiratoire, asthme, coqueluche.

**Hygiène du nez, de la gorge, et de la bouche dans les pyrexies : dentifrice** en nature sur la brosse à dents dans les traitements spécifiques *mercuriels* ou *bismuthiques*.

Usage hygiénique : tous professionnels de la voix

**Mode d'emploi.** — *Poudre* : inhalation avec une cuiller à café de poudre dissoute dans un bol d'eau bouillante.

Les éléments volatils disparus, il reste une excellente solution tiède, antiseptique et isotonique pour gargarismes, bains de gorge ou lavages de bouche.

**Pastilles.** — 8 à 10 par jour.

Prix : Poudre : 12 fr.

— Pastilles : 4 fr. 75.

Laboratoire du PULVEOL

10, impasse Milord — PARIS XVIII<sup>e</sup>.

Teleph. : Marcadet 37-98.

## PURGANOL DAGUIN

(C<sup>20</sup>H<sup>2</sup>·O<sup>1</sup>)

**Forme.** — Pastilles laxatives, à la menthe, dosées chacune à 0 gr. 20 de médicament actif. Bien préférable à la forme comprimés qui se désagrègent mal.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 1/2 à une pastille le soir, au coucher.

*Enfants* : 1/4 à 1/2 selon l'âge. Sucrer lentement et boire ensuite.

Ne donne pas de coliques, ne congestionne pas les organes du petit bassin, ce qui permet aux femmes enceintes d'en faire usage, Laxatif préféré des nourrices.

*Echantillons sur demande aux*

**Etablissements DAGUIN**

SAINT-MAUR (Seine).

## PURGOS

Eau Minérale Purgative, Sulfatée sodique et magnésienne. Contient tous les principes de l'Eau Minérale Naturelle de Vichy alliés aux Sels purgatifs  $MgO$  —  $NaO$  60 grammes de Sulfates par bouteille 1/2 litre.

*Dose purgative* : 1 à 2 grands verres.

*Dose laxative* : 1 verre à bordeaux le matin à jeun.

Dans le cours des voyages, dans les localités où l'Eau de Purgos viendrait à manquer, on peut lui substituer les

### COMPRIMÉS PURGOS

qui, dissous dans une Eau Minérale de Vichy, offrent, sous une présentation pratique, toutes les qualités de l'Eau Purgative.

*Dose purgative* : 4 à 6 comprimés.

*Dose laxative* : 2 à 3 comprimés.

Le matin à jeun.

En tube de : 24 comprimés.

Prix spéciaux pour le Corps Médical.

**Société PURGOS**

**Administration :**

11, rue Joseph-Bara — PARIS.

**Exploitation :**

111, rue du Maréchal-Pétain — VICHY (Allier).

## PYO-AMPHOGEL RONCHÈSE

Gelée molle à l'*Ampho-vaccin* pansement antipyogène.

**Composition.** — Le *Pyo-amphogel* n'est pas une pommade ni un pansement gélosé. C'est une gelée molle, non grasse, contenant une très forte proportion (75 p. 100) de bouillon-vaccin polyvalent, antipyogène (*staphylocoques*, *streptocoques*, *b. coli*, *entérocoques*, *B. pyocyaniques*).

**Avantages.** — Ne nécessite pas de fusion préalable. Eminemment absorbable par la peau. Favorise la cicatrisation. Son emploi n'offre aucun danger, il n'a aucune contre-indication.

**Indications.** — Abscès, Furoncles, Anthrax, Acné, Impétigo, Intra-trigo, Eczémas suintants, Ulcères, Sycosis, Mastites, Orgelets, Plaies infectées, Brûlures, etc...

**Mode d'emploi.** — Déposer la gelée sur la région à traiter en se servant d'un coton ou d'une gaze stérile qui sera laissée si un pansement à demeure est possible. Dans le cas contraire, la gelée adhère suffisamment par elle-même.

Prix 15 francs.

**Laboratoires des AMPHO-VACCINS.**

**A. D. RONCHÈSE**, docteur en pharmacie, 6, rue Rothschild — NICE.

## PYOFORMINE

Ampoules de 2 cc.

Pus aseptique obtenu par ponction de l'abcès térébenthiné du cheval en suspension dans une solution physiologique d'*Uroformine Gobey*.

**Dose et mode d'emploi.** — 2 à 3 amp. p. jour en injection sous-cutanée intramusculaire ou intra-veineuse dans les cas graves.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication héroïque des infections, toutes les pyrexies, toutes les septicémies. Remplace l'abcès de fixation.

**Indications.** — Méningites aiguës et encéphalites, pneumonies et complications, typhoïde, paratyphoïde et infections colibacillaires, pyélites, pyélonéphrites, cholécystites aiguës, états puerpéraux, péritonites aiguës, états septicémiques, grippe et complications.

Prix au public :

La boîte de 4 ampoules : 20 francs.

**Laboratoires GOBEY**

89, rue du Cherche-Midi — PARIS.

## PYRATONE

*(Guérison rapide de la Coqueluche  
et du Rhume des foins.)*

Composé de métaux colloïdaux, possède des propriétés antimicrobiennes et électro-chimiques puissantes.

**Forme.** — Comprimés.

**Propriétés thérapeutiques et indications.** — Coqueluche et toutes les séquelles bronchiques et pulmonaires de nature infectieuse. Convalescences. Anémies, Guérison radicale du *Rhume des Foins*.

**Mode d'emploi.** — Aux enfants de tout âge, un comprimé ou 1/2 comprimé de deux heures en deux heures dissous dans un peu d'eau ordinaire ou sucrée. La toux cède généralement le 2<sup>e</sup> jour du traitement. Dans les infections graves, fièvres violentes, on peut augmenter le nombre des doses, **sauf en cas d'entérite.**

Littérature et échantillons sur demande.

Prix : 15 fr., franco, le tube de 50 comprimés.

**Pharmacie SAINT-MICHEL**

A. Ferré, 71, boulevard St-Michel — PARIS (V°).

Tél. : Gobelins 14-26 — Cte Ch. postal : PARIS 290-10.

## PYRÉLAINE COLLAS

**Composition.** — Fixation à chaud du soufre sur les acides gras non saturés d'une huile végétale.

Chaque cc. contient 0 gr. 04 de soufre organique *combine non oxydé* doué de son pouvoir catalytique. Excipient balsamique.

**Propriétés.** — Permet d'administrer du soufre actif par voie digestive. Contrairement aux formes habituelles du soufre « per os », la Pyrélaïne n'est pas oxydée dans l'estomac et possède une action nette.

**Indications.** — Toutes celles du soufre. *Carences sulfurées*. Résultation thérapeutique. Toutes affections tributaires de la Diathèse lithiasique, notamment *Lithiase biliaire*, Cholecystite, Rhumatisme chronique, Goutte, Dermopathies, Parasites intestinaux.

Pas de contre-indications.

**Forme et posologie.** — Capsules gélatineuses dosées à 0 gr. 25 (Soufre : 0 gr. 01 par capsule). Affections chroniques et doses d'entretien : 2 à 3 capsules par jour avant les repas, dans une gorgée d'eau.

Crises aiguës : 3 à 6 capsules par jour.

*Enfants* : moitié de ces doses.

Le tube de 50 capsules : Prix au public : 10 fr.

**Société des Produits COLLAS et BOUDAULT**

MOUGNAUD et C<sup>ie</sup>, pharmaciens

15, 17, 19, rue Augustin-Thierry — PARIS (XIX<sup>e</sup>).

Tél. : Nord 28-65.

## PYRÉTHANE

Antinévralgique puissant.

Forme liquide ; Gouttes ; Ampoules.

**Composition.** — Diméthylaminopyrazoline phenazone carbamate d'éthyle (uréthane.)

**Emploi et doses.** — Doit se prendre dilué en eau bicarbonatée sodique (Vichy, Vals ou eau ordinaire ou sucrée, 60 cc. avec 0,30-0,50 de bicarbonate.

**Gouttes.** — *Adultes* : XXV-L à répéter à intervalles de 20 minutes. Chercher la dose-levier et passer aux doses massives LXXX-C, si nécessaire. Maximum : CCC *pro die*.

*Enfants* : I à II gouttes par année d'âge.

**Indications antithermiques** : Donner à doses réfractées.

**Ampoules A.** — 2 cc. antithermiques : 1 à 2 ampoules avec ou sans médication intercalaire.

**Ampoules B.** — 5 cc. antinévralgiques. Grandes névralgies, tabes, névrites, sciatiques : 1 à 2 par jour, avec ou sans médication intercalaire intensive. Maximum : CC gouttes.

**Injectons intramusculaires.**

**Indications.** — Migraines, Céphalalgies, Névralgies essentielles, intercostales, faciales, oculaire ; (XXV-L à répéter), chercher la dose-leviers, Dysménorrhées (XXV-L) ; Arthrites, Lumbagos, Sciatiques, Radiculites, Polynévrites, Syringomyélie (doses variables) ; Algies syphilitiques Tabes, Cancer (LX-LXXX-C gouttes, *permettent de garder en main médicale l'emploi de la morphine, de la diminuer ou de l'espace*) ; Rhumatisme chronique et séquelles rhumatismales (XXV-L, 2 fois par jour) ; phénomènes douloureux, inflammatoires et traumatiques ; Pansements douloureux (Post-opératoire en petite chirurgie). — Echantillons et Littérature.

**Gouttes** ; 18 fr. — **Ampoules A-B** : 16 francs.

Dépôt à Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**

61, boulevard Malesherbes — PARIS.

**Laboratoires CAMUSET**

18, rue Ernest-Rousselle — PARIS.

## PYRI-PYRIDIUM

(Phenyl-azo- $\alpha$ - $\alpha'$ -diamino-pyridine hydrochlorique.)

Un corps chimique *nouveau* pour la désinfection génito-urinaire par voie buccale; rend antiseptiques les *urines même alcalines*, pénètre et se fixe dans l'épithélium de l'*appareil génito-urinaire*; possède une remarquable *action analgésique*; a été adopté aux Etats-Unis par le *Congrès des Médecins*.

**Indications.** — Pyelites, Pyélonéphrites, Cystites, Urétrites, puissant adjuvant du traitement local de la blennorragie.

*Divisions et prix :*

Tubes de 12 comprimés à 0 gr. 10. ....	21 fr.
Flacon de 25 comprimés à 0 gr. 10. ....	43 fr.
Flacon de 100 comprimés à 0 gr. 10. ....	162 fr. 50

**Laboratoires SERVIER**

25, rue Eugène-Vignat — ORLÉANS.

## PYROLÉOL EDET

**Composition.** — Principes actifs de plantes non toxiques à saturation (mélilot, mille-pertuis, eucalyptus, etc.) solution huileuse.

**Propriétés.** — Neutre et aseptique, non toxique, analgésique et antiseptique, stimulant, tonique et cicatrisant.

**Indications.** — Brûlures, plaies atones, dermites, radiodermites, ulcères variqueux, engelures, escarres, eczéma, zona.

**Présentation.** — En flacons : 1/4, 1/2, entier.

**Mode d'emploi.** — Laver à l'eau bouillie et à l'eau oxygénée. Appliquer compresses stérilisées imbibées de *Pyroléol*. Renouveler après 24 ou 48 heures.

**Résultats.** — Disparition de la douleur, suppression de suppuration fétide. Production rapide de cicatrices vascularisées lisses, souples, non adhérentes.

Prix au public : 13, 20 et 35 fr.

**Pharmacie Centrale de France**

21, rue des Nonnains-d'Hyères — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## QUASSIA-KINA RABOT

Aux écorces d'oranges amères.

**Propriétés thérapeutiques.** — Reconstituant énergétique. Le meilleur stimulant de l'appétit. Très bien toléré par les estomacs les plus délicats.

**Indications.** — Asthénie, Vertiges stomacaux, Inappétence, Débilité, Convalescences.

**Formes pharmaceutiques et mode d'emploi.**

**VIN :** Un verre à madère aux 2 principaux repas. Véhicule idéal de la médication iodée, même intensive. — Prix : 25 fr.

**DRAGÉES :** Recommandé aux malades, auxquels le vin est contre-indiqué. *Adultes :* 3 à 6 par jour, 1/4 d'heure avant les repas. *Enfants :* 1/2 dose. — Prix : 12 fr. 50.

**GRANULE :** Convient particulièrement aux enfants. *Adultes :* 1 cuillerée à café aux repas. *Enfants :* 1/2 dose. Prix : 12 fr. 50.

**Les Établissements C. DAVID-RABOT**

**C. DAVID & ses Fils, pharmaciens**

49, rue de Bitché — COURBEVOIE (Seine).

## QUASSINE HOUDÉ

Granulés titrés à 1 milligramme.

### Quassine Houdé

Principe actif *cristallisé* du quassia amara.

#### Propriétés thérapeutiques :

Amer, excitant énergétique de l'appétit, prescrit dans dyspepsies atoniques, embarras gastrique, contre les borborygmes, l'inappétence, etc.

#### Doses et mode d'emploi :

4 à 6 granules par jour, pris 5 ou 10 minutes avant les repas.

**Laboratoires HOUDÉ**

9, rue Dieu — PARIS.

## QUERGÉMOL

**Forme.** — Dragées.

**Composition.** — Extrait Cérébrique. Extrait Splénique, bromhydrate de Quinine, Méthylarsinate disodique, Nucléinate de Manganèse.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Reconstituant opothérapique du cerveau et de la rate, Antitoxique, Antihémolytique, Régénérateur des globules sanguins, antiasthénique.

**Indications.** — Paludisme chronique. — Anémie palustre, — Fièvres intermittentes, Asthénie post-grippale.

**Mode d'emploi.** — Deux à six dragées par jour, au début des repas.

L'étui : 20 fr. (en France).

**Laboratoires A. BAILLY et C<sup>ie</sup>**  
15 et 17, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## QUINA BARON

à l'extrait sec complet de quina.

Solution sans alcool, correspondant à 0 gr. 50 d'extrait par cuillerée à soupe.

**Mode d'emploi :**

Deux à trois cuillerées à soupe par jour, avant chaque repas.

**Propriétés :**

Anémiés, convalescents, tuberculeux, opérés, femmes enceintes, nourrices et dans tous les cas où l'organisme doit être tonifié.

**P. FOURNIE**

pharmacien de 1<sup>re</sup> classe

3, place de la Miséricorde — LYON.



## QUINARSOL ANTIANÉMIQUE

Extrait de quinquina Grandval  
associé aux Strychno-Phospharsinates.

### Propriétés thérapeutiques :

Tonique. — Stimulant général. — Apéritif.

### Composition. — Chaque comprimé contient :

Quinquina Grandval.....	0 gr. 30
Glycérophosphates composés.....	0 gr. 30
Strychnine combinée.....	1 mgr. 60
Arsenic combiné .....	0 mgr. 18

**Indications.** — Anémie, Surmenage intellectuel et physique, Faiblesse générale, toutes convalescences, Grippe. — Diabète et ses complications, Séquelles du Paludisme.

*Permet l'absorption facile du Quinquina et de la Strychnine.*

### Dose :

2 comprimés avant chacun des deux principaux repas.

La boîte de 32 comprimés : 12 fr.

(Toutes pharmacies.)

**Laboratoires GRANDVAL**

12 et 14, rue Féry — REIMS.

## QUINARSOL FÉBRIFUGE

Extrait de quinquina à haut titre alcaloïdique  
avec fer et arsenic assimilable.

### Composition. — Chaque comprimé contient :

Quinquina Grandval (à haut titre)..	0 gr. 60
Fer combiné .....	0 gr. 015
Arsenic combiné .....	0 mgr. 90

### Propriétés thérapeutiques :

**Antipaludique.** — Permet, suivant la dose, soit de juguler l'accès, soit de combattre l'état chronique et de faciliter la résistance de l'organisme. — Régénérateur du Globule et des Eléments protoplasmiques.

### Indications :

Paludisme et ses conséquences, Fièvre de Malte, Affections produites par le séjour dans les pays chauds.

### Dose :

Pendant la crise, 4 à 8 comprimés par jour, suivant la violence de l'accès. — **Etat chronique**, 4 comprimés par jour.

La boîte de 30 comprimés : 14 fr. (toutes pharmacies).

**LABORATOIRES GRANDVAL**

12 et 14, rue Féry — REIMS.

# QUINBY ET QUINBY SOLUBLE

(Quinio-bismuth. Formule AUBRY.)

Adoptés par les hôpitaux de Paris, les ministères de l'Hygiène et des Colonies.

Produits originaux à base d'iodo-bismuthate de quinine chimiquement pur :

- a) En suspension huileuse 10 p. 100 (*Quinby*).
- b) En solution aqueuse incolore (*Quinby soluble*).

## Propriétés thérapeutiques :

Spécifique le plus puissant de la syphilis à toutes ses périodes et sous toutes ses formes. Injections intramusculaires, indolores. Pas de stomatite, pas d'abcès ni indurations, aucune toxicité.

## Présentation :

### *Quinby.*

- 1° Amp. normales de 3 cc. correspondant à 0 gr. 075 de bi-métal (boîtes de 12 et 6 amp.).
- 2° Amp. double dose (étiq. bleue) de 3 cc. correspondant à 0 gr. 15 bi-métal (boîtes de 12 et 6 amp.).
- 3° Amp. infantiles de 1,5 cc., correspondant à 0 gr. 0375 de bi-métal (boîtes de 12 amp. seulement).

### *Quinby soluble.*

Amp. de 5 cc. correspondant à 0 gr. 05 de bi-métal (pour adultes, et par boîtes de 6 amp. seulement).

## Posologie :

*Adultes* : 12 inj. de 3 cc. (*Quinby*) ou 18 inj. de 5 cc. (*Quinby soluble*) (2 inj. par semaine).

*Enfants* : 12 inj. de 2/10<sup>e</sup> de cc. (*Quinby*) par année d'âge (2 inj. par semaine).

N. B. : Les ampoules *Quinby soluble* sont plus spécialement réservées au traitement d'attaque de la syphilis ou de ses manifestations morbides, les ampoules *Quinby*, étiq. bleue, lorsque l'on désire faire des piqûres moins fréquentes.

Toutes ces ampoules peuvent être livrées directement, en vrac, par boîtes de 25, 50, 100, à des prix très avantageux à MM. les docteurs qui en font la demande directe au Laboratoire.

## Prix au public :

*Quinby* (normale ou étiq. bleue), la boîte de 12 ampoules : 36 francs. — La boîte de 6 : 20 francs.

*Quinby* infantile, la boîte de 12 ampoules : 25 francs.

*Quinby soluble*, la boîte de 6 ampoules : 20 francs.

## Laboratoires P. AUBRY

54, rue de la Bienfaisance — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

Tél. : Laborde 15-26.

BELGIQUE : Agent général : Ch. SCHÖFFER

34, rue du Canada — BRUXELLES.

En Belgique, ces produits peuvent être prescrits aux frais de l'Etat par MM. les médecins autorisés.

## QUINÉINE

Extrait intégral des principes actifs  
du quinquina.

Préparation concentrée, de titrage fixe, très active, faite avec des écorces choisies de même origine, concassées de la même façon, etc. XL gouttes deux fois par jour comme tonique. Dose fébrifuge : par 1/2 cuillerée à café. En solution non alcoolique.

**Indications.** — Paludisme, grippez, asthénie, convalescences, anémies.

Prix au public : 15 francs.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

**Laboratoire des Produits Scientia**

D<sup>r</sup> E. PERRAUDIN, pharmacien,  
21, rue Chaptal — PARIS.

---

## QUINICARDINE

**Forme.** — Comprimés glutinisés de sulfate de quinidine pur à 0 gr. 20.

**Indications.** — Arythmies ; fibrillation auriculaire ; tachycardies.

**Doses.** — Tâter la susceptibilité du malade par 1 ou 2 comprimés, puis augmenter progressivement la dose journalière à 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 comprimés par doses fractionnées de 1 à 2 comprimés à la fois.

**LABORATOIRE NATIVELLE**

27, rue de la Procession — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## QUINIMUTHOL SACA

**Composition.** — Iodobismuthate de quinine en suspension dans l'huile d'olive pure.

**Forme.** — Ampoules de 3 cc. renfermant 0 gr. 30 d'iodo-bismuthate de quinine (= 0 gr. 071 de bi-métal actif).

**Indications.** — Syphilis à toutes les périodes.

**Mode d'emploi.** — Une ampoule tous les 2 ou 3 jours en injection intramusculaire.

Prix de la boîte de 12 ampoules : 18 francs.

**Usines Chimiques des Laboratoires Français**  
89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

Dépositaire :

**Laboratoire et Pharmacie A. MILLET**  
5, rue Ambroise-Thomas — PARIS (IX<sup>e</sup>).  
Tél. : Provence 58-43.

## QUINIO-STOVAROL

Oxyacétylaminophénylarsinate de Quinine. Combinaison chimique définie, renfermant des proportions égales de Quinine et de Stovarsol ; le pouvoir curatif des composants est exalté par cette association.

*Indications :*

**Paludisme** (prophylaxie et traitement).

*Posologie et mode d'emploi :*

**Traitement curatif :** 4 comprimés à 0 gr. 25 par 24 heures (série de 10 jours).

**Prophylaxie :** 1 comprimé le matin à jeun (repos de 4 jours tous les 10 jours).

**Société Parisienne d'Expansion Chimique**  
« SPÉCIA »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## QUINOBROME

Dragées A et B.

Traitement rationnel du Paludisme

Chaque dragée contient :

	A	B
Bromhydr. de Quin. (Codex 1908)...	0 gr. 10	0 gr. 25
Méthylarsinate de Soude.....	àà	àà
Poudre de Noix vomique.....	0 gr. 01	0 gr. 02
Oxalate de fer.....	àà	àà
Extrait mou de Quinquina.....	0 gr. 05	0 gr. 10
Traitement préventif et d'entretien. Traitement rationnel basé sur l'emploi conjugué de la Quinine et de l'Arsenic. Tolérance parfaite. Action rapide et constante. Evite l'accoutumance à la Quinine.		

**Doses.** — 4 à 6 dragées par jour.

Dépôt général pour la France :

**Pharmacie Centrale de France.**

21, rue des Nonnains-d'Hyères — PARIS (IV°).

## QUINOFORME LACROIX

**Composition.** — Formiate basique de quinine découvert par H. Lacroix, inscrit au Codex (1925).

**Avantages.** — Le plus soluble et le plus actif des sels de quinine.

Le plus riche en quinine (87,56 p. 100 de sels basique ou neutre).

Injection indolore, n'occasionnant jamais d'abcès.

**Indications.** — Paludisme, Fièvres malariques, Fièvres intermittentes.

**Formes pharmaceutiques :**

Ampoules : 6 à 12 ampoules de 0,25, 0,50, 0,75, 1 gr., 1,25 et 1,50.

Cachets : 6 et 12 cachets de 0,25 et 0,50.

Comprimés : 10 et 20 comprimés de 0,10 à 0,50.

Pilules à 0,10.

**Laboratoires H. LACROIX**

V. Merobian et fils, successeurs.

37, rue Pajol — PARIS (XVIII°).

## QUINOÏDINE DURIEZ

(Alcaloïde de Sertuerner).

Dérivé du quinquina.

10 cgr. Quinoïdine pure par pilule.

Antiseptique du sang, tonique général et toni-cardiaque, antinévralgique.

GRIPPE, *Paludisme* et leurs séquelles : Prévention et traitement. Névralgies, surtout d'origine grippale ou palustre. Petites défaillances, nervosité ou irrégularités du cœur, avec ou sans lésions.

Aucun des inconvénients de la quinine, même après usage prolongé (Voir *Bull. Académie de médecine* : Communication du D<sup>r</sup> Burdel ; communications des D<sup>rs</sup> Le Moine, Dardenne, Dujardin-Beau-metz, etc.).

2 à 8 pilules par jour, au début des repas, pendant plusieurs semaines au besoin.

**DURIEZ**

20, place des Vosges — PARIS.

---

## QUINO-THORIUM

Préparation radio-active de chloroformiate de Quinine et de bromure de Mésothorium.

### Indications.

Paludisme et indications thérapeutiques de la quinine.

### Formes.

1° Ampoules à 25-50 centigrammes et 1 gr. pour injections intramusculaires profondes.

2° Dragées dosées à 25 centigrammes.

**Posologie.** — Habituelle de la quinine.

					Prix vente au public.	Prix médi- cal.
Boîte de	6 amp.	1 cc..	0,25		13,20	8,90
—	12	—	—	—	16,50	11,15
—	6	—	2 cc..	0,50	16,50	11,15
—	12	—	—	—	22 »	14,85
—	6	—	—	1 gr.	22 »	14,85
—	12	—	—	—	33 »	22,30
—	6	—	5 cc..	—	28 »	18,90
Dragées.....					20 »	13,50

**Société Générale  
d'Applications Thérapeutiques  
THERAPLIX**

*Pierre BRETEAU, Pharmacien*  
Membre de l'Académie de Médecine  
157, rue de Sèvres — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## QUINOVARINE OPTIMA

(Sous forme de dragées et sous forme d'ampoules.)

**Composition.** — Chaque dragée ou ampoule correspond à 2 cgr. chlorh. de quinine et 50 cgr. d'ovaire frais.

**Indications.** — Aménorrhée, chloroanémie des jeunes filles, dysménorrhée, règles insuffisantes, troubles psychiques d'origine ovarienne et en général toutes les indications de l'Ovarine.

### Posologie :

**Dragées :** 6 par jour, 2 à la fois 1 heure avant le repas.

**Ampoules :** Série de 10 ampoules en injections intramusculaires, à raison de 2 ou 3 par semaine. Repos de 15 jours, puis nouvelle série avec nouveau repos.

**Laboratoires « OPTIMA » S. A.**

78-80, Grande-Rue-au-Bois — BRUXELLES.

## QUINQUINA GMET

**Composition.** — Extrait *total* obtenu directement et exclusivement à l'aide du quinquina succirubra. Coloration et amertume parfaitement naturelles.

**Propriétés.** — Stimulant apéritif fébrifuge. *Active remarquablement la phagocytose.*

**Indications.** — Anémie, anorexie, grippe, tuberculose, épidémies, paludisme, tous les états fébriles ou non où l'activité leucocytaire doit être stimulée. Aménorrhée.

**Posologie.** — 1 à 3 cuillerées à café dans un peu d'eau ou de vin *immédiatement avant un repas* ou l'absorption d'une tisane, d'un peu de lait, d'un biscuit.

Le grand pouvoir apéritif du Quinquina GMET occasionne (si le malade ne mange pas aussitôt après) la sensation nauséuse consécutive à la faim non apaisée.

**Laboratoire GMET**

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX<sup>e</sup>).



## QUINSAL

l'Éther Salicylique de Quinine et lithine acétylsalicylée en tablettes glutinisées.

### ACTION THÉRAPEUTIQUE POLYVALENTE

**Calmant immédiat de la Douleur** par le groupement acétylsalicylique et la Quinine.

**Antithermique** par la Quinine.

**Diurétique et Uricolytique** par le Sel de Lithine et la Quinine.

**Spécifique antirhumatismal** par les Salicylates. Tolérance parfaite (tablettes glutinisées).

**Indications :** Rhumatismes, Sciatique, Lumbago, Névralgies, Douleurs grip-pales et en général toutes les Algies.

**Posologie.** — *Cas aigus.* — De 7 à 12 tablettes en trois fois par 24 heures, de préférence loin des repas afin que l'action sédative soit plus rapide.

*Cas chroniques.* — Dans l'intervalle des accès : 3 par 24 heures.

*Enfants.* — De 1 à 3 par 24 heures.

Prix de la boîte : 15 francs.

### Laboratoire du QUINSAL

M. LEULIER, docteur en pharmacie  
Membre de la Société de Chimie biologique  
GRAY (Haute-Saône).

Échantillon et Littérature sur demande.

## QUINTHÉRYL

**Composition.** — Ether anesthésique, essence de serpolet, oléo-camphre.

**Applications.** — Traitement *curatif de la coqueluche*, de la trachéite, de la laryngite ; *correctif* de toutes les toux quinteuses émétisantes, de l'asthme et de l'emphysème. Peut être employé dans les affections des voies pulmonaires. Utilisé en chirurgie et en stomatologie avant les opérations.

### Présentation :

1° ampoules de 1cc. (série A) pour les enfants de moins de 2 ans.

2° ampoules de 2 cc. (série B) pour les enfants plus âgés et les adultes.

**Posologie.** — Une injection *intramusculaire* (pratiquement *indolore*), hebdomadaire pour les enfants, tous les quatre jours pour les adultes.

Prix : Série A : 12 fr.

Série B : 15 fr.

DÉPOT GÉNÉRAL,

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS :

**M. LÉONARDON, Docteur en pharmacie.**

Licencié ès sciences. Ancien Élève de l'Institut Pasteur  
ARCACHON (Gironde).

## QUINURYL

Spécifique de l'*Azotémie*, adjuvant du régime hypoazoté. Cachets à base d'acide quinique.

**Indications.** — Symptômes de la petite azotémie. Céphalées, vertiges, éblouissements, bourdonnements d'oreilles, etc...

2 à 4 cachets par jour à prendre avec une infusion de fleurs de sureau ou de feuilles de bouleau.

La boîte : 16 francs.

**Laboratoires LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS (XI<sup>e</sup>).

## RADIOBAUME ADRIAN

Préparation kératoplastique et kératogénique à base de Tannins assimilables, de balsamiques et d'anesthésiques.

Traitement préventif et curatif des accidents *des aux radiations*.

Spécifique des brûlures, des coups de soleil et de toutes lésions ou irritations de la peau.

### ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## RADIOLYSINE

Complexe colloïdal radio-actif  
en solution isotonique injectable.

**Composition.** — Mésothorium, Cu, Mg, Si, Fe, Mn.  
Ph. Ca.

**Propriétés.** — La Radiolysine réalise la chimiothérapie totale du Cancer. Elle permet au médecin d'administrer simultanément à son malade tous les éléments qui ont donné des résultats dans le traitement du cancer.

**Indications.** — Tous les cancers, soit comme médication adjuvante du traitement chirurgical (prévient les récides) ou des traitements radium et radiothérapiques dont elle prolonge l'action. Cancers inopérables.

**Présentation.** — En boîtes unitaires, chaque boîte contenant les 2 ampoules jumelles nécessaires pour une seule injection de 5 cc.

**Mode de prescription.** — Prescrire 10 Radiolysine, pour une série de 10 injections intramusculaires, une tous les 3 jours.

**N.-B.** — Aucune indication ne révèle au malade la nature de l'affection pour laquelle il est traité.

**Pierre ALEXANDRE, Pharmacien**

41, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

Tél. : Laborde 08-00.

## RADIOPAQUE HEUDEBERT

**Composition.** — Le RADIOPAQUE Heudebert est un repas d'épreuve pour examen radiologique du tube digestif ; son opacité est obtenue par le sulfate de baryum gélatineux en suspension dans un support alimentaire composé d'hydrates de carbone, de graisses et de matières azotées représentant une valeur nutritive de 750 calories pour la dose de l'examen.

**Avantages.** — En raison de sa réelle valeur alimentaire, le RADIOPAQUE ne modifie en rien le rythme des contractions et permet l'examen du tube digestif dans son état de fonctionnement normal ; de plus, son goût très agréable de crème au chocolat le fait accepter sans répulsion par les malades les plus difficiles.

**Présentation.** — Il est présenté en flacons de 400 cc. pour examens complets et en 1/2 flacons pour examens partiels et examens des enfants. Il est prêt à l'emploi sans aucune préparation supplémentaire et son bouchage dans le vide suivi de 2 stérilisations lui assure une conservation indéfinie.

**Produits de Régime HEUDEBERT**

85, rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine).  
2 et 4, chemin Feuillat — LYON.

## RADIOTÉTRENE GÉRARD

**Composition.** — Tétra-iodo-phénol-phtaléine disodique.

**Mode d'action.** — Opacifie la vésicule biliaire aux rayons X.

**Avantages.** — Stable, de composition constante, non toxique.

1° *Forme dragées* : grâce à son enrobage spécial, la dissolution intestinale et la visibilité vésiculaire sont assurées.

2° *Forme colloïdale* : préparation liquide faite pour les malades ne pouvant absorber les dragées.

**Indications.** — Examens radiologiques de la vésicule biliaire.

**Forme et mode d'emploi :**

1° *Dragées* : 15 à 20 au cours du repas. Visibilité maximale entre la 14<sup>e</sup> et la 18<sup>e</sup> heure.

2° *Forme colloïdale* : mélanger le contenu des deux flacons, immédiatement avant l'absorption. Absorber la totalité du liquide (environ 60 cc.).

Prix au public : 25 francs.

**Laboratoires du Docteur LAURENT-GERARD**

Docteur ès sciences.

Ancien chef de Laboratoire

à la Faculté de Médecine de Paris

40, rue de Bellechasse — PARIS (VII<sup>e</sup>).

## RADIOTROPINE

Complexe à radioactivité stabilisée.

Association des deux plus puissants antiseptiques internes et les deux meilleurs dissolvants de l'acide urique et des urates : **Bromure de Radium** et **Urotropine**.

**Forme.** — Granulé effervescent chimiquement pur, rigoureusement dosé et **immédiatement soluble**.

**Indications.** — **Toute la Diathèse arthritique** (goutte, rhumatisme, gravelle, etc.), les **affections vésico-rénales** (néphrites, pyélo-néphrites, cystites, etc.), **affections biliaires** (cholécystites aiguës, angiocholites, ictères), et **tous les états infectieux** où la formine est indiquée (grippe, etc.).

**Posologie.** — 2 à 6 cuillerées à café par jour ; au commencement des repas, dans un demi-verre d'eau. Une cuillerée correspond à 0 gr. 25 d'hexaméthylènetétramine.

**Établissements LABORADIUM**

33, rue Saint-Jacques — PARIS.

---

## RÉALPHÈNE BUISSON

Ether phosphorique du glucose  
et Stovarsol calcique.

Augmentation rapide et durable  
de l'appétit, du poids et des forces.

### Indications :

Asthénie, Anorexie, Amaigrissement, Convalescences, Anémies, Surmenage, Entérites chroniques, Troubles généraux de la nutrition.

### Formes :

1° Comprimés ; 2° cachets ; 3° granulé ; 4° élixir.

### Posologie :

*Adultes. Comprimés et cachets* (10 centigr. de Stovarsol calcique et 2 centigr. d'éther phosphorique du glucose par comprimé ou cachet) : 1 à 2 par jour, pendant 6 jours.

*Granulé* : (5 centigr. de Stovarsol calcique et 2 centigr. d'éther phosphorique du glucose par mesure), 2 à 4 mesures par jour, pendant 6 jours et repos d'une semaine.

*Elixir* (5 centigr. de Stovarsol sodique et 2 centigr. d'éther phosphorique du glucose par cuillerée à potage) : 2 à 4 cuillerées à potage, par jour, pendant 6 jours.

*Enfants* : Jusqu'à 12 ans. *Granulé* : 1 à 2 mesures par jour pendant 6 jours et repos d'une semaine.

*Nourrissons. Granulé* : 1 à 3 demi-mesures par jour pendant 4 jours et 4 jours de repos (1 centigr. 1/2 à 2 centigr. de Stovarsol calcique par kilogr. de poids et par jour).

Prix de vente au public : 20 francs.

Prix médical : 12 fr. 60

(sous quelque forme que ce soit.)

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

*Pierre BRETEAU, Pharmacien*  
Membre de l'Académie de Médecine  
157, rue de Sèvres — PARIS (XV°).

## RÉARGON

Nouvel agent chimique antigonococcique.

### Composition :

Albuminate d'argent spécial et glucosides anthraquinoniques combinés.

### Propriétés :

Pénétration profonde des muqueuses.

Haut pouvoir bactéricide.

Action analgésique remarquable.

Tolérance parfaite.

### Usage :

En injections, lavages, instillations avec solution à 5 de Réargon pour 100 eau distillée.

### Doses :

Urétrites aiguës : par jour 3 ou 4 injections de 10 minutes.

Traitement abortif : 8 injections en 24 heures.

### Laboratoires NORGAN

Pierre ALEXANDRE, pharmacien,  
41, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

Tél. : Laborde 08-00.

---

## RECONSTITUANT MARY

**Propriétés thérapeutiques.** — Tonique de premier ordre ; grande richesse thérapeutique.

**Quina.** — Coca, kola, gentiane, quassia, cacao, noix vomique, fer organique et phosphates.

Traitement curatif des anémies, lymphatisme, anorexie, convalescences.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 verres à madère au milieu du repas. Demi-dose pour enfants.

**Laboratoire  
du reconstituant MARY**

32, rue de l'Ouest — PARIS.

P. TAVERNIER, Docteur en pharmacie.

## RECTAGINE

(Suppositoires radifères).

**Composition.** — Organate d'argent à 17 p. 100 d'argent pur, Hydrargyre, sulfo-oléo sulfonate de sodium camphré, et bromure de radium.

**Indications.** — 1° *Chez l'homme* : Agit sur les complications de la blennorrhagie, sur l'urètre, les testicules, les vésicules séminales, la prostate, etc.

2° *Chez la femme* : Action complémentaire des crayons Leucagine dans le traitement des métrites à tous stades ; médication de tous les états congestifs ou infectieux de l'utérus, des trompes et des ovaires.

3° *Cas particuliers* : Action résolutive très nette sur : le prurit anal, les érosions de l'anus, les hémorroïdes internes et les oxyures.

**Posologie.** — Introduire un suppositoire au moment du coucher, pendant 10 jours consécutifs, ou tous les 2 jours suivant le cas.

La boîte de 10 suppositoires : 15 fr.

Laboratoires pharmaceutiques

L.-G. TORAUDE, O. \*, O. I. ☉.

Docteur en pharmacie. Lauréat de l'Institut  
et de l'Académie de Médecine.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

## RECTOLINE

Pommade lanolinée à base d'Œsculine adrénalinée et d'Ortho-cocaïne, livrée en tube avec canule spéciale.

Pansement hémorroïdicure parfait.

**Prop. thér.** — Action calmante, décongestionnante, hémostatique et directement curatrice. Absorption facile, inodore, incolore. Application méthodique *loco dolenti* et toujours aseptique.

Prix : 14 francs complète.

Tube de rechange : 12 francs.

Laboratoire de la Varilaxine

164, rue Saint-Honoré — PARIS.



## RECTOPANBILINE

**Formes.** — Solution pour lavement et suppositoires.

**Définition.** — Lavement établi d'après les dernières données scientifiques et les travaux du D<sup>r</sup> Bensaude amenant, en quelques minutes, sans réaction nocive, par un mécanisme physiologique, une évacuation complète de tout le gros intestin. — Non irritant, non douloureux, non toxique, non salissant. — Concourt, en outre, à la guérison durable de la *Constipation* en rétablissant la biligenèse normale grâce à sa teneur en *Panbiline*. (Voir *Panbiline*.)

**Composition.** — Est une *Panbiline* avec prédominance d'Extrait de *Bile fraîche* additionnée dans les suppositoires de glycérine solidifiée.

**Indications.** — Toutes les modalités de *Constipation* médicale. En s'opposant à l'*Auto-intoxication intestinale*, supprime ses nombreuses manifestations pathologiques (troubles digestifs, nerveux, nutritifs, cutanés, etc.). Est le meilleur moyen d'entraver le développement de l'*Artériosclérose* dont le point de départ est aujourd'hui rattaché universellement à l'*Auto-intoxication intestinale* (Huchard, Chauffard, etc.). Résout parfaitement le problème posé par Metchnikoff dans ses travaux sur la *vieillesse précoce*.

**Autres indications :** Hémorroïdes, Vers intestinaux, Etats où la défécation doit se faire sans efforts, Hernies, Grossesse, Accouchements.

**Posologie.** — Un ou 2 suppositoires par jour ou 1 à 3 cuillerées à café de solution dans 160 gr. d'eau bouillie chaude à prendre en lavement à garder quelques minutes. — Demi-dose pour les enfants.

**Prix au public :** 12 francs le pot de Rectopanbiline.  
10 francs la boîte de suppositoires.

**Laboratoire de la PANBILINE**  
ANNONAY (Ardèche).

## RÉFISTINE

Extrait de Liane — Réfistine (Strychnos sans Strychnine.)

**Hypotenseur, Régularisateur**  
de la circulation :

Hypertension, Arthritisme, Artério-sclérose,  
Rhumatisme.

Tonique stimulant du système nerveux :  
Surmenage, Impuissance.

**Mode d'emploi.** — 4 à 9 comprimés ou  
pilules par jour avant les repas, suivant  
avis du médecin.

Prix par flacon de 50 comprimés ou de  
50 pilules : 25 francs.

**Laboratoire de la Réfistine**

20, rue du Conseil, 20

BRUXELLES — IXELLES (Belgique).

---

# RÉGYL

## « Régulateur de l'estomac ».

(A base de peroxyde de magnésium hydraté, de fluorure de sodium et de ferments digestifs).

### Présentation :

Sous forme de comprimés pesant chacun 0 gr. 60.

### Propriétés :

Régulateur de l'estomac, gastralgie, dyspepsie, flatulences, fermentation, pesanteur, renvois, crises stomacales tenaces.

### Dose et mode d'emploi :

Un ou même deux comprimés après chaque repas et de préférence dans une infusion. Doubler la dose dans les états aigus.

Prix au public (en cours de variation).

Echantillons et notices sur demande.

---

### Laboratoire du RÉGYL

8, rue Richer — PARIS (IX<sup>e</sup>).

Téléphone : Central 16-85.

## RÉNALEPTINE

Dioxyphényléthanol méthylamine.  
(Adrénaline lévogyre synthétique.)

La Rénaleptine présente toutes les qualités de l'adrénaline naturelle avec l'avantage d'une pureté garantie et d'une constance d'action absolue.

### *Indications :*

**Toutes les affections où l'on recherche des effets vaso-constricteurs.**

**Prévention et traitement des crises nitritoïdes.**

*Posologie et mode d'emploi.* — Solution de Rénaleptine à 1/1000. Doses par 24 heures :

Voie buccale : X à XXX gouttes.

Voie hypodermique : 1/4 de cc. à 1 cc.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## RÉPARATEUR THUAU

(Vin)

Reconnu médicamenteux par la Faculté de Pharmacie de Paris après analyse du Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

**Composition.** — Pour un verre à liqueur :

Extrait hydroalcoolique de Kola stabilisée.... 0 gr. 15

Extrait hydroalcoolique de Coca du Pérou.... 0 gr. 15

Extrait sec de Noix Vomique..... 0 gr. 009

Samos et bouquet oenanthique.

**Mode d'emploi.** — Deux verres à liqueur par jour, après les deux principaux repas.

**Action.** — Tonique reconstituant, stimulant, anti-dépériteur. Médication pour adultes.

**Indications.** — Convalescences, épuisement, surmenage, neurasthénie, faiblesse générale.

**Présentation.** — Vin. Son prix : 15 francs.

**Fabrication.** — Laboratoire du Réparateur THUAU, Angers.

**Vente.** — Dans toutes les bonnes Pharmacies.

**PHARMACIE NOUVELLE**

22, faubourg Saint-Michel — ANGERS (Maine-et-Loire).

Envoi Echantillons et Littérature.

## RESURREX (TABLETTES)

Médication colloïdale *solide* de conservation indéfinie (procédé spécial).

Précieux médicament permettant l'utilisation intégrale de l'action thérapeutique des colloïdes *fraîs*. Les colloïdes solides du *Résurrex* ne sont pas des colloïdes floculés. Ils reprennent, à la dissolution dans les liquides organiques, toutes leurs propriétés colloïdales.

**Composition.** — 1. *Colloïdes stabilisés* : Magnésium, Calcium, Fer, Iode (toujours frais et actifs). — 2. *Médicaments à forme usuelle* : Glycérophosphates de Magnésium, de Calcium, de Fer, Méthylarsinate di-sodique (Arrhénal).

**Propriétés.** — Reconstituant général excellent ; antitoxique de choix. (Action ionique des colloïdes dans l'organisme ; de plus, les médicaments d'accompagnement à forme usuelle ont leur action considérablement renforcée — catalysée — par les colloïdes joints.)

**Indications.** — *Tous états d'affaiblissement organique ou d'intoxication profonds* (anémie, dépression nerveuse, neurasthénie, suites de maladies infectieuses etc.) Le RESURREX est particulièrement indiqué dans les cas de douleurs persistantes (rhumatismes, sciaticques, névralgies), de troubles nerveux (spasmes, tics nerveux) ainsi que dans les affections de l'appareil respiratoire (asthme, emphysème, suites de gaz, etc.)

N. B. Nous tenons à faire remarquer que le Resurrex contient du magnésium sous une forme particulièrement active (magnésium colloïdal). Les tablettes de Resurrex constituent de ce fait un agent extrêmement efficace et commode de traitement magnésien.

**Posologie.** — *Enfants* : de 2 à 13 ans, 1 à 3 tablettes par jour ; 13 ans et au-dessus, 3 à 4 par jour.

*Adultes* : de 4 à 8 par jour. *Vieillards* : de 4 à 6 par jour.

Le Resurrex se suce comme un bonbon (à la rigueur on peut l'avaler comme un comprimé ordinaire) à n'importe quel moment de la journée, mais de préférence après les repas. Lorsque la dose le permet, on peut en sucer plusieurs à la fois.

Echantillons et Littérature sur demande :

Laboratoire du RESURREX

NOLAY (Côte-d'Or).

## RÉSYL

Antiseptique pulmonaire.

**Ether glycéro-gaïacolique soluble.** Non caustique, libère du gaïacol à l'état naissant. Antiseptique pulmonaire et modificateur des sécrétions bronchiques. Sous son influence la bronchorrhée diminue, les bacilles se raréfient, l'état général et les signes stéthoscopiques s'améliorent.

**Indications.** — Tuberculose pulmonaire avec ou sans température. Bronchites et toutes les affections de l'appareil respiratoire en général.

Sirop, Comprimés, Ampoules.

**Doses.** — 2 à 6 cuillerées à café de sirop, 2 à 6 comprimés par 24 heures. Voie hypodermique : une ampoule tous les 2 jours.

Sirop le petit flacon..... 8 fr. 50

— grand — ..... 15 fr. »

Le tube de 20 comprimés..... 7 fr. »

La boîte de 12 ampoules..... 15 fr. »

**Laboratoires O. ROLLAND**

109-113, boulevard de la Part-Dieu — LYON.

---

## RETHRAGINE

Médication bactéricide et radio-active des affections urétrales aiguës et chroniques chez l'homme et chez la femme.

### Nature du produit :

La *Réthragine* est une composition médicamenteuse présentée sous forme de bougies renfermant, en milieu indolore, de l'argent, du cuivre, de l'acide urique et du bromure de radium à l'équilibre radio-actif et répondant à des constantes physiques nettement déterminées.

### Présentation :

Les bougies *Réthragine* sont vendues sous le nom de « Bougies *Réthragine H* » pour les hommes et de « Bougies *Réthragine F* » pour les femmes.

Il existe deux concentrations radifères : 1 et 2 micros (2 micros pour les hommes seulement).

Prescrire : hommes : Bougies *Réthragine H*. à 1 ou 2 micros ; femmes : Bougies *Réthragine F*.

### Mode d'emploi :

En présence d'une urétrite confirmée par l'examen microscopique, commencer les grands lavages urétro-vésicaux au permanganate de potasse, solution à 0,25 p. 1000. Introduire ensuite une bougie et la maintenir en place en recouvrant le méat urinaire d'un tampon de coton stérile et, par-dessus, un préservatif. Il est indispensable que la bougie reste en contact le plus longtemps possible ; aussi faut-il recommander aux malades de n'uriner que cinq heures environ après l'application. Continuer les grands lavages qui seront faits tous les jours, ainsi que les applications de bougies.

### Durée du traitement :

L'application de 8 à 10 bougies est généralement suffisante, même dans les cas d'urétrite les plus rebelles.

### Prix :

La bougie <i>Réthragine H</i> . (1 micro).....	12	»
La boîte de 5 bougies <i>Réthragine H</i> . (1 micro)..	55	»
La bougie <i>Réthragine H</i> . (2 micros).....	15	»
La boîte de 5 bougies <i>Réthragine H</i> . (2 micros).	70	»
La bougie <i>Réthragine F</i> . (1 micro) .....	12	»
La boîte de 5 bougies <i>Réthragine F</i> . (1 micro)..	55	»

### Laboratoires pharmaceutiques : L. G. TORAUDE

Docteur en pharmacie de la Faculté de Paris,  
Lauréat de l'Institut et de l'Académie de médecine,  
Membre de la Société de pharmacie de Paris,  
22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

# RÉVULSIF LIQUIDE BOUDIN

## Propriétés thérapeutiques :

- 1° Il produit en une minute une révulsion intensive ;
- 2° Etant liquide, il peut être appliqué très rapidement sur une très large surface ;
- 3° Après le badigeonnage, le malade ne pouvant l'arracher, est forcé d'en subir les effets ;
- 4° Il ne colore pas et n'abîme pas la peau, peut être renouvelé et appliqué plusieurs fois par jour ;
- 5° absorbé par la peau, il agit efficacement sur les régions profondes qu'il décongestionne très vite ;
- 6° il ne contient aucun produit nuisible pour les reins et se conserve indéfiniment ;
- 7° il n'entre dans sa composition, ni cantharide, ni produit caustique ou acide.

## Indications thérapeutiques :

- 1° Maladies aiguës des voies respiratoires : Rhume, Laryngite, Bronchite, Congestion pulmonaire, Fluxion de poitrine, Pleurésie, Pneumonie, Broncho-Pneumonie ; —
- 2° Maladies chroniques des voies respiratoires : Asthme, Emphysème, Catharrhe, Bronchite chronique, Tuberculose pulmonaire ; —
- 3° Douleurs, Rhumatismes, Névralgies, Torticolis, Lumbago, Points de côté, Rhumatismes aigu et chronique, Arthrites, Névralgies de toutes sortes.

## Mode d'emploi :

- 1° Dans les maladies aiguës ou chroniques des voies respiratoires, badigeonner deux fois par jour avec le pinceau imbibé du Révulsif le dos et la poitrine du malade. Laisser sécher et appliquer flanelle ou ouate ;
- 2° Dans les douleurs, rhumatismes, névralgies, badigeonner deux fois par jour avec le pinceau imbibé du Révulsif toute la région douloureuse ou malade et la recouvrir ensuite de flanelle ou d'ouate. Pour les enfants dont l'épiderme est plus sensible que chez les grandes personnes, on peut additionner le Révulsif d'eau de Cologne ou d'alcool par partie égale.

**Laboratoire BOUDIN**

9, avenue Jean-Jaurès

JOINVILLE-LE-PONT (Seine).



## RÉVULSIF MILKO

### Innovation thérapeutique

**Composition.** — Essences naturelles. Terpènes. Alcool.  
(Ne renferme pas de produits phénoliques, d'essences  
de moutarde ou de capsicum, prurigineux.)

**Présentation.** — 3 concentrations différentes :

N° 1. *Pour bébés* (nourrissons et jeunes enfants) : 5 fr. 50.

N° 2. *Pour enfants* (de 5 à 13 ans environ) : 6 fr. 50.

N° 3. *Pour adultes* : 8 francs.

Le **Révulsif Milko** détermine une vaso-dilatation intense sans provoquer de phlyctènes. Ne *tache ni n'altère les téguments*, d'où répétition à volonté des badigeonnages. Pas d'action lacrymogène, ni sternutatoire. Odeur agréable.

**Action secondaire :** Antisepsie pulmonaire par absorption cutanée des essences et élimination bronchique.

**Indications.** — Rhume, Bronchite, Broncho-pneumonie, Coqueluche, Pleurite, Pleurésie.

**Laboratoire H. CLUZEL**

60, cours Emile-Zola. — LYON-VILLEURBANNE

Médaille d'Or : Strasbourg 1927.

---

## RÉVULSIF PROCIPHA

**Forme.** — Liquide.

**Mode d'emploi.** — Badigeonnage deux fois par jour.

**Composition.** — Mélange d'essences. Terpène, Pinène, Carvacrol, qui irritent légèrement l'épiderme, d'odeur très agréable.

**Indications.** — Maladies des voies respiratoires, affections rhumatismales et névralgies.

Prix : 7 fr.

**Laboratoires FISCH et C<sup>ie</sup>**

4, rue d'Ilzach — MULHOUSE.

Dépôt à Paris : 49, rue de Paradis.

Tél. : Provence 30-32.

## RHAGADINE BRACQUEMOND

**Forme.** — Pommade en tubes.

**Propriétés thérapeutiques.** — La *Rhagadine*, à base d'un mélange de Kératine, d'une innocuité absolue, possède des propriétés durcissantes assez grandes pour raffermir l'épiderme le plus délicat ; mélangée à des corps gras, maintient à l'épiderme toute sa souplesse sans atténuer en rien les propriétés spécifiques de la substance médicamenteuse agissante.

**Indications thérapeutiques.** — Gerçures des seins, Erythèmes des nouveau-nés, Fissures anales chez les hémorroïdaires, Ulcères variqueux, Brûlures, Plaies déchiquetées ou par arrachement.

Echantillons sur demande adressée au :

**Laboratoire BRACQUEMOND**

105, rue de Normandie — COURBEVOIE (Seine).

## RHÉANTINE LUMIÈRE

Vaccinothérapie polyvalente Antigonococcique.

**Constitution.** — Stock vaccin polyvalent, formé de 24 souches différentes de gonocoques, rigoureusement stérilisées et desséchées à froid par des procédés spéciaux, divisées ensuite en sphérules kératinisées.

**Propriétés.** — La RHÉANTINE LUMIÈRE est un vaccin antigonococcique dont l'absorption, par voie buccale, constitue l'originalité propre. Elle est toujours parfaitement tolérée, même par les malades les plus délicats et n'entraîne aucune réaction générale.

**Indications.** — Affections gonococciennes locales et métastatiques chez l'homme et chez la femme. Rhumatisme et arthrite blennorragiques, orchites, cystites, pyélites, épидидymites, ophtalmies, d'origine gonococcique, etc.

Traitement le plus simple, le plus anodin et le plus efficace.

**Dose courante.** — 4 sphérules par jour, 2 le matin et 2 le soir, une heure avant les repas, dans une gorgée d'eau.

**Formuler.** — Boîte de RHÉANTINE LUMIÈRE.

**AUTO-VACCINS.** — Pour provoquer chez les malades atteints de lésions complexes ou spéciales un processus humoral curatif, il faut se rapprocher des groupes infectants et le moyen de beaucoup le plus sûr réside dans l'emploi de vaccins autogènes auto-vaccins, préparés à partir du pus recueilli sur le sujet lui-même.

Les LABORATOIRES LUMIÈRE préparent des vaccins autogènes sur demande spéciale du médecin auquel ils fournissent gratuitement, le cas échéant, le matériel nécessaire pour le prélèvement et l'expédition du pus.

**LABORATOIRES LUMIÈRE.**

23, Cours de la Liberté — LYON.

## RHÉOTHYMINÉ CH. GAUTIER

Acide Thymique purifié et maintenu à l'état pulvérulent par un procédé spécial.

Contre toutes les Helminthiases : Oxyures, Ténias, Ascarides, Trichocéphales, Bothriocéphales, Ankylostomes, Douves, etc.

Constitue un *désinfectant énergique* de l'intestin et un traitement préventif de l'*Appendicite*.

Capsules kératinisées (0,30 pour adultes, 0,15 pour enfants de principe actif). Aucune action sur la muqueuse gastrique.

*Adultes* : 2 à 3 jours consécutifs, 8 capsules le matin à jeun (2 capsules toutes les 1/2 heures). Le dernier jour, 4 heures après la dernière prise, léger purgatif (20 gr. sulfate de soude ou 10 gr. magnésie calcinée).

*Enfants* : Comme précédent, 4 à 10 capsules suivant âge. Réduire le purgatif à 6 à 10 gr. de sulfate de soude ou 3 à 5 gr. de magnésie calcinée. La Rhéothymine, insoluble dans les sucs intestinaux, agit, sans absorption, en surface de l'intestin. Donc abstention d'huile et d'alcool.

Prix au public : *Adultes* : 20 francs.

*Enfants* : 14 francs.

**Laboratoires des Spécialités Pharmaceutiques**  
**CH. GAUTIER.**

S. A. R. L. Capital : 400 000 fr.  
13, rue Dorian — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## RHINADROL

(Baume nasal).

**Forme pharmaceutique et composition.** — Vaseline semi-liquide, avec Camphre, traces de Menthol, baume du Pérou, Soufre colloïdal, Adrénaline *huileuse* et essences.

**Propriétés.** — Décongestionnant, calmant, bactéricide.

**Avantages.** — Consistance *semi-liquide*, introduction d'adrénaline à l'état huileux, ce qui assure une *homogénéité* parfaite du baume.

**Indications.** — Toutes inflammations de la muqueuse nasale. Toutes *rhinites* et à titre préventif contre les maladies contagieuses.

**Présentation.** — *En tube avec embout* pour faciliter l'introduction dans les narines.

**Prescription.** — Un tube *Rhinadrol* Falvy.

**Les Laboratoires A. FALVY**

Licencié ès sciences

Ex-interne, lauréat des hôpitaux de Paris  
40, rue des Acacias — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## RHINASPIR

Poudre soluble et non caustique en étui saupoudreur pour aspirations et pulvérisations nasales.

**Composition.** — Adrénaline au 1/100, Scuro-forme, Aristol, Benzonaphtol, Salicylate de soude, Lactose, Acide borique, Terpiréol, Essence de pin.

**Propriétés.** — Décongestionne et antiseptise la pituitaire, fluidifie, puis tarit les sécrétions.

**Indications.** — Coryza aigu et chronique, obstruction nasale par hypertrophie des cornets, ozène, sinusites.

**Mode d'emploi.** — 5 à 6 fois par jour, priser une pincée ou mieux la projeter dans chaque fosse nasale avec le lance-poudre Rhinaspir.

Prix de l'étui : 10 francs.

Dépôt général pour la France :

**Laboratoire ASEPTOR**

21, rue Feydeau — PARIS (II<sup>e</sup>).

Téléph. : Central 83-15.

---

# RHINOFLUINE

Solution isotonique et stérilisée d'extrait de Jaborandi.

**Forme.** — Ampoules.

**Indications thérapeutiques.** — Action élective sur les terminaisons sensitives des nerfs trijumeau et pneumogastrique, au niveau des muqueuses oculaire, nasale et laryngo-trachéale.

**Rôle essentiel : Régulation de la sensibilité  
et des troubles sécrétoires.**

**1<sup>o</sup> En Rhinologie.** — La Rhinofluine doit être utilisée en instillations dans les cas suivants :

**Congestions et Obstructions Nasales  
(Vaso-motrices)**

**Rhino-Pharyngites**

**Rhinites Atrophiques — Ozène**

**Coryzas Spasmodiques**

**et Rhino-Bronchites Asthmatiques**

**Céphalées Rhinogènes**

Il est nécessaire dans l'Ozène et dans les Coryzas spasmodiques (rhume des foins en particulier) de combiner ce traitement local avec le traitement général par les produits ingestibles de jaborandi (Néopancarpine ou Vaso-Neurine) qui constituent le traitement de fond.

**2<sup>o</sup> En Ophtalmologie.** — La Rhinofluine est employée en instillations. Elle réalise une décongestion rapide de la muqueuse conjonctivale (disparition de la rougeur et de la tuméfaction) et atténue l'hyper-sécrétion lacrymale (larmolement). Par son action sur les terminaisons sensitives et la décongestion ainsi réalisée, les phénomènes douloureux orbitaires et périorbitaires sont rapidement atténués (picotements, cuisson, tension douloureuse, névralgies, migraine ophtalmique, céphalalgies).

**Mode d'emploi :**

Les instillations de Rhinofluine peuvent être pratiquées 2 ou 3 fois par jour si nécessaire.

*Pour les yeux*, il sera toujours préférable de faire l'instillation de I à II gouttes dans le coin de l'œil, le soir, avant de s'endormir, si l'on ne fait l'instillation qu'une fois par jour. L'action de la Rhinofluine provoque en effet une contraction de la pupille qui peut gêner momentanément l'accommodation. La solution est parfaitement tolérée par la muqueuse oculaire et n'a aucun effet toxique.

*Pour le nez et la gorge*, les instillations peuvent être renouvelées 2 à 3 fois par jour (III, IV, V gouttes chaque fois dans chaque narine).

(Instillateur spécial dans les boîtes)

Les gouttes instillées tombant dans la gorge peuvent être avalées.

**Laboratoire**

**de pathologie générale de Paris**

**1, rue François-Ponsard — PARIS (XV<sup>e</sup>).**

**Téléphone : Autouil 35-25.**

## RHINO-LIPOSEPTINE

Solution concentrée de l'antitoxine du professeur Lemoine pour pulvérisation dans le nez et la gorge.

**Composition.** — Extrait éthéré de levures de *saccharomycès*. — Possède toutes les propriétés curatives des vaccins les plus actifs.

**Indications.** — En pulvérisations ou instillations dans le nez et la gorge dans tous les cas de maladies infectieuses où ces cavités sont atteintes : Angines, Coryza, Rhinopharyngites, Ozène, Sinusites, Grippe, Bronchites, Diphtérie, Rougeole, Scarlatine.

Mais ne présente aucun des inconvénients du menthol ni du goménol ; pas d'irritation des muqueuses.

**Mode d'emploi.** — Pulvériser ou instiller plusieurs fois par jour.

**Laboratoires de la LIPOSEPTINE**

2, place des Vosges — PARIS.

## RHIZOTANIN CHAPOTOT

**Composition.** — Tanin physiologique vivant directement assimilable, sels de chaux et de magnésie.

**Forme.** — Cachets : pour *adultes*.

Poudre : pour *enfants*.

**Indications.** — Tuberculose pulmonaire, états tuberculeux et pré-tuberculeux, états de consommation, bronchites chroniques.

Neutrisation des toxines.

Consolidation du terrain affaibli.

Amélioration rapide des accidents diarrhéiques.

Exaltation des réactions défensives de l'organisme.

**Posologie.** — *Cachets* : 4 à 6 par jour.

*Poudre* : 2 à 4 cuillères mesure par jour, dans de la confiture ou du miel.

**Laboratoire CHAPOTOT**

56, boulevard Ornano,

et 31, rue du Poteau — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

Agent général pour la Belgique :

**A. CHOCAT**, 86, rue du Méridien — BRUXELLES.

## RHOCYA DYN

*Un progrès sur les médications iodées.*

### Rhodanate de potassium pur

(Solution titrée : une goutte = un centigramme.)

Même action pharmacodynamique que les iodures et dérivés iodés (iode organique, peptones iodées, lipoïdes iodés, iodotanniques), mieux toléré, évite les effets secondaires des produits iodés.

*Ne contient pas d'iode.*

**Indications.** — *Arthritisme, hypertension artérielle, rhumatisme chronique, emphysème, scléroses, lymphatisme, syphilis tertiaire, tuberculose fibreuse, etc.*

**Posologie.** — Cures régulières et prolongées : X à XX gouttes avant les trois repas.

Le flacon compte-gouttes : 18 francs.

**Société d'Applications Pharmacodynamiques**  
5, rue Claude-Decaen — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## RHODARSAN

Dioxydiamidoarsénobenzol méthylène  
sulfoxyate de soude.

Teneur en arsenic : 20 p. 100 environ. Donne, avec l'eau distillée, des solutions neutres, injectables par voie veineuse exclusivement.

*Indications :*

**Syphilis, Symbiose fuso-spirillaire, Pian, Protozooses, Charbon, Sodoku.**

*Posologie et mode d'emploi.* — Séries d'injections graduées de 0 gr. 15 à 0 gr. 90. Applications locales de poudre, collutoires ou pommades.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« **SPÉCIA** »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

**RHODAZIL**

Benzoate de Benzyle.  
Antispasmodique, non toxique.

*Indications :*

**Asthme vrai, Hypertension, Dysménorrhée, Coliques néphrétiques et hépatiques.**

**Hoquet persistant, Spasmes divers, Mal de mer.**

*Posologie et mode d'emploi :*

*Adultes :* Une demi-cuillerée à café de *solution* ou 2 *capsules* à renouveler.

*Enfants :* IV gouttes de *solution*, par année d'âge.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPÉCIA** »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

**RHOFÉINE**

Association d'acide acétylsalicylique (50 centigr.) et de caféine (5 centigr.) pour un comprimé ou un cachet.

La caféine dote la Rhoféine de ses propriétés toni-cardiaques.

*Indications :*

**Grippe, États fébriles, Migraines, Névralgies.**

*Posologie et mode d'emploi.* — 1 à 6 comprimés ou cachets par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique.

« **SPÉCIA** »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).



## RHOMNOL

A base d'acide nucléinique pur et de nucléophosphates naturels.

**Indications thérapeutiques.** — Puissant reconstituant du noyau cellulaire, anti-neurasthénique de choix, indiqué dans toutes les affections dyscrasiques consomptives.

**Doses et mode d'emploi.** — *Pilules* à 0,05 : 4 à 6 par jour aux repas. *Saccharure* (granulé) 0,10 par cuill. à dessert ; une cuill. à dessert aux repas, pour adultes ; moitié ou quart pour les enfants, suivant l'âge. *Ampoules* 1 cc. (0,05 de nucléinate de soude par cc.) pour injections intramusculaires de préférence (spécialement indiquées dans les maladies infectieuses aiguës).

Prix de vente au public : 18 fr.

**Laboratoires du Dr M. LEPRINCE**  
62, rue de la Tour — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

---

## RICÉYL BILLAULT

Traitement efficace de la constipation.

**Forme.** — Poudre.

### Composition :

Huile de Ricin .....	40 gr.	} pour 100 gr.
Magnésie .....	40 gr.	
Lactate de Magnésie .....	5 gr.	
Excipient : Sucre .....	15 gr.	

Le RICEYL agit tout à fait différemment des autres laxatifs. A ces derniers, on demande de produire leur effet du soir au matin sans se préoccuper des suites qui se manifestent si l'on en prend chaque jour : entérite, constipation accrue. Tout au contraire, le RICEYL implique un traitement à suivre et prétend au rétablissement normal des fonctions, grâce notamment à son action sur la sécrétion biliaire. Le plus souvent d'ailleurs, après 1, 2 ou 3 jours, on peut diminuer, puis espacer les doses. Une véritable rééducation de l'intestin est ainsi obtenue rapidement.

Faisons observer que le traitement par le RICEYL n'est pas onéreux, par le fait que l'on espace les doses pour un résultat durable.

**Mode d'emploi.** — Le RICEYL s'administre dans du lait, du café, ou du café au lait sucré, chaud, le matin à jeun ou le soir au coucher.

**Adultes :** Dose purgative : 3 à 4 cuillerées à café.  
Dose laxative : 1 à 2 cuillerées à café.

**Enfants :** Bébés, à partir du sevrage, 1/2 cuillerée à café ; de 3 ans à 6 ans, 1/2 cuillerée à café ; de 6 ans à 12 ans, 1 à 2 cuillerées à café.

La boîte : 12 francs.

### Laboratoires pharmaceutiques

**L.-G. TORAUDE**, O. ✱, O. I. ☉

Docteur en pharmacie, Lauréat de l'Institut  
et de l'Académie de Médecine,

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

Dépôt et Agence générale de vente des Produits  
pharmaceutiques spécialisés BILLAULT.

R. C. Seine 218758 B.

## RICIGEL

**Huile de Ricin.**

**Sous une forme nouvelle et agréable.**

**Forme.** — Gelée de fruits contenant 90 p. 100 d'huile de ricin fraîche, 2 p. 100 agar-agar, 8 p. 100 sirop de fruits.

Goût agréable, spécialement indiqué pour femmes et enfants.

**Propriétés thérapeutiques.** — Toutes celles de l'huile de ricin.

**Indications.** — Toutes celles de l'huile de ricin.

**Doses.** — 2 à 3 cuillerées à café à jeun produisent trois ou quatre heures après des selles molles, sans coliques. Cette dose pour les enfants est moindre et, chez les adultes, peut être doublée pour obtenir une véritable purgation.

Prix : 8 fr. 50.

**ROBERTS et C<sup>ie</sup>, Pharmaciens,**

5, rue de la Paix — PARIS.

Tél. : Central 69-86.

---

## RICOMALT

**Forme.** — Granulé.

**Composition.** — Huile de ricin, Magnésie, Extrait de Malt.

**Indications.** — *Constipation* : Laxatif doux, agréable à prendre.

**Posologie.** — *Adultes* : Laxatif : 1 à 3 cuillerées à café. Purgatif : 2 à 4 cuillerées à soupe.

*Enfants* : Demi-dose.

**Laboratoires**

**MARONNEAU-MOREL**

156, rue des Fauvelles

COURBEVOIE (Seine).

## RIODINE



**Composition.** — Ether glycérique iodé de l'acide rich-  
moléique contenant environ 20 % d'iode.

**Forme.** — Flacon de 50 perles. Chacune représentant  
l'action de 0,20 cgr environ d'iodure alcalin.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médicament iodo-orga-  
nique type, directement et totalement assimilable.  
*Action prolongée et durable sans iodisme.*

Pour injections intraveineuses ou intramusculaires, voir  
**Néo-Riodine**, mêmes applications : *action rapide et  
intensive.*

**Indications.** — Artério-sclérose, myocardites chro-  
niques, hypertension, etc. Emphysème pulmonaire,  
bronchites chroniques, asthme, etc... Obésité, rhuma-  
tisme chronique, scrofule, syphilis, et dans toute affec-  
tion où la médication iodée ou iodurée est indiquée.

**Doses.** — 2 à 6 perles par jour avant les repas.

Prix : 12 francs.

### LABORATOIRES P. ASTIER

41, 42, 43 à 47, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## ROB OBERLIN

(Hérédos-spécificité et cure d'entretien).

Hg. I<sup>3</sup> = un tiers de centigramme par cuillerée à  
café.

Hg. I<sup>2</sup> = deux tiers de centigramme par cuillerée  
à dessert.

Hg. I<sup>1</sup> = un centigramme par cuillerée à soupe.

**Posologie** (en moyenne) :

Un an

et au-dessous, 1/3 cuillerée à café par jour.

2 ans..... 1/2 — — —

3 et 4 ans..... une — — —

5 à 12 ans..... 1 à 2 cuillerées à dessert —

12 à 17 ans... 1 à 2 — à soupe —

Adultes..... 2 à 4 — — —

Forme agréable à absorber, présentation discrète.

Prix : 15 fr. 50.

### Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

17, rue Cadet — PARIS.

## ROMARANTYL TROUETTE-PERRET

est le spécifique des Affections du Foie.

Elixir Aromatique à base de :

Romarin-Piscidia-Aphloïa-Ononis-Menthe.

L'Efficacité du *Romarantyl T. P.* est due à son action cholagogue, stimulante, diurétique, antispasmodique.

### Mode d'emploi :

1 à 2 cuillerées à café avant chaque repas.

Echantillons et littérature sur demande aux

**Laboratoires TROUETTE-PERRET**

15, rue des Immeubles-Industriels,  
PARIS (XI<sup>e</sup>).

## ROSALYL A et B

### Composition

	A	B
Ail.....	0 gr. 70	0 gr. 80
Thym .....	2 gr. 00	2 gr. 00
Marrube .....	1 gr. 00	1 gr. 00
Drosera .....	0 gr. 30	0 gr. 40
Grindelia.....	0 gr. 20	0 gr. 20
Bromure de sodium.....	0 gr. 625	0 gr. 75
Excipient liquide sucré et glycérimé		
Q. S. p.....	100 cc.	100 cc.

**Propriétés thérapeutiques.** — Calmant, sans toxiques, des grandes toux quinteuses et spasmodiques. Puissant désinfectant des bronches. Vermifuge par l'ail et le thym.

**Formes.** — Liquide sucré et glycérimé.

*Rosalyl A* : enfants jusqu'à cinq ans.

*Rosalyl B* : enfants de cinq ans et au-dessus. Adultes.

**Indications.** — *Coqueluche*. Toux nerveuses. Bronchites.

**Posologie.** — Indications très détaillées sur l'étiquette. Par cuillerées à café, à dessert ou à soupe, suivant l'âge.

Prix au public : 15 francs le flacon de 200 cc.

**Laboratoire MALMANCHE**

Pharmacien, Docteur ès sciences

101, rue de Paris — RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise)

## ROYÉRINE DUPUY

**Poudre digestive**, absorbante et recalcifiante en cachets.

**Composition.** — Pepsine extractive, Pancréatine extractive titrées, Carbonate de bismuth, Phosphate, Carbonate de chaux et Magnésie lactosée.

**Avantages.** — La pepsine et la pancréatine associées à une poudre non fermentescible, antiputride, comme le carbonate de bismuth, se conservent indéfiniment. Absorbant de premier ordre, antiacide, ne provoque pas de constipation. Recalcification assurée.

**Indications.** — Dyspepsies à forme hypersthénique. Gastralgies, Fermentations secondaires, Entérites aiguës et chroniques, Diarrhées profuses des tuberculeux, Eruptions provenant de troubles digestifs (Urticaire).

**Dose.** — 2 à 8 cachets par jour.

Prix : la boîte de 40 cachets, 12 francs.

**LABORATOIRE de THÉRAPEUTIQUE**  
des **VOIES DIGESTIVES J. LAUMONIER**  
223, rue Saint-Martin — PARIS.

## ROZODERME

Le *Rozoderme* est une pommade rose à base d'essences végétales antiseptiques (type Lucas-Championnière) et de substances chimiques (boro-zinciques) inoffensives destinées à créer et entretenir un milieu favorable à la réfection des tissus. Présentation en tubes.

**Propriétés.** — Le *Rozoderme* calme la douleur et l'irritation, aseptise les plaies en détruisant les germes nocifs, stimule la vitalité des tissus et active la cicatrisation. Convient parfaitement pour la toilette journalière des jeunes enfants.

**Indications.** — Erythème fessier, feux de dents des nourrissons, gerçures du sein, brûlures et diverses formes d'eczémas : aigu, chronique ou variqueux, dermites toxiques, zona intercostal, etc.

**Mode d'emploi.** — Appliquer une couche légère sur la partie malade, préalablement lavée et séchée, recouvrir de gaze et renouveler le pansement toutes les vingt-quatre heures.

**Laboratoire du ROZODERME**  
11, rue des Deux-Ponts — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## RUBYL

Iodure double de quinine et de bismuth.  
Suspension huileuse stérilisée, injectable  
par la voie intramusculaire, bien tolérée.  
Teneur en Bi = 20 mgr. environ par cc.

*Indications :*

**Bismuthothérapie de la Syphilis.**

*Posologie et mode d'emploi :*

Injection du contenu d'une ampoule (3 cc.)  
tous les trois ou quatre jours ; série de  
12 injections.

*Chez les enfants :* 1/20<sup>e</sup> par année d'âge, de  
la dose conseillée chez l'adulte.

Société Parisienne d'Expansion Chimique.

**« SPÉCIA »**

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## RUTONAL

Phénylméthylmalonylurée.

Propriétés hypnotiques et antiépileptiques  
très voisines de celles du Gardénal. dont  
il est le succédané pour les malades into-  
lérants ou résistants à ce médicament.

*Indications :*

**Épilepsie, Chorée, Convulsions,  
États anxieux.**

*Posologie et mode d'emploi :*

Un à quatre comprimés à 20 centigr. par  
24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

**« SPÉCIA »**

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

**RYTHMOSYSTOL**

Marrube blanc, 4/5 ; adonis vernalis, 1/5.

Formes : Dragées, Gouttes, Ampoules.

**Propriétés.** — Régularisation du Rythme cardiaque (*extrasystoles*). Pas d'accumulation. Pas de contre-indications, aucune toxicité.

**Posologie.** — *Dragées* : 10 par jour.

*Gouttes* : LX par jour. — *Ampoules* : 2 à 4 par jour.

Prix : 14 francs.

**COMTE, Pharmacien**

60, rue Saint-Guilhem  
MONTPELLIER.

---



**SAINT-ARÉ**

(Composition de l'eau de Carlsbad.)

**Sulfatée sodique à 6 p. 1000.**

Chlorurée, bicarbonatée, magnésienne, calcique.

**Propriétés thérapeutiques :**

Syndromes vésiculaires et hépato-coliques.

— Alcalose. — Propriétés cholagogues, régulatrices de l'intestin. — Hypotensives, diurétiques.

Traitement à domicile.

**Société des Eaux Minérales de Declze  
(Nièvre).**

Bureau à Paris, 49, boulevard de Port-Royal.

---

## SALANTALE

**Vaccins polyvalents antiseptiques**  
(Procédé breveté).

**Antigènes et Antivirus microbiens polyvalents**  
spécifiques aux différentes affections.

### 1° VACCINOTHÉRAPIE

**Pommade-vaccin.** — Vaccination par voie cutanée et application locale, traitement curatif et préventif, aucune contre-indication. Sans réaction locale ni générale.

**Indications.** — Furonculoses aiguës et chroniques, Panaris, Orgelets, Blépharites, Mastites, toutes suppurations.

Prix de vente : 15 francs le tube.

**Ovules-vaccin.** — Vaccination par pansements gynécologiques.

**Indications.** — Toutes Leucorrhées et affections purulentes, Vulvo-vaginites, Urétrites, Métrites, Péricérites, Salpingites, Annexites, Bartholinites et toutes infections gonococciques.

**Mode d'emploi.** — Pansements gynécologiques. Ne tachent pas le linge, odeur agréable.

Prix de vente : 17 fr. 50 la boîte.

### 2° VACCINOTHÉRAPIE ET THÉRAPEUTIQUE SYMPTOMATIQUE COMBINÉES

**Rhino-Salantale.** — Pommade nasale.

**Indications.** — Rhumes, Sinusites aiguës et toutes inflammations des fosses nasales.

Prix de vente : Petit modèle, 9 fr. 75 le tube.

Grand modèle, 15 francs le tube.

**Recto-Salantale.** — Sous forme de pommade avec canule anale.

**Suppo-Salantale.** — Sous forme de suppositoires.

**Indications.** — Hémorroïdes, toutes fistules et fissures anales, etc.

Prix de vente : 17 fr. 50.

Echantillons et littérature sur demande.

**Laboratoires SALANTALE**  
**NOTH et ANSELM, Pharmaciens,**  
**STRASBOURG.**

## **SALÈNE CIBA** (et **SALÉNAL CIBA**)

Ethers méthyl et éthyl-glyco-salicylique possédant, à un haut degré, les propriétés analgésiques du salicylate de méthyle, mais ayant sur ce dernier l'avantage de l'absence d'odeur et de toute action irritante.

**Indications.** — Rhumatisme articulaire aigu ou chronique, Lumbago, Torticolis, Névrite rhumatismale, Goutte, Sciatique, etc.

**Doses.** — Se formule magistralement, pur ou en liniment par 5 ou 10 gr.

Le **SALENAL** (pommade au Salène) est vendu en tubes de 30 gr. Prix : 10 fr.

**Laboratoires CIBA, O. ROLLAND**

109-113, boulevard de la Part-Dieu — LYON.

---

## **SALICÉRAL**

**Composition.** — Le Salicéral est l'éther monosalicylique de la glycérine, préparé par double décomposition entre la glycérine et un éther sec de l'acide salicylique.

**Applications.** — Arthrite rhumatismale, Herpès tonsurant, Pityriasis versicolor, Névralgies sciatiques ou intercostales et dans toutes les indications de la médication salicylée.

**Formes.** — Liniment au Salicéral.

Flacon de 50 cc.

**Laboratoires CLIN**  
PARIS.

## SALSANOS

A base de sels de soude (sulfate, phosphate, tartrate, citrate)

**Forme.** — Sel granulé, effervescent, soluble et d'un goût agréable.

**Propriétés thérapeutiques.** — Maintient l'alcalinité du sang, empêche celle de l'urine, diminue l'acide urique et participe à son élimination, aide à la dissolution des urates et des oxalates, active la combustion des graisses.

**Indications.** — Artério-sclérose, Pléthorisme, Gastralgie, Arthritisme, Rhumatisme, Goutte, Coliques hépatiques et néphrétiques, Maux de tête, Troubles digestifs, Obésité et en général toutes les affections du foie et des reins.

**Doses.** — Une à trois cuillerées à café dans un 1/2 verre d'eau le matin à jeun.

Prix : 16 fr. 50.

**ROBERTS & C<sup>ie</sup>**, Pharmaciens.

5, rue de la Paix — PARIS.

Tél. : Central 69-86.

## SALUBRINE PHÉNIX

Liquide et comprimés.

**Composition.** — Antiseptique puissant à base de formolsulfonate de soude et de thymol.

**Formes pharmaceutiques.** — Solution incolore miscible à l'eau ; d'odeur agréable, ne tachant pas le linge. (Comprimés.)

**Indications.** — Gynécologie, accouchements, pansements, hyperhydrose.

**Posologie.** — 1 à 2 cuillerées à soupe ou 2 à 4 comprimés par litre d'eau. (Usage externe.)

**Laboratoire P. MAUCHANT**

14, rue de Birague — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## SALVATYL

Adopté par les Ministères de la Marine et des Colonies.

Prophylaxie antivénérienne individuelle.

Pommade polyvalente agissant à la fois contre le tréponème et le gonocoque.

**Principe actif.** — Protochlorure de mercure léger et dissociable (Voir *Gambéol*). ←,

**Mode d'emploi.** — En applications dans le canal de l'urètre sur la muqueuse balano-préputiale et les écorchures des parties génitales. A employer le plus tôt possible ; au plus tard dans les 12 heures consécutives à un contact suspect.

### Présentations :

Salvatyl G. M.....	15 francs.
— Rech .....	10 —
— P. M.....	5 —

### Laboratoire de SALVATYL.

42, rue Emile-Deschanel — COURBEVOIE (Seine).

---

## SALVENASE LEGOUX

### Composition :

#### *Traitement interne.*

A. Comprimés non enrobés se désagrégeant très rapide- ment ; consti- tués de :	Extraits secs	{	Marron d'Inde (stabilisé)
			Cupressus
		{	Hamamelis
			Viburnum
		{	Boldo
			Surrénales
	Poudre de glandes	{	Thyroïdes
			Ovaires

B. Granulé aromatisé soluble dans l'eau, de citrate de soude pur.

#### *Traitement externe.*

Sels pour bains à base de :	{	Sulfate de potasse et d'alumine.
		Hydrochlorate de soude.
		Carbonate de soude acide.

**Indications.** — Traitement complémentaire de la cure à BAGNOLES-DE-L'ORNE, ou à défaut son meilleur succédané.

### Mode d'emploi :

<i>Traitement interne.</i> (Prix : 15 fr.)	{	1° matin à jeun, 1 cuillerée à café pleine de granulé, dissous dans un demi-verre d'eau.
		2° A chaque repas de midi et du soir, prendre 2 à 3 comprimés.
<i>Traitement externe.</i> (Prix : 3 fr. 75).	{	1 bain ou 2 par semaine dans lequel on aura fait dissoudre le contenu d'une boîte Salvenase (sels pour bains).

**Laboratoires LEGOUX, frères**  
6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).  
Anciennement, 10, rue de Turenne,  
PARIS (IV<sup>e</sup>).

## SALYPTOL NARTY

Traitement de la Grippe, de la Coqueluche et des maladies des Voies respiratoires.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médicament héroïque, calmant énergique de la toux, anti-fébrifuge de premier ordre, médicament antigrippal et antibronchitique, par excellence.

### Indications :

Laryngites, Trachéites, Rhumes vulgaires, Bronchites aiguës, Bronchites chroniques dites négligées, Affections pulmonaires, Gripes et ses formes. Coqueluche et toutes les toux de l'enfant.

### Deux formes :

Elixir (adultes) : 4 à 5 cuillerées à dessert par 24 heures. Prix : 18 francs.

Gouttes (enfants) : X gouttes par jour et par année d'âge. Prix : 16 fr. 50.

**Laboratoires Georges TINARD**

134, boulevard Pereire — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## SALYSÉRUM

du Docteur Jules SÉJOURNET

Composé cosalicylé

(Communication à l'Académie de Médecine.)

**Forme.** — Ampoules de 2 cc. et de 5 cc d'acide salicylique *indolore*.

**Indic. therap.** — Rhumatisme aigu ou subaigu, Pleurodynies, Torticolis, Lumbagos, Rhumatisme gonococcique, Sciatique, Goutte.

**Doses.** — 2 à 4 ampoules chaque jour injectées au point douloureux.

**Prix :** 22 fr. la boîte de 10 ampoules de 2 cc.

— 22 fr. — 5 — de 5 cc.

**Laboratoires DROUET et PLET**

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

## SAMBUL

Médicament végétal, *sans colchique*.

**Composition.** — A base d'un suc extrait des baies du *Sambucus Ebulus*. Désodorisé.

**Indications.** — Goutte ; rhumatismes ; sciatique ; névralgies ; lumbago, migraines, etc.

**Posologie.** — Une cuillerée à café matin et soir, avant et à distance des repas. *N'est pas toxique* ; pas de contre-indications. Traitement à prolonger dans les cas chroniques rebelles de prime abord. Cures ininterrompues de 1 à 3 flacons.

Le flacon pour dix jours de traitement : 18 fr.

*Littérature et spécimens médicaux sur demande.*

**Société des Laboratoires du SAMBUL  
EVREUX (Eure).**

---



## SANAS

### Composition :

Extrait glycéринé concentré de foies frais de morue. Produit vitaminé, facteurs A et D, sans trace d'huile, ne contient aucune substance irradiée artificiellement.

### Préparation :

Sur les lieux mêmes de la pêche, dans les laboratoires du *Sanas*, à Saint-Pierre-Miquelon (Banc de Terre Neuve).

### Formes :

1<sup>o</sup> Gouttes ;

2<sup>o</sup> Ampoules. pour boisson. Spécialement indiquées pour les colonies et pays chauds.

### Avantages :

Sans odeur ou saveur désagréables.

Contient sous un faible volume les principes actifs des foies frais. Se prend aussi bien l'été que l'hiver.

### Indications :

Toutes celles de l'huile de foie de morue. Rachitisme, Prétuberculose, Anémie, Convalescence des maladies infectieuses, Adénopathies, Inappétence.

### Posologie :

*Enfants* : Dose journalière : II à IV gouttes par année d'âge.

*Adultes* : Dose journalière : L à LX gouttes.

### Mode d'emploi :

Une demi-dose journalière avant chacun des deux principaux repas, dans un peu de lait, de bière, de vin, de potage ou mélangée à un aliment quelconque.

Prix du flacon : 15 francs.

**A. WELCKER et C<sup>ie</sup>**

72, rue du Commerce — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## SANDOPTAL

Acide isobutyl-allyl-barbiturique.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés dosés à 20 centigr. d'isobutylallylmalonylurée.

**Propriétés.** — Assure un sommeil tranquille et naturel, suivi d'un réveil eusthénique. Index thérapeutique élevé. Tolérance parfaite.

**Indications.** — Toutes les insomnies.

**Posologie.** — Une dragée le soir avant de se coucher. Cas rebelles : 2 ou 3 dragées (maximum 4) à la fois.

**Présentation.** — Tubes de 10 dragées. Pour hôpitaux et cliniques : flacons de 100 et 500 dragées.

### Produits SANDOZ

3 et 5, rue de Metz — PARIS (X<sup>e</sup>).

M. CARILLON, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

Dépôt général et ventes :

Usine des Pharmaciens de France,  
129, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

## SANÉDRINE

d - hydroxy - B - méthylamino - propyl - benzène.

Chlorhydrate d'Ephédrine lévogyre.

*Indications :*

**Asthme bronchique, Fièvre des foins, Hypotension, Dysménorrhée, Accidents allergiques,**

*Posologie et mode d'emploi :*

Deux à six comprimés à 25 milligr. par 24 heures, en prises espacées.

S'abstenir chez les hypertendus.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## SANEX-INHALANT

**Composition.** — Liquide volatil antiseptique, à base d'essences aromatiques de pin sylvestre, de thym, de menthe, de camphre, de melaleuca de Gomène, d'eucalyptus, etc. en solution dans de l'acétone pure. Présenté en tube stilli-gouttes aluminium.

**Avantages.** — Permet de faire de très fréquentes inhalations antiseptiques sans appareil spécial ; il suffit de verser sur un mouchoir quelques gouttes de SANEX-INHALANT et de respirer fréquemment les vapeurs qui se dégagent pendant plusieurs heures. Ne tache pas le linge. Odeur agréable.

**Indications.** — Affections du nez, de la gorge et des bronches ; en particulier Coryza, Sinusite, Rhume des foins, Coqueluche, Asthme.

Prix : 10 francs.

Sur demande, envoi d'un spécimen à MM. les Docteurs.

**Laboratoire BOISSY**

49, rue Hoche — COURBEVOIE, près Paris.

Dépôt : Ph<sup>ie</sup> MANTOUT, 3, rue de Scribe, PARIS.

---

## SANGUIL

Reconstituant complet.

**Composition.** — Association de glycérophosphate de soude, phosphate tricalcique, fluorure de calcium, nucléinate de manganèse, oxalate de fer, méthylarsinate de soude, kola totale, noix vomique totale, surrénale.

**Action thérapeutique.** — Stimule la cellule nerveuse. Excite la nutrition. Régénère les globules sanguins. Tonifie l'organisme. Assure la reminéralisation complète par ses fixateurs opothérapiques.

### Formes :

**Cachets**, la boîte de 42 : 17 fr.

**Granulé** de goût agréable, la boîte : 14 fr.

### Mode d'emploi :

*Cachets* : Un cachet avant chacun des trois repas.

### *Granulés* :

Moins de 12 ans : deux cuillerées à café par jour.

De 12 à 18 ans : trois cuillerées à café.

*Adultes* : trois cuillerées à dessert.

A prendre au début des repas.

---

**Laboratoires Ch. BRÉSIL**

12, rue Saint-Gilles — PARIS (III<sup>e</sup>).

Téléphone : Archives 67-05.

## **SANGUINE IRRADIÉE**

### **Vitamine D.**

Traitement du rachitisme, Troubles de la croissance, Combat la déminéralisation, le surmenage, la fatigue, l'anémie.

Prix : 20 fr.

**Laboratoires RIETHE**

40, rue des Abbesses — PARIS.

---

### **SANLUOL**

Arsénobenzol en comprimés.

Le Sanluol permet, sous une forme commode et bien tolérée, l'administration de l'arsénobenzol, méthode préconisée par M. le Dr Ravaut.

*Indications :*

**Amibiase (prophylaxie et traitement).  
Diarrhées, Entérites.**

*Posologie et mode d'emploi :*

**Traitement :** Deux à six comprimés à 10 centigr. par 24 heures, par séries de 8 à 10 jours.

**Prophylaxie :** Un ou deux comprimés par jour, une ou deux fois par semaine.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« **SPÉCIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS. (III<sup>e</sup>).

## SANOFORMINE

**Composition.** — Bicarbonates alcalins, trioxyméthylène, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, menthol et essences aromatiques.

**Forme.** — Comprimés de dissolution facile et rapide dans l'eau tiède ou froide.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique, bactéricide, désodorisant puissant, astringent, décongestionnant et analgésique.

**Indications thérapeutiques et posologiques.** —

1° Toilette intime : 1 à 2 comprimés par litre ;

2° Métrites, leucorrhée, salpingites, etc., 2 à 3 comprimés par litre ;

3° Désodorisant : 12 comprimés pour un bain de pieds quotidien. — 10 comprimés par litre en lavage (plis de l'aîne, creux de l'aisselle).

**Laboratoires MAYOLY-SPINDLER**

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

A BRUXELLES :

**LE MARINEL, Pharmacien, 273, rue Victor-Rauter.**

---

## SANOGLYL

Pâte antispirillaire pour prévenir et traiter les Pyorrhées alvéolaires, Gingivites, Stomatites simples, mercurielles, bismuthiques, etc.

Prix : 6 fr., impôt compris.

## SANORAM

Antiseptique puissant, en comprimés : ne coagule pas l'albumine. Recommandé en Chirurgie générale, traitement des brûlures, soins de la bouche, toilette intime, etc.

Prix : 5 fr., impôt compris.

**H. VILLETTE, Pharmacien**

**Marques de « La Biothérapie »**

131, rue Cambronne — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Téléphone : Vaugirard 11-23.

## SANTAL-MIDY

**Composition.** — Essence de Santal pure obtenue par la distillation du bois de Santal citrin de Bombay, préférable au Copahu, au Cubèbe et à l'essence de térébenthine.

**Forme.** — Capsules.

**Caractéristiques.** — Pureté de l'essence et dosage élevé (0 gr. 25) par capsule.

**Indications.** — Blennorragie, Inflammation de la vessie, Néphrite suppurée, Catarrhe de la Vessie, Catarrhe vésical des vieillards, Maladie de Bright, Cystite aiguë, Coliques néphrétiques.

**Doses.** — Dès que la maladie est déclarée, 10 à 12 capsules le premier jour. Augmenter de 3 à 4 capsules les deuxième et troisième jours. Diminuer progressivement la dose.

Diviser les doses en quatre parties que l'on prend à distance égale et chaque fois un quart d'heure avant les repas.

**Laboratoire de Pharmacologie Générale**

D<sup>r</sup> Ph. CHAPELLE, 8, rue Vivienne — PARIS.

---

## SANTAL MONAL

au Bleu de Méthylène.

**Forme.** — Capsules.

**Composition.** — Chaque capsule contient : Essences balsamiques : 0 gr. 16.

Bleu de Méthylène : 0 gr. 02.

**Doses.** — 4 à 10 capsules par jour.

**Action.** — Antigonococcique, Antiseptique, Analgésique, Diurétique. Le plus actif et le mieux toléré des produits préconisés pour le traitement des Affections des Voies Urinaires.

**Particularité.** — Colore les urines en bleu.

Le flacon de 50 capsules : 20 fr.

**Laboratoires MONAL et C<sup>le</sup>**

6, rue Bridaine — PARIS.

## SANTHÉOSE

A base d'une diméthylxantine irréprochablement pure, associée selon les cas au *phosphate de soude*, à la *caféine* ou au *benzoate de lithiné*.

### Forme :

Se présente en cachets en forme de **cœur** (dosés à 0,50 de principe actif) et existe sous 4 variétés :

1° **Santhéose pure** : Affections cardio-rénales, albuminurie. 2° **Santhéose phosphatée** : Scléroses, convalescences. 3° **Santhéose caféinée** : asthénie, asystolie, infections. 4° **Santhéose lithinée**, artério-sclérose, rhumatisme, goutte.

**Dose.** — 1 à 4 cachets par jour.

### Propriétés thérapeutiques :

Diurétique, hypotenseur, toni-cardiaque, anti-toxique.

### Indications :

Toutes les affections justiciables d'un diurétique rénal direct.

Vente au public : la boîte de 24 cachets : 12 francs.

### Dépôt général :

4, rue du Roi-de-Sicile — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## SAPOLAN

Onguent de Naphte spécial.  
Spécifique des Prurits. — Eczémas.  
Psoriasis. — Lichens.

**Sapocrème.** — Crème de SAPOLAN. Adoucissante, antiprurigineuse. Dermites aiguës.  
Prix : 11 francs.

**Sapocade.** — (Sapolan et Huile de Cade.) Psoriasis. Séborrhée, Sycosis. Le tube : 11 fr.

**Lait de Sapolan.** — Erythèmes. Le flac. : 18 fr. 50.

**Lait de Soufre Sapolan.** — Acné. Le flac. : 18 fr. 50.

**Lait de Cèdre Sapolan.** — Pityriasis et Séborrhée du cuir chevelu. Le flac. : 18 fr. 50.

**Poudre de Sapolan.** — Dermites aiguës.  
La boîte : 11 francs.

**Savon de Sapolan.** — Savon surgras au Sapolan : Peaux irritables. Prix : 5 fr.

**Laboratoire du D<sup>r</sup> R. CAVAILLÈS**

34, rue de Turin — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

Détail : Pharmacie 116, bd Haussmann et toutes pharmacies.



## SARCOPTOL

Solution à base de soufre colloïdal.

**Indications.** — Séborrhée et états séborrhéiques, Epidermodermites microbiennes, Eczéma chronique et impétigineux, Prurit, Prophylaxie de la Furonculose, Parasiticide spécifique de la gale, qu'il guérit en une seule application sans frotte et sans bain.

**Avantages.** — Ne tache ni le linge ni la peau, d'une odeur agréable. Ni toxique, ni irritant, supprime les démangeaisons.

En flacons de 60 grammes : 15 fr.

— 120 — 28 fr.

### Laboratoire du Sarcoptol

9, boulevard Edgar Quinet — PARIS (XIV<sup>e</sup>).

---

## SAVON PÉRUSOL

**Composition.** — Baume du Pérou, Benjoin.

**Propriétés.** — Neutre, balsamique, antiseptique, adoucissant.

### Formes et indications :

a) *Savon de toilette* : Toilette quotidienne, soins hygiéniques de la peau et des muqueuses.

*Dermatoses superficielles.* — Rougeurs, Acnés, Gercures, Engelures, Dartres.

b) *Savon pour la barbe* : Sycosis, Dermites irritatives, Acné.

c) *Savon liquide* : Chirurgie, Gynécologie, Soins de la Chevelure.

*Tarif médical très réduit.*

**Produits du Laboratoire de Dermatologie de Paris.**

**HOURQUET et VIENNE, Pharmaciens-Concessionnaires,**

114, rue du Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## SAVONS A°. MOLLARD

SAVONS MOLLARD A TOUS MÉDICAMENTS

SAVONS SULFUREUX DE TOILETTE  
A°. MOLLARD

SAVONS FLUIDES MOLLARD

pour les soins du cuir chevelu  
(cèdre, cade, sulfureux, panama)

LOTION A° MOLLARD A. LA PILOCARPINE

SAVON DENTIFRICE MOLLARD

POMMADE ALCALINO-SULFUREUSE MOLLARD

CRÈME SULFUREUSE DE SAVON MOLLARD  
(affections squameuses du cuir chevelu)

Émile LANG et C<sup>ie</sup>

2, rue du Marché-des-Blancs-Manteaux  
PARIS (IV<sup>e</sup>)

Téléphone : Archives 20-71.

## SCILLARÈNE « SANDOZ »

**Composition.** — Tous les principes actifs du bulbe de scille isolés sous forme de glucosides purs.

**Forme.** — Comprimés à 0 millig. 8 de substance active ; solution à 1/2000 ; ampoules p. injections intramusculaires profondes à 1 cc. dosées à 0 gr. 0005 ; suppositoires dosés à 1 millig.

**Propriétés.** — Produit pur, cardiotonique et diurétique. Pas d'irritation rénale ou gastrique. Pas d'accumulation.

**Indications.** — 1° Remplace la digitale quand elle n'agit pas ou n'agit plus ; 2° Maintient la compensation ; 3° Puissant diurétique dans les néphrites, *le diurétique azoturique vrai.*

**Posologie.** — 1/2 à 2 ampoules par jour, 1 à 2 suppositoires, 1 comprimé ou XX gouttes 2 à 8 fois par jour à doses régulièrement ascendantes puis descendantes.

### Produits SANDOZ

3 et 5, rue de Metz — PARIS (X<sup>e</sup>)  
Dépôt général et Vente :

Usine des Pharmaciens de France  
129, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

## SCLÉROSÉROL

Hypotenseur, Diurétique  
Spécifique de l'Artério-sclérose.

**Composition.** — Acide thyminique, Théobromine, Digitale, Lactose, Extrait de Gui, Silicate de Soude.

**Indications.** — Hypertension sous toutes ses formes, Rétention chlorurée, Athérome, Scléroses organiques et Préscléroses.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Dose :**

3 à 6 par jour. Avaler les comprimés avec une gorgée de liquide et sans les écraser.

Prix : 15 francs.

**Laboratoire Moderne**  
**d'Opothérapie et Biologie Médicale**  
40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE

---

## SCLÉROSÉRUM

Traitement des Varices, des Hémorroïdes, des Rhinites congestives et hypertrophiques, des Epistaxis et Laryngites tuberculeuses par les injections sclérosantes.

**Formule.** — Nouvelle formule à base de sels doubles de Quinine et d'Urée, en milieu hypersclérosant. (Employée dans les Hôpitaux.)

**Indications, technique et posologie.** — Demander à notre Laboratoire l'opuscule traitant ces questions et contenant quelques-unes des observations prises dans les hôpitaux de Paris.

**Avantages sur les autres solutions.** — 1° Le plus actif des sels employés ; 2° absolument indolore pendant et après l'injection (jamais de crampe) ; 3° le moins réactionnel pour les tissus périvasculaires ; 4° nullement escarrotique à des doses permettant des scléroses étendues et complètes ; 5° sa présentation permet d'obtenir automatiquement tous les taux de solution désirables.

**Produits du Laboratoire de Dermatologie de Paris.**

**HOURQUET et VIENNE**

**Pharmaciens-Concessionnaires,**

114, rue du Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## SCLÉROVEINE HARDY

Traitement sclérosant des varices par injections intravariqueuses (*Solution originale* du professeur Sicard).

**Formes.** — Ampoules S au Salicylate de Soude de 5 cc. à 10, 20, 30, 40 p. 100. Ampoules C au Chlorhydrate de Quinine de 3 cc. à 10 et 15 p. 100.

**Indications.** — Tous les états variqueux.

**Mode d'emploi.** — Consulter la notice spéciale.

**Laboratoire Z. HARDY**

200, rue de Tolbiac — PARIS (XIII<sup>e</sup>).

Téléphone : Gobelins 72-06.

*Exportation réservée.*

**LECZINSKI et C<sup>ie</sup>**

67, rue de la Victoire — PARIS.

---

## SCUROCAÏNE

Novocaïnum (Codex français 1908).

Le moins toxique des succédanés de la cocaïne.

**Solutions :** à divers titres, additionnées ou non d'Adrénaline, pour tous usages anesthésiques.

Anesthésie par infiltration, tronculaire, rachidienne, épidurale, dentaire, oculaire, rhinolaryngologique.

**Comprimés** dosés à 5 centigr. avec ou sans Adrénaline. *Scurocaïne* cristallisée (chlorhydrate), nitrate de Scurocaïne, Scurocaïne basique.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« **SPÉCIA** »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## SCUROFORME

Paraminobenzoate de Butyle normal.

Anesthésique insoluble, non irritant, non toxique.

*Indications :*

**Plaies, Brûlures de la peau, Ulcérations des muqueuses, Dysphagie, Pharyngites, Ulcères gastriques, Usages stomatologiques.**

*Présentations, mode d'emploi :*

- 1° Poudre en nature : applications locales.
- 2° Poudre lactosée à 1/10<sup>e</sup> : Insufflations laryngées.
- 3° Pastilles chocolatées à 2 centigr. : Stomatites, Pharyngites.
- 4° Comprimés à 5 centigr. : Douleurs gastriques.
- 5° Solution huileuse ou glycéro-alcoolique : Badigeonnages.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## SÉCACORNINE « ROCHE »

**Composition.** — Tous les principes actifs de l'ergot de seigle (*secale cornutum*) sous une forme soluble et injectable.

**Action thérapeutique.** — Stable, d'action sûre, régulière et constante, c'est un vaso-constricteur puissant, donc un hémostatique interne énergique, décongestionnant, augmentant la tension artérielle et régularisant le pouls.

**Indications thérapeutiques.** — a) *Action hémostatique.* Toutes les hémorragies internes, hémoptysies, hématoméses, entérorragies, ménorragies, etc. — b) *Action toni-cardiaque.* Myocardites infectieuses. — c) *Action décongestive.* Congestion pulmonaire, états congestifs de l'encéphale, congestion éthylique, etc. — d) *Action vaso-constrictive.* Diarrhées, leucorrhée, lochies persistantes, sueurs des phthisiques, etc. — e) *Action sur les fibres musculaires lisses.* — a) *Utérus.* — Atonie utérine, avant, pendant et après les accouchements et les avortements. — Troubles menstruels. — b) *Rectum et vessie.* — Polypes du rectum (injection sous-muqueuse). — Incontinence d'urine, spermatorrhée, etc.

**Doses et mode d'emploi.** — 1 centimètre cube ou 1 ampoule, ou XL gouttes, ou 4 comprimés de *Sécacornine « Roche »* agissent comme 4 grammes de seigle ergoté.

**Thérapeutique d'urgence.** — 2 cc. ou LXXX gouttes par voie buccale ; ou 2 ampoules par voie hypodermique ou intramusculaire.

**Doses moyennes.** — 1/2 à 1 ampoule par jour, par voie hypodermique ou intramusculaire ; XX à XXX gouttes par jour, 1/2 à 1 cc. par jour, par voie buccale ou rectale ; 2 à 4 comprimés par jour, par voie buccale.

**Thérapeutique locale.** — 2 cc. ou 2 ampoules par jour, en injections intra-utérines (atonie utérine) ; 1 cc. ou 1 ampoule par jour en injection sous-muqueuse (loco dolenti) : Prolapsus du rectum.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et O<sup>ie</sup>**  
21, place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

## SEDARSAN

(Sédatif du système nerveux.)

En solution à prendre par gouttes.

**Composition.** — Extraits fluides à parties égales : Crataegus oxyacantha, Ballota foetida, Passiflora incarnata, les plantes ayant été stabilisées avant l'extraction.

**Indications.** — Palpitations, névroses cardiaques, hyperexcitabilité cardiaque, spasmes, dyspepsies nerveuses, troubles de la ménopause, insomnies, troubles nerveux et psychonerveux, affections spasmodiques et psychopathiques.

**Posologie.** — XV à XXX gouttes trois fois par jour ou plus sur indications strictes du médecin. A prendre avant le repas ou au coucher dans un peu d'eau.

**N. B.** — Le Sédarsan ne contient aucune substance toxique ou soporifique ; c'est un extrait physiologique végétal. Son action n'est pas immédiate mais curative.

**Laboratoires « OPTIMA » S. A.**  
78-80, Grande-Rue-au-Bois — BRUXELLES.

## SEDATINE CHRISTIAENS

*Remplace la Morphine.*

**Formule.** — Diiodo Salicylate de sodium, 2 gr. 10 ; Solution q. s. pour 100 cc.

En ampoules stérilisées de 2 cc.

**Indications thérapeutiques.** — Remplace la *Morphine* dans : Douleurs arthritiques, Sciatique, Lumbago, Névralgies cérébrale et intercostale, Vomissements incoercibles, Crises hépatiques.

**Toxicité : Nulle.** — Peut être laissée dans toutes les mains.

**Forme.** — Boîtes de 6 et boîtes de 12 ampoules de 2 cc.

**A. CHRISTIAENS**

2, rue du Champ-de-Mars — REIMS.

## SÉDATOSE

Tartrate borico-potassique  
du Docteur André Gigon

**Composition.** — Tartrate borico-potassique chimiquement pur.

**Forme.** — Poudre desséchée.

**Indications thérapeutiques.** — Epilepsie.

**Mode d'emploi et dose.** — Cuillère-mesure dosant 50 centigr. : 6 à 10 par jour ; traitement prolongé suivant avis du médecin.

Flacon de 40 gr.

**Laboratoires des Produits du Dr GIGON**

A. FABRE, pharmacien

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## SÉDATULINE

**Aérophagie-Palpitations.**

**Composition.** — A base de passiflore, balote, cratægus, valériane (plantes stabilisées).

**Indications.** — Insomnies, états nerveux et spasmodiques, affections du cœur et des vaisseaux de l'estomac et de l'intestin.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à café le matin et le soir et la nuit si besoin avec un peu d'eau pure ou sucrée.

Se fait également en pilules.

2 pilules le matin et le soir et dans la nuit si besoin.

Prix : 15 francs.

**P. BOUSQUET et E. LEROUX**

Anciens internes des Hôpitaux

46, rue de la Barrière — ELBEUF.



## SÉDOBROL « ROCHE »

Extrait de bouillon végétal concentré  
achloruré et bromuré.

**Tablettes et liquide.** — 1 tablette ou  
1 mesure = 1 gr. Na Br.

**Mode d'emploi et doses.** — Adultes :  
1 à 5 tablettes ou mesures par jour.

*Enfants* : 1/2 à 2 tablettes ou mesures par  
jour, selon l'âge.

Dans une tasse d'eau très chaude, on verse  
une ou deux mesures de *Sédobrol « Roche »*  
liquide où on fait dissoudre une ou deux  
tablettes : on prépare ainsi instantané-  
ment un bouillon particulièrement savou-  
reux que l'on peut prendre à n'importe  
quel moment de la journée.

**Propriétés Thérapeutiques.** — Médica-  
ment sédatif, hypnotique et calmant  
donnant des résultats certains et permet-  
tant d'imposer un *traitement bromuré*  
intensif *dissimulé*, tout en rendant agréa-  
ble le régime déchloruré.

**Indications Thérapeutiques.** — Insom-  
nies, névralgies, excitabilité, irritabilité,  
gastralgies, dyspepsies, palpitations, car-  
diopathies, migraines, spasmes, convul-  
sions, chorée, névroses, épilepsie, etc.

### PRODUITS

**F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>te</sup>**

21, place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

## SEDOGASTRINE

**Sédatif gastrique.**

**Formes.** — Granulé, comprimés (avec bonbonnière de poche).

**Composition.** — 1° *Substances neutralisantes :*

Hydroxyde de magnésium. Carbonate de calcium léger, précipité à froid.

2° *Substances modératrices de la sécrétion :*  
Phosphate de sodium, Phosphate de calcium.

3° *Substance calmante et antispasmodique :*  
Poudre de Ciguë à dose inoffensive, mais suffisamment active.

**Propriétés thérapeutiques :**

Sédation des phénomènes douloureux gastriques.

Réparation de la muqueuse de l'estomac.

Pas de constipation.

Pas d'accoutumance.

**Indications.** — Hypersécrétion.

Hyperacidité.

Dyspepsies douloureuses.

Spasmes.

Ulcères.

**Posologie.** — Après les repas et au moment des douleurs, prendre :

Granulé : une cuillerée à café.

Comprimés : deux à quatre jusqu'à sédation.

Prix : 12 fr. 50.

**Laboratoires du Docteur ZIZINE**

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie  
Ex-interne en Pharmacie — Lauréat des  
Hôpitaux. — Lauréat des Fac. de Méd. de Paris  
et Bordeaux.

24 et 26, rue de Féamp — PARIS (XII<sup>e</sup>).

Tél. : Diderot 28-96.

## SÉDOL

Association Scopolamine-Morphine.

**Mode d'emploi et dose.** — 1° **Ampoules** : 1 à 2 injections hypodermiques par 24 heures ;

2° **Suppositoires** : 1 à 2 « supposédol » par 24 heures.

**Propriétés thérapeutiques.** — Beaucoup plus actif que la morphine à dose égale.

**Indications.** — Phénomènes douloureux, Insomnies douloureuses, Cancers, Spasmes, Crises tabétiques, Maladie de Parkinson, Anesthésie chirurgicale, Accouchements, etc.

Prix de vente au public :

La boîte de 12 ampoules : 25 fr.

La boîte de 6 ampoules : 18 fr.

La boîte de 6 supposédol : 25 fr.

Prix médical :

La boîte de 12 ampoules : 16 fr. 90.

La boîte de 6 ampoules : 12 fr. 15.

La boîte de 6 supposédol : 16 fr. 90.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

*Pierre BRETEAU, Pharmacien*  
Membre de l'Académie de Médecine  
157, rue de Sèvres — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

**SEDONEUROL DEHAUSSY**

« Calme sans déprimer ».

**Composition.**

Phényléthyl malonylurée, Tartrate borico-potassique, Atropine.

*Comprimés jaunes* : Correctifs + Caféine  
0,025.

*Comprimés roses* : Correctifs + Caféine,  
0,015 + Strychnine, 0,0002.

Médication synergique permettant un effet thérapeutique équivalent. Dose moindre de phényléthyl malonylurée. Evite l'action dépressive de ce produit grâce aux correctifs.

Administer 8 jours les comprimés jaunes ;  
8 jours les comprimés roses pour éviter l'accoutumance aux correctifs.

Formule, posologie et indications établies d'après les travaux de Pierre Marie, Crouzon, Bouttier, Carrière, etc.

**Indications.**

**États spasmodiques.** — Traitement de choix de l'*Epilepsie* dans toutes ses formes. — *Maladie de Parkinson* et *Parkinsonisme*. — *Asthme rebelle*.

**Etats d'instabilité nerveuse.** — *Insomnies rebelles*, *Anxiété*, *Instabilité des basedowiens* et des *hypertendus*, *Prurits séntls*.

**Algies paroxystiques.** — *Migraine, Angine de poitrine.*

**Enfants et nourrissons.** — Toutes les manifestations spasmodiques de l'épilepsie, du croup, des *laryngites striduleuses et aiguës, toux persistante des broncho-pneumonies, coqueluche, tétanie, états convulsifs, chorées, tics, vomissements spasmodiques du nourrisson, etc.*

### **Posologie.**

**Epilepsie.** — Doses progressivement croissantes jusqu'à suppression des crises. Commencer par quatre comprimés chez l'adulte, deux comprimés à cinq ans.

### **Autres indications.**

*Adultes*, dose moyenne entre 4 et 8 comprimés. — *Enfants*, 1/2 comprimé par année d'âge. — *Nourrissons* (tolérance parfaite), 1/2 comprimé jusqu'à six mois, un comprimé de six à douze mois en deux prises.

(Un comprimé = 2 centigrammes et demi de phényléthyl malonylurée.

---

**Laboratoire DEHAUSSY**

66, rue Nationale

LILLE.

## SEDORHINOL

Médication décongestive et antiseptique des voies respiratoires supérieures.

Pommade nasale, Inhalation, Bains de gorge.

**Indications.** — Coryzas, rhinites, sinusites, adénoïdites, angines et amygdalites, laryngites, rhino-bronchites, otites.

**Trois formes.** — A) *Sedorhinol mixte*, comprend dans une même boîte :

1° Un tube de pommade nasale (canule) baume semi-liquide : adrénaline huileuse, stovaine benzoate de soude, essences aromatiques.

2° Comprimés inhalants : association d'essences de plusieurs espèces aromatiques (thym, romarin, lavande, menthe), bicarbonate et perborate de soude.

Ces comprimés solubles entièrement et progressivement en 4/5 minutes dans de l'eau à 75° permettent une inhalation et un bain de gorge, à la demande.

B) *Pommade de Sedorhinol* : seul baume nasal pour antiseptie et décongestion des fosses nasales, pré et post-opératoire.

C) *Comprimés de Sedorhinol* : Séparément employés pour inhalations, bains de gorge et de bouche (toutes affections de la muqueuse bucco-pharyngée).

**Laboratoires A. REGAGNON et Cie**

276, rue Lecourbe — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Tél. : Vaugirard 26-30.

---

**SÉDORMID « ROCHE »**

Allylisopropylacétylcarbamide.

(Chaque comprimé est dosé à 25 centigr.)

**Propriétés :**

Sédatif hypnogène doux et inoffensif, très maniable ; ne s'accumule pas.

**Indications :**

Toutes les Insomnies légères de quelque nature qu'elles soient ; Anxiété, Mélancolie, Symptômes hypernerveux, etc.

**Doses et mode d'emploi :**

Dose sédatif : 2 à 3 comprimés dans la journée.

Dose hypnogène : 1 à 2 comprimés au coucher.

Boîte de 20 comprimés.

**Produits**

**F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**

21, place des Vosges

PARIS (III<sup>e</sup>).

## SÉDOSINE

### Solution

**Sédatif à action élective  
sur le système neuro-végétatif.**

#### **Association synergique hyperactive :**

Dans la *Sédosine*, l'action antispasmodique bien connue de la *Jusquiame* se trouve considérablement renforcée par la présence de la *Passiflore* et du *Cratægus*, l'association de ces principes végétaux permettant d'obtenir un effet notable avec une dose réduite de *Jusquiame* (H. Leclerc).

Le mode d'association médicamenteux n'a, comme on sait, nulle part ailleurs, autant d'importance que lorsqu'il s'agit du *Sympathique* (Expériences de Danielopolu, de Garrelon, Santenoise et Tinel).

La *Sédosine*, à l'encontre des hypnotiques, agit par un véritable processus de détente et sans recourir à l'intoxication de la cellule nerveuse.

#### **Indications :**

Etats spasmodiques. Excitation nerveuse. Insomnie. Neurasthénie. Psychasthénie. Mélancolie.

#### **Posologie :**

*Contre l'insomnie* : 2 à 3 cuillerées à café prises en une seule fois avant de se coucher.

*Sédatif nerveux* : Dose moyenne : 1 à 3 cuillerées à café ou davantage dans le courant de la journée, suivant tolérance du malade.

La *Sédosine* se prend en nature ou mieux dans un peu de tisane.

**Laboratoires LICARDY**

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS.

Téléphone : Maillot 17-75.



## SELAMON

---

Voir : **Magnétone**

page 609.

---

## SEL DE HUNT

Alcalin type.

Régulateur normal de l'Acidité gastrique et des Fonctions digestives.

**Indications.** — Dyspepsies, Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Hyperacidité, Fermentations acides de l'Hyper et de l'Hypo-Chlorhydrie.

**Forme.** — Granulé friable.

**Posologie.** — Une à une cuillerée et demie à café dans 1/2 ou 1/4 de verre d'eau. Pour les légers malaises ne nécessitant que de petites doses, on peut à la rigueur prendre le *Sel de Hunt* à sec.

Prix au public : 9 fr. 50 le flacon.

Laboratoire **ALPHONSE BRUNOT**

16, rue de Boulainvilliers — PARIS.

Téléphone : Auteuil 20-21.

## SEL D'EWALD

Médication alcaline, sédative des douleurs d'estomac.

Le Sel d'Ewald se présente sous la forme d'un granulé assimilable, de saveur agréable, constitué par un mélange de : Citrate de soude, Kaolin, Carbonate de Bismuth, Carbonate de Chaux et Magnésie.

Le Sel d'Ewald trouve son application dans le traitement des : Gastralgies, Dyspepsies douloureuses, Hyperchlorhydrie, Fermentations acides, Ulcères de l'Estomac, Spasmes, Pyrosis, Vomissements de la grossesse.

**Mode d'emploi** — Une cuillerée à café de granulé délayé dans un quart de verre d'eau ou de lait après les repas ou bien au moment des crises.

Le Sel d'Ewald ne contenant aucun toxique est absolument inoffensif et il ne constipe pas.

**BRACQUEMOND et Cie,**  
**Docteurs en Pharmacie**

105, rue de Normandie — COURBEVOIE (Seine).

---

## SELENIOL

**Description.** — Complexe colloïdal électrique à base de sélénium en ampoules de 3 cmc. (4 par boîte).

**Action thérapeutique.** — Le Sélénol est une solution limpide de couleur brune; sous cette forme il n'est pas toxique et possède une affinité notable pour les cellules néoplasiques dont il provoque la liquéfaction, il améliore les troubles fonctionnels et relève l'état général.

**Indications.** — 1 à 3 ampoules par semaine en injections intramusculaires profondes ou intraveineuses, dans le traitement des affections cancéreuses, soit seul, soit associé à la Cytuline Couturieux.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**  
18, avenue Hoche — PARIS.

# SEL HÉPATIQUE U. N. ARQUEVAUX

**Composition.** — Complexe alcalin hypersolvant de l'acide urique.

**Forme.** — Poudre blanche entièrement soluble.

**Propriétés thérapeutiques.** — Insuffisance hépatique. Lixiviation de l'organisme par osmose isotonique ; action désincrustante décuplée analogue à celle des stations thermales de Carlsbad, Contrexéville, Bagnoles. Dissolvant de l'acide urique, éliminateur de toxines. Laxatif. Stimulant des fonctions de l'estomac, du pancréas, du foie, des reins et de l'intestin. Régulateur du métabolisme physiologique.

**Indications.** — Arthritisme, Traitement des troubles dus à l'acide urique (Rhumatisme, Goutte, Gravelle, Névralgies, Lumbago, Sciatique, etc.), de l'Artério-sclérose, des Phlébites et troubles trophiques, de la Constipation. Anti-acide. Anti-rhumatismal. Lithiases hépatique et rénale.

**Posologie.** — Une cuillerée à café rase (5 grammes) dans 200 grammes d'eau, de préférence très chaude à prendre le matin à jeun 25 jours de suite.

Le flacon : 15 fr. (pour 25 jours de traitement)  
Sans impôt.

**Laboratoires L. ARQUEVAUX**   
Pharmacien à ETAMPES (S.-et-O.).

**Dépôts:** Office commercial pharmaceutique,  
à Paris, et ses succursales de Bordeaux, Dijon,  
Lille, Lyon, Nice, Rennes, Rouen, Troyes, etc...

**Comptoir National de la Pharmacie française**  
47, rue Bonaparte — PARIS.

**Établissements GILBERT et RIPERT**  
MARSEILLE, NICE, TOULOUSE

**Drogueries THIRIET et C<sup>ie</sup>**  
26 et 28, rue des Ponts — NANCY.

## SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS

Le Perdriel.

**Nature.** — Sels de Lithine.

**Action.** — Les sels de Lithine, en opérant sur le foie, tarissent à la source même la production de l'acide urique en modifiant la nutrition troublée.

**Indications.** — *Carbonate*, rhumatisme, goutte, *Benzoate*, coliques néphrétiques, gravelle, coliques hépatiques, albuminurie, diabète. *Salicylate*, rhumatisme articulaire, rhumatisme chronique. *Glycérophosphate*, diathèse arthritique goutteuse, accompagnée de neurasthénie, possède en même temps les propriétés reconstituantes de l'acide glycérophosphorique. *Bromhydrate*, sédatif par le brome. Par la lithine dissout l'acide urique et les urates alcalins. *Citrate*, diathèse rhumatismale.

**Posologie et mode d'emploi.** — Chaque flacon de sels de Lithine est surmonté d'un bouchon-mesure qui contient 20 centigrammes de principe actif. Faire prendre dans de l'eau sucrée ou non, ou dans de la bière ou du lait.

**Laboratoires LE PERDRIEL**  
11, rue Milton — PARIS (IX<sup>e</sup>).

---

## SELS DU JURA

Produits thérapeutiques naturels pour le traitement  
à domicile :

### EAUX MÈRES CRISTALLISÉES DU JURA « Gynécomer ».

Forme : Cristaux.

**Propriétés thérapeutiques.** — Résorption des exsudats et engorgements, décongestion et mobilisation des organes, correction des déplacements vicieux, élimination des produits pathologiques.

**Indications.** — Traitement des Métrites et Salpingites subaiguës et chroniques, Fibrômes, Déviations utérines, Cellulites pelviennes, Troubles menstruels, suites de Couches.

**Doses.** — 1 à 4 cuillerées à soupe par litre d'eau bouillie, chauffée à 38-40° C, à prendre en irrigation vaginale, à faible pression, dans la position allongée à observer encore 1 heure après.

Prix : 15 francs la boîte.

### SELS POUR BAINS « Jurbainsel ».

Forme : Cristaux.

**Propriétés thérapeutiques.** — Augmentation des échanges moléculaires, activation de la vie cellulaire, action modificatrice sur le milieu sanguin et lymphatique.

**Indications.** — Anémie, Débilité, Rachitisme, Lymphatisme, chez les enfants.

Asthénie, chez les adultes.

**Doses.** — 10 à 20 grammes par litre d'eau chauffée à 36° C au maximum, pour un bain de 10 à 20 minutes.

Prix : 12 francs le paquet.

#### Compresses.

Pour les compresses, reconstituer les eaux mères liquides en faisant dissoudre les sels « Gynécomer » dans 3 fois leur volume d'eau tiède.

Dépôt : 11, avenue de l'Opéra, Paris.

#### Sels du Jura

11, avenue de l'Opéra — PARIS.

Tél. : Gut. 34-43, Cent. 01-25.

## SELUNIC

**Sel de fruits. Sel de santé.**

**Composition.** — Sels de soude, formant, à l'addition d'eau, un citro-tartrate de soude. Une cuillerée à café dans un verre d'eau représente environ 5 grammes de tartrate de soude.

**Forme.** — Poudre blanche granulée très fine, sans aucun goût ni parfum et ne contenant aucun sel minéral.

**Propriétés.** — Régulateur simple et efficace de la Santé, son effet repose sur les propriétés bienfaisantes des fruits frais.

**Indications et mode d'emploi.** — **Maladies du foie et des intestins.** Une cuillerée à café dans un verre d'eau à jeun.

**N. B.** — Plus l'eau sera chaude, plus l'action sera rapide.

**Estomac, impuretés du sang, maux de tête.** — Une cuillerée à café dans un verre d'eau une demi-heure après les repas.

**État bilieux, indigestion, excès de table.** — Une cuillerée à dessert en se couchant, renouvelée le matin au réveil.

**Désaltérant et rafraîchissant.** — Contre la soif, état fiévreux, etc... Presser une tranche de citron dans un verre d'eau et y faire couler une cuillerée à café. Boire par gorgées.

Des doses proportionnées en feront pour les enfants un moyen agréable de remédier à leurs petits maux.

**Obésité.** — Une cuillerée à café dans de l'eau tiède, matin et soir, combat l'embonpoint et aide à conserver au corps sa souplesse naturelle.

**Comme breuvage.** — Dans l'eau : en fait une boisson hygiénique et désaltérante.

Dans le vin et le cidre : une pincée combat l'excès d'acidité, et produit une boisson de table pétillante.

**Présentation.** — En flacons de 200 grammes : 20 fr. Le modèle « Week-End » de 60 grammes est réservé à l'usage personnel des praticiens, auxquels il est offert gracieusement.

**Préparé par : Georges MIQUEL**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, 3, avenue Lowendal — PARIS.

## LE SENOPHILE

**Calme toutes les irritations.**

**Préventif et curatif**

de toutes les inflammations épidermiques, il est particulièrement recommandé :

Chez *l'enfant*, contre :

Rougeurs des Nouveau-nés, Gourme, Croûtes de lait, Eczéma infantile.

Chez *l'adulte*, contre :

Crevasses des seins, Brûlures, Escarres fessières, Urticaire-Zona, Gerçures des mains, Coups de soleil, Ulcères variqueux, Intertrigo.

Laver à l'eau tiède, sécher, enduire 2-3 fois par jour et recouvrir de gaze hydrophile.

Le Senophile est sans aucun danger pour les yeux, il a même été employé avec succès dans la blépharite.

**Les Laboratoires BRUNEAU et C<sup>o</sup>**

17, rue de Berri — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

## SÉPHYDINE

**Composition.** — La Séphydine est une solution, dans le sérum physiologique, de chlorure de zinc réagissant en milieu acide sur la formaldéhyde. Médicament non irritant jouissant de propriétés particulières vis-à-vis de la peau et des muqueuses.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action antiseptique et stérilisante sur la peau et les muqueuses, action microbicide puissante sans aucune irritation. Action conservatrice de l'intégrité de la cellule épidermique par saturation des liquides humoraux et par excitation des phénomènes biologiques de défense contre l'infection. En raison de ses propriétés excitantes sur la phagocytose, la Séphydine constitue un excellent réparateur des lésions cutanées et des muqueuses, action désodorisante très grande.

### Indications :

*Dermatologie :* Folliculites, furoncles, anthrax, panaris, acnés, érysipèles, ulcères variqueux et cancéreux, alopecie, pelade, sueurs fétides.

*Obstétrique :* Infections puerpérales.

*Gynécologie :* Vulvites, vaginites, métrites, cancer utérin.

*Vénérologie :* Blennorrhagie, chancre mou, balanite.

*Stomatologie :* Gingivite chronique, granulations de la bouche, angines, fétidité de l'haleine.

*Oto-Rhino-Laryngologie :* Otite, coryza (guérison très rapide de cette affection), laryngite.

### Posologie :

Dilution pour injections, lavages locaux : 1 cuillerée à café par litre d'eau.

Dilution pour gargarismes, lavage de nez et des oreilles : 2 cuillerées à café par litre.

Dilution pour lavage de l'urètre : 3 cuillerées à café par litre.

Dilution pour pansements (chancre mou) : 4 cuillerées à café par litre.

Dilution pour ulcères variqueux, anthrax, panaris, désodorisation des pieds et des aisselles : 5 cuillerées à café par litre.

Dilution pour frictions du cuir chevelu : 1 cuillerée à café de Séphydine pour 5 d'eau.

Dilution par attouchements pour piqures d'insectes, (moustiques, guêpes, etc.) : 1 cuillerée à café de Séphydine pour 3 d'eau.

**Laboratoire Séphyda.**

**PUAUX, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
CHABEUIL (Drôme).**



## SEPTICÉMINE CORTIAL

**Composition.** — Di-formine iodobenzo-méthylée, cristallisée, dialysable, injectable, atoxique, *indolore*. Aucune réaction locale ou générale.

**Propriétés.** — Antisepsie intégrale, interne et externe, diffusion extrême jusque dans le liquide céphalo-rachidien (Maloëns). Chute de la température, régulière, complète, définitive. Microbicide et antitoxinique ; éliminateur hépatique et rénal.

**Indications.** — **Infections aiguës médicales :** Grippe, encéphalite, broncho-pneumonie, fièvre typhoïde et paratyphoïde, Entérites aiguës, Fièvres éruptives, Paludisme, Affections rhino-pharyngées.

**Infections Chirurgicales :** Septicémies, pyohémies, infections puerpérales. Pyélonéphites, Appendicite, Erysipèle, Anthrax, Ostéomyélites, Péritonites tuberculeuses.

**Forme.** — Ampoules de 4 cc. et 10 cc.

**Dose.** — Septicémies à marche rapide : 10, 20 cc. dans les 24 h. Septicémies à marche lente : 4 à 10 cc. dans les 24 h.

S'emploie aussi en applications locales et pulvérisations. Pure et étendue d'eau. Urologie, Gynécologie, Suppurations, Tumeurs ouvertes, Ulcérations de l'amygdale, Rhinites.

Stomatologie : pulvérisations alvéolaires et gingivales, injections intra-gingivales, circonscrivant le foyer infectieux.

**Laboratoires CORTIAL**

15, boulevard Pasteur — PARIS.

## SERIFER LAURENCON

*Traitement des déficiences sanguines par le fer  
vitalisé rendu assimilable après absorption par des  
Levures vivantes.*

**Composition.** — Ions fer et manganèse, Sérum de cheval, Hormones antianémiques de foie frais, Arsenic organique.

**Indications.** — Toutes déficiences sanguines, Anémies diverses, Chlorose, Lymphatisme, Etats hémorragiques, Suite d'Opérations, Paludisme.

**Forme.** — Délicieux granulé chocolaté.

### **Posologie :**

*Adultes :* 2 ou 3 cuillerées à café par jour avant les repas.

*Enfants :* Demi-doses.

**Laboratoire d'Actino-Biologie**

**J. LAURENCON, Pharmacien**

Professeur de Chimie et Pharmacologie

16, rue de la République  
VILLEFRANCHE (Rhône).

---

## **SÉRO-COMPRIMÉS MÉRIEUX**

### **Composition :**

A base de sérums polyvalents antidiph-térique, streptococcique, staphylococcique, de l'Institut biologique Mérieux, Lyon.

### **Indications :**

Préventivement : dans tous les cas de contagion ou d'irritation de la gorge.

Curativement : dans le traitement local des diverses angines.

### **Mode d'emploi :**

Prendre toutes les heures et le soir au coucher, 1 à 2 comprimés qu'on laissera fondre lentement dans la bouche en évitant l'absorption trop voisine de liquides ou aliments.

Prix du flacon de 40 compr. : 14 francs.

**S. SAVIGNEUX**

Dépositaire général.

63, rue Victor-Hugo — LYON.

## SERODAUSSÉ ANTITOXISENYL

(Sérum activé de taureau.)

Ce sérum contient les hormones circulantes des jeunes animaux mâles et les anticorps des poisons séniles.

**I** Le médicament est indiqué contre l'asthénie des personnes âgées ; il améliore leur capacité de travail physique et intellectuel et produit une orientation de leur caractère vers l'optimisme.

**II** Il s'administre tous les mois, pendant six jours consécutifs, à la dose quotidienne d'une ampoule dans un demi-verre d'eau sucrée ou non, 30 minutes avant le petit déjeuner. Chez certains sujets, une dose de 3 ampoules prises à jour passé est suffisante.

## SERODAUSSÉ OVARIEN

(Sérum activé de Génisse.)

Ce sérum contient, comme le précédent, les hormones circulantes des jeunes animaux femelles et les anticorps des poisons de Carrel.

**II** Il est indiqué contre l'asthénie des femmes âgées et contre les troubles de la ménopause physiologique, chirurgicale ou radiologique. Chez les femmes en état de déficit ovarien, il fait disparaître les bouffées de chaleur, les vertiges et les sueurs.

Même posologie, même mode d'emploi que le Séro-dausse Antitoxisenyl.

## SERODAUSSÉ INFANTILE

(Sérum de jeune bovidé en croissance.)

Ce sérum contient les facteurs internes de la croissance. Il produit une augmentation de la taille et du poids chez les enfants dont le développement est retardé.

**II** Il s'administre tous les mois, pendant 5 à 10 jours consécutifs, à la dose quotidienne d'une ampoule le matin à jeun, 30 minutes avant la première prise d'aliments, dans un quart de verre d'eau sucrée.

**Laboratoires DAUSSE**

4, rue Aubriot — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## SÉROLÉINE GRANULÉE BARON

**Forme.** — Granulé parfaitement toléré par les estomacs les plus délicats.

**Composition.** — Sels de Gaïacol et sels de chaux assimilables.

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant modificateur des sécrétions bronchiques ; désinfecte et assèche rapidement les lésions pulmonaires. Reconstituant général.

**Indications.** — Toutes les affections des voies respiratoires, tuberculose pulmonaire, osseuse et ganglionnaire.

**Posologie.** — Trois cuillerées à café par jour dans un peu de lait entre les repas. Demi-dose pour les enfants en dessous de 14 ans.

Prix : 18 francs le flacon.

Littérature et échantillons :

**Laboratoires BARON**

LES SABLES-D'OLONNE (Vendée).

---

## SÉROMA REY

Sérum **granulé**, activé, total.

### Composition :

100 gr. de Séroma contiennent :

Sérum normal d'équidés.....	90 gr. 90
Calcium .....	0 gr. 05
Fer .....	0 gr. 30
Manganèse .....	0 gr. 15

**Préparation.** — Sérum total de sang d'équidés soumis à une saignée unique, scientifiquement traité, stérilisé sans coagulation, rendu atoxique, stabilisé par dessiccation et activé par des co-ferments minéraux.

**Indications.** — Surmenage, Fatigue cérébrale, Chocs moraux, Dépression, Hémorragies, Hémophilies, Hémoptysies. Dans les Affections chroniques, quelle que soit leur nature (tuberculose, cancer, paludisme, etc.), adjoint à la thérapeutique appropriée, il permet à l'organisme de résister, ainsi que dans toutes les maladies infectieuses.

### Doses moyennes :

*Adultes* : 1 cuillerée à café de granulé deux fois par jour, un quart d'heure avant les repas.

*Enfants* : demi-doses.

Prix : 16 fr. 80 le flacon  
(pour une dizaine de jours de traitement).

**Laboratoires REY**

(Ludin) — DIJON.

*Séroma contient près de son poids  
de sérum activé.*

## SÉROQUINOL INJECTABLE

Paludisme.

Traitement d'attaque des accès.

**Composition :** Chaque ampoule « A » contient :

Bibromhydrate basique de Quinine (Codex 1908).....	0 gr. 50
Antipyrine .....	0 gr. 40
Cacodylate de soude.....	0 gr. 10
Glucose .....	0 gr. 10
Eau distillée .....	5 cent. cubes

### Forme :

Boîtes « A » — pour adultes — 6 amp. de 5 cc.

Boîtes « B » — pour enfants — 6 amp. de 2 cc.

Boîtes « DD » — pour adultes — 6 amp. de 5 cc. (double dose).

Boîtes « IV », intraveineux, 6 amp. de 20 cc.

En injections intramusculaires ou sous-cutanées.

Absolument indolores (ne provoquant ni abcès, ni Eschares).

Tolérance parfaite, très grande diffusibilité.

1 à 2 ampoules par jour, suivant la gravité des accès, l'âge et le poids des malades.

Dépôt général pour la France :

**Pharmacie centrale de France.**

21, rue des Nonnains-d'Hyères — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## SÉRO-SÉRUM RIVIER

Tonique. — Hémopoiétique. — Hémostatique  
Rigoureusement désalbuminé.

Chaque préparation passe par un double service de contrôle.

Injectable, sans risque d'anaphylaxie.  
Contient la totalité des éléments sériques (lipoides, hormones, etc.), sauf les albumines.

Injection indolore.

Ampoules de 2 cc. représentant 5 cc. de sérum frais de cheval.

1 à 4 ampoules par jour, suivant la gravité des cas et l'urgence.

**Laboratoires RIVIER**

26 et 28, rue Saint-Claude — PARIS.

## SÉRUM ANTI-ASTHMATIQUE

### de HECKEL

**Composition.** — Le Sérum de Heckel a pour base un extrait organique pur des glandes surrénales stabilisé dans un liquide isotonique.

**Mode d'emploi.** — Au moment de la crise, une injection sous-cutanée d'une demi-ampoule ou d'une ampoule.

**Action.** — L'excitation du pneumo-gastrique spasme les bronches et cause la crise d'asthme. Le sérum de Heckel, en excitant le grand sympathique, annihile l'action du pneumogastrique et le spasme cesse.

**Indications.** — Toutes les formes d'asthme, au moment des crises. Il est contre-indiqué chez la femme au terme de sa grossesse, et chez les cardiaques en imminence d'asystolie.

**Présentation.** — Sérum de Heckel pour adultes. 12 ampoules de 5 centicubes.

Prix : 22 francs.

Sérum de Heckel infantile, 12 ampoules de 2 centicubes.

Prix : 16 francs.

**Laboratoires pharmaceutiques CORBIERE**

27, rue Desrenaudes — PARIS. — Tél. : Carnot 78-11.

## SÉRUM DE JOUSSET

Toxines naturelles du bacille de Koch.

Combat l'infection mais non les lésions.

**Traitement de choix à la période initiale**, nuisible dans la tuberculose devenue phtisie. **Convient surtout aux enfants et adolescents.** Tuberculoses aiguës ou subaiguës, hémoptysies.

**Si après une semaine d'observation** la courbe de température apparaît régulière et peu oscillante on devra aborder la sérothérapie. Température irrégulière oscillations dépassant 2° est une contre-indication formelle.

**Posologie.** — Injection hypodermique face antérieure de la cuisse. Environ 3 cc. par kg. du poids du sujet en 3 injections à 2 jours d'intervalle (voir notice explicative, page 8). Ne pas oublier fortes doses salicylate si asthralgies le douzième jour.

**Contre-Indications.** — Asthmatiques, emphysémateux.

Demandez notice explicative aux

**Les Laboratoires BRUNEAU et Co**

17, rue de Berri — PARIS (VIII°).



## **SÉRUM FERRUGINEUX FRAISSE**

### **Composition :**

Glycérophosphate de Soude: 0 gr.10; Cacodylate de Fer: 0 gr. 01; Cacodylate de Strychnine: 1/2 milligr., pour 1 cc. d'eau distillée.

### **Indications :**

Dynamogénique puissant : spécifique des anémies et de la chlorose.

### **Formes :**

- 1<sup>o</sup> En ampoules, boîtes de 12 ampoules : 18 francs.
- 2<sup>o</sup> En gouttes, prix du flacon : 14 francs.

### **Laboratoires FRAISSE**

8, rue Jasmin, — PARIS.

---

## **SÉRUM HYPOTENSIF FRAISSE**

### **Composition :**

Extrait de gui : 0 gr. 05.  
Nitrite de Soude : 0 gr. 01.

### **Indications :**

Contre l'hypertension artérielle, l'artériosclérose.

### **Formes :**

- 1<sup>o</sup> En gouttes, prix du flacon : 14 francs.
- 2<sup>o</sup> En ampoules, boîte de 12 ampoules : 18 francs.

### **Laboratoires FRAISSE**

8, rue Jasmin — PARIS.

## SÉRUM NEUROPSYCHIQUE

**Ampoules.**

**Propriétés thérapeutiques.** — Préparation tonique et reconstituante injectable. Contre tous les cas d'anémie, dépression nerveuse, surmenage physique intellectuel, neurasthénie.

**Forme.** — Ampoules injectables.

**Mode d'emploi.** — 1 ampoule par jour.

**Formule.** — Glycérophosphates composés, cérébrine et moelle.

Prix de la boîte de 12 ampoules, au public :  
20 francs.

**Laboratoire HOCQUETTE**

191, rue du Faubourg-St-Antoine — PARIS.

Tél. : Diderot 04-71.

---

## SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

### **Composition :**

Glycérophosphate de Soude : 0 gr. 10 ;  
Cacodylate de Strychnine : 1/2 milligr. ;  
pour un cc. d'eau distillée.

### **Indications :**

Dynamogénique puissant. Active la phagocytose. S'emploie dans l'adynamie et la neurasthénie.

### **Formes :**

1° En ampoules, boîte de 12 ampoules :  
18 francs.

2° En gouttes, prix du flacon : 14 francs.

**Laboratoires FRAISSE**

8, rue Jasmin, 8 — PARIS.

## SÉRUM NORMET

### Chirurgical.

**Composition.** — Préparation à base de citrates métalliques (calcium, sodium, magnésium, fer et manganèse).

**Présentations.** — Ampoules de 20 cc. (boîte de 2).  
Ampoules de 10 cc. (boîte de 4).

**Indications.** — Grandes hémorragies, métrorragies, états de shock.

**Mode d'emploi.** — Par injections intraveineuses en solution à raison de 20 cc. de Sérum Normet dilués dans 1 litre de sérum physiologique (chlorure de sodium à 7 p. 1 000).

Prix : 20 francs la boîte.

---

## SÉRUM NORMET

### Médical.

**Composition.** — Préparation à base de citrates métalliques (les mêmes que ci-dessus, mais avec une très faible proportion de manganèse).

**Présentations.** — Ampoules de 15 cc. (boîte de 6).  
Ampoules de 5 cc. (boîte de 12).

**Indications.** — Anémies graves, hypotension, myocardites, hémophilie, états infectieux.

**Mode d'emploi.** — En injections hypodermiques, 1 à 15 cc. En goutte à goutte rectal après dilution dans du Sérum physiologique, à raison de 20 cc. par litre de sérum. En injections intraveineuses (non dilué) à raison de 1/2 à 5 cc. et plus, en surveillant la réaction du sujet.

Prix : 25 francs la boîte.

**Établissements T. LECLERO**

D<sup>r</sup> P. LEMELAND, pharmacien.  
10, rue Vignon — PARIS.

# SÉRUM-VÉGÉTAL

du Docteur CUGUILLIERE (antituberculeux)

## Composition :

Essences d'ail finement distillées et indolores, sels de chaux d'origine végétale, diastases vivantes soufrées.

## Références scientifiques :

*Expérimentation* sur des bovidés sous le haut patronage de M. le marquis de Castellane et sous le contrôle de l'éminent vétérinaire M. Faure, guérisons reconnues à l'examen anatomopathologique par le professeur H. Martin-Roux (hôpital Bichat à Paris).

Académie de médecine (séance du 10 mars 1908). Travail scientifique : *Guérison de la tuberculose par l'ail*. En vente : Librairie Norbert Maloine, 27, rue de l'Ecole-de-Médecine, à Paris.

**Indications.** — Le sérum est indiqué dans toutes les formes de tuberculose, néanmoins il doit être employé avec la plus grande prudence dans les tuberculoses pulmonaires, et son emploi doit être arrêté en périodes hémoptoïques.

Il donne des résultats tout à fait satisfaisants dans les tuberculoses pulmonaires, mais c'est toujours particulièrement dans les tuberculoses osseuses même prises très tard avec mauvais état général et fistulisations qu'il donne des guérisons aussi merveilleuses qu'inattendues.

Dans le courant de l'année 1929, 280 médecins français et de nombreux médecins étrangers sont venus nous dire leur profonde reconnaissance pour les guérisons qu'ils avaient obtenues par l'emploi du sérum.

## Posologie :

Le sérum existe sous 3 formes : Ampoules à 5 cc. (adultes). Ampoules à 2 cc. 1/2 (enfants), et sirop où le sérum est mélangé à du sirop iodotannique et à de l'arrhénal.

Le sérum végétal du Docteur Cuguillière ne possède aucune toxicité et est employé depuis 21 années avec le plus grand succès par les plus éminents praticiens.

Dans les formes chroniques : *Enfants* : une injection de 2 cc. 1/2 par semaine, et une cuillerée à café de sirop par jour. *Adultes* : une injection de 5 cc. par semaine et une cuillerée à soupe de sirop par jour.

Dans les formes aiguës : *enfants* : 2 injections de 2 cc. 1/2 par semaine et 2 cuillères à café de sirop par jour. *Adultes* : 2 injections de 5 cc. par semaine et 2 cuillerées à soupe par jour.

Arrêter le traitement par le sérum en période d'accidents congestifs.

Échantillons et ouvrage *Guérison de la tuberculose par l'ail* (200 pages, édité par la librairie Norbert Maloine) tenu gracieusement à la disposition de Messieurs les Docteurs qui ne connaissent pas encore le sérum.

**Laboratoires CUGUILLIERE**

19, rue des Chalets — TOULOUSE (France).

## SETI

Ampoules jumelées. Soufre et Iode.

**Propriétés thérapeutiques.** — Les ampoules SETI, l'une contenant la solution soufrée, l'autre la solution iodée, associent deux médicaments héroïques de la diathèse rhumatismale ; ce qui permet d'injecter une quantité de soufre beaucoup plus grande, qu'on ne pouvait le faire jusqu'à ce jour.

**Indications.** — Rhumatismes chroniques, Arthrites déformantes, Sciatique. Lumbago.

**Mode d'emploi.** — Mélanger dans la seringue les 2 ampoules au moment de l'emploi, et agiter jusqu'à décoloration.

Faire une injection intramusculaire toutes les 48 heures, suivant la technique indiquée.

Prix au Public : 22 francs.

**Laboratoires P. BRISSON et Cie**

157, rue Championnet — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

---

(Nouveauté 1931)

## SICCOGYNE

B. S. G. D. G. (Brevet Dr Ackermann.)

**Constitution.** — Tampon vaginal à la fois absorbant, antiseptique, auto-introducible, non-traumatisant : constitué par une gargousse fusible antiseptique, renfermant un pansement hydrophile antiseptique et stérile, et munie d'un fil de préhension.

**Indications.** — Métrorragies, Pertes blanches, Hydrorrhée thermique, Menstruations pénibles, Suintement séreux post-thérapeutique, Vaginites, Blennorragie vaginocervicale, Fistules recto-vaginales (traitement d'attente), Prélèvement et identification des écoulements, Certaines descentes vaginales et déviations utérines.

**Présentation.** — Boîtes de 6 tampons en 3 tailles différentes :

P 19 m/m de diamètre.

M 26 — — —

G 33 — — —

### Prescrire :

Suivant cas particulier. Spécifier l'antiseptique : Chloroxyl, (chloramine sodique du toluène), Créoline, etc... ou tous autres antiseptiques sur demande.

Un tampon peut sans inconvénient rester en place de 8 à 10 heures au moins.

Etablissements Pharmaceutiques

JACQUES MIDY

41, rue de Courbevoie — LA GARENNE (Seine).

Tél. : Charlebourg 09-80.

## SIDERARSAN

Réparateur général par excellence de l'enfance.

**Formes.** — Sirop (enfants, adultes), comprimés opothérapiques (adultes).

**Posologie.** — *Enfants* à partir de 2 ans : 1 à 2 cuillerées à dessert par jour.

*Adultes* : 3 à 5 cuillerées à soupe par jour.

(0,005 méthylarsinate de fer × extraits pluri-glandulaires et oxyhémoglobine par cuillerée à soupe et par comprimé.)

**Indications.** — Lymphatisme, Rachitisme, Adénopathie, Tuberculose, Anémie, Chlorose, Paludisme, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence.

**Prix :** Sirop : 18 francs. Comprimés : 13 francs.

**Laboratoires HALLEANA**

4, Impasse de Béarn — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## SILGUINE

**Composition.** — Chaque comprimé contient :

0,05 Extrait sec stabilisé de gui de pommier.

0,01 Extrait sec d'aubépine.

0,10 Poudre de prêle.

0,03 Extrait de glandes endocrines mâles.

**Action.** — La « SILGUINE », à base de produits végétaux particulièrement assimilables, abaisse la tension artérielle, augmente la diurèse, tonifie le cœur. Elle comble le déficit des sécrétions endocrines particulièrement important au moment de la ménopause. Elle sature l'organisme de silice et empêche l'apparition de lésions athéromateuses et de l'artériosclérose.

**Indications.** — Tous les symptômes de l'« Automnose », hypertension artérielle, artério-sclérose, céphalées, somnolence, vertiges, bourdonnements, d'oreilles, troubles oculaires, troubles de la circulation, dyspnée nocturne, dyspnée d'effort, hémorragies, hémorragies cérébrales, accidents rénaux, accidents cardiaques.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 comprimés, avant chaque repas, 20 jours par mois.

**Laboratoires G. REAUBOURG**

1, rue Raynouard — PARIS (XVI<sup>e</sup>).



## SILICYL

**Médication de base et de régime des carences siliceuses et des états artérioscléreux**, empêchant la transformation des éléments élastiques et striés de l'endartère, c'est-à-dire la *lésion initiale* et les altérations consécutives hypertrophiques, hyperplasiques et dégénératives, avec imprégnation secondaire calcaire ou cholestérinée d'un placard athéromateux ou d'une sténose oblitérante.

**Principe.** — L'adrénaline ne produit plus de lésions athéromateuses chez les sujets soumis à l'action du silicate de soude (Professeur Goujet, P. M. 1911). — L'injection intraveineuse, inoffensive, abaisse la tension artérielle et ramène à la normale la viscosité sanguine. (Professeurs Sartory, Scheffler et Pélissier, *Acad. Sciences, Août 1920.*)

**Composition.** — Silicates de formule  $\text{Si}^2 \text{O}^{12} \text{Na}^8$  et  $\text{K}^2$  stables, solubles, purs, sans excès de base, bien tolérés et de fabrication très spéciale.

**Emploi et doses.** — La médication doit être prolongée, de façon tenace et persistante par périodes de 20 jours par mois.

**GOUTTES :** Seule préparation titrée à 25 p. 100 de  $\text{SiO}_2$ . X à XXV gouttes aux repas, matin, midi et soir.

**COMPRIMÉS :** Titrés à 0,40 de sel de soude et de potasse : 1 à 2 comprimés, au repas, 3 fois par jour.

**AMPOULES :** Voie intraveineuse, 1 ampoule par 48 heures (Action rapide : préscléreux, angor.).

**Résultats.** — Abaissement de la tension Mm et Ma. Viscosité ramenée à la normale. Elimination chlorurée. Diurèse. Action anti-athéromateuse. Hypotension. Disparition de la Dyspnée d'effort et des symptômes cérébraux. Euphorie et augmentation de la vitalité générale.

**Indications.** — 1° Action minéralo-tissulaire : Bacilliose, Consolidation accélérée des fractures. Surdit   (Ionisation). Etats   lastopatiques.

2° Art  rioscl  rose, Hypertension, Aortite, Ath  rome aortique, Scl  rose r  nale, Angine de poitrine, Endart  rite obl  t  rante progressive. Prophylaxie de l'ath  rome et de l'h  morrhagie c  r  brale, Troubles c  r  braux, Migraines, Vertiges, Paresse intellectuelle, Bourdonnements, etc. Otite scl  reuse, Scl  rose auriculaire Troubles oculaires Presbytie, Fatigue et Scl  rose cardiaque, An  mie siliceuse.

Gouttes : 20 fr. — Ampoules : 16 fr. — Comprim  s : 18 fr.

Echantillons — Litt  rature

D  p  t, Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**  
61, Bd Malesherbes. — PARIS.

**Laboratoire CAMUSET**  
18, rue Ernest-Rousselle — PARIS.

## SILISODE

**Forme.** — Granulé.

**Composition.** — Une cuillerée à café contient :

Silicate de soude : 0 gr. 40

Benzoate de lithine : 0 gr. 10

**Dose.** — Une cuillerée à café avant les repas, 15 à 20 jours chaque mois.

**Action.** — Hypotensive, antisléreuse.

**Indications.** — Hypertension sous toutes ses formes, Artério-Sclérose, Aortites, Angine de poitrine.

**Laboratoires MICHELS**

9, rue Castex — PARIS. Tél. : Archives 45-12.

---

## SINAHIN

Antidiabétique.

**Forme.** — Pilules de Semen-contrà total.

**Propriétés :**

Traitement sans restrictions trop sévères dans l'alimentation normale.

Formule extraite des travaux d'Avicenne (Communication Académie de Médecine, décembre 1913.)

**Posologie :**

Trois à quinze pilules par jour.

Prix de vente au public. La boîte, 12 francs.

**Laboratoires CARTERET**

15, rue d'Argenteuil — PARIS.

## LE SINAPLASME

Cataplasme sinapisé instantané  
du Dr **JEAN FAURE**

---

LE PREMIER EN DATE - LE PLUS RÉGULIER  
LE MOINS CHER — LE MEILLEUR DE TOUS

---

— ÉVITEZ LES CONTREFAÇONS —

---

Prix : la boîte de 3 sinaplasmes double :  
5 francs.

---

**Docteurs FAURE et DUSSUEL**  
AIX-LES-BAINS (Savoie).

---

## SINUZYL

**Indications.** — Sinusites, Coryza, Rhinites, Laryngites, Ozène.

**Composition.** — Résorcine, camphre, essences végétales, antiseptiques, huile d'amandes douces.

**Forme et Mode d'emploi.** — Se vend en *huile* pour instillations nasales.

En *pommade* dans un tube spécial.

En *rhino-capsules* pour auto-injections.

**Laboratoires Pierre CHATEAU**

137, avenue Parmentier — PARIS (X<sup>e</sup>).

## SIROP AXARIA

**Laxatif mannité.**

Parfaitement toléré par les nourrissons dès le premier âge.

Essentiellement végétal, dépourvu de principes drastiques.

Ne provoque pas de coliques, ne détermine aucune accoutumance.

**Indications.** — Traitement de la Constipation chez les enfants, les femmes enceintes, les nourrices, les personnes âgées ou affaiblies et tous les sujets délicats.

### **Posologie :**

De 2 à 6 mois : 1/2 cuillerée à café.

De 6 mois à 2 ans : 1 à 2 cuillerées à café.

De 2 ans à 5 ans : 2 à 3 cuillerées à café.

Au-dessus de 5 ans : 1 à 2 cuillerées à soupe.

*Adultes* : 1 à 3 cuillerées à soupe.

Modifier les doses suivant la sensibilité du sujet et l'effet désiré.

Le flacon : 5 fr. 25.

**Les Spécialités de l'Enfance.**

**Laboratoires AXAREL**

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

## SIROP BRAHMA

**Composition.** — Sulfogaïacolate de potasse, benzoate de soude, codéine, dionine, aconit, belladone, grindélia.

**Action.** — Antiseptique puissant, régularise les sécrétions, les diminue. Calme rapidement la toux.

**Indications.** — Toutes les affections broncho-pulmonaires, rhumes, bronchites, grippe, laryngites, coqueluche, tuberculose au début.

**Mode d'emploi.** — 4 à 5 cuillerées à soupe par 24 heures, 1 heure avant ou 2 heures après manger, pur ou mieux dans de la tisane.

Prix : 11 francs.

**Laboratoires G. COULLOUX**

116, rue du Pont — AUXERRE (Yonne).

## SIROP COMPOSÉ AUX HYPOPHOSPHITES « FELLOWS »

Le reminéralisateur par excellence.

**Composition.** — Potasse, chaux, fer, manganèse, sodium, quinine, strychnine.

**Indications.** — Anémie, neurasthénie, maladies chroniques, affections pulmonaires, rachitisme, convalescence.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : Tonique, 1 cuillerée à café à chaque repas ; stimulant et tonique, 2 cuillerées à café aux repas. — *Pour les enfants* : De 9 à 12 ans, 1/2 cuillerée à café ; 5 à 9 ans : 1/3 de cuillerée à café ; 1 à 5 ans, 1/4.

**Nota.** — Pour obtenir les meilleurs résultats, avoir soin de toujours diluer le sirop dans de l'eau froide, dans la proportion d'un demi-verre d'eau pour une cuillerée à café de sirop.

**Laboratoires Fellows,**  
26 Christopher St. — NEW-YORK.

Dépôt général pour la France :  
**Laboratoire ROBERTS et Co,**  
5, rue de la Paix — PARIS.

## SIROP DE BLANCARD

Al'iodure de fer inaltérable  
10 cgr. par cuillerée à soupe.

**Doses et mode d'emploi.** — 1 à 3 cuillerées à soupe par jour aux repas.

**Propriétés thérapeutiques.** Agent incomparable d'Hématopoïèse.

**Indications.** — Anémie, Scrofules, Lymphatisme, Chlorose, Leucorrhée, Aménorrhée, Syphilis accidentelles ou constitutionnelles, suite de Gripes infectieuses, etc,

Prix : 11 francs.

**BERTAUT-BLANCARD Frères,**  
64, rue de La Rochefoucauld — PARIS

## SIROP DE CRÉOSOTE VACHERON

**Composition.** — 0 gr. 15 de créosote par cuillerée à soupe.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antibacillaire et antiseptique puissant des bronches et du poumon.

**Avantages.** — De saveur agréable, nullement caustique, très bien toléré par l'estomac. Excellent sirop pectoral.

**Indications.** — Rhumes de toutes natures, bronchites aiguës et chroniques, toux rebelles, catarrhes, laryngites, grippe, influenza, etc...

**Modes d'emploi.** — *Adultes* : 1 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures, à prendre dans l'intervalle des repas.

Prix : 14 francs.

**Produits GONNON**

**J. et C. GONNON, Pharmaciens**

14, rue Victor-Hugo — LYON.

## SIROP DE GLYCÉROPHOSPHATES VACHERON

**Au Gaïacol de synthèse cristallisé et aux glycérophosphates de chaux, de soude et de potasse.**

**Composition.** — Cette préparation contient par cuillerée à soupe :

0 gr. 15 de gaïacol de synthèse cristallisé.  
0 gr. 30 de glycérophosphates.

**Avantages et Propriétés thérapeutiques.** — Ce sirop possède le même pouvoir antibacillaire que le sirop Vacheron au Gaïacol (*voir plus loin*), et en plus l'action reconstituante des phosphates organiques.

**Indications.** — Affection des voies respiratoires, chez les anémiques, les lymphatiques, les rachitiques et contre la tuberculose pulmonaire.

**Mode d'emploi :**

*Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants* : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 15 francs.

**Produits GONNON**

**J. et C. GONNON, Pharmaciens**

14, rue Victor-Hugo — LYON.

## SIROP DE LA MATERNITÉ

Sirop de Cassia ac., 60 gr.; sirop de fleur de pêcher, 20 gr. ; sirop de pomme Reinette, 18 gr. ; teinture d'orange douce, 2 gr.

**Dose et mode d'emploi.** — Jusqu'à 2 mois 1/2 cuill. à café, au-dessus de 2 mois 1 à 2 cuill. à café.

**Propriétés thérapeutiques.** — Laxatif pour enfants, pouvant être donné à tout âge. Pas de coliques.

**Indications.** — Constipation, Embarras gastrique, Pas de contre-indications.

Prix : le flacon, 10 fr.

**L. LAURIN**

86, boulevard Port-Royal — PARIS.

## SIROP DE LOVEL

Iodo-phosphaté tannique.

1 cuillerée à soupe contient :

Iode métalloïdique, combiné aux roses rouges.....	0 gr. 02
Extr. tannique des roses de Provins et de Ratanhia .....	0 gr. 20
Phosphate monocalcique cristallisé.....	0 gr. 25

### Posologie :

*Adultes* : 1 à 2 cuillerées à soupe matin et soir.

*Enfants* : 1 à 4 cuillerées à café par jour.

**Indications.** — Lymphatisme, rachitisme, carie des os, affections scrofuleuses, maladies dues à l'anémie et à la débilitation générale.

Préparation très recommandée aux enfants.

Prix : 12 francs.

**Produits GONNON**

14, rue Victor-Hugo — LYON.

## SIROP DE SIRTAL

**Composition.** — Tricrésol sulfonate de calcium, dérivé d'un monophénol, le Crésol, qui est lui-même un des constituants de la créosote, aucun autre agent sédatif, opiacé ou hypnotique.

**Propriétés.** — C'est au Tricrésol que sont dues les principales propriétés antiseptiques et balsamiques de la créosote. Il présente les propriétés physiologiques de la créosote et ne détermine jamais aucun phénomène d'intolérance des voies digestives.

**Applications thérapeutiques.** — Puissant sédatif de la toux par antiseptie pulmonaire. Indiqué dans toutes les maladies des voies respiratoires accompagnées de catarrhe, de toux et d'expectoration : *rhumes, bronchites aiguës, bronchites chroniques, congestions pulmonaires, emphysème, grippe, dilatation des bronches, broncho-pneumonies, pneumonie, tuberculose pulmonaire* dans ses formes à marche lente, torpides, sans hémorragies, avec expectoration abondante.

*Doses :*

*Pour l'adulte :* 4 à 6 cuillerées à soupe par jour ;

*Pour l'enfant :* 4 à 6 cuillerées à café.

Ces doses peuvent être augmentées suivant les cas.

**Laboratoires CLIN — PARIS.**

## SIROP DU Dr GELINEAU

**Composition :**

Arsenic-Chloral-Bromuré.

**Indications thérapeutiques :**

Insomnie, Névralgie, Hystérie.

**Posologie :**

*Par cuillerée à soupe.*

Kbr..... 1 gr. 50

Chloral cristallisé ..... 1 gramme.

Arsenic..... 1 milligr.

Une à deux cuillerées à bouche le soir au coucher.

Doses supplémentaires en cas de besoin.

*Littérature et échantillons sur demande :*

**Laboratoires J. MOUSNIER-DELERME**  
9, bd Carnot — BOURG-LA-REINE (Seine).



## SIROP FAMEL

**Antiseptique.** — Lactocréosote soluble. — Cicatrisant, non caustique bien toléré.

**Calmant.** — Codéine, Aconit.

**Récalcificateur.** — Lactophosphate de chaux.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : Une cuill. à soupe le matin, avant déjeuner, et une le soir, au coucher ; délayer dans infusion chaude *non sucrée*. En cas de besoin, 3<sup>e</sup> cuill. à midi.

*Enfants* : de 8 à 14 ans, par cuill. à dessert ; de moins de 8 ans, par cuill. ou demi-cuill. à café, ou moins, selon l'âge, toujours dans infusion non sucrée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Calmant de la toux, puissant antiseptique du poumon.

**Indications thérapeutiques.** — Affections des bronches et du poumon : bronchites chroniques, tuberculose, rhumes négligés, toux. Comme adjuvant dans la grippe, coqueluche, rougeole, scarlatine, pour écarter les dangers de complications pulmonaires.

Prix : 10 francs.

16 à 22, rue des Orteaux — PARIS (XX<sup>e</sup>).

## SIROP GRIBELL

**Composition.** — Baume du Canada, « *Prunus virginianus* », Aconit, Codéine, Phosphate de chaux soluble. Baume de Tolu.

**Indications.** — Toutes les affections des voies respiratoires.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 4 à 5 cuillerées à bouche par jour, pur ou dans de la tisane pectorale chaude.

Le flacon : 9 francs.

### PATE GRIBELL

Même composition. — Mêmes indications.

La boîte : 4 francs.

### SIROP GRIBELL POUR ENFANTS

Formule spéciale ne renfermant aucun principe opiacé.

**Mode d'emploi.** — Jusqu'à 7 ans, 3 à 5 cuillerées à café par jour. Au-dessus de 8 ans, par cuillerée à dessert, suivant l'âge.

Le flacon : 7 francs.

**Laboratoires BELIERES**

19, rue Drouot — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## SIROP IODERMOL VIGIER

Le médecin doit souvent traiter une syphilis acquise ou héréditaire sans attirer l'attention du malade sur la nature des médicaments qu'il lui prescrit.

Le **Sirop Iodermol Vigier** est un sirop de Gibert au café. Cette préparation, sous quelque état que le mercure se trouve dans ce milieu riche en tanin, est infiniment mieux tolérée que le sirop de Gibert du Codex. Il a la même posologie : une cuillerée à soupe contient 1 centigramme de bi-iodure de mercure et 50 centigrammes d'iodure de potassium.

**Laboratoire R. HUERRE et C<sup>ie</sup>**

12, boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS.

---

## SIROP LAXATIF GOBEY

Laxatif uniquement végétal, d'une douceur et d'une sûreté d'action inégalées. Le véhicule, pur jus de fruits, constitue une véritable friandise.

**Doses et mode d'emploi.** — De une demi-cuillerée à café à une cuillerée à soupe le soir, au coucher, suivant l'âge.

**Indications thérapeutiques.** — Le sirop Laxatif Gobey peut être employé dès le premier âge, chez les nourrissons. Sa composition en fait le médicament par excellence de tous les sujets délicats. Il est particulièrement indiqué chez la femme enceinte, les opérés, les enfants et les vieillards. Ne provoquant jamais le moindre trouble, il ne comporte donc aucune contre-indication et peut être utilisé par tous sans limitation de durée parce qu'il ne s'accompagne pas d'accoutumance.

Pris pendant deux ou trois semaines systématiquement au printemps et à l'automne, le sirop laxatif Gobey réalise une cure de désintoxication et constitue le dépuratif idéal.

Prix au public : le flacon : 11 fr. 50.

**Laboratoires GOBEY**

89, rue du Cherche-Midi — PARIS.

## SIROP MINÉRAL SULFUREUX CROSNIER

Au monosulfure de sodium inaltérable et goudron.  
Approbation scientifique de l'Académie de médecine  
de Paris.

### Indications thérapeutiques :

Succédané avantageux des eaux sulfureuses. Affections subaiguës ou chroniques des voies respiratoires, laryngites, lymphatisme, dermatoses, hydrargyrisme, bismuthisme.

### Posologie :

*Adultes* : une cuillerée à soupe de sirop 2 à 3 fois par jour, une heure avant ou deux heures après les repas.  
*Enfants* : 2 à 3 cuillerées à dessert : de 7 à 14 ans ; 2 à 3 cuillerées à café pour ceux de 2 à 6 ans.

### — GRANULES MINÉRAL SULFUREUX CROSNIER. —

#### Composition et indications thérapeutiques :

Celles du sirop.

### Posologie :

2 granules = 1 cuillerée à soupe de sirop.

### Laboratoires CROSNIER

6, rue Chanoinesse — PARIS.

---

## SIROP MIREILLE

Le plus *agréable* au goût, le plus *actif*, pour le **traitement polyvalent** des **affections de l'appareil respiratoire**.

*Calmant, sédatif, hypnotique*, par : le bromhydrate de codéine, l'eau de laurier-cerise, l'aconit et la belladone.

*Balsamique, antiseptique, diurétique*, par : la terpine et le benzoate de soude du benjoin.

*Expectorant, émollient, sudorifique*, par : des extraits de plantes pectorales.

**Doses par 24 heures et mode d'emploi :**

*Adultes* : 4 à 6 cuillerées à soupe.

De 10 à 16 ans : 3 à 6 cuill. à dessert.

De 2 à 10 ans : 2 à 6 cuill. à café.

*Se prend à toute heure ; aucune contre-indication ; pas de toxicité ; pas d'intolérance ; pas d'accoutumance.* Une cuiller à soupe prise le soir au coucher dans une infusion chaude assure un sommeil paisible.

Prix au public : 10 fr. 50 (exempt d'impôt).

---

LABORATOIRES LEGENDRE et Cie.

Section D. S. — HOUILLES (S.-et-O.).

DÉPOT GÉNÉRAL :

*France, Colonies et Protectorats.*

O. C. P. 71, rue du Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

*Belgique* : M. Ramlot, 72, rue de l'Escaut  
à Bruxelles-Maritime.

## SIROP MYRIANIS

**Sédatif polybromuré pour enfants.**

Chaque cuillerée à café renferme 0 gr. 065 de polybromures.

Tolérance parfaite : aucun narcotique, aucun hypnotique.

**Indications.** — Excitabilité, *Insomnie*, Epilepsie, Vomissements spasmodiques du nourrisson et toutes manifestations nerveuses de la première enfance.

**Posologie.** — De 3 mois à 1 an : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

De 1 à 3 ans : 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Au-dessus de 3 ans : par cuillerées à soupe.

Le flacon : 5 fr. 25.

**Les Spécialités de l'Enfance.**

**Laboratoires AXAREL**

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

## SIROP NEVRA

**Composition.** — Sirop à base de bi-iodure de mercure, iodure de potassium, iodure de fer, iode, tannin, arseniate de soude, dosé à :

0,005 de Bi-Iodure.

0,20 de KI.

par cuillerée à soupe.

**Mode d'action.** — Traitement dissimulé de la Syphilis.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 3 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants* : 1 cuillerée à café à 2 cuillerées à dessert par jour, suivant l'âge.

**Laboratoire R. FAURE**

80, rue du Rocher — PARIS.

## SIROP NOGUES

### Composition :

Alcoolature d'aconit	}	0,04
Teinture de belladone		
Teinture de grindelia		0,09
Bromoforme		0,022
Codéine		0,012
Benzoate de soude		0,10
Sirop de Tolu, Desessartz, laurier-cerise		Q. S.
pour une cuillerée à bouche.		

**Dose et mode d'emploi.** — 4 à 5 cuillerées à bouche par 24 heures.

**Propriétés thérapeutiques.** — Calmant de la toux, incisif, pectoral.

**Indications.** — Toux quinteuses, bronchites, toutes affections des bronches.

Prix : 11 francs.

**Laboratoire NOGUES**

11, rue Joseph-Bara — PARIS.

## SIROP PHÉNIQUE VIAL

**Composition.** — Sirop à base d'acide phénique, principe actif des goudrons.

**Indications.** — Trachéite, Laryngite, Bronchite aiguë et chronique, Asthme, Grippe, Coqueluche, Tuberculose pulmonaire, Hémoptysie, Bronchite fétide, Gangrène pulmonaire, toutes les Hémorragies, Diarrhées chroniques.

**Action.** — Antiseptique et désodorisant puissant ; augmente la coagulabilité du sang, diminue les sécrétions.

**Mode d'emploi.** — 3 cuillerées à soupe par jour, pur ou de préférence dans une tasse de tisane quelconque.

**LABORATOIRE  
DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE  
Dr PH. CHAPELLE, 8, rue Vivienne, PARIS.**

## **SIROP « ROCHE » AU THIOL**

1 cuill. à soupe de Sirop « Roche » = 1 gr. de Thiocol « Roche ».

1 gr. de Thiocol « Roche » = 0,52 cgr. de gâicol cristallisé.

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : 2 à 4 cuill. à soupe par jour. *Enfants* : 2 à 4 cuill. à café selon l'âge.

**Prop. thér.** — Antiseptique pulmonaire. Phagocytogène. Eupeptique. Oréxique.

**Indic. thér.** — Toutes les affections broncho-pulmonaires : Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques. Grippe. Pneumonie. Coqueluche. Scrofule. Anémie. Rachitisme. Dyspepsies. Entérites. Diarrhées, etc.

### **Produits**

**F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**  
21, place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## **SIROP SENTINI**

**Aux Prunes d'Ente d'Agen.**

### **Principes actifs :**

Pruneaux d'Agen. Cassia Lenitiva. Cephaelis Ipécacuanha.

### **Propriétés :**

Laxatif et Purgatif doux. Pas d'accoutumance. Efficacité parfaite.

### **Dose laxative :**

*Bébés* : Une demi à une cuillerée à café.

*Enfants* : Une à deux cuillerées à café.

*Adultes* : Une cuillerée à soupe le soir.

### **Dose purgative :**

Le double des doses laxatives.

**Laboratoires COMERGUE**

AGEN (Lot-et-Garonne).

## SIROP TEYSSÈDRE

au Bromure de Calcium pur  
Médecine du nourrisson.

**Indications thérapeutiques.** — Colique des nouveau-nés, Insomnies, Cris et pleurs prolongés, Crispations nerveuses, Vomissements, Diarrhée, Prurit dentaire, Accident de la première dentition, Affections convulsives, etc.

**Doses.** — Sommeil agité, Nervosité : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Dentition : 4 à 5 cuillerées à café par jour.

Convulsions (pendant les accès), 1 cuillerée à café toutes les 5 minutes.

Convulsions (après les accès), 1 cuillerée à café toutes les 3 heures.

(Se méfier des imitations).

Prix de vente au public : 5 fr. 50 le flacon.

**Laboratoire TEYSSÈDRE**

34, faubourg d'Angoulême — LIMOGES.

## SIROP TINARDON

Iodo-tannique phosphaté

Contenant pour 100 cc. :

Iode bi-sublimé .....	0 gr. 15
Extrait sec de ratanhia.....	1 gr. 10
Lactophosphate de chaux....	2 gr. 25
Sirop d'orange. Q. S. pour 100 cc.	

**Posologie.** — 2 ou 3 cuillerées à soupe suivant l'âge. (Le flacon contient environ 30 cuillerées à soupe.)

**Indications.** — Lymphatisme, Adénopathies, croissance difficile.

Prix : 12 fr. 50.

**LABORATOIRE OBERLIN**

**J. TINARDON,**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe de l'Ecole Supérieure de Paris.

17, rue Cadet — PARIS.



## SIROP VACHERON

au Gaïacol de Synthèse.

**Composition.** — Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 15 de gaïacol de synthèse cristallisé titrant 100 p. 100 de gaïacol absolu.

**Avantages.** — Le gaïacol est en solution complète et en dilution étendue, par conséquent sans action sur les fonctions digestives.

**Propriétés thérapeutiques.** — Calme la toux rapidement. Diminue et facilite l'expectoration. Détruit les germes morbides.

**Indications.** — Rhumes, Gripes, Bronchites aiguës ou chroniques, Laryngites, Catarrhe pulmonaire, Coqueluche.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour dans un demi-verre de tisane, lait ou eau, à prendre dans l'intervalle des repas.

*Enfants* : De 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 14 francs le flacon de 250 cc.

**Produits GONNON**

**J. et C. GONNON, Pharmaciens.**

14, rue Victor-Hugo — LYON.

## SISTOMENSINE CIBA

Substance lipoidique extraite de l'ovaire, insoluble dans l'eau.

**Action physiologique.** — Equilibre de la fonction menstruelle, limite et régularise le flux cataménial. Agit efficacement sur les douleurs dysménorrhéiques.

**Indications.**

- I. — Flux menstruel trop abondant, ménorragie essentielle des jeunes filles.
- II. — Règles trop fréquentes ou de trop longue durée.
- III. — Douleurs et malaises liés à un flux trop abondant.

*Comprimés, Ampoules.*

**Doses.** — 3 à 6 comprimés par 24 heures : 1 ou 2 ampoules.

Le flacon de 40 comprimés : 15 francs.

Le — de 100 — : 30 —

La boîte de 4 ampoules : 20 francs

(Voir Agomensine.)

**Laboratoire CIBA, C. ROLLAND**

109 à 113, boulevard de la Part-Dieu. — LYON.

## SODERSEÏNE

**Indication.** — Coqueluche.

**Composition.** — Bismuth colloïdal obtenu par électrolyse.

**Forme.** — Solution sans saveur et d'une innocuité absolue (Ce qui en rend l'emploi facile même chez les nourrissons).

**Doses journalières :**

<i>Enfants</i> jusqu'à 6 mois .....	100 gr.
— de 6 mois à 2 ans .....	150 gr.
— de 2 ans et au-dessus .	200 gr.

(Echelle de doses sur le flacon).

Prix du flacon de 500 gr. : 10 francs.

**J. DEPRUNEAUX**, Pharm. de 1<sup>re</sup> classe  
18, rue de Beaune et 31, rue de Verneuil  
PARIS (VII<sup>e</sup>).

---

## SODOGASTROL

**Spécifique des affections gastro-intestinales et biliaires.**

**Forme.** — Cachets et Granulés.

**Composition.** — Un cachet ou une cuillerée à café de granule renferme : Sulfate de Soude, 1 gr., Phosphate de Soude, 0 gr. 50, Bicarbonate de soude, 0 gr. 25.

**Actions thérapeutiques et usages.** —

Favorise les sécrétions glandulaires du tube digestif, supprime les fermentations toxiques gastro-intestinales, neutralise le suc gastrique, décongestionne la muqueuse gastro-intestinale, facilitant ainsi la digestion et régularisant les fonctions de l'intestin.

**Indications.** — Dyspepsies, gastralgies, gastrites, hyperchlorhydrie, brûlures d'estomac, ptose gastrique, ulcère, appendicite, infections gastro-intestinales, entérites muco-membraneuses, hépatite, obésité, goutte, hypertension.

**Mode d'emploi.** — 3 cachets le matin à jeûn ou 3 cuillerées à café de granulé à l'aide d'une infusion chaude. Cette dose pourra être doublée sans inconvénient.

**Laboratoires LAGOUTTE**

229, Cours Gambetta — LYON (III<sup>e</sup>).

## SODOLACTINE

(Estomac.)

Poudre soluble, n'agissant ni comme un alcalin, ni comme un absorbant, ni comme un isolant. De goût très agréable, la *Sodolactine* est le médicament de choix dans la plupart des affections stomacales.

La *Sodolactine* ne modifie pas le chimisme du contenu gastrique, elle facilite physiquement l'évacuation de l'estomac. Non laxative.

Outre son activité, facile à vérifier, elle a l'énorme avantage de constituer un traitement très économique.

### Posologie :

Une mesure dans une tasse à *thé* d'infusion ou d'eau tiède.

*Après les repas* : Hyperchlorhydrie, Dyspepsies hypersthéniques, Aigreurs, Brûlures, Ulcérations, Affections atteignant l'orifice pylorique, Vomissements et nausées de la grossesse, Vomissements des nourrissons ; (1 cuillerée à café dans un biberon de 120 cc. d'eau bouillie, faire prendre 1 à 2 cuillerées à soupe de cette solution après chaque tétée.)

*Avant les repas* (un quart d'heure) et le matin à jeun : Hypochlorhydrie, Dyspepsies simples, Dilatations, Atonies gastriques, Digestions laborieuses, Mal de mer.

*Remarque importante.* — La *Sodolactine* agissant d'une façon physique et non chimique, bien respecter la concentration indiquée : *une mesure par tasse à thé de liquide.* (A titre indicatif une tasse à thé 120 cc. ou 8 cuillerées à soupe.)

Prix : 10 francs.

**Laboratoires GERDA**

163, boulevard Croix-Rousse — LYON.

# SODOTHIOL

## Composition :

Solution stérilisée pure, isotonique, injectable de thiosulfates alcalins.

## Forme pharmaceutique :

Ampoules de 2 centicubes préparées pour injections hypodermiques ou intramusculaires.

## Indications thérapeutiques majeures :

*Affections hépatiques.* — Coliques hépatiques, Lithiase biliaire, Angiocholite lithiasique, Cholécytite calculuse, Cholémie simple, Ictère catarrhal ou émotif, Hépatisme de Roger Glénard.

*Manifestations arthritiques.* — Lithiase rénale, Coliques néphrétiques, Gravelle, Anurie calculuse, Calculs vésicaux, Rhumatisme noueux déformant, chronique, Ankyloses fibreuses articulaires, Otosclérose, Otospongieuse.

## Indications thérapeutiques secondaires :

*Dermatologie.* — Eczémas, Acnés, Accidents cutanés récidivants ou prurigineux.

*Etats congestifs chroniques des muqueuses respiratoires.*

## Mode d'emploi :

A. *Cure d'assaut.* — 10 injections, une tous les jours.

B. *Cure de fixation.* — 10 autres injections 15 jours, puis deux mois plus tard.

C. *Cure d'entretien.* — 10 injections 6 mois, puis un an après la première série.

Dans le cas de Rhumatismes chroniques noueux ou déformants et quelques affections cutanées récidivantes, la *Cure d'assaut* comprendra 20 injections à raison d'une par jour, complétée d'une *Cure de complément A bis* après 15 jours de repos.

Le Sodothioliol étant dépourvu de toute toxicité, son usage pourrait, s'il en était besoin, être prolongé tout le temps jugé nécessaire.

## Incompatibilités :

Acides, Sels acides, Iodures.

## Prescrire :

Sodothioliol : 1 boîte d'ampoules.

Prix, la boîte de 10 ampoules : 20 francs.

Laboratoire de MÉDECINE  
EXPÉRIMENTALE

1 et 3, rue de Malherbe, — BEAUVAIS (Oise). Tél. : 4-84

Echantillons et littérature médicale sur demande.

## SOLMUTH

Solution huileuse de Campho-Carbonate  
de Bismuthyle.

### Indications :

Le Solmuth s'emploie en *injections intramusculaires* dans le traitement de la syphilis à toutes périodes. Tolérance parfaite ; élimination complète, sans dépôt huileux ou bismuthique intramusculaire. Activité supérieure à celle des sels insolubles de bismuth, action stérilisante aussi rapide que celle des arsenicaux en solution aqueuse.

### Mode d'emploi :

2 injections intramusculaires de une ampoule de 1 cc. par semaine.

### Présentation :

En boîte de 12 ampoules de 1 cc. (une ampoule contient 4 centig. Bi-métal par cc.).

### Prix de vente au public :

25 francs la boîte de 12 ampoules.

**Laboratoire L. LECOQ et F. FERRAND**

14, rue Gravel — LEVALLOIS (Seine).

## SOLUCALCINE

Chlorure de Calcium pur et stable.

**Composition.** — Préparée à partir du calcium et de l'acide chlorhydrique purs, cette solution concentrée est stable et ne présente pas d'oxychlorures, même à la longue.

XXX gouttes de la solution contiennent un gramme de chlorure de calcium.

**Action.** — Le chlorure de calcium est un recalcfiant, un antihémorragique, un déchlorurant.

**Indications.** — Tuberculose et pré-tuberculose. Hémorragies internes. Hémorragies opératoires, chirurgicales et obstétricales (traitement préventif), Spasmophilie, Tétanie, Eclampsie, Urticaire, Asthme. Rhume des foins, Accidents post-sériques, Ascite, Œdèmes.

**Posologie et mode d'emploi.** — Doses faibles comme recalcfiant, Doses fortes comme antihémorragique et déchlorurant.

Doses moyennes pour les autres indications.

Doses faibles : 1 gr. soit XXX gouttes par jour, en deux fois.

Doses fortes : 4 à 6 gr. soit CXX à CLXXX gouttes par jour en deux fois.

Faire tomber les gouttes dans 1/4 de verre d'eau très sucrée à prendre pendant les repas.

**Laboratoire du Docteur COIRRE**  
5, boulevard du Montparnasse — PARIS.

## SOLUCAMPHRE DELALANDE

Dérivé du camphre naturel, soluble dans l'eau, succédané de l'huile camphrée.

**Avantages.** — Injection facile et indolore. Résorption immédiate, d'où action plus vive et plus vigoureuse. Injection intraveineuse sans danger. Toxicité nulle.

**Action physiologique.** — L'action du Solucamphre rappelle en tous points celle du camphre.

Il agit sur le myocarde en renforçant les contractions et sur le pneumogastrique en régularisant celles-ci.

### Mode d'emploi :

De 2 à 8 cc. par jour en médecine.

De 10 à 15 cc. par jour en chirurgie.

**Présentation.** — Boîtes de 6 ampoules de 1 cc., 2 cc., 3 cc., 5 cc. et 3 amp. de 10 cc. et gouttes.

Le Solucamphre se prépare également en solution à prendre "per os" à la dose de C à XXV gouttes par jour.

Prix : 6 ampoules de 1 cc., 10 fr. ; 6 ampoules de 2 cc., 12 fr. 75 ; 6 ampoules de 3 cc., 14 fr. 50 ; 6 ampoules de 5 cc., 17 fr. ; 3 ampoules de 10 cc. 17 fr. ; Gouttes, 14 fr.

**MICHEL DELALANDE**

16, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE (Seine).

---

## SOLUPROTINE ROCHE

*Solution à 10 p. 100 de Protéine Solubilisée.*  
**(PEPTONE de CASÉINE « ROCHE »)**  
de composition constante, stérilisable et inaltérable.

**Indications.** — *Toutes les indications de la Protéinothérapie :* Rhumatismes, Infections, Septicémies, Gonococcies, Salpingites, Kératites, Sycosis, Furunculose, Tuberculose, et, en général, toutes les fois que l'on cherche à déclencher ou à stimuler les réactions défensives de l'organisme.

**Doses et mode d'emploi.** — *Injections intramusculaires.* — Etats aigus : doses croissantes de 1/4, 1/2, puis 1 cc. tous les 2, 3 ou 4 jours.

Etats subaigus et chroniques : doses croissantes de 1/2, 1, puis 2 cc. tous les 2, 3 ou 4 jours.

*Injections endoveineuses.* — Etats aigus ou subaigus : diluer 1/4 ou 1/2 cc. dans 10 cc. de solution physiologique pour chaque injection et faire l'injection tous les 3 ou 4 jours.

**N. B.** — *Les injections intramusculaires et endoveineuses sont parfaitement indolores ; elles donnent lieu quelquefois à des réactions assez violentes, dont l'intensité varie avec chaque malade (choc protéinique). Il peut y avoir des sueurs, de la fièvre, des frissons, etc. qui sont l'indice de la réaction défensive de l'organisme.*

Boîte de 12 ampoules de 1 cc.

### Produits

**F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**

21, place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).



## **SOLUROL**

(Acide thyminique)

**Propriétés thérapeutiques.** — Eliminateur physiologique de l'acide urique. Traitement de la diathèse urique sous toutes ses formes.

**Formes.** — Comprimés dosés à 25 centigr.

**Doses et mode d'emploi.** — Crises aiguës : 5 à 7 comprimés par jour. Cures périodiques : 3 à 4 comprimés par jour. Ecraser les comprimés pour les avaler.

**Remarque.** — Le Solurol doit faire l'objet de cures périodiques chez tous les malades, qui ont à redouter le retour d'accidents uriques. Ces cures devront de préférence avoir lieu au printemps et à l'automne surtout chez les goutteux. Elles dureront chaque fois 3 à 4 semaines, au minimum.

**Laboratoires CLIN**

PARIS.

---

## **SOLUTION BARDET**

**à l'Extrait sec de Quinquina.**

Adoptée par le ministère des Colonies.  
Médaille d'Or, Strasbourg 1924.

### **Composition :**

Solution sans sucre, sans alcool, contenant  
0 gr. 50 de principes actifs par cuillerée  
à soupe et titrant au minimum 10 p. 100  
d'alcaloïdes totaux.

### **Propriétés thérapeutiques :**

Tonique de premier ordre. Fébrifuge à forte  
dose. Action rapide et fidèle.

### **Indications :**

Asthénie, Anorexie, Anémie, Convales-  
cences, Lymphatisme, Pyrexies diverses,  
Paludisme en particulier.

### **Mode d'emploi :**

#### **Tonique :**

*Adultes* : 1 cuillerée à soupe. *Enfants* :  
1 à 2 cuillerées à café au début des deux  
principaux repas.

#### **Fébrifuge :**

*Adultes* : 4 à 5 cuillerées à soupe. *Enfants* :  
4 à 8 cuillerées à café par 24 heures.

Se méfier des nombreuses contrefaçons et  
imitations.

Formuler : « **Solution Bardet** ».

Échantillons et littérature :

**Laboratoires BARDET**

fondés en 1860,

76, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

## SOLUTION COIRRE

au Chlorhydrophosphate de Chaux.

**Composition et préparation.** — Phosphate bicalcique solubilisé en milieu chlorhydrique. La seule préparation physiologique, puisque le phosphate de chaux doit toujours être solubilisé par l'acide chlorhydrique dans l'estomac.

**Action.** — Action synergique du calcium et de l'acide phosphorique. De la présence de Ca en quantité suffisante dépend le bon fonctionnement de l'organisme. Cette formule solubilisée est plus active.

**Indications.** — Tuberculose, Rachitisme, Anémie, Convalescence.

**Doses et mode d'emploi.** — Chaque cuillerée à soupe contient 0,40 de phosphate bicalcique.

*Adultes* : 2 à 4 cuillerées par jour.

*Enfants* : 2 à 4 cuillerées à café.

*A prendre au commencement du repas dans de l'eau sucrée ou coupée de vin.*

**Laboratoire D<sup>r</sup> COIRRE**

5, boulevard du Montparnasse — PARIS.

## SOLUTION HUILEUSE AU NESTOSYL

Anesthésique par contact.

**Caractéristiques.** — Association d'éthers des séries phtalique et para-aminobenzoïque puissamment anesthésique par contact. Aucun produit des tableaux A et B. Antiseptique.

**Indications.** — Anesthésie des muqueuses et des plaies : Cathéters, bougies exploratrices ou dilatatrices, cystite, cystoscopie, rectoscopie, cautérisations, changements de pansement, brûlures, démangeaisons, inflammations, éruptions, excoriations, etc...

**Posologie.** — Anesthésie des canaux : instiller quelques gouttes dans le canal 2 à 3 minutes avant d'introduire l'instrument enduit lui-même de solution ; de la vessie : instiller quelques centimètres cubes, dose généralement suffisante 10 à 15 cc. ; de la muqueuse vaginale : introduire un tampon vaginal imbibé de solution ; de la muqueuse rectale : instiller 10 à 15 cc. avec une poire en caoutchouc ; des plaies et dermatoses : recouvrir d'un pansement imbibé de solution et maintenu en permanence.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires du NESTOSYL.**

**P. BAUDE**, pharmacien,

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII<sup>e</sup>)

Tél. : Ségur 96-46. — Adr. télégr. : Nestosyl, 27, Paris.

## SOLUTION LAROYENNE

### Composition :

Succinate d'ammoniaque, valérianate d'éthyle, bromure de potassium.

### Indications :

Spécifique contre toutes les formes de l'agitation nerveuse.

### Posologie :

Une cuillerée à café dans un peu d'eau avant chacun des trois repas.

Prix : 45 fr. le flacon ; 25 fr. le demi-flacon.

### Laboratoire DUREL

7, boulevard Denain — PARIS.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

**Composition.** — Créosote pure de hêtre, 0 gr. 10 ; Chlorhydro-phosphate de chaux, 0 gr. 50 ; par cuillerée à potage.

**Action.** — A l'action anticatarrhale, antiseptique et cicatrisante de la créosote, elle joint l'action tonique et récalcifiante du chlorhydro-phosphate de chaux, le plus assimilable des sels de chaux.

Grâce à sa forme de solution complète et bien diluée, elle est toujours bien supportée par l'estomac.

**Indications.** — Toutes les affections broncho-pulmonaires : Bronchite chronique, Toux, Grippe, Prétuberculose, Tuberculose, Coqueluche.

**Posologie.** — 3 à 4 cuillerées à potage par jour avant les repas pour les adultes.

2 à 3 cuillerées à dessert par jour avant les repas pour les enfants au-dessus de 5 ans.

2 à 3 cuillerées à café par jour avant les repas pour les enfants au-dessous de 5 ans.

Prix : 15 fr. le flacon de 350 cc.

### Laboratoire PAUTAUBERGE

10, rue de Constantinople — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## SOLUTIONS DU D<sup>r</sup> CLIN

1° Au salicylate de soude. 2° Au salicylate de lithine. 3° A l'antipyrine.

**Avantages.** — Pureté et tolérance garanties.

**Formes et doses.** — 1° Solution du D<sup>r</sup> Clin au salicylate de soude dosée à 2 gr. par cuillerée à soupe. 2 à 4 cuill. à soupe par jour.

2° Solution du D<sup>r</sup> Clin au salicylate de lithine, dosée à 1 gr. par cuillerée à soupe. 1 à 4 cuillerées à soupe par jour.

3° Solution d'antipyrine du D<sup>r</sup> Clin, dosée à 1 gr. par cuill. à soupe. 1 à 3 cuill. par jour.

**Remarque.** — Grâce à leur véhicule spécial, les solutions du D<sup>r</sup> Clin assurent la tolérance et la diffusion du médicament et se sont acquis, à ce point de vue, une réputation bien connue.

**Laboratoires CLIN**

PARIS.

---

## SOLVURIC

### Forme :

Granulé effervescent à base de formine et de benzopyruvate de soude et de lithine.

### Indications :

Arthritisme, Goutte, Gravelle, Artériosclérose, Antisepsie urinaire.

### Doses :

2 à 4 cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau.

**Laboratoire P. MAUCHANT**

14, rue de Birague — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## SOMNACETINE

### Composition :

Diéthylbarbitur. de soude.....	3 gr.
Phénacet. Codéine Phosph.....	2 gr. 75
Amidon.....	2 gr. 25

**Avantages.** — Combinaison hypnotique selon méthode Burgi, par laquelle les composants unis en prop. judicieuse neutralisent réciproquement leur toxicité, réalisant ainsi un équilibre et une efficacité maxima.

**Indications.** — Insomnie, angoisses, cures de désintoxication ; troubles nerveux, même circulatoires ; névrites, etc...

**Formes.** — *Tablettes* : 10 × 0,3 et 20 × 0,3.

*Ampoules injectables* : 6 × 2 cc.

*Suppositoires* : boîte de 6 et 12.

*Flacon-gouttes* de 20 cc.

**Laboratoires des D<sup>rs</sup> R. et O. WEIL**

**Établ. MERMINOD et C<sup>o</sup>, Concessionnaires**

49, rue de Paradis — PARIS (X<sup>e</sup>).

Tél. : Provence 30-32.

---

## SONÉRYL

Butyléthylmalonylurée.

Action hypnotique, très sûre, propriétés sédatives marquées, sans effets toxiques ni phénomènes d'accoutumance.

*Indications :*

**Insomnies de toute nature, même celles qui sont provoquées par la douleur.**

*Posologie et mode d'emploi :*

Deux comprimés à 10 centigr. le soir au coucher. Répéter cette dose dans la nuit en cas de besoin.

Dose maximum (adultes); 6 comprimés par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« **SPÉCIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## SOPORALOSE

**Principe actif.** — Anhydroglucotrichloréthanol chimiquement pur.

**Propriétés physiques.** — Fines aiguilles cristallines, légèrement amères, peu solubles dans l'eau.

**Action physiologique.** — Son action sur le système nerveux est localisée au cerveau. Agit à faible dose comme hypnotique, à dose plus forte comme anesthésique.

Sans action sur la circulation, la respiration, la digestion. Non toxique, élimination parfaite, accoutumance nulle.

**Action thérapeutique.** — Provoque un sommeil calme et exempt de rêves, sans sensation désagréable au réveil.

**Contre-indications.** — Tous états entraînant hypersensibilité médullaire (hystérie, ataxie, alcoolisme, tabagisme, etc...).

**Posologie.** — Dose normale moyenne : 0 gr. 20.

**Usage.** — Contre toutes insomnies simples ou provenant de causes passagères, de fatigue, de surmenage, de soucis, de neurasthénie.

Convient remarquablement aux cardiaques, dyspeptiques, artérioscléreux, vieillards, tuberculeux.

La boîte de 12 cachets : 10 francs.

**Fabricants : POINTET et GIRARD**

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.

## SOPORIGÈNE DELQUÉ

**Composition.** — Cachets de buthyl-éthyl-malonylurée, dosés à 20 centigrammes.

**Action thérapeutique.** — Hynoptique, anal-gésique.

**Avantages.** — Le moins toxique des hypno-tiques, ne laisse au réveil aucune sensation désagréable, procure un sommeil parfait.

**Indications.** — Toutes les insomnies ner-veuses et douloureuses,

**Mode d'emploi.** — 2 cachets par jour au maximum, dans un peu d'eau, 1/2 heure avant le sommeil, à une heure de distance des repas.

Prix : 8 fr. 50 la boîte de 10 cachets.

**Laboratoires J. M. RICARDOU**  
docteur en pharmacie.

46, rue Pierre-Charron — PARIS.

## SORNYAL

Produit supérieur au Benzoate de Benzyle, dont il ne présente pas les inconvénients et contenant tous les dérivés benzyliques en association médicamenteuse.

**Deux présentations :** 1° *Gouttes* ; 2° *Comprimés*.

**GOUTTES.** — Spécifique des affections spasmodiques des organes à musculature lisse :

Asthme vrai (ou essentiel). Coliques hépatiques ou néphrétiques. Constipation et diarrhée spasmodiques. Hoquet persistant. Coqueluche. Hypertension.

**Posologie.** — V à XL gouttes 4 à 5 fois par jour.

**COMPRIMÉS.** — Spécifique de la DYSMÉNORRÉE (Règles douloureuses).

**Posologie.** — 2 comprimés à un quart d'heure d'inter-  
valle, 6 à 10 par jour.

Gouttes : le flacon : 12 francs.

Comprimés : la boîte de 2 tubes de 10 : 10 fr.

**Laboratoires pharmaceutiques,**  
**L.-G. TORAUDE, O. ✱, O. I. ☉.**

Docteur en Pharmacie, Lauréat de l'Institut et de l'Aca-  
démie de Médecine.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).



## **SPARAPLAST FOURNIER** **à l'Oxyde de zinc.**

Le plus ADHÉSIF. Le plus NERVEUX  
Le plus SOUPLE. Le plus STABLE  
NON IRRITANT.

Garanti renfermant 25 p. 100  
de caoutchouc.

**Laboratoires FOURNIER et Cie**

**J. JARY**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe  
de l'École Supérieure de Paris  
DIJON (France).

---

## **SPASMACOL** **(NORMACOL ATROPINÉ)**

Préparation associant le pouvoir antispasmodique de la Belladone aux propriétés émollientes et évacuantes du Normacol, mucilage parfait.

L'effet utile et maximum de l'alcaloïde est obtenu remarquablement, au point voulu, grâce :

1° A la forme pharmaceutique de petits grains très menus demeurant indépendants, même après gonflement, et répartis sur toute la surface du bol intestinal.

2° Aux propriétés émollientes du mucilage-Normacol, véhicule adéquat de l'alcaloïde.

**Forme.** — Granulé dragéifié en grains très menus.

**Dosage.** — 4/10<sup>e</sup> de millig. d'Atropine-sulfate par cuill. à café rase.

**Indications.** — Toutes gastro-entéropathies avec spasmes.

**Emploi.** — 1 ou 2 cuill. à café aux repas ou en dehors des repas. Mettre le granulé sur la langue, puis l'avaler au moyen d'une gorgée de liquide.

**Laboratoire NORGAN**

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien  
41, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

Tél. : Laborde 08-00.

# SPASMALGINE « ROCHE »

Antispaémodique vrai.

**Composition.** — 1 ampoule ou 1 comprimé contient ;

- A. 1 centigramme PANTOPON « ROCHE »  
(Opium total injectable).
- B. 2 centigrammes PAPAVERINE « ROCHE »,  
(Alcaloïde de l'opium le moins toxique, à propriétés spasmolytiques spéciales).
- C. 1 milligramme ATRINAL « ROCHE »  
(Ether sulf-atropine, sans action sur le centre para-sympathique).

**Propriétés.** — Les *propriétés antagonistes* des éléments entrant dans la composition de la *Spasmalgine* « Roche » expliquent la *toxicité atténuée* de ce médicament prouvée par l'expérimentation et la clinique.

**Indications thérapeutiques.** — *Tous les états spasmodiques*, et notamment coliques hépatiques et néphrétiques, spasmes du larynx, de l'intestin, de l'estomac, coliques, sueurs, diarrhées des tuberculeux, dysménorrhée, angine de poitrine, hoquet épidémique, excitation ante et post-opératoire, accouchements laborieux, tous états d'hyper-excitation, etc.

**Dose et mode d'emploi :**

Voie bucale.....	{	Dose moyenne : 1 à 2 comprimés par jour.
		Dose forte : 2 à 4 comprimés par jour.
Voie hypodermique ou intramusculaire.	{	Dose moyenne : 1 à 2 ampoules par jour.
		Dose forte : 2 à 4 ampoules par jour.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**  
21, place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

## SPASMINE JOLLY

Sédatif de choix du système nerveux.  
Combinaison physiologique stabilisée de

Valériane fraîche et Aubépine.

Odeur et saveur agréables.

**Forme.** — Elixir dosé à 0 gr. 10 par cuillerée à café.

**Doses et mode d'emploi.** — 4 à 6 cuillerées à café par 24 heures ; 1/2 dose pour les enfants.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antispasmodique, hypnotique et hypotenseur, régulateur cardiaque.

**Indications.** — Névropathies et Cardiopathies.

*Echantillons et Notice sur demande.*

Prix du flacon : 12 francs.

**Laboratoire L. JOLLY**

1, rue Christine — PARIS (VI<sup>e</sup>).

---

## SPASMOPURINE

Combinaison calmante et spasmolytique des dérivés de la purine.

**Avantages.** — Outre son action sur l'appareil circulatoire, associe les propriétés antispasmodiques et bronchodilatatrices des dérivés de la Purine. Innocuité absolue, agit mieux que les alcaloïdes.

**Indications.** — Asthme bronchial, asthme cardiaque, dyspnée, affections spasmodiques des voies digestives et urinaires, dysménorrhée.

**Posologie.** — 1 suppositoire 2 à 3 fois par jour (la boîte : 21 francs et 40 francs). Autres formes : Capsules, ampoules.

Littérature, renseignements, échantillons :

**Laboratoires des D<sup>rs</sup> R. et O. WEIL**

**Établ. MERMINOD et C<sup>o</sup>, Concessionnaires**

49, rue de Paradis — PARIS (X<sup>e</sup>).

Tél. : Provence 30-32.

## SPASMOSÉDINE

Antispasmodique — Sédatif nerveux.  
(Thérapeutique cardio-vasculaire.)

### Composition :

Phényléthylmalonylurée .....	0 gr. 015
Bromhydrate de quinine.....	0 gr. 05
Extrait de Cratægus stabilisé...	0 gr. 05
Excipient q. s. pour 1 comprimé	glutinisé.

### Présentation :

Comprimés glutinisés.

### Indications et posologie :

a) *Palpitations, extrasystoles, instabilité cardiaque.*

1 à 2 comprimés avant chacun des deux principaux repas (10 jours par mois).

b) *Tous les troubles fonctionnels consécutifs aux spasmes vasculaires de l'hypertension (céphalée, bourdonnements d'oreilles, éblouissements, vertiges, etc.).*

1 à 2 comprimés avant chacun des deux principaux repas (10 à 15 jours par mois.)

c) *Angine de poitrine et algies précordiales.*

1 à 3 comprimés avant chacun des deux principaux repas (pendant 10 à 15 jours par mois).

Avaler avec un peu d'eau, sans sucer ni croquer.

### Laboratoires DEGLAUDE

*Médicaments cardiaques spécialisés*

Digibaïne, Cardibaïne, Théoxanthine, etc.

6, rue d'Assas — PARIS (VI<sup>e</sup>).

Tél. : Littré 31-85.

Belgique : Agent général : L. Prunières  
19, rue Louis-Hap — BRUXELLES.

## SPÉCIFIQUE BEJEAN

préparation antigoutteuse et antirhumatismale, la plus efficace et la plus inoffensive. Elle réussit dans les cas où les autres médicaments ont échoué.

**Composition.** — Contient comme principes actifs : 1 gr. de teinture de colchique et 0 gr. 20 d'iodure de potassium par cuillerée à café.

**Indications.** — Goutte aiguë ou chronique, Rhumatismes, Sciatique, Névralgies et, en général, toutes les manifestations douloureuses ou fluxionnaires se portant sur les articulations, les muscles et les viscères et qui soient d'origine goutteuse et rhumatismale.

**Doses.** — *Cas aigus* : 3 cuillerées à café par jour, dans une infusion de feuilles de frêne ou un peu d'eau sucrée, jusqu'à sédation de la douleur.

*Cas chroniques* : 1 ou 2 cuillerées à café par jour pendant une semaine sur deux ou pendant douze jours.

*Pour les enfants et les vieillards*, les doses ci-dessus devront être réduites de moitié.

La médication devra être suspendue en cas de diarrhée ou autres troubles intestinaux.

**Dépôt général :**

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.

## SPECTROL

Sérothérapie spécifique des anémies.

**Composition.** — Sérum frais hémopoïétique de cheval, prélevé sur des animaux mis en état de rénovation sanguine par saignées préalables, contenant les hémopoïétines spécifiques du Professeur Carnot (*Ac. des Sc.*, 1906). Ce sérum n'est pas inactivé par tyndalisation, ses substances minimales sont intactes.

**Propriétés thérapeutiques.** — 1° Agent d'Hémopoïèse (Hémopoïétines de Carnot);  
2° Agent de Leucopoïèse et de phagocytose (opsonines);  
3° Action tonique générale du sérum de cheval;  
4° Agent d'Hémostase générale (Traitement prophylactique des interventions sanglantes).

**Indications.** — Toutes anémies, hémophilie, états hémorragipares, convalescences, déficiences organiques, tuberculose, infections et toxi-infections, cure pré-opératoire dans les interventions chirurgicales sanglantes. Pas d'accidents sériques ou infectieux.

**Mode d'emploi. Posologie.** — Sirop agréable à prendre.

Une cuillerée à potage le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau froide ou tiède (jamais chaude).

Une à deux cuillerées à potage dans un demi-verre d'eau avant les deux principaux repas.

Le sérum pris dans ces conditions est rapidement évacué dans le duodénum et ne se peptonise pas.

Littérature et Echantillons :

**LANCOSME**

71, avenue Victor-Emmanuel-III  
PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## SPLÉNARMONE

**Composition.** — Réunit en une préparation facile à prendre l'hormone anti-anémique, l'hormone splénique et les acides aminés (1 ampoule ingérable de 10 cc. correspond à foie frais, 50 gr. ; rate fraîche, 50 gr. ; acides aminés exprimés en glycocolle : 0 gr. 50.)

**Propriétés thérapeutiques.** — Le foie et la rate agissent en puissante synergie pour régénérer la formule sanguine et augmenter la teneur en hémoglobine du sang. Les acides aminés reconstituent les réserves azotées tissulaires et exercent une action excito-sécrétoire sur les sucs digestifs.

**Indications.** — Energique reconstituant, indiqué dans toutes les anémies, la tuberculose, les états consomptifs, anémiques, anorexiques, toutes les déficiences du métabolisme basal. *Adultes* : 1 à 2 ampoules par jour. *Enfants* : 1 ampoule, dans un peu d'eau tiède ou de bouillon non salé.

**Les Établissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS

## SPLÉNOCRISINE

**Solutions injectables de Rate désalbuminée à haute concentration.**

**Splénocrisine 15**

(15 grammes rate par ampoule).

**Splénocrisine 30**

(30 grammes rate par ampoule).

**Splénocrisine 60**

(60 grammes rate par ampoule).

**Dermatoses prurigineuses. Voir Opo-**  
**thérapie Fournier (Endocrisines.)**

**Laboratoires FOURNIER Frères**

7, rue Biscornet — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## SPLÉNO-MAGNÉSIUM

**Composition.** — Comprimés dragéifiés inaltérables à base de :

Extrait de rate.

Oxalate de fer.

Chlorure de magnésium.

Citrate de soude.

**Mode d'action.** — Reminéralisation, excitation de la défense cellulaire, renforcement de l'action du Chlorure de Magnésium par la Splénine.

**Indications.** — Manifestations cancéroïdes, asthénie, insuffisance hépatique, tuberculose.

**Laboratoire R. FAURE**

80, rue du Rocher — PARIS.

---

## SPLENOMANGANOL

**Propriétés thérapeutiques.** — Réparateur puissant, reconstituant, réminéralisateur physiologique.

**Indications.** — Convalescences difficiles, grossesse, allaitement, amaigrissement, rachitisme, bacilloses pulmonaires et osseuses, anémie, neurasthénie.

**Formule.** — Extrait de vitamine B, chlorure de calcium, extrait de rate, nucléinate de manganèse, os frais pulvérisé, surrénale, foie, moelle osseuse rouge, céréaline.

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

**Dose et mode d'emploi.** — Deux à trois comprimés à chacun des deux principaux repas.

Prix de la boîte au public : 20 francs.

**Laboratoires HOCQUETTE**

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine — PARIS.

Tél. : Diderot 04-71.



## SPYROLIDES

**Composition.** — Comprimés gynécologiques à base de bleu de méthylène, méthylbenzénols, tanin, perborate de sodium (oxygène naissant).

**Présentation.** — Dernier mot de la science pharmaceutique en matière de comprimés gynécologiques. Emploi commode et discret ; dissolution complète et instantanée ; ni caustiques, ni irritants, ni toxiques. Désodorisants, décongestionnants, antiseptiques. Ne achent pas. Parfum agréable.

**Propriétés thérapeutiques.** — Au contact de l'eau, les *Spyrolides* produisent instantanément un vif dégagement d'oxygène, donnant une solution puis samment bactéricide, dont l'emploi, même prolongé, n'irrite jamais les muqueuses, favorisant au contraire leur rapide régénération et assurant la défense de leur vitalité.

**Mode d'emploi.** — Un ou 2 comprimés par litre, pour l'injection quotidienne ou biquotidienne de propreté et d'hygiène.

**A titre curatif :** 2 à 3 comprimés par litre, en cas de leucorrhée, métrites, vaginites, salpingites, etc..., ou après l'accouchement.

L'eau *Spyrolidée* par 1 ou 2 comprimés désodorise complètement la peau (transpiration excessive des aisselles, des pieds, etc.).

**Prescrire :** *Spyrolides* : 1 tube (faire suivre du nombre d'injections quotidiennes et du nombre de comprimés à employer).

Tube de 28 comprimés : Prix : 8 fr. 95.

Echantillons et littérature :

**Laboratoires du D<sup>r</sup> NARODETZKI**  
19, boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS

## STAL-KOSAL

« La poudre qui calme »

**Coréine bismuthée.**

Pansement gastro-intestinal.

**Poudre et tablettes.**

**Formule.** — Coréine, mucilage pur, et carbonate de bismuth, chimiquement pur, associés au kaolin et au  $\text{Co}^3\text{Ca}$ .

**Indications.** — Toutes les Gastrites et toutes les Colites. Toutes les inflammations du Cœcum.

**Mode d'emploi :**

**Poudre :** Une cuillerée à soupe *bien délayée* dans un demi-verre d'eau légèrement tiède, le matin au lit et à jeun. Une deuxième cuillerée à soupe le soir, une heure avant le dîner.

Et une cuillerée à dessert au moment des douleurs.

**Tablettes :** dès l'apparition des douleurs, prendre 2 tablettes. Si après quelques minutes les douleurs persistent, prendre une demi-tablette de 5 en 5 minutes jusqu'à sédation.

**Laboratoires A. DANIEL-BRUNET**  
8, rue de la Source — PARIS (XVI<sup>e</sup>).  
Tél. : Auteuil 11-86.

## STALYSINE

**Vaccin curatif antistaphylococcique**  
(D'après la technique du Dr Fisch).

**Indications.** — Furunculose, anthrax, acné, et toutes affections d'origine staphylococcique.

**Double supériorité :** Action directe sur le microbe, pas de réaction fébrile.

**Formes.** — Buccale, la plus pratique (10 ampoules de 3 cc.).

Injectable, la plus rapide et la plus sûre (10 ampoules de 1 cc.).

Filtrat, pour applications sur les foyers ouverts (6 ampoules de 3 cc.).

Prix : 25 fr.

Boîtes de 50 ampoules pour cliniques et hôpitaux.

**Laboratoires P. ASTIER**

41, 42, 43 à 47, rue du Docteur-Blanche, PARIS

## STANION

**Description.** — Etain colloïdal en capsules et en ampoules.

**Capsules :** contiennent 0 gr. 05 d'étain colloïdal avec enrobage de kératine (50 capsules par flacon)

**Ampoules :** contiennent 3 cc. de solution isotonique d'étain colloïdal électrique (4 ampoules par boîte)

**Action thérapeutique.** — L'étain colloïdal s'emploie dans le traitement de toutes les staphylococcies où il permet d'obtenir la régression de l'œdème, suppression de l'inflammation et de la douleur, retour à la température normale, assèchement des foyers, expulsion aisée des bourbillons ; les récidives sont évitées.

**Indications.** — 1 à 2 ampoules par jour dans le traitement des staphylococcies, soit au voisinage de l'abcès, soit dans la fesse.

**Capsules :** 4 à 10 par jour dans le traitement des furonculoses, folliculites, anthrax, phlegmons, panaris, abcès tubéreux, pyodermites, sycosis, septicémies staphylococciques.

**Laboratoires CH. COUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS

## STANNOXYL

Oxyde d'étain et étain métallique  
absolument purs.

**Indications.** — Furunculose et toutes affections à staphylocoque : acné, anthrax, abcès du sein chez les nourrices, etc.

**Formes.** — Pour l'usage *interne* : comprimés, cachets, ampoules. — Pour l'usage *externe* : liquide, pommade.

**Avantages.** — Traitement **pratique, rapide et définitif** : l'ingestion quotidienne de 4 à 8 comprimés fait disparaître l'inflammation et les douleurs et arrête l'évolution de la maladie.

**Laboratoires ROBERT et CARRIERE**

37, rue de Bourgogne — PARIS

---

## STAPHYLAGONE

Vaccin antistaphylococcique, antitoxique et antimicrobien composé de :

Corps microbiens + lysat + anatoxine.

**Indications.** — Vaccination pré-opératoire et traitement de toutes les suppurations et *infections rebelles* à Staphylocoques.

**Posologie.** — Une injection sous-cutanée tous les deux ou trois jours, de 1/2 à 2 cc. progressivement.

Littérature et échantillons :

**H. CARRION et C<sup>o</sup>**

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS

Tél. : Elysées 36-64 et 36-45.

## STAPHYLASE

### du Docteur DOYEN.

Solution concentrée des principes actifs des levures de bière et de vin.

**Indications.** — Acné, Furonculose, Anthrax, Ostéomyélite, Impétigo, Angines, Bronchites, Pneumonies, Gripes, Coryza, Stomatites, Dyspepsie, Entérites.

**Doses.** — *Adultes* : 4 à 12 cuillerées à soupe par jour. *Enfants* : 1 à 4 cuillerées à café par jour.

Associée à l'iodure de potassium et au bromure de potassium, la Staphylase a la propriété d'annihiler les effets secondaires de ces produits.

**Laboratoires LEBEAULT**  
5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III<sup>e</sup>)

## STAPHYLOCIDE AUDRAS

Tablettes sucrées parfumées à la menthe, dosées à 0 gr. 25 d'Étain-Oxyde d'étain plus purs et plus solubles que les produits commerciaux, parce que « Étain d'électrolyse ».

— Croquer 2 à 4 tablettes par jour, aux repas de préférence.

— Contre furonculose, acné, orgelets, phlegmon, abcès divers et toutes infections staphylococciques.  
*Enfants et adultes* : pas de contre-indication.

**NOTA.** — Préparation particulièrement *pratique, absorbable, efficace*, à cause de sa forme de tablettes, nécessitant une longue trituration et division des principes actifs avec le sucre, et leur assurant en outre une fine émulsion par la salive. L'étain arrive ainsi à l'estomac dans l'état idéal pour une absorption rapide et totale.

La boîte (10 à 20 jours) : 12 fr. toutes pharmacies.  
*Demander échantillon à :*

**Laboratoire du STAPHYLOCIDE AUDRAS**  
112, rue de Gerland — LYON.

## STAPHYLO-COCCINE FRAQUET

Extrait protoplasmique de la levure de bière isolé de sa membrane cellulaire. La levure est ainsi de digestion plus facile, d'action plus prompte à doses moindres.

**Propriété thérapeutique.** — Agent de la phagocytose.

**Indications.** — Furunculose, Anthrax, Angine, Maladies infectieuses, Dermatoses.

**Doses et mode d'emploi.**

Adultes : 2 à 5 cuillers à soupe par jour.

— : 4 à 10 comprimés —

— : 1 ampoule —

Enfants : Moitié de ces doses ou moins suivant l'âge.

Prix au public :

Solution, Comprimés ou Ampoules : 15 fr.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

**Laboratoire des Produits SCIENTIA**

D<sup>r</sup> E. PERRAUDIN, pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS.

## STAPHYLOTHANOL

Hydroxyde de Bismuth radifère.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les staphylococcies : Furoncle, Anthrax, Abscess tubéreux de l'aisselle, Ostéomyélites, Ostéites, etc.

Se recommande dans les cas rebelles à toute autre médication.

**Posologie et Présentation :**

Adultes : 1 ampoule de 2 cc. tous les 3 jours ; boîte de 6 ampoules : 18 fr. Ou 1 suppositoire tous les 2 jours ; boîte de 10 suppositoires : 15 fr.

Enfants : 1 ampoule de 1 cc. tous les 3 jours ; boîte de 6 ampoules : 13 fr. Ou 1 suppositoire tous les 2 jours ; boîte de 10 suppositoires : 12 fr.

**Laboratoire G. FERMÉ**

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X<sup>e</sup>).

R. C. Seine 143-981.

## STÉRAMINE

Pâte antiseptique soluble.

**Composition.** — Crème onctueuse stéaro-sodique contenant 1 p. 100 de Clonazone Daufresne, libérant lentement dans la plaie de l'hypochlorite naissant.

**Indications.** — Plaies récentes ou infectées, brûlures, engelures, ulcères variqueux.

**Mode d'emploi.** — Appliquer une fois par jour une couche de 2 à 3 millimètres d'épaisseur et recouvrir d'un pansement sec.

**Avantages.** — Action antiseptique prolongée, pansement propre et sans odeur, cicatrisation rapide.

Prix : 5 fr. le tube.

Echantillons médicaux sur demande.

Laboratoire

des **ANTISEPTIQUES OHLORES**

40, rue Thiers — LE HAVRE.

---

## STÉRINASE VINCENT

Granulé de Cholestérine.

**Composition.** — Granulé dosé à 2 p. 100 de Cholestérine. La Cholestérine n'est pas irradiée et agit ici par doses massives.

**Indications.** — *Chez les enfants* : Hypotrophie, Débilité, Troubles de croissance. *Chez les adultes* : Tuberculose, Maladies infectieuses, Anémie, Hypotension artérielle, Amaigrissement, Convalescence.

**Doses.** — Quatre à six cuillerées à café par jour, au début des repas et plus s'il est nécessaire. Mêmes doses chez les grands enfants. Deux ou trois cuillerées à café chez les nourrissons.

Laboratoire **VINCENT**

14, avenue Mac-Mahon — PARIS

## STÉROGYL

**Formule.** — Solution huileuse au centième d'ergostérine irradiée pure.

**Présentation.** — En flacon de 10 cc. dont X gouttes = 4 milligr. de vitamine D. La faible quantité d'huile administrée à chaque prise n'est pas susceptible de provoquer le moindre trouble digestif même chez les nourrissons les plus fragiles.

**Propriétés thérapeutiques.** — Sous l'influence des rayons ultra-violet, l'ergostérine, substance inerte, donne naissance à une substance active, la vitamine D, douée d'un pouvoir antirachitique très puissant.

La vitamine D est la seule partie agissante de l'huile de foie de morue qu'elle remplace totalement dans toutes ses indications.

**Indications thérapeutiques.** — Tous les états rachitiques, tous les troubles du métabolisme du Calcium, toutes les déperditions en chaux et en phosphates.

Par conséquent, rachitisme, états ganglionnaires, anémies pré-tuberculeuses et post-infectieuses, grossesse, carie des dents, consolidation des fractures.

**Posologie.** — Jusqu'à 1 an..... X gouttes par jour.

De 1 à 10 ans..... X à XX gouttes

Au delà de 10 ans et chez l'adulte : XX à XXX gouttes.

Prix au public, le flacon : 15 fr.

**Laboratoire Français de Chimiothérapie**

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>)

---

# STHÉNOLÉINE

**HUILE POTHÉRAPIQUE  
TONIQUE ET ANTISEPTIQUE  
INJECTABLE  
CHOLESTÉRINÉE ET GOMÉNOLÉE**

**irradiée aux rayons ultra-violet**

**POUR LA MISE EN ÉTAT DE DÉFENSE  
DE TOUT ORGANISME DÉFICIENT  
CONTRE LES GRANDES INFECTIONS**

**Méthode d'immunisation artificielle  
préventive et curative  
par voie intramusculaire.**

**PRODUIT MÉDICINAL FRANÇAIS**

**très diffusible.**

## COMPOSITION

donnée par la formule suivante :

<b>Cholestérine pure</b> (point de fusion 145°-147°).....	0 gr. 04
<b>Lipoïdes spléniques</b> (extrait total de Rate).....	0 gr. 04
<b>Lipoïdes biliaires</b> (extrait total de Bile).....	0 gr. 002
<b>Goménol</b> (essence naturelle pure).....	0 gr. 10
<b>Camphre du Japon</b> .....	0 gr. 10
<b>Eucalyptol</b> .....	0 gr. 02
<b>Huile d'olive surfine</b> , chimiquement épurée, lavée à l'alcool et stérilisée .....	<b>Q. S.</b>
<b>pour une ampoule de 2 cc.</b>	

**N. B. —** Les préparations opothérapiques employées sont faites à partir d'organes frais rigoureusement sélectionnés et contrôlés, puis desséchés dans le vide et à froid avant d'être pulvérisés. Ces préparations sont garanties pures et sans odeur. Leur conservation est indéfinie.

## PRÉSENTATION

La « Sthénoléine » est présentée sous forme injectable  
en ampoules de 2 cc.

(modèle unique).

## EFFETS PHYSIOLOGIQUES

Grâce à la **Cholestérine**, lipoïde insaponifiable retiré du cerveau, la « Sthénoléine » possède de remarquables propriétés antitoxiques, anti-infectieuses et antihémolytiques, d'où son rôle capital dans les actes de défense de l'organisme chez les sujets déficients ou infectés, à sang pauvre en cholestérine.

Grâce encore à la **Cholestérine irradiée aux rayons ultra-violet**, la « Sthénoléine » facilite la fixation du **Calcium** et du **Phosphore** dans l'économie (actinothérapie indirecte).

Grâce à l'**Extrait total de Rate**, la « Sthénoléine » stimule les organes hématopoïétiques et leucopoïétiques insuffisants et supplée à leur déficience (pouvoir de vicariance à l'égard de la moelle rouge osseuse en particulier).



Grâce à l'**Extrait total de Bile**, la «**Sthénoléine**», en injection, amplifie le **péristaltisme intestinal** et stimule toutes les **sécrétions glandulaires**, surtout celles du **Pancréas** et du **Foie** (augmentation de la biligénèse et de la glycogénèse).

Grâce au **Goménol** et au **Camphre**, la «**Sthénoléine**» augmente l'énergie et le nombre des contractions du **Cœur**.

Grâce enfin au **Goménol** et à l'**Eucalyptol**, la «**Sthénoléine**» est fortement **antiseptique** et rapidement **désodorisante**.

### **PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES**

**Antitoxique — Anti-infectieuse — Antihémolytique.**

**Cardio-tonique — Antiseptique — Désodorisante.**

### **INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES**

**Tous états de déchéance organique.**

**Anémies, Chlorose, Lymphatisme, Scrofule, Arriération, Amaigrissements, Prétuberculose, Déminéralisations.**

**Toutes les maladies infectieuses.**

**Grippe, Fièvre typhoïde, Paludisme, Rhumatisme, Pleurésies, Tuberculose confirmée, Pneumonie.**

### **MODE D'EMPLOI ET DOSES**

La «**Sthénoléine**» s'injecte dans les muscles de la région fessière suivant la technique habituelle.

L'injection ne cause ni douleur, ni induration.

**DOSES MOYENNES POUR 48 HEURES**

#### **Adultes**

une ampoule de 2 cc.

**Adolescents — Enfants — Nourrissons**

1 cc. 1/2

1 cc.

1/2 cc.

**en une fois tous les deux jours**

Jusqu'à concurrence de dix injections consécutives.

— **Remarque** —

*Il est souvent prescrit par le Médecin de faire plusieurs séries de dix injections (même à raison d'une injection tous les jours et à plus fortes doses) sans intervalles de repos.*

### **PRIX DE VENTE IMPOSÉ**

**L'étui de 10 ampoules de 2 cc. : 25 fr.**

### **LABORATOIRE DU MIGELLIODE**

**Produits médicaux spécialisés.**

*Fabrication française.*

**A. ROLLAND, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
31, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (IV<sup>e</sup>).**

#### **DÉPOT GÉNÉRAL**

**Service commercial — Service médical**

**88, rue de la Villette — PARIS (XIX<sup>e</sup>).**

**Téléphone : Botzaris 34-32.**

## STHENOXAL

Médication réparatrice et reconstituante, en comprimés dragéifiés. Fer et Arsenic organiques, Kola ; Strychnos.

**Indications.** — Syndromes d'hypovitalité générale. Insuffisances, appauvrissements et affaiblissements organiques. Grossesse, allaitement, vieillesse. Anémies, chlorose, hérédité. Déchéances progressives. Convalescences. Intoxications et toxi-infections.

### Emplol et doses.

**Adultes :** 3 comprimés par jour au total, aux repas ; avaler sans croquer.

**Vieillards :** 2 comprimés par jour.

**Enfants :** A partir de 6 ans : 1 comprimé par jour ; de 10 à 15 ans : 1 ou 2 comprimés par jour ; de 15 à 18 ans : 2 comprimés par jour.

Prix : 17 francs.

Echantillons grandeur normale sur demande

**Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées**

47, rue de Paris — ASNIÈRES (Seine).

## STOMAL

Pansement gastrique calmant.

**Composition.** — Poudre à base de kaolin, carbonates alcalins, saturants, bétol, pepsine.

**Indications.** — Pyrosis, Dyspepsies, Hyperchlorhydrie, Gastrite, Dilatation. Calme la crise gastrique par saturation des acides ; désinfecte l'intestin et neutralise les fermentations.

**Posologie.** — Une cuillerée à café à jeun et après les repas dans un peu d'eau ; une ou deux autres dans la journée si besoin. Innocuité absolue.

Prix : 12 fr. 50.

Echantillons sur demande adressés à :

**Laboratoire PY**

58, bd Richard-Wallace — PUTEAUX (Seine).

## STOMARINE BILLAULT

Traitement des maladies de l'estomac par le tricarbonate de chaux, magnésie, bismuth.

**Forme :** Comprimés.

Il résulte des recherches faites sur des affections stomacales et notamment des travaux remarquables du professeur ROBIN que les meilleures médications provoquant le soulagement et la guérison de la presque totalité des troubles de l'estomac comportent dans leur formule de la magnésie et du bismuth.

Partant de ces données, nous avons fait un choix judicieux des composés de magnésie et de bismuth qu'il fallait utiliser et après un dosage rigoureux des éléments actifs, nous avons adopté le tricarbonate de magnésie, bismuth et chaux ; ce dernier corps agissant comme neutralisant de l'acidité stomacale sans action laxative.

**Mode d'emploi.** — Sucrer 2 comprimés et davantage sans inconvénient chaque fois que les douleurs se font sentir ; celles-ci sont calmées instantanément.

La boîte : 12 francs.

**Laboratoires pharmaceutiques**

L.-G. TORAUDE O. , O. I. ,

Docteur en pharmacie, Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°)

Dépôt et Agence générale de Vente des Produits pharmaceutiques spécialisés BILLAULT. — R. C. Seine 218758 B.

## STOMAROL

**Estomac de porc desséché et délipoidé**  
(Méthode de Castle.)

**Composition.** — Le Stomarol est un Extrait d'estomac de porc desséché et délipoidé selon la *méthode de Castle* qui permet de conserver intégralement au produit les ferments résolutifs de la viande tels qu'ils se trouvent dans un estomac normal.

**Présentation.** — Forme poudre, insoluble, sans odeur ni mauvais goût, dont :

30 gr. représentent 250 gr. estomac frais de porc.

**Indications.** — Le Stomarol est recommandé dans tous les cas d'insuffisance gastrique et particulièrement dans l'anémie pernicieuse généralement accompagnée d'achylie.

**Posologie :**

**Adultes :** 20 à 30 grammes par jour (2 à 3 cuillerées à soupe).

**Enfants :** 10 à 15 grammes par jour (2 à 3 cuillerées à dessert).

**Mode d'emploi.** — A prendre au début des repas délayé dans : potage, lait, purée de légumes, confiture, etc.).

**Laboratoire Albert ROLLAND**

31, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (IV°).

## STOMÉOL-VICHY

Poudre-Cure alcaline.

**Composition.** — Papaine, Kaolin, Carbonate de Chaux, Magnésie, Phosphate de Chaux, Sel de Vichy, Ess. de Menthe.

**Indications.** — Le meilleur saturant des Hyperacidités gastriques. Digère les albuminoïdes. Agit aussi bien en milieu acide que neutre ou alcalin.

**Posologie.** — 1 cuillerée à café dans un peu d'eau, après les repas ou au moment des douleurs.

Prix du flacon : 15 francs.

**Laboratoire CHEVILLON**

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-Oise).

## STOMOBROL

Sédatif et Curatif puissants des Gastropathies, Troubles dyspeptiques douloureux.

**Propriétés thérapeutiques.** — *Pansement véritable de la muqueuse gastrique* par le Kaolin.

*Antiseptique* : par le Carbonate de bismuth.

*Absorbant* : par le Carbonate de chaux léger et la Magnésie hydratée.

*Sédatif* : par le bromure de sodium, la belladone, la codéïne.

*Musculopoiétique* : par la noix vomique qui rétablit les contractions normales de l'estomac rendues indolores par la belladone.

*Reconstituant* : par le phosphate tricalcique et la strychnine (*noix vomique*) dans les états dépressifs consécutifs aux gastropathies.

**Indications.** — Dyspepsies, hypersthénies, gastralgies, pyrosis, ulcères, aérophagies, anorexies d'origine digestive. Entérites aiguës et chroniques.

**Présentation et mode d'emploi.** — *Poudre* : 1 à 2 cuillerées à café délayées dans un peu d'eau après les repas ou au moment des douleurs.

*Cachets* : 2 à 4 par jour, après les repas ou au moment des douleurs avec une infusion chaude de préférence.

Littérature et échantillons sur demande.

**Laboratoires CLAVERIE**

4, avenue de Brazza — ROMAINVILLE (Seine).

## STOMOPHILE

### RÉGULATEUR ENERGIQUE DES FONCTIONS STOMACALES

(Alcalin-Antiferment.)

**Forme.** — Paquets (de saturation).

**Composition.** — Alcalins (sodium, calcium, magnésium). Bismuth (professeur Hayem).

**Indications.** — Dyspepsie, Gastralgie, Gastrites aiguë et chronique, Hyperchlorhydrie, Hypersthénie, Pyrosis, Ulcère.

(Supprime, dans de nombreux cas, l'atonie intestinale.)

**Posologie.** — Un paquet, délayé dans un peu d'eau, à la fin ou 1 heure après les principaux repas.

Dans les crises aiguës, prendre supplémentairement 1 ou 2 paquets dans le courant de la journée.

### INNOCUITÉ ABSOLUE

Littérature et échantillon gratuit à MM. les Docteurs pour leurs essais cliniques.

Prix : 12 francs.

**Laboratoires DORANTOWIOZ**

17 bis, avenue Parmentier — PARIS.

## STOMOXYGÈNE

Troubles gastro-intestinaux. Constipation. Fétidité de l'haleine. Insuffisance hépatique.

**Composition.** — Peroxyde de magnésie, chimiquement pur, extraits biliaires, émodine, purgène et belladone (Travaux de Tschirch).

**Forme.** — Comprimés dragéifiés.

Double réaction en milieu stomacal.	{	Dégagement d'O.	{ Naissant. }	Action antiseptique.
		Production de chlorure de magnésium.	{ Naissant. }	

**Propriétés thérapeutiques.** — Action antifermentescible, désinfectante, antiseptique, anti-colibacillaire. Effets toniques et cytophylactiques des sels halogènes magnésiens. Laxatif puissant, sans accoutumance.

**Indications.** — Toutes les dyspepsies. Constipation sous toutes ses formes. Fétidité de l'haleine. Toutes les fermentations. Rééducation intestinale, colites, entérocrites, etc... et toutes les manifestations colibacillaires.

**Mode d'emploi.** — 1 à 2 pastilles avant chaque repas. Littérature et échantillons.

**Société Française d'Extension Bio-Chimique,**

6, rue du Chevalier-de-la-Barre — SAINT-QUENTIN (Aisne).

## STOPRAL

Analgésique, sédatif, antipyrétique, régulateur nerveux. Strictement atoxique. Formule établie pour adultes seulement. Comprimés à avaler, ou à déliter dans l'eau auparavant.

**Indications.** — Douleurs de la goutte, de l'arthritisme.

Névralgies.

Règles douloureuses, spasmes douloureux,

Fièvre, malaises généraux, grippe, maladies fébriles.

Migraines, céphalées, coryza.

Le STOPRAL ne provoque aucune fatigue des voies digestives,

Exerce sur le cœur une action tonique,

Agit rapidement,

Ne présente pas de contre-indication.

**Doses.** — Pour adultes seulement :

Un comprimé dans 1/2 verre d'eau au moment de la douleur, à n'importe quel moment de la journée. Un second comprimé peut être utile quelques heures après le premier, un troisième est rarement utile et constitue la dose maxima.

Prix : 12 francs.

Echantillon grandeur normale sur demande.

Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées  
47, rue de Paris — ASNIÈRES (Seine).

## STOVAÏNE

Chlorhydrate de diméthylaminobenzoyl-pentanol.

Anesthésique local moins toxique que la cocaïne. Vaso-constricteur, toni-cardiaque et antiseptique. Pas d'accoutumance.

*Indications :*

**Toutes les applications médicales et chirurgicales de la cocaïne.**

*Posologie et mode d'emploi :*

Solution à 0,50 et à 1 p. 100 (Anesthésie locale), solution à 10 p. 100 (Rachi-anesthésie), Pastilles à 2 centigr. (Affections de la bouche et du pharynx)

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## STOVAR SOL

Acide oxyacétylaminophénylarsinique.

Forte teneur en arsenic (27,2 p. 100). Toxicité faible. S'administre par la voie buccale.

*Indications :*

**Amibiase, Lambliose, Helminthiases, Spirochètoses intestinales, États diarrhéiques, Syphilis, Pian.**

*Posologie et mode d'emploi :*

Comprimés à 25 centigr., 5 centigr. et 1 centigr.

*Doses moyennes : adultes : 50 centigr. à 1 gr. par 24 heures ; enfants : 2 à 10 centigr.*

Le *Stovarsol sodique*, soluble, convient aux injections hypodermiques (paralysie générale).

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## STROPHANTINE CATILLON

**Forme : GRANULES DE CATILLON**

à 0,0001 de Strophantine cristallisée  
extraite du Strophantus Gratus.

Synonyme : **Ouabaïne.**

**Indications.** — Affections mitrales, Dyspnée, Oppression, Œdèmes, Asystolie, Cardiopathies des enfants et vieillards, Lésions cardiaco-aortiques. Artério-sclérose avec ou sans néphrites.

**Posologie.** — 2 à 4 granules par jour, comme tonique du cœur.

## STROPHANTUS CATILLON

**Forme : GRANULES DE CATILLON**

à 0,001 Extrait titré de Strophantus.

**Indications.** — Asystolie, Oppression, Dyspnée, Œdèmes, Affections mitrales, Cardiopathies enfants et vieillards.

**Posologie.** — 2 à 4 granules par jour, comme tonique du cœur, *diurétique.*

En cas urgent, on peut donner 10 à 20 granules pour forcer la diurèse.

Prix de l'Académie de médecine.

---

**Laboratoire CATILLON**

3, boulevard Saint-Martin — PARIS.



## **STRYCHNAL LONGUET**

Toutes indications de la strychnine.

Dérivé synthétique de la strychnine, de toxicité dix fois moindre.

Affections médullaires et névritiques. — Asthénie. — Neurasthénie. — Tuberculose. — Maladies infectieuses. — Convalescence. — Anémie.

**Doses.** — Par jour :

2 à 4 granules de 0 gr. 01 ctgr. de Strychnal.  
1 à 2 ampoules de 0 gr. 01 ctgr. de Strychnal par cm<sup>3</sup>.

Le flacon de 50 granules : 14 fr.

La boîte de 12 ampoules : 18 fr.

**Laboratoires LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS (XI<sup>e</sup>).

---

## **STRYCHNARSITOL ROBIN**

Injectable

Glycérophosphate de soude, acide nucléinique et méthylarsinate de strychnine.

Ampoules injectables de 2 cc.

**Dose et mode d'emploi.**

Une injection Hypodermique de 2 cc.  
par 24 heures.

**Laboratoires M. ROBIN**

13, rue de Poissy — PARIS.

## STUPHO

Antidiarrhéique non toxique.

**Composition.** — Lactate de Chaux, Extrait de Salicaire, Benzonaphtol.

**Aux propriétés antidiarrhéiques de la salicaire signalées par d'éminents thérapeutes (de ROUVILLE, CAMPARDOU, DUFOUR) s'associe l'action remarquable du Lactate de chaux dans toute diarrhée ou dysenterie.**

**La présentation en comprimés ou granulés en permet l'administration aisée aux enfants les plus jeunes, la solution du granulé dans l'eau donnant instantanément une préparation vanillée très agréable au goût.**

**Mode d'emploi.** — *Comprimés* : 2 à 6 par 24 heures pour l'adulte ; 1 à 4 par 24 heures pour l'enfant à délayer dans 1/4 de verre d'eau sucrée tiède.

*Granulé* : 1 à 4 cuillerées à bouche pour l'adulte.

1 à 3 cuillerées à dessert pour l'enfant.

1 à 4 cuillerées à café pour le bébé.

à croquer ou dissous dans un peu d'eau tiède.

Prix : *Granulé*, 9 fr. *Comprimés*, 5 fr.

**LABORATOIRE DU MAINGUY**

**M. BASSIN**, docteur en pharmacie — BONDY (Seine).

*Echantillons sur demande.*

## SUCRE EDULCOR

dit le Sucre des Diabétiques.

Très ancienne préparation, très connue, recommandée aux Diabétiques par tout le Corps Médical.

Une pastille suffit pour sucrer une tasse de café, thé, grog, etc...

## LITHARSYNE

**Indications.** — Traitement du diabète et de l'arthritisme par le Chlorhydro-Méthylarsinate de Lithine.

**Posologie.** — *Solution* : 1 cuillerée à soupe avant les repas de midi et du soir.

*Gouttes* : XXV gouttes avant les repas de midi et du soir dans un peu d'eau.

*Comprimés* : 6 par jour (3 avant chaque repas).

Echantillons gratuits à Messieurs les Docteurs.

**Laboratoires E. FERRÉ**

19, rue Grégoire-de-Tours — PARIS (VI°).

# SUCROQUININE

Ch. Gautier.

La SUCROQUININE est du chlorhydrate de quinine purifié, solubilisé par l'uréthane, en solution isotonique glucosée. Les travaux de Georges Rosenthal, René Besnard, de Caussade, de Lesné, ont démontré que la quinine est parfaitement tolérée par les veines lorsqu'elle est préparée dans ces conditions.

**Indications.** — Paludisme sous toutes ses formes.

**Présentation.** — Ampoules de 5 cc. pour injections intraveineuses contenant 0,30 de chlorhydrate neutre de quinine par ampoule.

**Posologie.** — De 1 à 4 ampoules par jour, espacées de 4 heures en 4 heures, selon la gravité de la crise. Cette dernière dose ne doit pas être dépassée.

Le traitement sera continué plusieurs jours de suite jusqu'à jugulation complète de la crise.

Prix au public : 14 francs.

Laboratoires  
des

Spécialités pharmaceutiques Ch. GAUTIER

13, rue Dorian — PARIS (XII<sup>e</sup>).

# SULFARSÉNOL

Adopté par les Hôpitaux.

Dioxydiaminoarsénobenzène diméthylène sulfite de soude. Teneur en arsenic : 20 p. 100.

**Injections** (au choix du médecin) : Intraveineuses, sous-cutanées, intramusculaires.

**Indications.** — Syphilis, Hérédo-Syphilis, Paludisme, Pian, Infection puerpérale, Blennorrhagie, Erysipèle, Athrepsie, Anorexie des nourrissons, Goitre endémique, Angine de Vincent, Dermatoses chroniques, Zona, Pyorrhée alvéolaire, Interventions chirurgicales.

**Doses :**

A	B	C	D	E	1	2	3	4
5 milgr.	1 ctgr.	1,5	2	3	6	12	18	24
$\frac{5}{30}$ $\frac{6}{36}$	$\frac{7}{42}$ $\frac{8}{48}$	$\frac{9}{54}$	$\frac{10}{60}$	$\frac{11}{72}$	$\frac{12}{84}$	$\frac{13}{96}$		
								ctgr.

Voir Arsénos-Solvant.

Laboratoires de Biochimie Médicale  
Ch. DESGREZ, Docteur en pharmacie

19-21, rue Van-Lée — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Téléphone : Auteuil 26-62 et 04-30.

## SULFARSINOL LEFÈVRE

**Composition.** — Combinaison organique de nature grasse, renfermant du soufre, de l'iode et de l'arsenic associés à l'acide cinnamique.

Facilement saponifiable dans l'intestin en donnant du soufre et de l'iodure d'arsenic à l'état colloïdal en même temps qu'un cinnamate alcalin.

Se trouve en capsules gélatineuses correspondant à la formule : acide cinnamique : 0,02 ; iodure d'arsenic : 0,003 ; sulfoléine à 35 p. 100 de soufre : 0 gr. 30.

**Propriétés thérapeutiques.** — Celles du soufre colloïdal et de l'iodure d'arsenic associés à un balsamique, l'acide cinnamique. — Affections cutanées, rhumatismes, bronchites, emphysèmes, etc.

**Mode d'emploi.** — 2 à 6 capsules par jour, avant le repas.

Prix : 12 francs.

Echantillons :

**Laboratoire du Docteur C. LEFÈVRE**  
52, rue Descamps — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

## SULFARSIODE

**Composition et dosage :**

Iode .....	0 gr. 006	par cc.
Arsenic .....	0 gr. 002	
Soufre allylique .....	0 gr. 004	—
1 cc. représente 42 gouttes.		

**Indications :**

Troubles ganglionnaires et lymphatiques, adénite, affections cutanées, asthme, arthritisme, engelures, accidents spécifiques héréditaires ou acquis.

**Posologie :**

Bébés, selon l'âge, VI à XII gouttes par jour.

Adolescents — X à XX — —

Adultes — XVI à XXX — —

A prendre en 2 fois dans un peu d'eau sucrée au milieu des repas.

**Forme et prix :**

Gouttes : 16 fr. le flacon.

Préparé par le Dr ROGER, Pharmacien.

Echantillons et vente en gros : **François OARTIER**  
1, rue de la Martinière — LYON:

## SULFOBYL

**Forme.** — Dragées glutinisées.

### Composition :

Soufre colloïdal.....	0,02
Extrait de bile .....	0,05
Extrait de foie .....	0,05
Entérokinase .....	0,02
Extrait de pancréas .....	0,02
Urotropine .....	0,05
Aloïne .....	0,005

Par dragée.

### Action thérapeutique :

Excite la sécrétion biliaire et la fonction antitoxique, assure la digestion parfaite des différents aliments, combat les infections intestinales et la constipation, évite le choc hématoclasique de Widal.

### Indications :

Insuffisances du foie et de l'appareil digestif, constipation, auto-intoxication intestinale, arthritisme, dermatoses, etc.

### Mode d'emploi :

Adultes : 2 dragées après chaque repas avec un peu d'eau.

Enfants : 1 dragée.

Avaler sans croquer. — Prix : 10 francs.

**Laboratoire LAFARGE**

6, boulevard Arago — PARIS.

## SULFOCRÈME LILESS

**Composition.** — Crème non grasse contenant 20 p. 100 de Soufre précipité desséchant et formant poudre adhérente à la peau.

**Indications.** — Contre séborrhée et acnés.

**Mode d'emploi.** — Appliquer la nuit en couche très légère dans les cas légers, plus ou moins épaisse dans les cas rebelles et en couche aussi légère que l'on veut pour la journée, en poudrant par-dessus. Elle se nettoie avec la plus grande facilité avec des tampons d'ouate et de l'eau chaude ou par le simple lavage.

Prix : 7 francs.

**Laboratoires FISCH et C<sup>ie</sup>**

4, rue d'Illzach — MULHOUSE (Haut-Rhin).

Dépôt à PARIS : 49, rue de Paradis.

Tél. : Provence 30-32.

---

## SULFOÏDOL ROBIN

Soufre colloïdal.

Granulé. Ampoules. Pommades.

**Doses et mode d'emploi.** — Granulé : 2 cuillers-mesure 2 fois par jour. Chaque cuiller contenant 10 centigr. de soufre colloïdal.

**Injectable :** 1 injection par jour dans les cas graves. Dans les cas ordinaires 1 injection tous les 2 ou 3 jours.

**Indications.** — Troubles de la nutrition sulfurée. Pharyngites chroniques. Bronchites chroniques. Antisepsie de l'intestin. Rhumatismes aigus et chroniques. Arthritismes. Syphilis.

**Laboratoires M. ROBIN**

13, rue de Poissy — PARIS.

## SULFOLÉINE

du D<sup>r</sup> E. ROZET

**Principe actif.** — Sulfolitholate d'ammonium.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication soufrée organique, antiseptique, expectorante, balsamique, décongestionnante. Ni toxique, ni narcotique, ni antispasmodique, n'entrave pas l'expectoration.

**Forme.** — Solution désodorisée aromatisée.

**Indications.** — Coqueluche, Bronchites aiguës et chroniques, Laryngites et Rhino-pharyngites aiguës et chroniques, Associations microbiennes secondaires de la Tuberculose pulmonaire.

**Doses moyennes.** — 3 à 5 cuillerées à café, à dessert, à soupe par 24 heures, suivant les âges et l'intensité des cas. La Sulfoléine peut être prescrite aux plus jeunes nourrissons. Les doses moyennes peuvent être doublées.

**Mode d'emploi.** — Donner les doses prescrites avant les repas, après une quinte, soit pures, soit dans eau sucrée, lait, tisane, à volonté.

Prix : 8 francs.

Laboratoire de la Sulfoléine ROZET

Benderitter et C<sup>ie</sup> — VENDOME (Loir-et-Cher).

## SULFO-RHINOL FAYÈS

Baume demi-solide en tube stérilisé, pour l'antisepsie des fosses nasales.

**Composition.** — Soufre naissant, benjoin, vaseline rectifiée.

**Propriétés.** — Désinfecte sans l'irriter la cavité du rhino-pharynx, modère la congestion locale, calme l'irritation de la muqueuse, fixe les poussières et détruit les microbes charriés par l'air inspiré.

**Indications.** — Coryza aigu, grippe, pharyngites, otites, affections typhoïdes. Prévention de l'influenza, de la diphtérie, des fièvres éruptives, de la méningite cérébro-spinale, etc. Très utile aussi quand on voyage en chemin de fer, ou qu'on séjourne dans une atmosphère chargée de poussières.

**Mode d'emploi.** — Introduire matin et soir dans chaque narine une parcelle de baume, grosse comme une lentille. Renifler fortement pour faire pénétrer le médicament jusqu'au rhino-pharynx.

Laboratoires des Produits Fayès

199, rue Saint-Denis — PARIS (II<sup>e</sup>).

## SULFUREUX CONCENTRÉ DAX

Soufre colloïdal par voie buccale.

**Composition.** — Soufre colloïdal : 1 gr. 50 pour une AMPOULE de 10 cc. à diluer dans 250 gr. d'eau pour en faire une POTION-SEMAINE, 3 ampoules par boîte.

**Avantages.** — 1° ÉTAT COLLOÏDAL certain, car le liquide conserve ses mouvements browniens ; 2° conservation indéfinie, car la pseudo-solution concentrée, en ampoules scellées met le soufre à l'abri de l'air et empêche la formation d'anhydride sulfureux ; donc AUCUNE MAUVAISE ODEUR ; 3° attrait pour le malade de la fabrication de la potion, 3 potions dans une boîte pour 18 francs.

**Posologie.** — Chaque ampoule, diluée dans 250 gr. d'eau, sucrée ou non, fait une potion pour une semaine.

2 à 4 cuillerées à soupe par jour, matin et soir.

**Indications.** — Toute manifestation arthritique. Bronchite chronique, emphysème, asthme, catarrhe, rhumatismes, dermatoses (eczéma, acné).

**Coqueluche :** 2 à 4 cuillers à café au-dessous de 10 ans ; 2 à 4 cuillers à soupe au-dessus de 10 ans. Adjuvant du traitement syphilitique, action antitoxique et éliminatrice du HG et AS.

Prix au public : 18 francs (traitement d'un mois).

**Laboratoire MORELLET**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des hôpitaux de Paris,  
BAGNOLLES DE-L'ORNE— (Orne).

---



## SULFUREUX POUILLET

*Approuvé par l'Académie de Médecine.*

### MÉDICATION SULFUREUSE

---

Le *Sulfureux Pouillet* pour boisson est une poudre sulfureuse amorphe créée par M. Pouillet, l'éminent professeur de Chimie.

**Mode d'action.** — Au contact de l'eau, formation de Monosulfure de sodium à l'état naissant.

**Indications thérapeutiques.** — Les propriétés sont celles des eaux minérales sulfureuses naturelles.

Son action est merveilleuse dans les Rhumes au moment de l'expectoration, Catarrhes pulmonaires ou Bronchites, Affections du Larynx, Granulations de la Gorge, Pharyngites, Extinctions de voix, Catarrhes nasopharyngiens, dans l'Ozène et autres maladies du nez et de la gorge, les Diathèses arthritiques, herpétiques, rhumatismales, et en lavements contre les oxyures.

Enfin l'effet curatif est surprenant dans la plupart des Eczémas, dans l'Acné et en général dans toutes les affections de la peau.

Le *Sulfureux Pouillet* s'emploie en boisson ou en bains. Il est des plus efficaces en vaporisations au moyen du pulvérisateur à vapeur.

**Mode d'emploi.** — *Boisson* : 1 mesure pour un verre d'eau ou de lait (agiter avec une baguette de bois) ; à prendre matin et soir, loin des repas. Echantillons sur demande. Prix : 9 fr. 50.

## SULFUREUX POUILLET

pour bains et lotions.

Un flacon pour un bain d'adulte..

Un demi-flacon pour un bain d'enfant.

1 cuillerée à café pour 2 litres d'eau (pour lotions).

Prix : 6 fr.

---

**Laboratoire POMPANON**

62, rue du Cardinal-Lemoine — PARIS (V°).

## SULFURINE DU DOCTEUR LANGLEBERT

**Composition.** — A base de : Carbonate neutre de sodium, de soufre spécial et de chrome.

### Action :

*La sulfurine* donne, par sa dissolution dans l'eau, un bain alcalin soufré ; et réalise, à domicile, le bain hygiénique par excellence.

**Indications.** — Dermatoses, rhumatisme chronique, traumatismes, blessures, diabète, lymphatisme, scrofule, anémie, chlorose, rachitisme, convalescences, déchéance organique.

Bain hygiénique, tonique et fortifiant. N'abîme pas les baignoires.

**Mode d'emploi.** — Une boîte pour un grand bain. Utiliser, pour les soins de la toilette et dans les dermatoses, le *savon Sulfurine Langlebert*.

**ADRIAN et Cie**

9 et 11, rue de la Perle — PARIS.

---

## SULFURION

**Description.** — Complexe colloïdal électrique isotonique, non toxique et indolore, à base de soufre, en ampoules de 3 cc. (4 ampoules par boîte).

**Action thérapeutique.** — Le Sulfurion libère les ankyloses dans le rhumatisme chronique, diminue les nodosités, permet le retour au fonctionnement des articulations et remédie à l'insuffisance sulfurée. En même temps les phénomènes douloureux disparaissent et le retour à la santé s'établit.

**Indications.** — 1 ampoule de 3 cc. tous les 2 ou 3 jours, dans toutes les formes de rhumatisme aigu ou chronique, simple, fibreux, osseux, partiel, blennorragique, et dans toutes les insuffisances sulfurées, goutte, acné, pharyngites chroniques, etc.

**Laboratoires Ch. COUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS.

## SULFURYL MONAL

**Formes.** — Deux formes.

*Usage interne :* Pastilles agréables à sucer ou à croquer.

*Usage externe :* Comprimés inhalants pour gargarismes, inhalations, pulvérisations, etc.

**Composition.** — Synthèse des eaux minérales sulfureuses.

**Doses.** — *Usage interne :* Croquer ou sucer 2 à 6 pastilles par jour.

*Usage externe :* 1 comprimé dans un récipient d'eau chaude chaque 4 minutes.

**Propriétés.** — Permet d'instituer d'une façon active partout et en toute saison la *médication sulfureuse interne et externe.*

**Action.** — Antiseptique et antitoxique, stimule les échanges.

**Indications.** — Affections de la gorge et des voies respiratoires, Grippe, Coqueluche, Lymphatisme, Rhumatismes, Syphilis, Maladies de la peau, Etats infectieux et post-infectieux.

Le tube de 30 pastilles (Sulfuryl Monal) : 12 francs.

Le flacon de 30 comprimés (Sulfuryl Monal Inhalant) : 12 francs.

**Laboratoires MONAL et C<sup>ie</sup>**

6, rue Bridaine — PARIS.

## SUPER-DIGESTIF LEGRAND

Antigastralgique.

**Indications.** — Hypopepsie, Hyperchlorhydrie, Fatigue de l'estomac, Fermentations, Pyrosis, etc.

Muqueuse ulcérée.

Médication prénéoplasique.

**Posologie.** — 1 cachet après les trois repas.

Prix : 15 francs la boîte de 30 cachets.

**Laboratoire DU SIÈCLE**

94-96, rue Monge — DIJON.

## SUPERNUCLÉINE LEGRAND

Reconstituant cellulaire.

**Indications.** — Chlorose, Cachexie, Anémie, Asthénie, Intoxications intestinales, prétuberculose et néoplasmes. (Littérature discrète sans aucune mention de ces deux derniers cas.)

**Posologie.** — 1 à 3 cachets par jour avant les repas, suivant la gravité du cas.

Prix : 15 fr. la boîte de 30 cachets.

**Laboratoire du SIÈCLE**  
94-96, Rue Monge — DIJON

## SUPPARGYRES

du Docteur FAUCHER

Traitement de la Syphilis acquise ou héréditaire, récente ou ancienne. Méthode simple sous forme discrète, *voie recto-portale (voie rectale)*, active et sans inconvénient à tous les âges et dans tous les états (grossesse, fatigue, voyage, etc.).

**Forme.** — Adultes. — Suppositoires à 0.04 cgr. de Hg. vif préparé mécaniquement à froid pour obtenir une division absolue. Nourrissons et enfants de 1 à 10 ou 11 ans : 0,02 cgr.

**Dose.** — 1 le soir en se couchant. Suivre le traitement 30 à 40 jours, repos de 8 ou 10 jours ou davantage et recommencer.

**Nota.** — Hg. vif est et reste supérieur à tous les sels, toujours instable. Le seul anti-syphilitique *indiscutable et indiscuté*. Sa véritable voie d'absorption est la *voie rectale* parce que tous les capillaires de l'intestin vont au foie qui vitalise et rend Hg. actif. On mélange à une solution d'arséno-benzol de tréponèmes vivants : *Ils vivent*. Mais si l'on ajoute au mélange une trace d'**EXTRAIT de FOIE**, les tréponèmes sont foudroyés.

(Expériences de Levaditi.)

**Laboratoire du Docteur TISSOT**  
24, boulevard de Clichy — PARIS

## SUPPO-GYNALS

Analgésique sédatif, local et général.

**FORME.** — Suppositoires.

**Composition.** — Antipyrine, chlorhydrate de morphine, extraits de belladone, de jusquiame et de sénéçon, beurre de cacao.

**Propriétés thérapeutiques.** — Calment instantanément les douleurs qui précèdent les règles et, en général, celles qui ont pour siège les organes pelviens, les règles douloureuses, contractions utérines, hémorroïdes, fistules, etc...

**Mode d'emploi.** — Dès le début des douleurs, introduire dans l'anus un **Suppo-Gynal**. Dix minutes après, deuxième suppositoire. (Il est bon d'employer les suppo-gynals dès le début des douleurs. Plus on tarde, moins l'effet est sûr.)

Prix : 12 francs.

**Laboratoires LEES**

124, rue du Bac — PARIS.

---

## SUPPOSITOIRES A L'ESCULÉOL

Contre les hémorroïdes.

Adrénaline, scuroforme, stovaïne, extrait de marron d'Inde et d'Hamamelis, Euproctol.

**Avantages.** — Analgésiques, antiseptiques, décongestionnants.

Ne provoquent aucun choc local et atténuent rapidement les douleurs.

**Mode d'emploi.** — Un suppositoire matin et soir et après chaque garde-robe pendant les crises. Pour les chroniques, un suppositoire par jour.

Prix : 12 fr.

**MICHEL DELALANDE**

16, rue Henri-Regnault  
COURBEVOIE (Seine).

## SUPPOSITOIRES AU NESTOSYL

Anesthésiques par contact.

**Caractéristiques.** — Association d'éthers des séries phtalique et paraaminobenzoïque puissamment anesthésique par contact. Aucun produit des tableaux A et B. Antiseptique.

**Indications.** — Suppression rapide de la douleur, antiseptie et décongestion, dans : Hémorroïdes internes, prurit anal, fistules, fissure, constipation douloureuse, plaies anales ou rectales, prostatite, cystite, ténésme, douleurs du bas-ventre, douleurs post-opératoires, règles douloureuses, coliques néphrétiques, etc...

**Posologie.** — Un à deux suppositoires renouvelés suivant les besoins. Si l'affection est à la fois interne et externe, employer concurremment la pommade au Nestosyl.

Prix : 15 francs.

Laboratoires du NESTOSYL

P. BAUDE, Pharmacien,

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII<sup>e</sup>).

Tél. : Ségur 96-46.

Adr. télégr. : Nestosyl, 27, Paris.

## SUPPOSITOIRES CHAUMEL

Suppositoires à la Glycérine solidifiée, pour adultes et pour enfants.

**Mode d'emploi.** — Mouiller légèrement le suppositoire, en le trempant dans l'eau chaude, puis l'introduire dans l'anus par la pointe. Lorsqu'il est complètement enfoncé, le pousser profondément avec le doigt, jusqu'à ce qu'on ne sente plus le contact du suppositoire.

**Indications.** — Prescrits contre la constipation chez l'adulte et chez l'enfant.

Les Suppositoires Chaumel à la glycérine solidifiée se préparent également aux principaux médicaments, pour leur administration par la voie rectale.

Établissements FUMOUZE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS

## SUPPOSITOIRES CORBIÈRE

**Composition.** — A base d'Arsénobenzol (606).

**Mode d'emploi.** — Un suppositoire chaque soir après une selle spontanée ou provoquée par un lavement évacuateur.

**Continuer le traitement 24 jours, cesser deux semaines et reprendre une nouvelle série.**

**Indications.** — Syphilis à toutes les périodes. Syphilis viscérale.

**Hérédo-Syphilis.** — Angine de Vincent. — Dysenteries amibiennes.

**Présentation.** — Chaque boîte contient 6 suppositoires et ne porte aucune indication de nature à gêner le secret professionnel.

Suppositoires pour adultes à 0 gr. 10 de 606.

Prix : 18 francs.

Suppositoires pour enfants, à 0 gr. 03 de 606.

Prix : 16 francs.

Suppositoires pour nourrissons, à 0 gr. 01 de 606.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE**

27, rue Desrenaudes — PARIS. — Tél. : Carnot 78-11.

---

## SUPPOSITOIRES GONNON

(Glycérine dans du beurre de cacao.)

*Pour enfants :* 1 gramme de glycérine.

*Pour adultes :* 2 grammes de glycérine.

**Indications.** — Constipation, Hémorroïdes.

Ils présentent l'avantage des lavements de glycérine sans en avoir les inconvénients ; sont appréciés par les personnes qui voyagent.

Prix : 7 francs la boîte

de 12 suppositoires pour enfants.

ou de 10 suppositoires pour adultes.

**Produits GONNON**

14, rue Victor-Hugo — LYON.

## SUPPOSITOIRES HYMEL

Traitement mercuriel d'entretien dissimulé.

### 2 Titrages :

*Adultes* : 0,06 Onguent napolitain, soit 0,03 Hg. métal.

*Enfants et Nourrissons* : 0,03 Onguent napolitain, soit 0,015 Hg. métal.

**Originalité.** — Préparés entièrement à froid, ce qui assure une exacte répartition de mercure dans le produit fini. Aussi ils sont très *bien tolérés*, ne causant ni ténésme, ni diarrhées, ni coliques.

**Présentation dissimulée.** — Sans indication de maladies, ni de nature de produit actif.

**Posologie.** — Un le soir au coucher, pendant 20 jours de suite.

**Prescription.** — De préférence, intercaler une période de 20 jours d'Elixir Hymel entre deux périodes de suppositoires Hymel.

**Laboratoires A. DUTEIL**

90, avenue de Saint-Ouen — PARIS.

## SUPPOSITOIRES LOGEAI

### Composition .

Extrait d'Hamamélis.....	0,33
Sulfoichtyolate de Soude.....	0,33
B. Cacao.....	Q. S.

Par suppositoire.

**Indications.** — Hémorroïdes internes et rectite concomitante.

**Propriétés.** — Atoxiques, analgésiques, décongestionnants, vaso-constricteurs. Sédation rapide et durable, aucune réaction douloureuse. Tolérance parfaite.

Ni cocaïne, ni adrénaline, ni extraits opothérapiques. Prescription facile sans contre-indication.

**Mode d'emploi.** — Introduire matin et soir après lavage un suppositoire Logeais par le petit bout pour ne pas augmenter l'irritation locale.

Prix au public : 13 fr. 75.

**Laboratoires Émile LOGEAI**

24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE.

Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.



## SUPPOSITOIRES MIDY

(Adréno-Styptiques.)

Adrénaline .....	0 gr. 00015
Stovaïne .....	0 gr. 025
Anesthésine .....	0 gr. 025
Ext. de Marron d'Inde frais sta- bilisé .....	0 gr. 05

Pour un suppositoire.

**Dose et mode d'emploi.** — Introduire un ou deux suppositoires par jour, aux instants les plus propices, soit le matin une heure avant d'aller à la selle, c'est-à-dire avant le moment où l'expulsion des matières fécales refoule et congestionne les hémorroïdes ; soit le soir en se couchant, lorsque les hémorroïdes sont douloureuses, congestionnées par la fatigue et la station verticale.

**Propriétés thérapeutiques.** — Décongestionnants, astringents, anesthésiques, calmants, antiseptiques.

**Indications.** — Traitement rationnel des Hémorroïdes.

**Laboratoires MIDY**

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## SUPPOSITOIRES PEPET

(Beurre de Cacao — Glycérine)

pour Bébés, pour Garçonnetts,  
pour Adultes.

## CONSTIPATION. HEMORROÏDES

La boîte : 12 fr. 50.

La 1/2 boîte : 7 fr. 50.

**Henry ROGIER**

Docteur en Pharmacie  
56, boulevard Péreire  
PARIS.

## SUPPOSITOIRES PYRAX

Médication sédative et antithermique de choix dans toutes les maladies de l'Enfance. Action antithermique (Quinine).

Action tonidiurétique (aspirine caféinée).

**Deux dosages.** — Bébés jusqu'à 3 ans.  
Enfants au-dessus de 3 ans.

**Présentation.** — 3 étuis de 2 suppositoires par boîte.

**Emploi.** — 1 à 3 par jour.

Toutes Pharmacies, la boîte bébé : 7 fr. 50.

La boîte enfants : 9 francs.

Echantillons :

**Laboratoire CHAVIALLE**

70, Grande-Rue — SÈVRES (S.-et-O.).

## SUPPOSITOIRES ROCAV

Médication mercurielle active et d'un emploi particulièrement commode.

Les suppositoires ROCAV ne provoquent pas d'épreintes. Leur forme particulière facilite l'introduction et surtout la pénétration profonde dans le rectum, condition optima d'absorption du médicament.

**Dosage.** — *Adultes* : 0,05 Hg vif. *Enfants* : 0,025 Hg vif.

**Indications.** — Traitement d'usure. Syphilis hépatiques, Syphilis du tube digestif.

**Mode d'emploi.** — Un suppositoire tous les deux jours le soir en se couchant.

Prix : *Adultes* : 20 francs. *Enfants* : 18 francs.

**NOTA.** — Le conditionnement de ce produit ne porte aucune indication concernant sa composition ou son emploi thérapeutique.

**Pharmacie ROGÉ-CAVAILLES**

**M. LACHARTRE**, Docteur en Pharmacie,  
Successeur,

116, boulevard Haussmann — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## “ SUPPOTONIC ”

Nouvelle Médication Reconstituante.

**Forme.** — Suppositoires deux dosages.

### Composition :

	Adultes.	Enfants.
Méthylarsinate de soude.....	0 gr. 05	0 gr. 025
Méthylarsinate de strychnine.	0 gr. 001	0
Nucléinate de soude .....	0 gr. 05	0 gr. 005
Glycérophosphate de soude...	0 gr. 10	0 gr. 05
Beurre de cacao.....	3 gr.	2 gr.

pour un suppositoire.

**Actions thérapeutiques.** — Les Suppotonics agissent sûrement et aussi rapidement qu’une injection hypodermique ; ils sont parfaitement tolérés et ont l’avantage de la commodité de leur administration. *Leur emploi remplace les piqûres, médication parfois dangereuse lorsqu’elle n’est pas administrée par le médecin.*

Les Suppotonics stimulent l’appétit, activent les phénomènes de la nutrition et le fonctionnement du système nerveux. Ils favorisent la formation des globules rouges, ils sont en même temps un excitant du système nerveux, des voies respiratoires et des fonctions digestives, toniques du cœur et de la circulation.

**Indications.** — Rachitisme, Neurasthénie, Chlorose, Anémie, Cachexies chroniques, Phosphaturie, Convalescences de la grippe et des maladies infectieuses, Albuminuries phosphaturiques, Diabète à la période cachectique, Tuberculose pulmonaire, Dyspepsies atoniques et paralysies d’origine périphérique.

**Posologie.** — Un suppositoire le soir en se couchant, pendant 9 jours. Faire ainsi usage de trois boîtes en se reposant 8 jours entre chaque boîte.

**Laboratoire LAGOUTTE**

229, cours Gambetta — LYON (III°).

**SYLCASE****Silicium — Calcium**

Formule du Docteur CRETIN.

Rachitisme.

Fractures, toutes maladies osseuses.

Comprimés, Granulé, Poudre.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires GRYSA**

7, rue Saint-André — LE MANS.

C. LÉTANG, pharmacien.

**SYMPATHYL****Chantereau**

La première synergie médicamenteuse constituant, non pas seulement un sédatif, mais un régulateur complet des dystonies organo-végétatives.

**Forme.** — Comprimés.

**Indications principales.** — Emotivité, Irritabilité, Anxiété, Eréthisme cardiaque, Angor, Spasmes, Asthmes, Troubles thyroïdiens, Séquelles d'hystérectomie et d'ovariotomie, Syndromes solaires.

**Composition :**

Extrait spécial de crataegus .....	0,06
Extrait de boldo .....	0,01
Rutonal.....	0,01
Hexaméthylènetétramine.....	0,06
Peptone polyvalente .....	0,03

Pour 1 comprimé.

**Posologie.** — 3 à 8 comprimés par jour, de préférence avant les repas.

**Laboratoires CHANTEREAU**

26 bis, rue Dombasle — PARIS (XV).

## SYNCAÏNE

**Composition.** — Ether para-aminobenzoïque du diéthyl-aminoéthanol.

**Propriétés.** — Anesthésique, sept fois moins toxique que la cocaïne.

**Applications.** — Anesthésie locale, régionale, épidurale et rachidienne.

**Formes.** — I. *Syncaïne pure*, à l'état de sel. — II. *Comprimés de Syncaïne pure et de Syncaïne-Adrénaline.* — III. *Ampoules sèches*, à 0 gr. 08, 0 gr. 12, 0 gr. 15. — IV. *Solutions adranesthésiques.* — V. *Nécessaire pour anesthésie épidurale.* — VI. *Tubes stérilisés Clin* (1, 2, 5, 10, 25 et 50 cc.), aux titres usuels. — VII. *Collyres de Syncaïne.*

**Laboratoires CLIN**

PARIS.

---

## SYNERGYL VADAM

Stimulant et Leucocytochrome.

**Formes.** — *Ampoules et Granulé.*

**Doses.** — Une ampoule tous les 2 jours (ou une cuillerée à café de granulé 2 fois par jour), chez tous les déprimés et convalescents.

**Composition.** — Nucléophosphate de soude et de chaux associé aux arsenicaux assimilables et à la strychnine (0,001 par ampoule).

**Prix :** Boîte 12 ampoules : 18 francs. — Boîte 200 gr. granulé : 15 francs.

Demander Echantillons et Littérature aux

**Laboratoires J. PLÉ**

**Docteur en Pharmacie,**

111 bis, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).

**SYNTHALINE B**

Marque déposée.

Médicament antidiabétique « per os ».  
Dichlorhydrate de dodécaméthylène de guanidine.

**Forme.** — Flacons de 60 dragées à 0 gr. 005.

**Indications.** — Cas légers et moyens du diabète sucré.

**Contre-indications.** — Coma ou état pré-comateux, ainsi que diabète grave et avancé du jeune âge.

La *Synthaline* se complète avec l'Insuline et peut être employée concurremment soit pour diminuer les piqûres, soit pour renforcer l'action de l'Insuline.

**Laboratoires CRUET**

13, rue Miollis — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

## TABLETTES HOVA

(ou Hovalettes).

**Composition.** — Chaque tablette renferme *cinq centigrammes* d'extraits dialysés, dont un tiers de HOUBLON et deux tiers de VALÉRIANE.

**Propriétés.** — Sédation inoffensive et *progressive* du système nerveux, dispensant de l'emploi du chloral, des bromures et des dérivés barbituriques.

**Indications.** — *Toutes les affections d'origine nerveuse* : Surexcitation, Insomnie, Neurasthénie, Troubles de la ménopause. Se prescrit également aux enfants dont le sommeil est agité; aux vieillards, pour combattre les battements de cœur et autres manifestations de l'artériosclérose.

**Mode d'emploi.** — 3 à 4 tablettes 3 fois par jour, aux deux repas et au moment de se coucher. Demi-dose pour les enfants.

Laboratoire ZYMA

4, rue Bellart — PARIS (XV°).

## TABLETTES PERROUD

La « *Tablette Perroud* » est certainement la forme la plus pratique, la plus agréable, la plus efficace d'administration du Bismuth. A sa pureté, sa division, son adhérence, elle joint l'agrément : le goût n'est pas offusqué, les reflexes fâcheux évités. Par un procédé spécial, de petites quantités de sucre et de Cacao diastasé favorisent l'adhérence.

**Composition.** — 50 gr. de corps crépissant par tablette de 10 bâtons contenant chacun 5 gr.

**Doses.** — Plus fortes elles seront, plus rapides les résultats. — *Minimum* : dans l'*Hyperchlorhydrie*, 2 bâtons avant chaque repas ; dans l'*Ulcère*, 4 bâtons le matin à jeun ; dans les *Colites*, 1 à 4 bâtons par jour. — Contre les *Oxyures*, médicament puissant (le prospectus indique les doses suivant l'âge). — Dans toutes les gastropathies : *Gastrite*, *Gastralgie*, *Hypersécrétion*, dans les *fermentations intestinales*; à petites doses seule ou associée, la « *Tablette Perroud* » rendra toujours de réels services.

Laboratoire PERROUD

3, rue Sébastien-Gryphe — LYON.  
(anciennement, 7, rue des Archers)

## TABLETTES ZEVA

**Formule.** — Extrait stabilisé d'ovaire. Extraits ~~seos~~ d'hydrastis, hamamélis, viburnum, bourdaine, kola, Excipient spécial.

(Aucune incompatibilité comme avec les mélanges d'extraits fluides et de teintures.)

**Présentation.** — Tablettes de 1 gr. équivalentes à 0 gr.03 d'extrait ovarien et environ XL gouttes du mélange d'extraits fluides. Goût agréable. Conservation parfaite.

**Posologie.** — 1 à 4 par jour, 15 à 20 jours par mois. (Aucune contre-indication.)

**Indications.** — Dysménorrhée, Aménorrhée, Ménopause, Suites d'ovariotomie, Varices, Phlébites, Hémorroïdes.

Prix : 15 francs.

Laboratoire H. CLUZEL

60, cours Emile-Zola — LYON-VILLEURBANNE

Médaille d'Or : Strasbourg 1927.

## TABUROL MONAL

Dynamogène, Hématopoiétique, leucocytogène.

**Trois formes.** — Ampoules, Dragées, Gouttes.

**Composition.** — Hémoglobine, manganèse, strychnine, fluor, méthylarsinate, glycérophosphate, acide nucléinique. Dans les ampoules, pas hémoglobine.

**Doses.** — 4 à 6 dragées par jour aux repas. Avaler sans croquer. — XV à XX gouttes avant les repas. — 1 ampoule chaque jour.

**Action.** — Stimule la nutrition cellulaire.

Restaure les déficiences nerveuses.

Reminéralise l'organisme.

**Indications.** — Etats anémiques, convalescences, troubles palustres, dépression nerveuse.

La boîte de 10 ampoules : 15 francs.

Le flacon de 50 dragées : 12 francs.

Le flacon de gouttes : 12 francs.

Laboratoires MONAL et C<sup>ie</sup>

6, rue Bridaine — PARIS.



## TÆNIFUGE BARDET

Médaille d'Or, Strasbourg 1924.

**Composition.** — Préparation liquide à base d'*Aspidium Filix Mas*, obtenue par un procédé mécanique à l'état colloïdal, lui conférant un maximum d'activité.

**Indications.** — Médication anthelminthique complète : *Tænias*, *Ascarides*, *Oxyures*, *Ankylostomes*, *Tricocéphales* et tous parasites intestinaux.

**Présentation.** — Dans la même boîte se trouvent :

*a.* Le *Tænifuge* proprement dit ; *b.* le purgatif.

**Posologie.** — *Tænias.* — La veille, alimentation lactée. Absorber à jeun en 2 fois à 20 minutes d'intervalle le *Tænifuge* aux doses suivantes :

*Adultes* : la totalité du contenu du flacon ;  
*Adolescents* de 15 à 20 ans : 8 à 10 cuillerées à café.

*Enfants* de 10 à 15 ans : 6 à 8 cuillerées à café.

*Enfants* de 3 à 10 ans : 2 à 6 cuillerées à café.

Une heure après, prendre le purgatif mélangé à une infusion tiède.

**Tous les autres vers.** — Pendant 4 jours consécutifs, donner le *tænifuge* le matin à jeun aux doses suivantes :

*Adultes* : 1 cuillerée à soupe ;

*Adolescents* de 12 à 20 ans : 1 cuillerée à dessert ;

*Enfants* de 3 à 12 ans : 1 à 2 cuillerées à café.

Le 5<sup>e</sup> jour, administrer le purgatif à jeun.

Renouveler le traitement, plusieurs fois s'il y a lieu, à intervalle de 10 jours maximum.

Formuler : « TÆNIFUGE BARDET ».

Echantillon et Littérature détaillée.

**Laboratoires BARDET**

76, rue de Sèvres — PARIS (VII<sup>e</sup>).

## TÆNIFUGE DU D<sup>r</sup> JACQUÈME

**Composition.** — Liquide en capsules à base d'Aspidium, Filix Mas et de Podophyllin en solution huileuse chloroformée par procédé spécial.

**Indications.** — Expulsion radicale du tænia.

**Avantages** — Aucune toxicité. Absorption de 4 capsules seulement pour adultes. Enfants, petites capsules spéciales dont le nombre varie de 3 à 12 ans. Indiquer l'âge.

**Mode d'emploi.** — Au repas du soir prendre seulement un demi-litre de lait sucré, le lendemain matin avaler les capsules avec un demi-verre d'eau.

**Effet :** deux heures au maximum.

Prix : 20 francs.

---

**Laboratoires CHIARINI**

68, rue du Roi-René

AIX-EN-PROVENCE,

## TÆNIFUGE FRANÇAIS DU D<sup>r</sup> E. DUHOURCAU

**Composition.** — Extrait chloroformo-huileux de Fougère mâle des Pyrénées, comprenant le purgatif. Présenté en capsules.

**Indications.** — Ankylostomiase, Teniasis, Parasites intestinaux.

**Caractéristiques.** — Pas de traitement préalable, pas de diète, pas de purgatif, pas d'arrêt du travail, absorption particulièrement simple, *non tonique*.

**Mode d'emploi.** — Absorption de capsules le matin à jeun, en 10 minutes, avec *aussi peu de liquide que possible*. Action au bout d'une heure ou deux. Si malaise ou nausées, absorption d'un peu de café ou de thé.

**Doses.** — *Adultes* : 12 capsules. *Enfants* au-dessous de 12 ans ; autant de capsules que d'années d'âge et une en plus.

Prix : 12 fr. 50.

**Laboratoires du D<sup>r</sup> E. DUHOURCAU**

6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).

Anciennement : 10, rue de Turenne — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## TÆNIFUGE KIRN

En capsules

à base de *filicine*, principe actif de la fougère mâle dissous dans son huile grasse.

Tænifuge le plus actif, ne présentant pas les dangereux inconvénients des tænicides, comme la p<sup>o</sup>tiérine.  
(Travaux de thèse de Kirn et Schmitt.)

**Capsules Kirn.** — Capsules à l'extrait vert éthéré de fougère mâle, mais caractérisées par ce fait unique que le titre du principe actif, la *filicine*, est toujours stable et uniforme ; sans calomel.

**Mode d'emploi.** — 1<sup>o</sup> Avant-veille, purgation ; 2<sup>o</sup> la veille, diète presque absolue (lait) ; 3<sup>o</sup> le matin à jeun l'absorption de 5 en 5 minutes, des 12 capsules du flacon avec un peu de sirop d'éther ou un grog, suivie à nouveau d'une légère purgation.

Résultat certain si ces indications sont scrupuleusement observées.

*Enfants* : Capsulines Kirn, spécialement dosées.

Médication sans similaires

**Laboratoires A. DANIEL-BRUNET**

rue de la Source — PARIS (XVI<sup>e</sup>). Tél. : Aut. 11-86.

## TAMAR INDIEN GRILLON

**Laxatif végétal doux et agréable.**

**Présentation.** — Bonbons chocolatés à la pulpe de tamarin et au sené ; ne renferme aucun produit chimique, n'irrite pas l'intestin.

Recommandé aux femmes et aux enfants.

**Doses.** — Un bonbon le soir en se couchant.

*Enfants :* Un bonbon ou 1/2 bonbon en prenant le repas du soir.

Prix : Boîte de 12 bonbons : 9 francs.

**Société du TAMAR INDIEN GRILLON**

13, rue Pavée — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## TAMPOL « ROCHE »

Pansement gynécologique idéal.

**Le *Tampol Roche*** est constitué par un ovule derrière lequel est comprimée une certaine quantité de laine aseptique, non absorbante, contenue dans une capsule de gélatine et portant à son extrémité un cordonnet.

**Mode d'emploi.** — Plonger pendant 3 à 4 secondes environ le *Tampol Roche* dans de l'eau bouillie à peine tiède, puis, la malade ayant pris la position gynécologique, introduire ce pansement jusqu'au fond du vagin et le maintenir en place quelques minutes. Au bout de ce temps, la dissolution de la gélatine s'est effectuée, la laine s'est développée en tous sens : le *tamponnement vaginal* est parfait.

**N.-B.** — Il ne faut jamais se servir pour l'introduction du *Tampol Roche* d'huile ou de corps gras qui empêchent la dissolution de la capsule de gélatine.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et O<sup>u</sup>**

21, place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

## TAPO

Ferments lactiques.

Spécifiques des affections gastro-intestinales.

**Forme.** — Cultures liquides.

**Composition.** — Excipient : Bouillon de Viande peptoné. Principe actif : Ferments lactiques sélectionnés.

**Propriétés thérapeutiques.** — Au point de vue curatif, le **Tapo** modifie rapidement le terrain infecté, augmente la résistance du malade en apportant une aide indispensable à la leucocytose organique et détruit les conséquences de l'infection.

Au point de vue préventif, le **Tapo** met l'organisme en état de non réceptivité tant par la résistance qu'il augmente que par la destruction des microorganismes qui assègent l'individu continuellement.

**Indications.** — Gastrites, Entérites, Entérocolites, Intoxications alimentaires, Diarrhées chroniques, Dysenteries, Insuffisance hépatique, Appendicite chronique, Néphrites coli-bacillaires, Albuminurie, Impétigo, Eczéma, Furunculose, Pyodermites, enfin dans toutes les maladies fébriles aiguës (Grippe, Fièvres typhoïde et para-typhoïde) *comme agent anti-infectieux.*

**Posologie.** — De 1 à 2 flacons-ampoules par 24 heures (ou plus dans les cas d'infections marquées) pur ou dans un peu d'eau. Le traitement est de trois boîtes, on peut le continuer comme préventif en cas de récurrence.

Le **Tapo** est d'une conservation indéfinie ; ne s'altère pas sous l'action de la chaleur et du froid : c'est donc le produit d'élection pour les colonies et les pays chauds.

Prix de vente au public : 20 francs.

**Laboratoires MADYL**

14, rue de Miromesnil — PARIS.

Téléphone : Anjou 16-55.

## TARTRATE BORICO- POTASSIQUE PACHAUT

Tubes dosés de tartrate borico-potassique pur  
à faire dissoudre au moment de l'emploi.  
Conservation parfaite.

**Indications.** — Epilepsie, troubles névropathiques.

**Présentation.** — En boîtes de 30 tubes dosés à :  
0 gr. 50, 1 gr., 2 gr., 3 gr., 4 gr., 5 gr., 6 gr., 8 gr.

**Posologie.** — Dose moyenne : 4 à 5 gr. par jour  
pour les adultes. Dépourvu de toute toxicité,  
doit être pris chaque jour sans interruption jus-  
qu'à guérison.

**Mode d'emploi.** — Faire dissoudre le contenu  
d'un tube dans un verre d'eau, à prendre en  
2 ou 3 fois dans les 24 heures.

**Laboratoires PACHAUT**  
130, boulevard Haussmann — PARIS.

## TAXOL

**Composition :**

Poudre de muqueuses intesti- nales.....	0 gr. 05
Extrait biliaire.....	0 gr. 10
Agar-Agar .....	0 gr. 05
Ferments lactiques.....	0 gr. 05

**Forme.** — En comprimés de 0 gr. 25.

**Propriétés thérapeutiques.** — Régulateur phy-  
siologique de l'intestin. Aucune accoutumance.  
Non toxique.

**Indications.** — Constipation, Entérite chronique,  
Entérocolite, Dermatoses.

**Doses et mode d'emploi.** — De 1 à 6 comprimés  
par jour. Commencer le traitement par deux  
comprimés après un des repas. Augmenter ou  
diminuer la dose suivant l'effet produit. Avaler  
sans mâcher.

Prix de vente au public : 10 francs.

**Laboratoires « LOBICA »**  
46, avenue des Ternes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## TÉBÉPHAGUINE-FORNET

**Vaccin buccal antituberculeux.**

**Principe actif.** — Bacilles tuberculeux isolés des affections tuberculeuses les plus diverses et dégraissés par un procédé spécial breveté en France et retenu par l'Institut Pasteur.

**Indications.** — Tuberculose pulmonaire, ganglionnaire, osseuse et autres.

**Posologie.** — 1 à 3 pilules par jour.

**Propriétés thérapeutiques.** — Après une réaction locale et générale, légère diminution et disparition de la Fièvre, des Sueurs, de la Toux, des Douleurs et de la Faiblesse. Augmentation du poids et des forces, Amélioration de l'appétit, du sommeil et de l'état général.

Prix : 36 francs.

Service de vente et Echantillonnage :

**Laboratoires,**

23, rue du Caire — PARIS (II<sup>e</sup>).

Service d'Etude et de Fabrication :

**Institut de Microbiologie,**  
SARREBRUCK (Sarre).

## TÉCARINE

Homocaféinate de sodium.

Diurétique déchlorurant, dépourvu de toxicité. Présente sur la théobromine l'avantage de ne pas s'exposer aux troubles gastriques et à la céphalée.

*Indications :*

**Oligurie des affections cardio-rénales,**  
**Cedèmes, Ascites.**

*Posologie et mode d'emploi :*

Voie buccale : 1 à 3 comprimés à 25 centigr. par 24 heures.

Voie hypodermique : 1 ou 2 ampoules de 2 cc. par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
**« SPÉCIA »**

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

**TERGYL LAMO****Spécialité dermatologique.****1° POMMADE :**

**Composition.** — Sulfo-Ichthyolate Amm., S/Gallate de Bismuth, Oxyde de Titane, Onguent de Naphte, Chlor. de Mg., Huile Adréralinée.

**Indications.** — La plupart des Eczémas-Acnés, Rougeurs des Nouveau-nés, etc.

Prix au public : Petit tube : 6 francs.

Tube moyen : 10 francs. — Triple tube : 23 francs.

**2° POUDRE (C. T. L.).**

**Composition.** — Chlor. de Mg., Sulfo-Ichthyolate d'Amm., Extrait mou Hamamélis, Onguent de Naphte, Ceyssatite, Kaolin, Oxyde de Titane, etc.

**Indications.** — Complément de la pommade, mêmes indications thérapeutiques. Parfum léger.

Prix au public : la boîte : 6 francs.

**Laboratoires LAMO.**

26-28, rue Paul-de-Kock. — PARIS (XIX<sup>e</sup>)

---

**TERKAL MONAL**

**Forme.** — Dragées.

**Composition.** — Carbonate de gaïacol terpino-codéiné associé au fluorure de calcium nucléiné et aux extraits de plantes béchiques.

**Dose.** — Quatre à six dragées par jour entre les repas. Avaler sans croquer.

**Action.** — Calmantes, Expectorantes, Curatives, Reminéralisatrices.

**Indications.** — Toux, Bronchites, Affections broncho-pulmonaires.

Le flacon de 40 dragées : 10 francs.

**Laboratoires MONAL et C<sup>ie</sup>**

6, rue Bridaine — PARIS.



## TERPINE GONNON

**Présentation et composition.** — *Elixir* : Terpene dissoute dans l'alcool et sirop de Tolu (1 verre à liqueur — 0 gr. 20 de terpene).

*Capsules* : Terpene, 0 gr. 10 ; Codéine, 0 gr. 005 ; Benzoate de soude, 0 gr. 15.

*Pâte* : Terpene, aconit, benzoate de soude, Tolu, Terpinol.

*Pastilles* : Terpene 0 gr. 05 et Tolu.

**Propriétés thérapeutiques.** — Augmente et fluidifie la sécrétion bronchique.

**Posologie.** — *Elixir* : 2 à 4 verres à liqueur par jour.

*Capsules* : 4 à 6 capsules par jour.

*Pâte* : 15 à 20 morceaux par jour.

*Pastilles* : 8 à 10 pastilles par jour.

**Indications.** — Toux, rhumes, catarrhes, bronchites, emphysème. Employée aussi avec succès contre les maladies des voies urinaires et contre les affections du système nerveux.

*Elixir* : 20 fr. ; *Capsules*, 8 fr. ; *Pâte et pastilles*, 4 fr. 50.

### Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

---

## TÉTRANITROL ROUSSEL

### Composition.

Comprimés de Tétranitrate d'Erythrol à 1, 2, 5 mmgr. et 1 centigramme.

### Indications.

Hypertension : Angine de poitrine, asthme cardiaque, œdème pulmonaire.

### Doses et mode d'emploi.

Laisser fondre les comprimés sur la langue (de 1 à 15 mmgr. par 24 heures).

### Pharmacie ROUSSEL

10, rue Washington — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## THALASSOTONINE VADAM

Triade leucocytogène et tonique associée à l'action catalytique de l'Eau de Mer vraie.

### Formule :

Eau de mer isotonique .....	5 cc.
Cadodylate de soude.....	5 centigr.
Sulfate de strychnine .....	1 milligr.
Nucléino-phosphoglycérate de soude..	10 centigr.

**Posologie.** — Une injection, indolore, intra musculaire tous les deux jours, ou chaque jour.

**Indications.** — Etats infectieux torpides, déficiences cellulaires, surmenages, neurasthénie, convalescences.

Prix au public : Boîte de 10 ampoules : 25 francs.  
Echantillon et littérature sur demande.

### Laboratoire J. PLÉ

111 *bis*, rue de Turenne — PARIS (III<sup>e</sup>).  
J. PLÉ, Docteur en Pharmacie (Univ. de Paris).

## THAOLAXINE

(Laxatif-régime.)

Combinaison d'agar-agar et d'extrait de rhâmnées. Paillettes, cachets, comprimés, granulé.

**Doses et mode d'emploi.** — Paillettes, 1 à 4 cuiller. à café à chaque repas ; cachets, 1 à 4 cachets à chaque repas ; comprimés, 2 à 8 comprimés à chaque repas ; granulé, 1 à 2 cuiller. à café à chaque repas (spécialement préparé pour les enfants).

**Propriétés thérapeutiques.** — Exonérateur de l'intestin, agit en augmentant le volume et l'hydratation des fèces.

**Indications.** — Spécifique de la constipation habituelle.

Prix : 12 francs.

Laboratoires DURET et RÉMY  
et du Docteur Pierre ROLLAND  
ASNIÈRES (Seine).

## THEBAÏL

(Opium essentiel.)

**Propriétés.** — Le *Thébaïl* (opium essentiel) qui exclut de sa composition les alcaloïdes convulsivants et stupéfiants de l'opium et qui n'en conserve que les alcaloïdes soporifiques et calmants, donne la puissance maxima de l'opium, avec toutes les efficacités pacificatrices que l'on attend de ce précieux agent. Enfin son activité physiologique est rigoureusement dosée *in vivo*.

**Formes thérapeutiques.** — Le *Thébaïl* est présenté sous 3 formes :

1<sup>o</sup> En ampoules isovisqueuses indolores dosant par cent. cube :

Thébaïl .....	2 centigr.
équivalent à { morphine .....	1 —
{ extrait d'opium.....	5 —

2<sup>o</sup> En comprimés dosant :

Thébaïl .....	1 centigr.
équivalent à { morphine .....	5 milligr.
{ extrait d'opium.....	25 —

3<sup>o</sup> En suppositoires dosant :

Thébaïl .....	2 centigr.
---------------	------------

**Posologie pour les adultes :**

Ampoules.....	1 à 2 par 24 heures...	Prix 20 fr.
Comprimés.....	2 à 4 —	— 9 fr.
Suppositoires .....	1 —	— 15 fr.

Dépôt Laboratoires **NOGUÈS**  
11, rue Joseph-Bara — PARIS.

## THÉINOL

**Forme.** — Elixir.

**Composition.** — Théine en combinaison salicylique, Salicylate d'Antipirine.

**Propriétés pharmacodynamiques.** —

Euphorique. — *Antidépresseur*. — Analgésique. — Régulateur des fonctions nerveuses. — Tonique circulatoire.

**Indications.** — Migraines. — Névralgies. —

Douleurs rhumatoïdes. — Crises gastro-intestinales. — Dysménorrhées.

**Mode d'emploi.** — Deux cuillerées à dessert à une heure d'intervalle l'une de l'autre.

Le flacon : 14 fr. (en France).

Laboratoires **A. BAILLY et C<sup>te</sup>**  
15 et 17, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## THÉISINE DUBAT

*Granulé de Théobromine et Extrait de maïs.*

**Propriétés thérapeutiques.** — Diurétique idéal dans les affections du cœur et des reins. Action certaine, constante, durable ; toxicité nulle ; pas de céphalées, pas d'intolérance. *Granulé* de goût agréable préféré aux cachets et aux solutions par les enfants et les vieillards.

**Indications.** — Toutes celles de la théobromine, insuffisance cardiaque, endocardite, myocardite, fléchissement du cœur dans l'artériosclérose, affections cardiorénales, mal de Bright, albuminurie, néphrite, maladies infectieuses et tous les cas d'insuffisance urinaire.

**Doses.** — 2 à 8 cuillerées à café par jour.

Cuillerée à café =  $\left\{ \begin{array}{l} 0 \text{ gr. } 25 \text{ théobromine pure.} \\ 0 \text{ gr. } 05 \text{ extrait de maïs.} \end{array} \right.$

Prix : 14 francs.

Echantillons sur demande

**LABORATOIRE DU D<sup>r</sup> DUBAT**

80, rue du Faubourg-Saint-Denis, — PARIS.

## THEMSALINE

**Composition.** — La Themsaline préparée d'après les travaux du D<sup>r</sup> Jentzer de Genève (Voir *Traitement biologique des infections*, Masson, éditeur), est un mélange fractionné et rectifié d'essences, de résine élémi, de baume du Pérou et de thymol.

**Propriétés.** — Agit comme antiseptique, antitoxique, analgésique, sédatif, leucogène et tonique. Attaque l'infection *étiologiquement* et non symptomatiquement comme tous les narcotiques.

**Indications.** — *Toutes les infections aiguës* : grippe et infections pyogènes, érysipèle, angines, annexites, septicémies, anthrax, phlegmons, péritonites, fistules d'origine infectieuse, plaies infectées. *Contre-indications* : éviter les doses fortes dans la pneumonie, la broncho-pneumonie, les néphrites.

**Mode d'emploi.** — En injections intraveineuses, pratiquées *très lentement* (durée 10 minutes environ), avec une seringue à tuberculine et, de préférence, avec l'aiguille spéciale Jentzer : 6/10 cmc. chez l'adulte, et 3/10 cmc chez l'enfant. Une injection par jour, jusqu'à guérison ou apyrexie.

**Laboratoire ZYMA**

4, rue Bellart — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## THÉOBROMINE INVAR

Produit soumis au contrôle physiologique le plus rigoureux ; donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

**Action.** — Diurétique puissant.

**Indications.** — Néphrites, cardiopathies, artériosclérose, arthritisme.

**Formes.** — Pure, caféinée, lithinée, phosphatée, en boîtes de 24 cachets à 0,50 ; 30 cachets à 0,25.

Prix au public : 12 fr.

**Pharmacie Centrale de France**

21, rue des Nonnains-d'Hyères

PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## THÉOBROMOSE DUMESNIL

Théobrominate de lithium cristallisé.

**Prop. théér.** — Possède les propriétés toni-cardiaques et diurétiques de la théobromine, mais est dépourvue des inconvénients de celle-ci ; son activité se manifeste à des doses 5 fois moindres. Elle agit quand la théobromine est inefficace et provoque l'excrétion de l'urée et des chlorures.

**Indications.** — Les effets cardio-toniques et vaso-dilatateurs de la Théobromose, en outre de son action diurétique énergique, font de ce produit associé ou non à la Digitaline la base de la thérapeutique cardio-rénale. Elle est indiquée dans l'urémie, l'uricémie, l'artério-sclérose, la sclérose cardio-rénale, les œdèmes d'origine cardiaque ou rénale, etc.

**Formes.** — 1<sup>o</sup> Solution. Dose : 1 à 4 cuillerées à soupe par jour dans un peu d'eau sucrée.

Une cuillerée équivaut à 0,50 gr. de Théobromine.

2<sup>o</sup> Gouttes. — Dose : 1 cuiller-mesure ou LX gouttes, une à quatre fois par jour.

LX gouttes ou une cuiller-mesure équivalent à 0,50 gr. de Théobromine

3<sup>o</sup> Comprimés. — Dose : 2 à 8 par jour.

2 comprimés équivalent à 0,50 cgr. de Théobromine.

**Laboratoires DUMESNIL**

10, rue du Plâtre — PARIS,

## THÉOBRYL « ROCHE »

(Théobromine injectable).

Indications, Contre-indications, Action thérapeutique de la Théobromine, mais plus maniable, plus actif et à doses moindres. (Voir les travaux des Professeurs Pouchet, Rémond, E. Duhot, des Docteurs Jouisse, Richard St-Yves, Bénech, Ségard, Vigoureux, Colombiès, Crampon, etc.).

Toujours très bien toléré par les adultes, les vieillards et les enfants.

### THÉOBRYL « ROCHE » AMPOULES

chaque ampoule = 2 cc.

Cette forme est indiquée quand il y a intolérance gastrique ou susceptibilité du malade et chaque fois qu'il faut agir vite et imposer un traitement intensif.

ADULTES : dose moyenne utile, 1/2 ampoule 2 à 4 fois par jour.

(Voir page Ampoules Théobryl.)

### THÉOBRYL « ROCHE » GOUTTES

1 cc. = XXX gouttes.

Cette forme permet de continuer et de prolonger l'action obtenue par les injections ou de réaliser un *traitement d'entretien* toujours parfaitement supporté. Chaque dose doit être prise dans un verre d'eau sucrée ou aromatisée, ou bien dans une tasse de tisane de queues de cerises, orge et chiendent, stigmates de maïs, etc., à n'importe quel moment de la journée, de préférence une demi-heure avant ou après les repas.

ADULTES : dose moyenne utile, X gouttes 4 à 8 fois par jour.

Enfants : V gouttes 2 à 6 fois par jour.

#### Produits

**F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**  
21, place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

## THÉOSALVOSE

**Composition.** — Cachets de Théobromine chimiquement pure, extraite du cacao.

**Propriétés.** — Diurétique d'une innocuité complète, d'un pouvoir remarquable, d'une fidélité constante.

**Indications.** — Artériosclérose, Affections cardiaques et rénales. Albuminurie, Intoxications, Urémie, Uricémie, Goutte, Gravelle, Rhumatismes, Hydropisie, Maladies infectieuses, Scarlatine.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 cachets dosés à 0 gr. 50 ou 4 à 8 cachets dosés à 0 gr. 25 par jour.

**Formes.** — Théosalvose pure, digitalique, strophantique, spartéinée, scillitique, barbiturique, caféinée, phosphatée, lithinée.

Prix : 15 francs et 17 fr. 50.

**Laboratoires André GUILLAUMIN**

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

## THÉOVADIL

**DIURÉTIQUE CONSTANT**

**TOUJOURS VASO-DILATATEUR**

**Composition.** — Diméthylxanthine rigoureusement pure ne provoquant ni nausées, ni céphalée, en comprimés dosés à 0 gr. 25.

**Indications.** — Affections cardiaques et rénales, Albumine, Artériosclérose, Urémie, Uricémie.

**Mode d'emploi.** — De 2 à 12 comprimés en 24 heures délités dans un peu d'eau et répartis en 2 ou 3 doses.

Dose moyenne : 3 comprimés matin et soir.

**Laboratoires du THÉOVADIL**

85, rue des Morillons — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## THÉOXANTHINE

Diurétique cardio-rénal

Adjuvant précieux des cures toni-cardiaques.

**Composition.** — Théobromine *cristallisée* pure associée au phosphate disodique.

**Indications.** — En général toutes celles de la théobromine. Pas d'intolérance. Activité plus grande à doses moindres. Complète très heureusement les cures toni-cardiaques.

**Présentation et posologie :**

*Cachets A* : Théobromine crist. pure..... 0,50  
Phosphate disodique..... 0,20

*Adultes* : 2 à 3 cachets par jour.

*Cachets B* : Théobromine crist. pure..... 0,25  
Phosphate disodique..... 0,10

*Enfants* : 1 à 2 par jour ; *Adultes*, 4 à 6.

Echantillons et littérature :

**Laboratoires DEGLAUDE**

6, rue d'Assas — PARIS (VI<sup>e</sup>). Tél. : Littré 31-85.

Belgique : *Agent général* : **L. Prunières**  
19, rue Louis-Hap — BRUXELLES.

## THÉ SUÉDOIS

Mélange dépoussiéré et spécialement séché, de bourdaine, saponaire, verveine, menthe, matricaire.

**Type** du thé laxatif et purgatif *sans sené* purgeant doucement et sans coliques.

**Indications.** — Constipation, paresse de l'intestin.

**Doses.** — 1 cuill. à soupe pour une tasse d'eau comme laxatif.

2 cuill. comme purgatif.

Faire bouillir 5 minutes, laisser tremper 8 à 10 heures et absorber sucré ou non.

**Laboratoires des Produits Français**

**L. HERIN**, ex-interne des Hôpitaux,  
LA MADELEINE (Nord).



## THIGÉNOL « ROCHE »

Solution aqueuse d'oléo-sulfonate de sodium, ni toxique, ni caustique, sans odeur désagréable et ne laissant pas de taches indélébiles sur le linge.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique, analgésique, kératoplastique, décongestionnant et puissamment résolutif.

**Indications thérapeutiques.** — Dermatologie, Otorhino-laryngologie, Ophtalmologie, Médecine générale, Erysipèle, Brûlures, Fissures, Rhumatismes, etc.

*Thigénol « Roche »* pur ou en solution glycinée (10 à 15 p. 100) en applications externes.

*Savon « Roche » au Thigénol*, le meilleur savon antiseptique.

*Toutes les affections gynécologiques :*

*Thigénol « Roche »* pur ou en solution glycinée (10 à 15 p. 100).

*Ovules « Roche » au Thigénol* à 30 p. 100 (voir page spéciale).

*Tampol « Roche »* pansement gynécologique idéal (voir page spéciale).

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**

21, place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## THIOCITROL THEVENOT

**Granulé soluble.**

**Composition.** — Citrate de chaux, hyposulfite de magnésium, sulfate de magnésie, oxyde de magnésie, peptone et amidon soluble.

**Propriétés.** — Cholagogue et antianaphylactique, Régulateur des Fonctions gastro-intestinales, Dépuratif, Tonique.

**Indications.** — Affections du foie et des voies biliaires. Troubles digestifs, Constipation, anaphylaxie, dermatoses, urticaires, arthritisme.

**Mode d'emploi.** — 1 à 3 cuillerées à café par jour, soit à jeun le matin, soit 1/2 heure avant chaque repas. *Enfants* : 1/2 dose.

Prix de la boîte de 125 gr. : 18 francs.

**Laboratoire THEVENOT**

DIJON.

## THIOLCOL « ROCHE »

Dérivé du gaïacol, inodore, ni toxique, ni caustique, soluble dans l'eau.

1 gr. de Thiocol « Roche » = 0,52 ctg. de gaïacol cristallé.

### Doses et mode d'emploi :

#### *SIROP « ROCHE » au Thiocol.*

(1 cuill. à soupe = 1 gr. Thiocol « Roche »)

*Adultes* : 2 à 4 cuill. à soupe par jour.

*Enfants* : 2 à 4 cuill. à café, selon l'âge.

#### *CACHETS « ROCHE » de Thiocol.*

(1 cachet = 0,50 ctg. Thiocol « Roche »)

2 à 6 cachets par jour

#### *COMPRIMÉS « ROCHE » de Thiocol.*

(1 comprimé = 0,50 ctg. Thiocol « Roche »)

2 à 6 comprimés par jour.

### Propriétés thérapeutiques :

Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène, Eupeptique, Orexique.

### Indications thérapeutiques :

Toutes les affections broncho-pulmonaires, Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Grippe, Pneumonie, Coqueluche, Serofule, Anémie, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites, Diarrhées, etc.

### Produits

**F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>**

21, place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

## THIOPHYL

Le flacon de 100 pilules : 20 francs.

**Indications.** — Traitement interne de la furonculose (résultats surprenants) et de toutes staphylococcies, acné, Furonculoses et dermatoses en général.

**Posologie.** — 3 à 9 pilules par jour, indiquée de façon détaillée sur prospectus.

**Composition.** — Sulfures complexes + ion Calcium et Charbon activé.

Échantillons gratuits :

**Laboratoires G. BEYTOUT**

12, boul<sup>d</sup> Saint-Martin — PARIS (X<sup>e</sup>).

## THIORINE

(Soufre et hyposulfite de soude en granulé anisé, friable, agréable au goût)

1<sup>o</sup> Médication de choix des affections respiratoires subaiguës ou chroniques.

Tous les catarrhes muqueux ou purulents du nez, de la gorge et des bronches : Ozène. — Adénoïdites et amygdalites subaiguës ou chroniques. — Pharyngites et laryngites trainantes. — Trachéo-bronchites récidivantes. — Dilatation des bronches. — Expecto-rations tenaces (La Thiorine fluidifie, puis assèche les sécrétions). — Gazés. — Tuberculose pulmonaire torpide non fébrile.

2<sup>o</sup> Médication de l'auto-intoxication chronique et des affections qui en découlent. (Eczéma, purit, acné, etc., etc.)

3<sup>o</sup> Médication des maladies par ralentissement de la nutrition.

Arthritisme, goutte, rhumatisme chronique, etc., etc.

Dose moyenne : 1 cuillerée à café 2 à 3 fois par jour, au début des repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau.

*Échantillons :*

**Laboratoire de la THIORINE**

Jean Dedieu, Pharmacien.

39, rue Fondaudège — BORDEAUX.

## THIOSOTE

**Lambiotte Frères.**

Sirop concentré à base de sulfo-créosotate de potassium et de teintures de Lobélie et de Drosera.

**Propriétés thérapeutiques.** — Bactéricide, dynamogène, sclérogène, modificateur des échanges respiratoires.

**Indications.** — Affections aiguës ou chroniques des voies respiratoires.

**Mode d'emploi :**

*Adultes :* 4 cuillerées à dessert par jour.

*Enfants :* A partir de 3 ans (4 cuillerées à café par jour), à prendre de préférence comme édulcorant d'une boisson chaude (lait, tisane, etc.).

*Nourrissons :* XXV à L gouttes par jour selon l'âge par prise de V à X gouttes mélangées au lait.

Littérature et Echantillons :

**Produits LAMBIOTTE FRERES**

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS.

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

## THIO-TERPINE DALIN

Médication des voies respiratoires.

**Composition.** — Sulfogaiacololate de potasse associé à la terpine avec benzoate de soude et codéine.

**Présentation et doses :**

*Cachets :* 2 à 3 cachets par jour (un cachet = 0,40 sulfog. potasse et 0,007 codéine).

*Elixir :* 3 à 4 cuillerées à soupe par jour (une cuillerée = 0,40 sulfog. potasse et 0,007 codéine).

*Granulés :* 2 à 4 cuillerées à café par jour (une cuillerée à café = 0,40 sulfog. potasse).

La forme *Granulée* ne contient pas de codéine.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les affections des voies respiratoires. Antisepsie broncho-pulmonaire. Tuberculose. Asthme. Coqueluche, etc...

**Laboratoires DALIN**

R. BOITAS et C<sup>ie</sup>

1, rue de la Martinière — LYON.

## **THORIUM X RHEMDA** **(THORIX.)**

**INDICATIONS.** — **Traitement radioactif des Rhumatismes de toute nature. Sciatique. Névrites. Anémies. Leucémie. Psoriasis.**

**Emploi.** — *Série de 8-10 injections indolores (une par semaine). Passer la commande le lundi matin au plus tard.*

**Laboratoires RHEMDA**

51, rue d'Alsace — COURBEVOIE  
(Seine).

Téléph. : Wagram 58-89.

---

## **THOROXYL**

Antiseptique intestinal - antidiarrhéique  
non constipant.

**Pharmacologie.** — A base de terres rares, bactéricide et favorisant l'action des sucs digestifs.

**Indications.** — Tous les états diarrhéiques du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte. Tous les syndromes infectieux à point de départ intestinal (colibacillurie, etc.).

**Posologie.** — Aucune contre-indication. Aucune toxicité. 6 à 10 comprimés pour l'adulte ; 2 à 6 comprimés pour l'enfant et le nourrisson.

Prix au public : 12 francs.

**Laboratoires du D<sup>r</sup>. LAURENT-GÉRARD**  
Docteur ès sciences.

Ancien chef de Laboratoire à la Faculté de Médecine  
de Paris.

40, rue de Bellechasse — PARIS.

Tél. : Littré 97-95.

## THYMO-MENTHOL EUPNIQUE BELHOMME

**Indications.** — Infections du nez, de la gorge, des bronches, des poumons et des organes qui en dépendent. Pré-tuberculose. Tarit toutes suppurations de l'appareil respiratoire.

**Doses.** — 3 à 4 cuill. à café par 1/2 litre d'eau bouillante en **Inhalations**.

Pour combattre la contagion : 2 cuill. à soupe dans de l'eau portée à l'ébullition dans la chambre.

**Laboratoire BELHOMME**

2, rue Tiron — 13, rue de Rivoli,  
PARIS (IV<sup>e</sup>).

## THYROIDINE ET RADIOPHORINE GORY

**Thyroidine :**

Traitement et déficiences nerveuses et circulatoires, par solution rigoureusement pure de suc thyroïdien, de saveur agréable et parfaitement assimilable.

**Indications.** — Neuro-arthritisme, Anorexie, Aménorrhée, Migraines, Psychoses, Convulsions et Epilepsie, Refroidissement habituel et Troubles vaso-moteurs. Arrêts du développement et troubles de la croissance.

**Posologie.** — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe aux 2 principaux repas.

*Adolescents* : 1 cuillerée à dessert aux 2 principaux repas.

*Enfants* : 1 cuillerée à café aux 2 principaux repas.

Prix : 25 francs.

Le traitement est heureusement complété par la **Radiophorine** (association de phosphore et phosphate) (1 gr. de phosphate et 0 gr. 025 d'acide phosphorique pur pour une cuillerée à soupe), dont les indications sont les mêmes et plus spécialement : la neurasthénie, les névroses, les psychiatries, l'anémie cérébrale, tous les épuisements nerveux, le rachitisme infantile et la destruction du sucre dans le diabète.

(Même Posologie. — Même Prix.)

**Laboratoire des Produits Gory.**

M. JOÛSS, Pharmacien,

7 bis, rue du Général-Galliéni, — MONTREUIL (Seine).

## THYROXINE « ROCHE »

Thyroxine synthétique préparée suivant les données de Harington et Barger.

*Ampoules* : (boîtes de 6) une ampoule de 1 cc. = 1 milligr. de thyroxine.

*Comprimés* (tubes de 30) : un comprimé = 1/2 milligr. de thyroxine.

### Indications :

Obésité générale, Myxœdèmes, Goitre, Cachexie strumiprive, Troubles de la croissance et du développement, Oligurie.

### Mode d'emploi et doses :

Voie buccale : 1 à 2 comprimés par jour et plus. Voie intramusculaire : 1/2 à 1 ampoule par jour et plus.

Les injections peuvent être aussi endoveineuses et même sous-cutanées, celles-ci déterminant une légère sensation de tension qui disparaît rapidement.

### Produits

**F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>ie</sup>**  
21, place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

## TINCTIODE

Pour la Préparation instantanée de la Teinture d'Iode aqueuse.

**Forme.** — Deux sortes de comprimés iodo-générateurs.

**Indications.** — Les mêmes que celles de la Teinture d'Iode : Révulsions, Usage chirurgical, Usages médicaux interne et externe.

**Avantages.** — Parfaite conservation, propriété, facilité de transport sous un petit volume.

**Mode d'emploi.** — Dissoudre 1 comprimé n° 1 et 1 comprimé n° 2 dans 5 centimètres cubes d'eau, au moyen du flacon spécial. Voir Notice.

**Laboratoires ROBERT et CARRIERE**  
37, rue de Bourgogne — PARIS.

## TIODINE COGNET



**Composition.** — Combinaison cristallisée, soluble dans l'eau, de l'iode (47 %) avec la thiosinamine.

**Propriétés.** — Réalise l'Association *Iode-soufre*. Médicament organo-iodique soufré. Pas d'iodisme. Pas de contre-indications.

**Indications.** — Toutes celles de l'iode et du soufre, ensemble ou séparément. Toutes scléroses. Hypertension. Rhumatisme chronique. Tabès. Scléroses médullaires. Asthme. Emphysème. Syphilis. Obésité, etc.

**Formes et posologie.** — Pilules (Tiodine : 0 gr. 05 par pilule). *Adultes* : 2 à 5 par jour. *Enfants* : 2 par jour. Ampoules (Tiodine 0 gr. 20), 1 tous les 2 jours (voie intramusculaire, sous-cutanée ou intra veineuse).

Prix au public : Pilules — Le flacon : 13 fr.

Ampoules — La boîte : 15 fr.

**Laboratoires des Produits COGNÉT**

Armingeat et C<sup>ie</sup>

43, rue de Saintonge — PARIS (III<sup>e</sup>).



## TOCHLORINE

Paratoluène Sulfochloramine.

Action antiseptique durable, par mise en liberté progressive de petites quantités d'hypochlorite de soude (principe de la solution de Dakin).

*Indications :*

**Antisepsie chirurgicale et médicale.**

**Désinfection des eaux.**

*Posologie et mode d'emploi. — Usage externe :*

*Chirurgie générale :* Solution aqueuse à 2 p. 100.

*Urologie :* Solut. de 1 p. 100 à 5 p. 100.

*Gynécologie :* Sol. de 0,5 à 2 p. 100.

*Stomatologie :* Solut. à 1 p. 100.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

**« SPÉCIA »**

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**

86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## TONICALCINE

**Association Magnésium-Calcium.**

1 gr. (XL gouttes)  $\left\{ \begin{array}{l} 0 \text{ gr. } 25 \text{ CaCl}^2. \\ 0 \text{ gr. } 10 \text{ MgCl}^2. \end{array} \right.$

**Forme. — Liquide.**

**Indications. —** Tonique général, hémostatique, antialbuminurique, régulateur de la sécrétion biliaire, etc...

**Doses. — 1<sup>o</sup> Adultes :** a) Comme tonique, régulateur biliaire, etc... : LXXX gouttes midi et soir avant les repas.

b) Comme hémostatique : De 1 à 5 cuillerées à café par jour.

2<sup>o</sup> *Enfants :* De XX à XL gouttes midi et soir suivant l'âge.

Prix : 15 francs.

**G. MARTINIE, Pharmacien**

62, avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI<sup>e</sup>).

# TONICARDINE GONNON

## Composition :

	Par granule.
Adonidine .....	0 gr. 002
Convallamarine.....	0 gr. 02
Extrait de strophantus.....	0 gr. 001
Extrait de Scille.....	0 gr. 004

## Propriétés thérapeutiques.

Tonifie le muscle cardiaque et les artères, active la circulation sanguine et la diurèse sans élever la pression artérielle.

## Indications :

Artério-sclérose, néphrites, hydropisies, angine de poitrine, myocardites infectieuses et toutes les cardiopathies asystoliques.

## Avantages :

Dosage régulier. Effets thérapeutiques absolument certains et constants. Pas d'accumulation. Pas d'accoutumance. Ne provoque pas l'insomnie comme la caféine, ni la céphalée comme la théobromine. Médicament de choix dans les intervalles du traitement digitalique et dans le cas où la digitale est nuisible et impuissante, lorsque le myocarde faiblit et que l'imperméabilité rénale augmente.

## Posologie :

2, puis 3 ou 4 granules par jour loin des repas.

Prix : 18 francs.

## Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

## TONIKÉINE CHEVRETIN

Sérum neuro-tonique.

Ampoules contenant chacune :

Sulfate de strychnine .....	1 milligr.
Cacodylate de soude .....	0,05
Glycérophosph. soude (Cod. 1908).	0,20
Eau de mer diluée .....	5 cc.

**Propriétés thérapeutiques.** — Possède les propriétés stimulantes de l'eau de mer auxquelles s'ajoutent celles des autres éléments dont l'action tonique et reconstituante est bien connue.

**Indications.** — *Etats de dépression nerveuse et organique, Convalescences, Neurasthénie, Entérites, Tuberculose.*

**Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT**

52, rue La Bruyère — PARIS.

Télégr. Chevrematte-90-Paris.

---

## TONI-PECTORAL ADRIAN

Bonbon pectoral et stimulant à base de chlorure de magnésium et parfumé à l'anis.

**Présentation.** — Pâte pectorale, forme boursier.

**Action thérapeutique.** — Produit béchique, calmant et antiseptique par l'action de ses constituants (régliste, benzoate de soude, cachou, menthol, extrait thébaïque). Tonique général grâce à l'action du chlorure de magnésium.

**ADRIAN ET Cie**

9 et 11, rue de la Perle,  
PARIS (III<sup>e</sup>).

## TONIQUE GONNON

Aux Phosphoglycérates de soude, chaux et potasse.

**Propriétés thérapeutiques.** — Assimilation parfaite et certaine du phosphore, stimulant de l'appareil nerveux, il accélère la nutrition de tous les organes.

**Indications.** — Anémie, convalescence, neurasthénie, grossesse, médication infantile par excellence.

### Forme et Posologie :

*Vin et sirop* : 2 à 4 cuill. à soupe par jour (1 cuill. = 0 gr. 20 de phosphoglycérates associés).

*Granulé* : 2 à 4 cuill. à café par jour (1 cuill. = 0 gr. 20 de phosphoglycérates associés).

Demi-dose pour les enfants.

Prix :

*Vin et Sirop* : 12 francs.

*Granulé* : 9 francs.

**Produits GONNON**

14, rue Victor-Hugo — LYON.

---

## **TONIQUE « ROCHE »**

Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale.

Goût très agréable. Efficacité certaine.

### **Propriétés thérapeutiques :**

Propriétés classiques de ses constituants : Acide phosphorique, Arsyène, Strychnine, Kola, complétées et renforcées par un catalyseur de choix : le Manganèse.

### **Indications :**

Tous surmenages, Asthénies, Neurasthénie, Anémies, Prétuberculose, Convalescences, Adénopathies, etc.

### **Mode d'emploi et doses :**

*Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour dans un liquide quelconque.

*Enfants* (de 8 à 15 ans) : demi-doses.

### **Produits**

**F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>le</sup>**

21, place des Vosges — PARIS (III<sup>e</sup>).

## TONUDOL

Comprimés, granulé, injectable.  
Nucléarsinate de manganèse associé aux hypophosphites de chaux et de fer.

**Dose et mode d'emploi.** — 2 comprimés, 1 mesure ou cuillerée à café de granulé avant chaque repas.

*Injectable* : 1 ampoule de 1 cc. tous les jours ou tous les deux jours en injection intramusculaire profonde.

**Indications.** — Reconstituant de l'organisme indiqué dans les Surmenages, les Troubles de la Nutrition et de la croissance, la Chlorose et l'Anémie.

*Fortifie sans provoquer d'excitation.*

**Laboratoires LICARDY**

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS.  
Téléphone : Maillot 17-75.

---

## TONYOL « F »

**Composition.** — Préparation à base d'*acantha virilis*, de *piscidia* et de *viburnum*.

**Action.** — L'*acantha virilis*, dont le principe actif est la muiirapuiamine, a été étudiée par Rebourgeon et Matte. C'est un remarquable tonique neuromusculaire et un accélérateur du courant circulatoire, à action prolongée due à la lenteur de l'élimination.

**Indications.** — Troubles de la circulation, Accidents de la puberté et de la ménopause, Règles douloureuses et irrégulières, Congestion pelvienne, Artério-sclérose, Varices, Hémorroïdes.

**Mode d'emploi.** — 2 à 3 comprimés par jour.

Prix du flacon : 15 francs.

**Laboratoires VARGAS**

5, rue Chauveau-Lagarde — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## TOPIQUE NASAL A.B.C. (NÉFITOL)

**Présentation.** — En tube, dans une boîte à tiroir.

**Composition.** — Adrénaline, Benjoin, Cocaïne, Hexyl-Résorcine, etc., dissous ou en suspension dans de la vaseline neutre, fluide.

**Propriétés thérapeutiques.** — Spécifique par excellence des maladies des voies aériennes supérieures, en décongestionnant rapidement les muqueuses sans jamais les irriter.

**Indications.** — *Coryza* aigu ou chronique, *rhume des foins*, *rhinites*, *pharyngites*, etc.

**Mode d'emploi.** — En introduire gros comme un pois dans chaque narine, 3 ou 4 fois par jour (renifler doucement).

**Laboratoires J. TIFFENEAU**

Docteur en Pharmacie,

24, rue de Monttessuy — PARIS (VII<sup>e</sup>).

Tél. : Ségur 35-30.

---

## TORITANE LAMO

### 1<sup>o</sup> SIROP :

Principe du Sirop de Gibert, Arséniate de Soude et Biphosphate de Calcium ; Excipient agréable, Traitement dissimulé, présenté comme dépuratif polyvalent.

**Doses efficaces par jour.** — *Adultes* : 1 à 3 cuillerées à soupe. — *Enfants* : 1 à 3 cuillerées à café. — *Nourrissons* : 1/3 à 1 cuillerée à café (dans une infusion ou du lait).

### 2<sup>o</sup> DRAGÉES :

Mêmes propriétés que le sirop. — 1 dragée = 1 cuillerée à café.

**Doses efficaces par jour.** — *Adultes* : 3 à 9 dragées — *Enfants* : 1 à 3 dragées (avalier sans croquer avec eau, infusion ou lait).

Prix au public :

Sirop : 18 francs. — Dragées : 18 francs.

**Laboratoires LAMO**

26-28, rue Paul-de-Kock — PARIS (XIX<sup>e</sup>).

**TORITANOL LAMO****1° SIROP :**

Iodures simples, très purs (potassium, sodium, str., Mg.). Goût parfait.

Lymphatisme, Goîtres, Sclérose, Mycoses, etc.

**Doses efficaces par jour.** — *Adultes* : 1 à 3 cuillerées à soupe. — *Enfants* : 1 à 3 cuillerées à café. — *Nourrissons* : 1/3 à 1 cuillerée à café (dans infusion ou lait).

**2° DRAGÉES :**

Mêmes propriétés que le sirop. — 1 dragée = 1 cuillerée à café.

**Doses efficaces par jour.** — *Adultes* : 3 à 9 dragées. — *Enfants* : 1 à 3 dragées (avalier sans croquer avec eau ou infusion).

Prix au public :

Sirop : 22 francs. — Dragées : 22 francs.

**Laboratoires LAMO**

26-28, rue Paul-de-Kock — PARIS (XIX<sup>e</sup>).

---



## TOTAL-TONIC

Le plus complet et le plus énergique des Reconstituants.

**Forme.** — Elixir.

**Action.** — Immédiate sur les systèmes nerveux, osseux, musculaire, glandulaire et sur le plasma sanguin.

**Indications.** — Toutes défaillances de l'organisme, Amaigrissement, Asthénie, Anorexie, Anémies, convalescences, maladies de la nutrition, bronchites chroniques et prébacillose, neurasthénie, etc.

**Composition.** — Chaque cuiller à soupe contient :

Fer (citrate ammoniacal).....	0.05
Manganèse (sulfate).....	0.0375
Phosphate de soude.....	0.50
Acide phosphorique officinal....	0.25
Méthylarsinate de soude.....	0.015
Extrait de quinquina.....	0.25
Teinture de noix vomique.....	0.25
Teinture de coca.....	1.25
Extrait fluide de kola.....	0.32

Le TOTAL-TONIC réalise une association nouvelle, complète, et moderne des éléments indispensables à l'organisme défaillant.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : Une cuiller à soupe avant le repas de midi et du soir dans un peu d'eau, de vin ou de lait.

*Adolescents* (14 à 18 ans) : Une cuiller à dessert aux mêmes heures et de la même façon.

*Enfants* (au-dessus de 10 ans seulement) : Une cuiller à café dans un peu d'eau ou de lait avant le repas de midi et du soir pendant 12 jours ; arrêter 5 jours et terminer le flacon aux mêmes doses.

Prix : 16 francs.

**Laboratoires B. C. L.**

**M. BERGER**

29, faubourg de Bourgogne — ORLÉANS.

Dépôt général : Office commercial pharmaceutique, 71, rue du Temple, PARIS (III<sup>e</sup>) — et ses succursales,

## TOT'HAMELIS

Chantereau.

**Composition.** — Hamamélis administré en nature, avec la totalité des principes actifs de la plante *fraîche* stabilisée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Médication de base de l'insuffisance veineuse. Tonique de la fibre lisse et modificateur de la viscosité sanguine.

**Indications.** — Stases veineuses. Varices, hémorroïdes. États congestifs. Hypertension.

**Posologie.** — *Comprimés* : 6 par jour, aux repas. *Cachets* : 2 par jour, aux repas. *Suppositoires* (hémorroïdes) : 1 à 2 par 24 heures.

**Laboratoires CHANTEREAU**

26 bis, rue Dombasle — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

# TRÉPARSÉNANS

## SULFO-TRÉPARSÉNAN

**Composition.** — Dioxydiaminoarsénobenzène méthylène sulfonate de soude. Contient 20 p. 100 d'arsenic ; solutions moins oxydables à l'air que celles des 606 et 914. Injections sous-cutanées ou intramusculaires indolores.

**Formes.** — Le *Sulfo-Tréparsénan* est délivré en ampoules scellées à la lampe et contenant le produit dans le vide sur gaz carbonique, en boîtes d'une dose et en boîtes de 10 ampoules d'une même dose.

Doses.	00	0	I	II	III
	0 gr. 02	0 gr. 04	0 gr. 06	0 gr. 12	0 gr. 18
IV	V	VI	VII	VIII	IX
0 gr. 24	0 gr. 30	0 gr. 36	0 gr. 42	0 gr. 48	0 gr. 54
X					
0 gr. 60					

## NÉO-TRÉPARSÉNAN

**Composition.** — Dioxydiaminoarsénobenzol méthylène sulfoxylylate de soude. Produit défini, rigoureusement stable ; se présente sous l'aspect d'une poudre jaune citron légère, douée d'une odeur franche, faiblement alliagée, très facilement soluble dans son poids d'eau distillée ; sa solution est neutre.

**Doses et Formes.** — Délivré en ampoules scellées à la lampe et contenant le médicament dans le vide, sur gaz carbonique, aux doses suivantes :

I	II	III	IV	V
0 gr. 15	0 gr. 30	0 gr. 45	0 gr. 60	0 gr. 75
VI	VII			
0 gr. 90	1 gr. 05			

- 1° Par boîte de 1 dose en ampoules de 10 cc. à fond plat ;
- 2° Par boîte contenant la série des 6 doses progressives (I à VI) en ampoules à fond plat ;
- 3° Par boîte de 10 ampoules de la même dose, en ampoules ordinaires de 5 cc. à fond rond ;
- 4° En boîtes de 3 ampoules de 3 grammes de sel.

**TREPARSÉNAN.** — Dichlorhydrate de dioxydiaminoarséno-benzène.

Doses de 0 gr. 10 à 0 gr. 60 par progression de 0 gr. 10.

**Nota.** — Avant d'être livrés pour l'usage thérapeutique, les *Tréparsénans* sont l'objet d'un contrôle chimique et d'un contrôle physiologique des plus sévères de façon à ne présenter que des produits parfaitement purs, de bonne conservation et de constance éprouvée.

**Laboratoires CLIN — PARIS.**

## TRÉPARSOL

Acide formyl-méta-amino-  
para oxyphénylarsinique.

### Indications :

*Syphilis*, à tous les âges (nourrissons, enfants, adultes), et à toutes les périodes de la maladie (Hérédo-Syphilis, Syphilis primaire, secondaire, tertiaire, Para-Syphilis).

*Dysenterie amibienne*. Le Tréparsol est un véritable spécifique de cette affection, qu'il guérit en détruisant les Amibes et les Kystes amibiens.

*Protozooses intestinales, Diarrhée des Tuberculeux, entéro-colites diverses* (d'origine parasitaire ou infectieuse).

*Pian et toutes Spirochétoses* : Angine fusospirillaire de Vincent, etc.

### Présentation :

Tubes de 30 comprimés dosés à 0,25  
(dosage adultes). Prix : 22 fr.

Tubes de 40 comprimés dosés à 0,10  
(dosage enfants). Prix : 13 fr. 20.

Tubes de 60 comprimés dosés à 0,02  
(dosage nourrissons). Prix : 11 fr.

### Posologie :

*Adultes* : 1 à 4 comprimés par jour.

*Enfants* : 0,01 à 0,02 cg. par jour et par kilog.

### Mode d'emploi :

Traitement *discontinu* (3 à 4 jours consécutifs par semaine), et *progressif* (commencer par des doses faibles et augmenter de semaine en semaine).

Dépôt : Pharmacie Générale.

54, rue de la Chaussée-d'Antin — PARIS.

### Laboratoire

L. LECOQ et F. FERRAND,

14, rue Gravel — LEVALLOIS (Seine).

## TRÉPHONYL DU Dr ROUSSEL

(L'Hépatothérapie associée à la Sérothérapie et aux Tréphones embryonnaires.)

**Composition.** — Extrait de foie fœtal, Suc embryonnaire, Sérum hémopoïétique.

**Mode d'action.** — Par l'extrait hépatique fœtal et le sérum hémopoïétique, constitue la médication de choix de *toutes les Anémies même les plus graves.*

Par les Tréphones du suc embryonnaire, accélère la croissance et assure la régénération des tissus.

**Indications.** — *Toutes les Anémies, même les plus graves. Toutes les déficiences organiques : convalescences difficiles ; retards dans le développement ou la croissance chez les enfants.*

**Posologie.** — 1 à 2 flacons-ampoules par jour *par voie buccale.*

**Laboratoire de L'HÉMOSTYL**

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI<sup>e</sup>).

## TRÉPOL

Traitement bismuthique de la syphilis. Médication intramusculaire en ampoules stérilisées (3 cc.).

Spirillicide à base de tartrate basique de bismuth renfermant environ 80 p. 100 de Bi en suspension huileuse.

Adopté par l'Assistance publique et le Ministère de l'Hygiène.

La boîte de 12 ampoules : 36 fr. ; de 6 : 20 fr.

Pour tous renseignements sur le mode d'emploi, la technique et la littérature de cette préparation s'adresser aux

**Laboratoires pharmaceutiques**

**L.-G. TORAUDE, O. , O. I. .**

Docteur en Pharmacie, Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V<sup>e</sup>).

## TRÉPOQUINOL

Traitement de la Syphilis par l'Iodo-Bismuthate  
de Quinine  
en

Suspension Aqueuse  
ne possédant pas les inconvénients des suspen-  
sions huileuses.

Sans danger de stomatite, sans abcès, sans indu-  
rations, Sans toxicité.

Préparation adoptée par l'Assistance Publique à  
PARIS.

Ampoules de 3 cc. dosées à 0,10 par cc.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 21 francs.

Prix de la boîte de 12 ampoules : 40 francs.

**Laboratoires Pharmaceutiques**

**L.-G. TORAUDE**

Docteur de la Faculté de Pharmacie de Paris  
Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine  
Membre de la Société de Pharmacie de Paris.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V<sup>e</sup>).

## TRIBROMURE GIGON

**Composition.** — Bromure triple de potas-  
sium, sodium et ammonium.

**Forme.** — Poudre desséchée.

**Indications thérapeutiques.** — États  
nerveux, Psychoses, Hyperexcitabilité,  
Insomnies, Epilepsie.

**Mode d'emploi et doses.** — Cuillère-  
mesure dosant 1 gr. : 2 à 12 par jour.  
suivant avis du médecin.

Flacons pM., mM., gM.

**Laboratoire des Produits du D<sup>r</sup> GIGON**

A. FABRE, pharmacien

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## TRICALCINE

A base de sels calciques rendus assimilables, phosphates tribasiques, carbonates et autres sels de chaux et de magnésie nécessaires à l'organisme.

**Propriétés thérapeutiques.** — Recalcification de l'organisme (Formule et théorie de Ferrier-Sergent).

**Indications.** — Tuberculoses pulmonaire, osseuse, péritonite tuberculeuse, Rachitisme, Lymphatisme, Scrofulose, Grossesse, Allaitement, Troubles de la dentition, Fractures.

**Doses et mode d'emploi.** — Tricalcine pure.

*Adultes :*

Poudre : 1 cuiller mesure.

Cachets : 1 cachet.

Comprimés : 1 comprimé.

Granulés : 2 cuillers mesure.

Tablettes chocolat : 2 tablettes.

Tricalcine adrénalinée : 1 cachet.

— méthylarsinée : 1 cach.

— fluorée : 1 cachet.

Tricalcine Irradiée : 1 cachet ou 1 cuillerée à café de granulés.

— **Opothérapique** (1) : 2 drag. ou 2 cuillers à café de granulés aux 3 repas.

Enfants : moitié de ces doses.

Avant  
ou  
pendant  
chacun  
des trois  
repas.

Prix au public : poudre, granulés, cachets, chocolat : 14 fr. ; comprimés : 12 fr. ; Méthylarsinée, adrénalinée, fluorée et opothérapique : 16 fr.

(1) La formule de la Tricalcine opothérapique a été établie d'après les travaux les plus récents des auteurs français et étrangers sur le métabolisme du calcium. Cette formule d'association pluriglandulaire est composée des meilleurs fixants endocriniens du calcium.

(Association Parathyroïdes, Surrénales, Thymus, Foie, Rate, Moëlle osseuse.)

Autorisé par les *Assurances sociales*.

**Laboratoire des Produits SCIENTIA**

D<sup>r</sup> E. PERRAUDIN, pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS.

## TRIDIGESTINE DALLOZ

**Composition.** — Les trois ferments digestifs essentiels à leur maximum d'activité physiologique sous une forme qui assure l'intégrité complète de leur pouvoir digestif.

**Forme.** — Granulé.

**Indications.** — Dyspepsies par insuffisance sécrétoire.

**Dose.** — 1 à 2 cuillerées à café après les repas.

Le flacon : 12 fr. 50

**Laboratoire DALLOZ**

13, boulevard de la Chapelle — PARIS (X<sup>e</sup>).

---



## TRIDYNOL

Médicament composé leucopoiétique puissant. Employé contre les tuberculoses.

**Mode d'action.** — Dans la tuberculose augmentation des globules blancs et spécialement des lymphocytes.

L'autolysat des globules blancs est bactéricide par ses oxydases et lipases. Dissolution des cires bacillaires par les lipases. Exp. de Fiessinger.

Agglutination des bacilles qui prennent des formes d'involution et de souffrance, puis diminuent de nombre et disparaissent souvent après 6, 8, 10 mois.

Ce traitement est activé et exalté par la Diathermie transpulmonaire qui, employée seule, est inutile. Diathermie transpulmonaire 1 500 à 2 000 millampères, trois séances par semaine une demi-heure. 20 à 30 séances consécutives.

Parfois momentanément dépression et fatigue vers le dixième ou quinzième jour.

En général, augmentation de la toux et des crachats qui deviennent souvent très abondants, purulents, puis muqueux et enfin disparaissent.

Contre indication absolue : l'*Albuminurie*.

La Diathermie ne provoque pas d'Hémoptysie (professeur d'Arsonval).

Réaction thermique variable souvent défervescence après un temps variable.

En dehors de la tuberculose, s'emploie aussi avec succès dans les maladies infectieuses, salpingites, entérites, suppurations, cachexies.

**Résultats.** — Malgré toute la prudence de rigueur en cette matière, on peut dire que les résultats sont très bons au premier et deuxième degré. Variable au troisième degré, tout dépendant de l'état général.

Administration à doses fractionnées pour éviter le choc.

Pilules : 5 par jour en moyenne, 8 h., 10 h., 12 h., 3 h., 7 h., sans s'occuper des repas.

Cette médication est très efficace à doses réduites chez les enfants, combinée avec les rayons ultraviolets (sans diathermie).

Pour renseignements s'adresser :

**Pharmacie HUET**

4, place de Strasbourg. — LILLE.

## TRIGANOL VIGIER

Traitement des Amaigrissements et des Asthénies.

**Forme.** — Cachets contenant 0 gr. 70 de poudre et 0 gr. 10 d'extrait.

**Composition.** — Poudre de Fenugrec désodorisée, épuisée par les solvants généraux, et additionnée d'extrait de Fenugrec.

**Propriétés et indications thérapeutiques.**

— Stimule l'appétit, donne des forces et favorise la reprise du poids. Tuberculose à tendance fibreuse. Asthénie. Convalescence. Diabète et tous états d'amaigrissement.

**Doses.** — Trois cachets par jour et plus. *Se fait également en granulé pour enfants : 2 cuillerées à café par jour.*

**Laboratoire R. HUERRE et C<sup>ie</sup>**  
12, boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS.

## TRINITRINE CAFÉINÉE DUBOIS

(Dragées blanches à Noyau Mou).

**Composition.** — Chaque dragée est rigoureusement dosée à :

Trinitrine au centième .....	II gouttes (3 centigr.).
Caféine .....	2 centigrammes.

**Propriétés et indications thérapeutiques.** — *Vasodilatateur puissant à diffusion instantanée et action immédiate, ne provoquant aucun phénomène réactionnel. Médicament de choix de l'Angine de Poitrine, l'Asthme Cardiaque, l'Œdème Pulmonaire.*

**Mode d'emploi.** — Ces dragées doivent être *croquées* : leur noyau mou facilite leur absorption rapide et permet d'obtenir la diffusion instantanée des principes actifs et par là même une action immédiate.

**Croquer** une, deux ou trois dragées (à quelques minutes d'intervalle), au moment des accès. Dose maxima : 10 dragées par 24 heures.

Etui de 60 dragées : 15 francs.

**Laboratoires LALEUF**  
20, rue du Laos — PARIS (XV°).

## TRINITRINE-PAPAVÉRINE LALEUF

(Dragées roses à Noyau Mou.)

**Composition.** — Chaque dragée est rigoureusement dosée à :

Trinitrine au centième..... II gouttes (3 centigr.).  
Chte Papavérine ..... 5 milligrammes.

**Propriétés et Indications thérapeutiques.** — Association synergique hypotensive et analgésique, à diffusion instantanée et action immédiate, ne provoquant aucun phénomène réactionnel.

Spécialement indiquée dans : *Angine de Poitrine, Asthme cardiaque et pulmonaire, Aortites, Artérites, Urémie.*

**Mode d'emploi.** — Ces dragées doivent être croquées : leur noyau mou facilite leur absorption rapide et permet d'obtenir la diffusion instantanée des principes actifs et par là même une action immédiate.

Croquer une, deux ou trois dragées (à quelques minutes d'intervalle) au moment ou en prévision des accès.  
Dose maxima : 10 dragées par 24 heures.

Etui de 60 dragées : 20 francs.

**Laboratoires LALEUF**  
20, rue du Laos — PARIS (XV°).

## TRINITRINE ROUSSEL

**Composition :**

Comprimés n<sup>os</sup> I, II, III correspondant à I,  
II ou III gouttes de la solution au 1/100<sup>e</sup>.

**Indications.**

**Hypertension :** Crises douloureuses des aortiques, angine de poitrine, asthme cardiaque.

**Doses et mode d'emploi :**

Au moment des crises, laisser fondre sur la langue un comprimé. (Deux à 6 par 24 heures.)

**Pharmacie ROUSSEL**  
10, rue Washington — PARIS (VIII°).

## TRIRADOL

Association d'iode organique, menthol, camphre et éléments radio-actifs.

**Indications thérapeutiques.** — Toutes les tuberculoses à lésions limitées et à évolution lente.

**Contre-indications.** — Tuberculose évolutive rapide, néphrite, insuffisance hépatique, etc.

**Posologie.** — *Adultes* : une ampoule de 1 cc. ou 4 à 6 capsules par jour, par série de 30.

*Enfants* : suivant l'âge. — Voir Littérature.

**Présentation.** — Boîte de 10 ampoules : 20 fr. — Flacon de 60 capsules : 20 fr.

**Laboratoire G. FERMÉ**

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X<sup>e</sup>).

R. C. Seine 143-981.

## TRISEPTINE

Granulé de charbon animal uroforminé, citraté, pepto-nagnésié, de goût très agréable.

**Propriétés.** — Triple action antiseptique (sur l'intestin, sur les voies biliaires, sur les voies urinaires), absorbant, cholagogue, désensibilisant, diurétique ; assure le drainage des voies biliaires et le bon fonctionnement de l'intestin.

**Originalité.** — Formation de citrate de magnésie, sans inconvénient, au moment de l'absorption ; action de l'ion citrique qui fluidifie le sang, la bile et les sécrétions. Produit d'une innocuité parfaite ayant à la fois une action antiseptique, cholagogue, absorbante, désensibilisante et diurétique.

**Indications.** — Infections gastro-intestinales, biliaires et urinaires ; auto-intoxication et auto-infection intestinales avec leurs conséquences (entérite, colibacilliose, cystites, cholécystite, ictère, manifestations anaphylactiques, urticaire, furonculose, etc...)

**Doses et mode d'emploi.** — *Adultes* : 1 à 3 cuillerées à café par jour, *Enfants* : 1/2 à 1 cuillerée à café par jour, une demi-heure environ avant les repas ou le matin à jeun et le soir en se couchant. Croquer et boire un peu d'eau aussitôt après.

**Laboratoires G. LAMBERT,**

Docteur en Pharmacie,

6, rue de Longchamp — VICHY (Allier).

## TRISODYL ROZET

**Hypotenseur Antiscléreux.**

**Composition** (Dose quotidienne moyenne)

Nitrite de soude chimiq. pur...	0 gr. 20
Silicate de soude chimiq. pur...	2 gr.
Citrate de soude chimiq. pur....	4 gr.

**Formes Pharmaceutiques et Posologie.**

**Comprimés.** — 6 comprimés par jour dans un peu d'eau.

**Solution.** — Une cuillerée à café dans un peu d'eau, avant les deux principaux repas.

**Action.** — Provoque une vaso-dilatation périphérique modérée et continue, portant sur les Artérioles et les Capillaires (Nitrite de soude). Solubilise la chaux, augmente la diurèse, s'oppose aux fermentations (silicate de soude). Ramène à la normale la coagulabilité et la viscosité sanguine (citrate de soude).

**Indications.** — Hypertension artérielle. Artériosclérose. Etats pléthoriques et angiospasmodiques, Angine de poitrine, aortites, etc.

**Prix :** 20 fr. le flacon de solution ou la boîte de Comprimés pour un traitement d'un mois environ.

**Laboratoire de la Sulfoléine Rozet**  
**Benderitter et C<sup>ie</sup> — VENDOME (L.-et-Ch.).**

## TROUSSES DOSURINE

### LES EXAMENS D'URINES ET LE DOSAGE DES ÉLÉMENTS ANORMAUX (Sucre-Albumine)

sont grandement facilités par l'emploi des

#### « Trousses Dosurine »

qui assurent à ces examens la plus grande précision scientifique, permettent de les faire en quelques minutes.

Ces Trousses, sous la forme d'un petit livre facilement transportable, se présentent sous 3 modèles :

- 1° **Trousse Index** « *La Dosurine* » qui permet de décèler la présence de l'Albumine ou du Sucre.
- 2° **Trousse A** « *La Dosurine* » destinée à doser l'Albumine contenue dans l'urine.
- 3° **Trousse D** « *La Dosurine* » destinée à doser la quantité de Sucre (Glucose).

Prix de chaque trousse : 20 fr. (franco par poste : 21 fr. 25).

#### *Ampoules de renouvellement :*

La boîte de 10 : 9 fr. (par poste, 10 fr. 05).

La boîte de 20 : 16 fr. (par poste, 17 fr. 25).

Remise de 25 % à MM. les Docteurs.

Envoi franco notice sur demande.

**LA DOSURINE**, 16, rue Charlemagne — PARIS.

Chèques postaux n° 1352.39 Paris.

## TRYNOL

(Comprimés)

**Forme pharmaceutique et composition.** — Comprimés à base de silicate de soude, sels sodiques décholestérinisants, Gui, Parenchyme hépatique et thyroïdien.

**Propriétés et avantages.** — Abaissant la tension artérielle, dissolvant la cholestérine et décalcifiant les parois artérielles, il tend à rendre de la souplesse aux artères, en empêchant les formations scléreuses.

**Indications.** — Artériosclérose, Athérome, Vertiges, Troubles circulatoires, etc.

**Mode d'emploi.** — 6 comprimés par jour le matin à jeun ou 3 à midi et 3 le soir, de préférence avec une infusion rafraîchissante.

**Prescription.** — 1 boîte comprimés Trynol.

**Les laboratoires A. FALVY,**

Licencié ès sciences,

Ex-interne, lauréat des hôpitaux de Paris

40, rue des Acacias, PARIS — (XVII<sup>e</sup>).

## TRYPARSAMIDE

Sel de sodium de l'acide-N-phényl-glycinamide-p. arsinique.

Action spirillicide et trypanocide très énergique. Teneur en arsenic = 25 p. 100.

Action élective sur les formes nerveuses de la trypanosomiase.

### *Indications :*

**Maladie du sommeil, Syphilis nerveuse.**

### *Posologie et mode d'emploi :*

Injections hebdomadaires (intraveineusés, intramusculaires ou sous-cutanées) à raison de 35 mgr. par kilogr. de poids du malade. Séries de 6 à 10 injections. Surveiller l'état de la vision.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« **SPÉCIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## TRYPSOGEN

**Composition.** — Chaque tablette contient les éléments excitant la sécrétion interne du pancréas insuffisant, les ferments protéolytiques et lipolytiques et 5 milligr. de bromure d'or et de bromure d'arsenic.

**Indications.** — Diabète sucré, glycosurie, troubles du métabolisme des hydrocarbures. Est également indiqué dans certains troubles du pancréas et comme adjuvant dans l'hypertension.

**Présentation.** — Flacons de 50 et 100 tablettes.

**Mode d'emploi.** — 2 à 7 tablettes, après les repas.

Prix : 50 tablettes, 45 francs.

**G. W. CARRICK CO.**

20 Mt. Pleasant Ave. Newark, N. J. U. S. A.

Agent pour la France : **DÉGÉGÉ**

7, rue Princesse — PARIS.

Agent en Belgique :

**Pharmacie centrale de Belgique**

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

## TUBEROUSÉINE LEISYN

Complexe métallo-organo-végétal pour la chimiothérapie des tuberculoses de toutes natures.

**Composition.** — Métaux précieux, Hg, terres rares, balsamiques, etc...

**Action.** — Médication très diffusible à action antiseptique élective sur le bacille de Koch, rendant l'organisme réfractaire à la prolifération et à la reproduction du bacille de Koch.

**Indications.** — Tuberculoses fermées. Tuberculoses ouvertes des 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> degrés, même présentant des cavernes très étendues. Tuberculoses caséeuses, intestinales, ganglionnaires, cutanées, osseuses, chirurgicales. Aucune contre-indication, même dans les cas fébriles ou hémoptoïques. Jamais d'inconvénients ni d'incidents.

**Présentation.** — Pilules kératinisées (3 à 15 *pro die*). Suppositoires (1 à 2 par 24 heures).

Aucune toxicité. Innocuité absolue. Pas de contre-indication.

**Les Laboratoires LEISYN**

1 bis, rue Molitor — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

---



## TUBÉROL

### TUBEROL (pur).

**Forme.** — Liquide.

**Composition.** — Association complexe d'Essences balsamiques pures.

**Indications.** — Toutes affections des poumons, broncho-pneumonies, bronchites purulentes, coqueluche, tuberculose, etc.

**Mode d'emploi.** — En enveloppements thoraciques : avec gaz hydrophile imbibée et en inhalations.

### TUBÉROL (onguent).

**Composition.** — Tubérol + Excipient adhésif.

**Indications.** — Fin de broncho-pneumonie, bronchite légère, coqueluche, engorgements ganglionnaires.

**Mode d'emploi.** — En onctions de la poitrine ou des ganglions. Recouvrir de papier brouillard.

### TUBÉROL (Oléo).

**Forme.** — Solution huileuse.

**Composition.** — Tubérol + Huile stérilisée.

**Indications.** — Affections naso-pharyngées, oreillons, coqueluche, grippe, rhumes, etc.

**Mode d'emploi.** — En pulvérisations et instillations nasales. Badigeonnage dans oreillons, coqueluche, scarlatine.

### TUBÉROL (injectable).

**Forme.** — Ampoules.

**Composition.** — Tubérol + Benzoate de Benzyl + Huile d'Olive stérilisée éthéro-camphrée.

**Indications.** — Complément intensif du Tubérol dans bronchites fétides, pneumonies, coqueluche, tuberculose.

**Mode d'emploi.** — 1 à 6 ampoules par jour suivant gravité.

### TUBÉROL (Sirop).

**Composition.** — Tubérol + véhicule.

**Indications.** — Antiseptique des voies respiratoires. Calme la toux.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

*Enfants* : 3 à 4 cuillerées à café.

Laboratoires E. BOUTEILLE

23, rue des Moines — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

Tél. : Marcadet 04-02.

## TUBES BLACHE

Toutes formules en pommades pour  
l'Ophthalmologie.

### Liste des principales préparations :

Adréno-éphédrine,  
Aminothionine Westermann,  
Analgo-contractine,  
Analgo-mydratine,  
Argovyl, Cadmio-zinc, Camphocuiivre,  
Chaulmocuprine, Chlorhydratine,  
Colorants composés, Compositol,  
Contractine, Dioptril, Ichto-zinc,  
Iodure alcalino-calcique, Kinargol,  
Mydratine, Organo-bismuth,  
Oxy-arsine Hg, Oxyde Hg,  
Paléocaline,  
Phocéol, Thiosulfol cuprique,  
Thiosulfol hydrargyrique,  
Zircotanyl, etc.

## TUBES CHAUVIN

Toutes formules en pommades pour l'Oto-  
Rhinologie et pour la Dermatologie :

Série *Rhino* pour le nez.

Série *Oto* pour les oreilles.

Série *Dermo* pour la peau.

Établissements Alfred CHAUVIN

AUBENAS (Ardèche).

## **TUBES DU D<sup>r</sup> GUIRAUD**

Ex-Pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux  
(Anciennement tubes DAVIEL).

### **POMMADES OPHTALMIQUES**

munis d'une canule spéciale permettant l'introduction directe de la pommade dans l'oeil.

#### **TOUTES FORMULES**

**Spécialement recommandées :** Pommades à l'aristol, à l'oxyde jaune orangé et à l'atropine. Obtenues par dissolution préalable de la substance active et évaporation du solvant, ce qui assure un état de division extrême et une puissance d'action considérable.

Prix : 9 et 10 francs.

Echantillons sur demande.

### **Laboratoire SPES GUIRAUD**

10, impasse Milord — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

Téléph. : Marcadet 37-98.

---

## TUBES DULCIS

### Pommades ophtalmiques.

<b>Argolène</b> (Sel d'Ag). — Conjonctivites aiguës, à 5 p. 100 et 10 p. 100.....	12 fr.
<b>Cadmiol</b> — Conjonctivites chroniques, à 1 p. 100 et 2 p. 100.....	12 fr.
<b>Cuprinol</b> (Sel organique de Cu). — Conjonctivites chroniques, à 1 p. 100, 2 p. 100, 5 p. 100.....	12 fr.
<b>Iodo-Calciq.</b> — Traitement de la cataracte, 8 p. 100.....	12 fr.
<b>Ichtyol-zinc.</b> — Blépharites.....	12 fr.
<b>Novoptine.</b> — Ulcères à pneumocoques, à 1 p. 100.....	12 fr.
<b>Oxyde orangé de Hg.</b> — Blépharites conjonctivites phlycténulaires, à 1 p. 100, 2 p. 100, 3 p. 100, 4 p. 100, 5 p. 100	11 fr.
<b>Ophtalmoforme.</b> — Antipurulent, à 2 p. 100, 3 p. 100.....	12 fr.
<b>Aristol.</b> — Antipurulent, à 2 p. 100.	12 fr.
<b>Iodoforme.</b> — A 1 p. 100, et 2 p. 100 .....	12 fr.
<b>Thiosinamine.</b> — Opacités et synéchies à 1 p. 100.....	12 fr.
<b>Mydriazine.</b> — Mydriatique puis-sant .....	16 fr.
<b>Alcaloïdes seuls</b> .....	12 fr.
<b>Alcaloïdes associés</b> .....	14 fr.
<b>Myosine forte.</b> — Glaucome.....	16 fr.
<b>Myosine faible</b> .....	16 fr.
<b>Iodo-Rubidium.</b> — Cataracte.....	16 fr.

**Laboratoire de Thérapie Oculaire**  
**du DOCTEUR FERRY,**  
**Place Clichy — MONTE-CARLO.**

# TUBES OPHTALMOLOGIQUES FERLUX

## Tubes Ferlux :

Huile de Chaulmoogra, Chaulmoogra-Butelline.

Oxyde de mercure orangé, 1, 2, 3, 4 et 5 p. 100  
— jaune, 1, 2, 3, 4 et 5 p. 100

Iodoforme, Calomel, Précipité blanc, Ethylhydrocupréine (optochin), Halocalcine ( $I Na + CaCl^2$ ), Ichtyol-oxyde de zinc, Thigénol-oxyde de zinc, etc., etc.

## Produits Orhino :

Pour Otorhinolaryngologie.

Prix moyen : 10 francs.

## Laboratoires RHINOPHTA

G. Bousquet, Docteur en Pharmacie — ALBI.

# TULLE GRAS LUMIÈRE

Pansement indolore des plaies

Double la vitesse de cicatrisation.

Il peut être prescrit aux accidentés du travail

**Constitution.** — Carrés de tulle imprégnés d'une composition grasse à base de baume du Pérou, qui lui communique des propriétés désodorisantes, kératoplastiques, (activation considérable de la cicatrisation).

**Propriétés.** — Evite l'adhérence des pièces de pansement aux plaies. Se détache aisément sans provoquer de douleur ni d'hémorragie, évite l'arrachement des bourgeons, respecte leur tissu fragile et supprime totalement la douleur du décollement des compresses, douleur souvent intolérable chez les amputés ou les grands brûlés, par exemple.

Le Tulle gras Lumière permet d'abrèger la durée de la cicatrisation dans des limites très importantes.

**Présentation.** — Le Tulle gras Lumière est présenté en carrés de dimensions fixes :

0 <sup>m</sup> 10 × 0 <sup>m</sup> 10.	Boîte de 10 compresses.
0 <sup>m</sup> 10 × 0 <sup>m</sup> 10.	— 20 —
0 <sup>m</sup> 10 × 0 <sup>m</sup> 10.	— 30 —
0 <sup>m</sup> 22 × 0 <sup>m</sup> 22.	— 30 —

Ces carrés de tulle que l'on applique directement sur les plaies sont superposés dans une boîte, métallique, séparés les uns des autres par des carrés de papier. Le tout est ensuite stérilisé à l'autoclave à 120°.

**Mode d'emploi.** — Placer un carré de Tulle gras sur la plaie, appliquer par dessus le pansement stérilisé.

LABORATOIRES LUMIÈRE

23, Cours de la Liberté. — LYON.

## **TULLE ROSE BESLIER**

**Pansement isolant et non adhérent.**

Constitué par un carré de  $13 \times 13$  imprégné d'un mélange plastique à base de Microcidine, Baume du Pérou, Huile essentielle de Verveine, Thym, Niaouli, Pélargonium.

Le **Tulle Rose Beslier** est un cicatrisant énergique ; il permet le renouvellement indolore des pansements sans arrachements des bourgeons charnus, sans hémorragies.

Il assure des cicatrices souples, sur les brûlures, plaies par vésication, ulcères variqueux, plaies atones, plaies infectées, phlegmons, abcès, etc...

Le **Tulle Rose Beslier** est livré en boîte de 10 carrés de  $13 \times 13$ .

Prix : 7 francs la boîte.

**M. COQUELU, Pharmacien-Fabricant**  
**DIGOIN (S.-et.-L.).**

---

## UCLARSYL

(Ancien Métarsenobenzol Saca)

Dioxydiaminoarsénobenzène - monométhylène - Sulfoxylate de soude (914).

Rigoureusement pur (double contrôle chimique et physiologique). Traitement d'attaque et d'entretien de la syphilis.

**Préparation intraveineuse.** — Poudre très aisément soluble dans l'eau distillée pour injections intraveineuses.

Doses progressives de 0 gr. 15 à 0 gr. 90.

**Usines Chimiques des Laboratoires Français**

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI<sup>e</sup>).

Dépositaire :

**Laboratoire et Pharmacie A. MILLET**

5, rue Ambroise-Thomas — PARIS (IX<sup>e</sup>).

Tél. : Provence 58-43.

## ULCÉOBALNÉINE

Poudre spéciale pour bains de jambe antivariqueux.

Alcalino-sodique-silicatée.

Par son action sédative sur l'élément nerveux, les bains à l'Ulcéobalnéine :

Calment les douleurs variqueuses, arrêtent l'évolution des varices et en diminuent le volume ; font résorber l'œdème et l'empatement ; guérissent les congestions variqueuses et périphlébitiques.

Un bain de jambe de 30 minutes à 36° tous les jours pendant 24 jours.

Une boîte pour 4 bains de jambe.

Prix : 6 fr. 75.

**Laboratoire SÉVIGNÉ**

10, rue du Parc-Royal — PARIS (III<sup>e</sup>).

## ULCÉOPLAQUE - ULCÉOBANDE

Pansement de marche.

**Cicatrisation** certaine des *Plaies aux jambes*, des *plaies atones* et des *Ulcères variqueux*, même anciens et trophonévrotiques, sans interrompre ni le travail ni la marche.

Pansement souple et spongieux préparé avec des poudres aseptiques émulsionnées. C'est un merveilleux générateur de la cellule, un stimulant de sa vitalité. **Résultats surprenants.**

Boîte de 6 pansements pour 20 ou 24 jours.

Deux dimensions :

Ulcéoplaque n° 1 5/6 centim. Ulcéoplaque n° 2 7/9 centim.

Formuler : Une boîte Ulcéoplaque n° 1 ou n° 2.

Prix : 24 ou 36 francs.

1 Ulcéobande. Prix : 30 francs.

## ULCÉOSINE

Sulfo-citrate de soude et pipérazine formino-bicarbonaté, arsénio-lithiné.

Action antitoxique et hypotensive.

Indiquée dans l'artério-sclérose, l'hypertension artérielle, les troubles hépatiques, les varices, les congestions variqueuses et phlébitiques, les plaies atones, les ulcères variqueux, le rhumatisme chronique, l'hyperglycémie, le diabète.

1 cuillerée à café par jour dans un verre d'eau chaude ou froide, pendant 15 jours consécutifs.

Prix : 10 francs.

**Laboratoire SÉVIGNÉ**

10, rue du Parc-Royal — PARIS (III<sup>e</sup>).



## **ULCÉOSOL-POMMADE**

Oxyde de zinc, Cuivre salicylé, Silicate de magnésie et excipient spécial.

Guérison rapide de l'Eczéma variqueux sec, Irritation de la peau, Prurigo.

Prix : 10 francs.

## **ULCÉOSOL-POUDRE**

Oxyde de zinc bismuthé, Acide salicylique, Silicate de magnésie.

Poudre siccative, guérit rapidement l'eczéma variqueux suintant, les excoriations eczémateuses superficielles.

Prix : 10 francs.

**Laboratoire SÉVIGNÉ**

10, rue du Parc-Royal — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## ULCÉROPHILE NOSAN

Traitement ambulatoire des Ulcères variqueux.

**Présentation et composition.** — Bande de 0 m. 13 × 12 mètres imprégnée aseptiquement par un procédé spécial d'une pâte gélatino-amidonnée (pâte de Unna modifiée) constituant, après application, un appareil de contention parfait.

**Action.** — Décongestionnant, cicatrisant, on obtient par ce pansement un bas à varices semi-rigide moulé sur le membre et ne pouvant se distendre ; provoque par la marche un léger massage qui a pour résultat la résorption rapide du liquide séreux infiltré et le dégonflement du membre. Rétablissement de la circulation veineuse, meilleure nutrition des tissus qui retrouvent toute leur vitalité et enfin la cicatrisation des lésions.

**Indications.** — Toutes les plaies atones des membres inférieurs et particulièrement des Ulcères variqueux même les plus anciens, sans tendance à la cicatrisation. Plaies traumatiques à cicatrisation lente, phlébites, varices douloureuses, eczémas, brûlures à épidermisation difficile.

**Mode d'emploi.** — Plonger la boîte contenant la bande dans un récipient d'eau assez profond (bouillotte) et porter à l'ébullition jusqu'à ramollissement complet (15 à 20 minutes). Appliquer la bande directement sur la peau à la façon d'une bande molletière en évitant les renversés.

Prix au public : 25 fr. la bande.

**Pharmacie MAYAUD**

6 ter, rue Voltaire,

LA GARENNE-COLOMBES (Seine).

## ULMARÈNE GIGON

**Composition.** — Ether salicylique liquide d'odeur faible.

**Indications thérapeutiques.** — Analgésique local, antirhumatismal externe. Spécifique contre les rhumatismes, les névralgies.

**Formes.** — 1° Ulmarène pur flacons de 30, 60, 125 cc. (pM, mM, gM) ;

2° Ulmarène formulé dans une préparation magistrale (liniment, pommade) ;

3° Ulmarol Gigon (liniment) ;

4° Baume du docteur Gigon, en tube.

**Mode d'emploi.** — Onctions suivies d'enveloppements.

**Laboratoire des Produits du Dr GIGON**

**A. FABRE, pharmacien**

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## ULTRACAO LAURENÇON

**Suraliment Minéro-Nucléiné**

Délicieux déjeuner à base de Cacao.

Tonique Reconstituant.

Suralimentation Rationnelle de l'enfant et de l'adulte. (Ne constipe jamais).

**Forme.** — Poudre soluble.

**Posologie.** — Délayer à froid le contenu de 2 cuillerées à café dans une bonne tasse d'eau ou de lait de préférence. Porter à l'ébullition pendant quelques minutes en remuant jusqu'à complète homogénéité.

**Laboratoire d'Actino-Biologie**

**J. LAURENÇON, Pharmacien**

Professeur de Chimie et de Pharmacologie

16, rue de la République,

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE.

## ULTRA-LEVURE

**Levure ultra-haute (37°) de H. Boulard.**

**Composition.** — 120 à 150 millions de globules de levure par ampoule de 3 cc. 5 dans un milieu isotonique où la levure reste vivante pendant plus de 5 ans.

**Propriétés.** — Température d'activité et de reproduction optimale correspondant à la température physiologique de l'intestin. Élimine les ferments pathogènes par concurrence vitale. Passe dans la circulation et se retrouve dans les urines.

Ne produit qu'une acidité insignifiante.

Facilite les phénomènes d'assimilation et de désassimilation — tonique par les diastases et les vitamines produites en grande abondance (principalement vitamine B). Action spéciale sur les dermatoses par la Vitamine B.

**Indications.** — *Infections intestinales*, états aigus et chroniques, diarrhées infantiles (se prend dans du lait), diarrhées et dysenteries amibiennes ou bacillaires, entérites, furonculoses et dermatoses; *colibacilloses intestinales et urinaires* (résultats très rapides).

**Mode d'emploi.** — Livrée en boîte de 12 ampoules de 3 cc. 5. *Dose normale* : 1 ampoule par jour dans un peu d'eau sucrée; *dans les cas aigus* : 1 ampoule deux fois par jour; *dose d'entretien* : 2 ampoules par semaine.

**Laboratoire des Ultra-Levures**  
6, rue de Naples — PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
Et tous grossistes.

## ULTRA-VIOLETS

- 1° *Affections de la première et de la seconde enfance, hypotrophies, rachitisme, tétanie, anémies ;*
- 2° *Tuberculoses dites chirurgicales : ganglionnaire, osseuse et ostéo-articulaire, péritonéales, génitale ;*
- 3° *Affections cutanées : acné, psoriasis, engelures, lupus, et affections du cuir chevelu : pelade ;*
- 4° *Etats de surmenage et d'asthénie, convalescences ;*
- 5° *Infections de l'oreille, tuberculoses oculaires, carie dentaire, pyorrhée, blanchiment des dents.*

Vente et location de tous appareils et accessoires à

**La Verrerie Scientifique**

12, avenue du Maine — PARIS (XV<sup>e</sup>).

Tél. : Littré 94-62 et Littré 01-63.

## ULTRAVITAMINE 4

Les Quatre Vitamines A. B. C. D. (cholestérol ergostérinique irradié) associées à des éléments minéraux : Phosphore, Manganèse, Calcium, en combinaison avec des éléments opothérapiques : Moelles et Poudre d'Os frais.

**Indications.** — Déminéralisation. Rachitisme. Toutes Carences et Convalescences. Dépression nerveuse. Fatigue musculaire. Allaitement. Pré-tuberculose. Puissant Dynamogène. Récalcifiant intégral.

**Forme.** — Délicieux granulé bicolore.

**Posologie.** — La même pour enfants et adultes : 1 cuillerée à café de granulé sec ou dissous dans un peu d'eau froide, 1/2 heure avant les 2 ou 3 principaux repas.

**Laboratoire d'Actino-Biologie**

**J. LAURENÇON, Pharmacien.**

Professeur de Chimie et de Pharmacologie,

16, rue de la République,

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE.

## URALYSOL

**Propriétés thérapeutiques.** — Traitement de la diathèse rhumatismale. Agent de dissolution et d'élimination de l'acide urique.

**Indications.** — Arthritisme, Rhumatismes, Goutte, Coliques néphrétiques et hépatiques, Urétrites, Cystites.

**Deux formes :** a. *Granulés* ; b. *Comprimés*.

**Formule.** — Acide thyminique, Hexaméthylène-tétramine, Lysidine, Helmithol, Sels de lithine.

### Modes d'emploi .

A. *Granulés* : Une cuillerée à café, matin et soir dans un verre d'eau.

B. *Comprimés* : 4 comprimés par jour en moyenne une demi-heure avant les repas ou une heure après.

Prix de vente au public : 12 francs.

**Laboratoires LOBICA**

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

## URASEPTINE ROGIER

A base de Hexaméthylènetétramine et son citrate, Diéthylènediamine, Benzoate de soude et de lithine, etc.

Granulé soluble dosé à 0 gr. 50 de substance active par cuill. à café.

**Dose.** — 3 à 6 cuill. à café par jour.

**Propriétés.** — Antiseptique urinaire et biliaire par excellence. Dissout et chasse l'acide urique.

Le flacon : 12 fr. 50.

**Henry ROGIER, docteur en pharmacie**  
56, boulevard Pereire — PARIS.

## URAZINE

Citro-salicylate de pipérazine.

Dissolvant de l'acide urique et des urates.  
Action analgésique et antiseptique. Innocuité absolue.

*Indications :*

**Lithiase rénale, Goutte, Gravelle,  
Douleurs rhumatismales.**

*Posologie et mode d'emploi :*

Comprimés à 30 centigr. : trois ou quatre par jour, au moment des repas.

Granulés effervescents : une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau, aux deux principaux repas.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## UR-CLAR

**Antiseptique Urinaire.**

### UR-CLAR BLEU.

**Composition.** — Bleu de Méthylène, Citraminoxiphène, Poudre d'Hamamélis.

**Propriétés.** — Antiseptique et analgésique des voies urinaires et du tube digestif.

**Indications.** — *Toutes* les infections urinaires et en particulier les colibacilluries, la tuberculose rénale et vésicale et la blennorrhagie.

**Doses.** — 9 à 12 capsules par jour.

### UR-CLAR BLANC.

**Composition.** — Santalol citraminoxiphène, poudre d'Hamamélis.

**Propriétés.** — Antiseptique et balsamique des voies urinaires.

**Indications.** — La blennorrhagie et ses complications.

**Doses.** — 9 à 12 capsules par jour.

**Laboratoire Central Maubeuge**

**A. ROUX, Pharmacien**

58, rue de Maubeuge — PARIS.

Tél. : Trudaine 54-69.

---

## URICEMINE

Synergie médicamenteuse à doses non flocculantes.

**Composition.** — Salicylate de pipérazine, 0,04 ; benzoate de soude, 0,10 ; benzoate de lithine, 0,02 ; silicate de soude, 0,02 ; urotropine, 0,10 ; citrate acide de soude, 0,30 ; sous forme de granulés. Doses fractionnées utilisables en totalité par synergie et sans provoquer de précipitation.

**Mode d'action.** — Dissolvant de l'acide urique, anti-purinique, anti-flocculant, anti-sclérosant, antiseptique.

**Indications.** — Hyperuricémie, Lithiase rénale, hypertension artérielle, artério-sclérose, athérome, goutte, sciatique, asthme, pléthore, dermatoses. Infections urinaires et biliaires.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 cuillerées à café par jour dans un verre de liquide, aux repas ou en dehors.

**Produits SANOVA**

41, rue d'Amsterdam — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

**URICLARINE**

(Comprimés.)

Antiseptique entéro-rénal.

**Propriétés thérapeutiques.** — Combat l'infection urinaire au lieu même où elle naît : dans le tube digestif. L'Uriclarine, dans laquelle le chlorure d'ammonium renforce l'action du salicylate de phénile et de l'urotropine, est le médicament des affections réno-vésicales d'origine intestinale.

**Indications.** — Maladies infectieuses des Voies Urinaires, Cystites, Pyélites, Colibacillurie, Blennorrhagie.

**Mode d'emploi.** — Avaler sans croquer 6 à 8 comprimés par jour de préférence aux repas.

Prix au public : 11 francs.

**Laboratoires P. BRISSON et C<sup>ie</sup>**  
157, rue Championnet — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

---

**URIFLUINE**

Succinate de lithine.

Dissout l'acide urique, augmente la quantité des urines, empêche les coliques néphrétiques. Action anti-rhumatismale dans la Cellulite et le Rhumatisme chronique.

La boîte de comprimés ou pilules : 12 francs  
prix public.

La boîte de 10 ampoules : 13 fr. 50  
prix public.

**Laboratoires STENE**  
2, place des Vosges — PARIS.



## URISANINE

**Composition.** — Benzoate d'hexaméthylène-tétramine dissous dans un excipient à base végétale (plantes balsamiques) auquel a été incorporé l'extrait de stigmates de maïs.

**Dosage.** — Une cuillerée à café = 0 gr. 75 de Benzoate d'hexaméthylène-tétramine + 0 gr. 25 d'extrait de stigmates de maïs dissous dans 4 gr. d'excipient végétal balsamique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique urinaire et biliaire complet ; balsamique et diurétique ; dissolvant phosphatique, urique et uratique ; éliminant sûr et rapide.

**Indications.** — Toutes affections des voies urinaires et biliaires, maladies infectieuses (typhoïde, scarlatine, grippe), comme préventif de l'infection vésico-rénale.

**Mode d'emploi.** — Se prend dilué dans 1/2 verre d'eau naturelle ou gazeuse.

**Adultes :** 2 à 4 cuillerées à café par jour.

**Enfants :** par 1/2 cuillerée à café suivant l'âge.

**Laboratoires LONGUET**

34, rue Sedaine — PARIS.

## UROBUCCOL MALMANCHE

### Composition :

Formine (uroformine, urotropine) . . .	25 centigr.
Benzoate de soude . . . . .	20 —
— de lithine . . . . .	10 —
Sirop de buccu . . . . .	2 grammes.
— de maïs . . . . .	2 —
— de térébenthine . . . . .	2 —

par cuillerée à café.

**Forme.** — Liquide, sirupeuse.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique des voies urinaires et des voies biliaires, antiseptique général, balsamique et diurétique puissant. Dissolvant phosphatique, urique et uratique.

**Indications.** — Pyélites, Pyélonéphrites, Cystites, Urétrites, Prostatite, Blennorrhagie, Uricémie, Goutte, Lithiase rénale, Coliques hépatiques.

**Posologie.** — 2 à 3 cuillerées à café par jour, pur ou dans une infusion.

Prix au public : 12 francs.

**Laboratoire MALMANCHE**

Pharmacien. Docteur ès sciences.

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

## UROCLASE

Antiurique vrai

Préventif et curatif. Non toxique.

**Définition et composition centésimale.** — Bioxyde de Silicium (0,25) à l'état colloïdal, uni par adsorption au Carbonate de K (0,025) et au Chlorure de Na (0,19) dispersés en milieu aqueux par un procédé spécial.

**Mode d'action.** — Rétablit progressivement le métabolisme normal des échanges de l'économie et lui rend sa réaction finale légèrement acide ; la précipitation de l'acide urique dans l'organisme devient ainsi impossible. Il est donc aussi bien préventif des accidents à venir que curatif des accidents en cours, et de toxicité rigoureusement nulle.

**Agit à la manière d'un ferment,** suivant les lois de la physicochimie des colloïdes et par conséquent, de la matière vivante.

**Indications.** — Tous les états uricémiques dans toutes leurs manifestations.

**Emploi et Doses.** — V gouttes le matin à jeun dans un peu d'eau. Cures régulières et successives de 10 jours, séparées par repos de 10 jours.

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

Tél. : Laborde 08-00.

## UROFORMINE GOBEY

Comprimés dosés à 0 gr. 50. Comprimés effervescents dosés à 0 gr. 25 (solubilité instantanée). Solution injectable en ampoules de 2 et 5 cc., 0 gr. 25 par cc.

**Dose et mode d'emploi.** — 2 à 6 comprimés par jour dans un verre d'eau froide. Injections de 0 gr. 50 à 2 gr. par jour. (Intraveineuses seulement.)

**Propriétés thérapeutiques.** — Le plus puissant antiseptique interne. Dissolvant de l'acide urique.

**Indications.** — Fièvres infectieuses, Grippe, Encéphalite, Complications broncho-pulmonaires, etc., Rhumatismes, Infections des voies biliaires et urinaires, etc.

Prix au public :

La boîte de 50 comprimés à 0,50 : 12 fr. 50.

— de comprimés effervescents : 12 fr. 50.

Laboratoires GOBEY

89, rue du Cherche-Midi — PARIS.

## UROIODINE

**Composition.** — L'Uroïdine ou Iodoéthylate d'hexaméthylènetétramine est une combinaison organique contenant 42 p. 100 d'iode rigoureusement titré, associée à un sel de lithine.

**Propriétés physiques et chimiques.** — Solution dialysable, se décompose lentement, est diffusée dans tout l'organisme, s'élimine dans l'urine sous forme d'iodure alcalin, ce qui indique une destruction complète de la molécule organique. Pas d'accumulation.

**Propriétés physiologiques.** — Grâce à sa molécule iodée, l'Uroïdine est un excitateur puissant des fonctions lymphoïdes, déterminant une hyperleucocytose intense, un fixateur d'oxygène, stimulant les échanges nutritifs de l'organisme.

Grâce à l'heureuse combinaison Iodo-Formine, l'Uroïdine constitue un agent anti-infectieux particulièrement énergique. Enfin grâce à l'association Formine-Lithine, l'Uroïdine est un diurétique très actif et un excellent dissolvant de l'acide urique et des urates.

**Indications.** — Toutes affections glandulaires : adénites, adénopathies, végétations adénoïdes, scrofulides, etc... Maladies de la nutrition : toutes manifestations des diathèses. Urique : goutte, gravelle, calculs, etc. Arthritique : rhumatismes chroniques et déformants. Tuberculoses localisées : osseuses et ganglionnaires, Tertiarisme, Scléroses, Asthme, Emphysème, etc...

**Formes et Posologie.** — Ampoules de 3 cm. 3/4. Comprimés kératinisés de 0 gr. 50. Chez l'enfant au-dessous de 15 ans, 1/2 à 1 ampoule par jour. Chez l'adulte, 1 à 2 ampoules en injections intramusculaires ou intraveineuses (bien tolérées sans réaction locale ni chronique classique, résorption parfaite). Comprimés : 1 à 2 comprimés suivant l'âge chez l'enfant ; 2 à 6 comprimés suivant l'âge chez l'adulte, comme traitement d'entretien contenant 42 p. 100 d'iode ; remplaçant avantageusement les iodopeptones qui n'ont que 17 p. 100 d'iode, mieux tolérés grâce à leur enrobage spécial.

**Laboratoire de l'UROIODINE**  
45, boulevard Lafayette — CALAIS.

## UROMÉTHYL

(Dragées).

**Association stable :** Urotropine chimiquement pure, Salol, Citrate d'Urotropine, Bleu de méthylène.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antiseptique interne particulièrement énergique et anti-infectieux par excellence. Aucune intolérance. Pas de contre-indication.

**Indications.** — Antisepsie générale. Maladies infectieuses. Infections urinaires et biliaires. Diathèse urique. Diathèse arthritique.

**Mode d'emploi.** — 6 à 9 dragées par jour au moment des repas.

Littérature et échantillons.

Laboratoire de l'Urométhyl.

J. BRESSIER, Pharmacien,  
102, rue Vincent — MARSEILLE.

## UROMÉTINE LAMBIOTTE FRÈRES

*Hexaméthylènetétramine pure.*

**Formes.** — Comprimés, Ampoules, Cristaux.

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant antiseptique interne, antitoxique, antiuricémique.

**Indications.** — Toutes infections urinaires, intestinales et biliaires, toutes maladies infectieuses, toutes manifestations de la diathèse urique.

**Mode d'emploi.** — 1° Comprimés de 0 gr. 50 à faire dissoudre dans l'eau et à prendre matin, midi et soir : 6 à 8 dans les cas aigus, 3 à 4 dans les cas chroniques ; 2° Ampoules de 2 cc. et 5 cc. dosées à 0 gr. 25 par cc. pour injections intramusculaires ou mieux intraveineuses ; 3° Cristaux pour prescriptions magistrales.

Littératures et Echantillons :

**Produits LAMBIOTTE FRÈRES**

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

## UROMIL

**Composition.** — Association d'éther phényl-cinchonique, piperazine, hexaméthylène tétramine.

**Forme.** — Granulé de goût agréable, effervescent, instantanément soluble dans l'eau.

**Action.** — Mobilise, dissout, élimine l'acide urique. Par ses éléments phosphoriques, empêche la formation de purines endogènes, génératrices d'acide urique.

Par son phosphate disodique, entrave la précipitation de l'acide urique au niveau du rein et de la vessie.

Possède une activité double de celle des pipérazines granulées.

**Indications.** — Diathèse urique, goutte, rhumatisme chronique, lithiase hépatique et rénale.

**Mode d'emploi.** — 2 à 4 cuillerées à café par jour, chacune dans un verre d'eau.

**Laboratoires UROMIL**

Dr L. BELIERES

19, rue Drouot — PARIS (IX<sup>e</sup>).

---

## UROPHILE

**Forme.** — Granulé effervescent.

**Composition.** — Lithine en combinaison benzoïque, Hexaméthylène tétramine, Acide Thyminique.

**Propriétés pharmacodynamiques.** — Uricolytique, Diurétique, Régulateur de l'activité hépatique, Antiseptique des voies urinaires et biliaires.

**Indications.** — Diathèse arthritique. — Goutte aiguë et chronique. — Gravelle urique. — Lithiase biliaire. — Rhumatismes. — Cystites.

**Mode d'emploi.** — Une cuillerée à café dans un peu d'eau, deux fois par jour, entre les repas.

L'étui : 14 francs. (En France.)

**Laboratoires A. BAILLY et C<sup>ie</sup>**

15 et 17, rue de Rome — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## UROSALYL

**Association stable de l'Urotropine et du Salol.**

### Composition :

Hexaméthylène tétramine. 0 gr. 40.  
 Salol..... 0 gr. 50.  
 Excipient neutre..... Q. S. pour 1 cachet.

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant antiseptique des infections urinaires, biliaires, intestinales. Il donne d'excellents résultats dans les urétrites, prostatites, cystites purulentes, pyurie ; prophylaxie de la fièvre typhoïde et toutes les maladies infectieuses.

**Présentation.** — En boîtes de 24 et de 60 cachets.

**Doses.** — 2 à 3 cachets par jour, au début des repas.

**Prix de vente :** G. M., 20 fr. ; P. M., 8 fr. 50.

## UROSALYL MÉTHYLÉ

(Bande bleue.)

Réservé aux malades qui présentent de l'intolérance vésicale pour l'Urotropine.

**Formule :** Salol, 0 gr. 65 ; Bleu de méthylène chimiquement pur, 0,03 ; Excipient neutre, Q. S. pour 1 cachet.

Même présentation, mêmes indications, mêmes doses et mêmes prix que l'Urosalyl simple.

**Clément GARDIOL,**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe,  
 de la Faculté de Montpellier.

6, rue Félix-Pyat — MARSEILLE.  
 Échantillons. — Littérature sur demande.

## UROSAN DUFAYARD

**Forme.** — Comprimé à faire dissoudre.

**Composition.** — Benzo-camphorate d'urotropine et extrait de styles de maïs.

**Indications.** — Antiseptique, urinaire et biliaire. *Médicament de choix* pour le traitement des Cystites, Prostatites, Urétrites, Pyélites, Pyélonéphrites de la Grippe, Fièvre typhoïde, Diathèse urique, Rhumatismes, Goutte, Gravelle, Calculs, Phosphaturie.

2 à 6 comprimés par jour, dissous dans l'eau.

Echantillons sur demande.

Prix : 14 francs.

**Laboratoires DUFAYARD**

12, rue des Saints-Pères — PARIS.

## UROZEA

**Antiseptique hépato-urinaire.**

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant dissolvant de l'acide urique.

**Indications.** — Maladies infectieuses, syndrome entéro-rénal, lithiases biliaire et rénale, goutte, rhumatisme chronique.

**Forme.** — Granulé effervescent agréable au goût.

**Formule.** — Hexaméthylène tétramine, benzoate de lithine, salicylate de lithine, carbonate de lithine, citrate hexaméthylène tétramine, théobromine, benzoate soude, scille, pipérazine. Ext. de stig. de maïs, ext. uva ursi, ext. chiendent.

**Dose et mode d'emploi.** — 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix de la boîte au public : 19 fr. 50.

**Laboratoire LOBRY**

6, rue Parrot — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## UTÉRAMINE

### Composition :

Solution au centième de chlorhydrate de paraoxyphényléthylamine présentée en ampoules de 1 cc., pour injections, et en flacons de 10 cc., pour l'usage interne.

### Propriétés :

*Excellent hémostatique, cardio-tonique et bon excitant de l'utérus.* Remplace ergotines et extraits pituitaires aux effets inconstants.

### Indications :

*Obstétrique et gynécologie.* Post-partum (hémorragies et atonies utérines), placenta praevia, ménorragies, métrorragies, dysménorrhées, ménopause.

*Médecine interne.* Hémophilie, hémoptysie, épistaxis, hémorragies intestinales, choc, collapsus, hémorragies en nappes.

### Mode d'emploi :

On utilisera pour les injections hypodermiques (avant-bras ou cuisse) ou intramusculaires (muscle fessier), 1 à 3 cc. et jusqu'à 5 cc. selon les cas. Pour l'usage interne 20 à 30 gouttes, trois fois par jour.

### Laboratoire ZYMA

4, rue Bellart — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---



## UVARGOL

Argent colloïdal irradié.

*Première utilisation, en thérapeutique, de l'action des rayons lumineux sur l'argent, action qui détermine une propriété photo-catalytique extrêmement puissante sur les cellules vivantes.*

**Avantages.** — Puissamment activé par l'irradiation (on connaît la sensibilité particulière de l'argent à la lumière, utilisée jusqu'à ce jour, en photographie seulement), agit sans intolérance, en raison de la dose extrêmement réduite d'argent colloïdal.

### Dragées, comprimés solubles.

Puissant bactéricide spécifique des *Microbes de l'Intestin, Affections à Colibacilles.*

**Indications.** — Entérites, entéro-colites, diarrhées (notamment infantiles), fièvre typhoïde et affections para-typhiques, grippe infectieuse, cystites et pyélo-néphrites à colibacilles, syndrome entéro-rénal, métrites à colibacilles, etc.

**Doses.** — *Adultes* : 6 à 8 dragées (à avaler) ou comprimés solubles, avant le repas.

*Enfants et nourrissons* : 3 à 5 comprimés solubles, à dissoudre dans l'eau, et à prendre, par les nourrissons, avant les tétées.

**Formule** : Un centigr. argent colloïdal activé par dragée ou comprimé soluble.

**Prix** : La boîte de 50 dragées : 20 francs.

La boîte de 50 comprimés solubles : 18 francs.

### Ovules

Traitement des *Affections de la femme* : métrites, salpingites, vaginites, etc.

**Formule** : Cinq centigr. argent colloïdal irradié par ovule.

**Prix** : La boîte de 6 ovules : 22 francs.

### Laboratoires de l'UVARGOL

G. Martinie, Ph<sup>1<sup>er</sup></sup>, 62, avenue Philippe-Auguste  
PARIS (XI<sup>e</sup>).

Téléph. : Roquette 86-84. — R. C. : 440-107

**UVÉ****(Gouttes)**

**Composition.** — Solution aqueuse de Phosphate de chaux, Chlorures de manganèse, Magnésie et fer, acide phosphorique (11 centigr. par cc.) irradiés par rayons ultra-violets. **Ni Arsenic, ni Strychnine.**

**Mode d'action.** — Reminéralisent, reconstituent, désintoxiquent.

**Indications.** — Toutes les **ANOREXIES** (nourrissons, enfants, adultes) dont elles sont le véritable spécifique, Convalescences post-infectieuses, Asthénies, Surmenage, etc.

**Posologie.** — *Adultes* : XL à LX gouttes. *Enfants* : XX à XL gouttes, en une ou deux fois, dans un peu d'eau simple ou de préférence bicarbonatée. *Nourrissons* : I goutte par mois d'âge de 1 à 6 mois ; I goutte et demie de 6 à 12 mois, dans le lait des tétées.

**Prix** : Le flacon : 9 fr. 80 ; grand modèle : 18 fr.

**Laboratoires de L'UVÉ**

18, rue Saint-Amand — PARIS (XV<sup>e</sup>).

**UVÉOLINE**

Pommade antiseptique aux essences aromatiques, longuement irradiée par les Rayons Ultra-Violets.

**Indications.** — Pyodermites, Plaies atones, Ulcères variqueux, Furonculose.

**Mode d'action.** — Agit par les essences végétales, l'hydroxyde de magnésium, le peroxyde de zinc, le bismuth, le calomel.

**Mode d'emploi.** — En onctions ; en compresses imprégnées ; incorporée à la parafine dans les brûlures.

**Prix** du tube de 40 gr. : 10 francs.

**Laboratoire de l'UVÉOLINE**

**Pharmacie AMBARD**

CARCES (Var).

## UVÉPHORINE

Spécifique de toutes les carences de l'organisme.

**Composition.** — Association de l'Ergostérine irradiée ou Vitamine D à la Phytosphosphine (Inosito-hexaphosphate de chaux et de Magnésie).

**Propriétés.** — A pour buts bien définis : La fixation du calcium dans l'organisme, et l'apport de phosphore à un organisme qui s'en trouve insuffisamment pourvu. Possède un grand pouvoir reminéralisateur et reconstituant.

**Indications.** — Rachitisme, Déminéralisation, Faiblesse générale, Anémie, Surmenage, Croissance, Accidents de carie dentaire, Troubles de l'ossification, Grossesse, Allaitement.

**Doses.** — *Adultes* : 2 *cachets* par jour, aux repas ou 2 cuillerées à café de *granulé*.

*Enfants* : 1 à 2 *cachets* par jour ou 1 à 2 cuillerées à café de *granulé*.

Prix : Cachets (boîte de 24) : 15 fr. — Granulé : 16 fr. 50.

**Laboratoire E. HAUTDIDIER**

37, rue Galilée — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

---

## UVÉSTÉROL

Vitamine D + Facteur de croissance.  
**ERGOSTÉRINE** et **CHOLESTÉRINE**  
*Irradiées par rayons ultra-violets.*

### Composition :

Emulsion *non huileuse* contenant par cc. (XXV gouttes) : 1500 unités antirachitiques D ; Cholestérine, 15 mgr.

### Mode d'action :

Fixe chaux et phosphore, Active la croissance, Antitoxique, bactéricide, hémopoïétique.

### Avantages :

*Remplace intégralement l'huile de foie de morue*, parce qu'il unit à l'action exclusivement antirachitique de l'Ergostérine irradiée (Lesné, Clément, Simon) les activités de croissance, antitoxique et antianémique, de la Cholestérine.

II gouttes égalent 3 cuillerées à soupe d'huile de foie de morue.

Aucune toxicité, aucune contre-indication.  
*Parfaitement toléré même par les fébricitants.*

### Indications :

Croissances difficiles ou retardées, Lymphatisme, Prétuberculose.

Rachitisme, tétanie, décalcifications.

Toutes tuberculoses (osseuses, séreuses, ganglionnaires, pulmonaires).

### Conservation :

Garde intacte son activité, même au bout d'un an.  
 Les flacons portent une date limite d'utilisation.

### Posologie :

*Adultes* : XXX à LXXX gouttes. *Enfants* : X à XXX gouttes, soit pures, soit diluées dans une boisson lactée, une eau alcaline, du jus d'orange.

Chez le *nourrisson sain* (action préventive) : V gouttes.

Chez le *nourrisson rachitique* : X à XL gouttes.

**Prix** : Le flacon : 10 fr. 50 ; grand modèle : 18 fr. 50.

**Laboratoires de l'UVÉ**

18, rue Saint-Amand — PARIS (XV°).

# VACCIN ANTI-ASTHMATIQUE

du Professeur MINET

**Le traitement vaccinal de l'asthme et des affections pulmonaires présente sur les nombreuses médications utilisées jusqu'à ce jour l'avantage de s'adresser non pas à un symptôme, tel que la toux ou l'oppression, mais à une des causes les plus évidentes de l'entretien des affections, à savoir la pullulation microbienne à l'intérieur des voies respiratoires.**

**Indications.** — Asthme, Emphysème, Catarrhe. Infections secondaires de la Tuberculose pulmonaire.

**Mode d'emploi.** — L'injection doit être faite dans le tissu cellulaire sous-cutané ; le point d'élection est la région dorsale, vers la base du thorax. Chez l'adulte, on peut injecter sans inconvénient le contenu d'une ampoule de 1 cc. 1/2. Les injections doivent être répétées tous les deux jours. Entre la 5<sup>e</sup> et la 6<sup>e</sup> injection, il est recommandé d'interrompre durant 6 jours et de reprendre le traitement dans les mêmes conditions. Chez l'enfant, le vaccin est aussi bien supporté que chez l'adulte, à la dose de 1/4 de cc. entre 1 et 3 ans ; à 1/3 de cc. de 3 à 7 ans ; à 1/2 cc. de 7 à 12 ans.

La boîte de 10 ampoules : 35 francs (prix au public).

# VACCIN ANTI-PNEUMONIQUE

du Professeur MINET

« A la suite de l'injection de ce Vaccin, on assiste à une modification véritablement impressionnante du tableau classique de la pneumonie. »

**Indications.** — Pneumonie, broncho-pneumonie des enfants et des vieillards.

**Mode d'emploi.** — Le point d'élection est incontestablement la région sus-épineuse. Chez l'adulte, il faut injecter d'emblée le contenu d'une ampoule soit 1 cc. et répéter l'injection toutes les 24 heures. Dans les cas graves, la dose peut être portée dès le deuxième jour, à deux ampoules en une seule injection. Si le cœur et les reins sont déjà touchés par l'infection, il y a lieu de commencer à la dose de 1/2 cc. Chez l'enfant, il y a lieu de réduire la dose à 1/4 de cc. entre 1 à 3 ans ; 1/3 de cc. de 3 à 7 ans ; à 1/2 cc. de 7 à 12 ans.

La boîte de 5 ampoules. Prix au public : 35 francs.

# VACCIN ANTI-GRIPPAL

du Professeur MINET

Traitement de la grippe et de toutes les complications pulmonaires et suppuratives : otites, sinusites, etc., congestion grippale.

**Mode d'emploi.** — Voir « Vaccin Anti-Pneumonique ».

La boîte de 5 ampoules. Prix au public : 35 francs.

Laboratoires " STÈNE "

2, place des Vosges — PARIS.

## VACCIN DEMONCHY

### anti-gonococcique

Le vaccin Demonchy, grâce à sa richesse en corps microbiens (25 milliards de germes au cc.), donne d'excellents résultats non seulement dans les urétrites aiguës et subaiguës, mais aussi dans les complications de la blennorrhagie.

#### Présentation :

Ampoules de 1 cc.

#### Posologie :

Pratiquer une série de 8 à 10 injections de vaccin à doses progressivement croissantes (1/4 de cc., 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2 cc.) en s'abstenant rigoureusement de tout traitement local.

#### Technique des injections :

Les injections doivent être faites en plein tissu sous-cutané, entre la crête iliaque et les dernières côtes.

Les injections se font tous les deux jours. Pour éviter toute réaction du derme, ne pas utiliser pour l'injection l'aiguille qui a servi à prendre le vaccin dans l'ampoule. Lorsque la vaccination est effectuée en se conformant à cette technique, l'action du vaccin se manifeste par *une rapide amélioration et après la huitième injection, il suffit, pour obtenir la guérison, de quelques lavages.*

#### Société Générale

#### d'Applications Thérapeutiques

#### THERAPLIX

Pierre BRETEAU, Pharmacien

Membre de l'Académie de Médecine

157, rue de Sèvres — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## VACCIN DE WEILL ET DUFOUT

**Composition.** — Pneumocoques, Entérocoques, Staphylocoques, Tétragènes.

### Indications :

- 1<sup>o</sup> *Préventif* : Bronchites profondes ou épidémiques. — Broncho-pneumonies post-opératoires.  
2<sup>o</sup> *Curatif* : Broncho-pneumonies de l'enfant et de l'adulte. — Pneumonies.

**Avantages.** — Aucune contre-indication. — Aucune réaction.

### Posologie :

*Nourrissons* :  $\frac{1}{3}$  de cc. ; puis  $\frac{1}{2}$  cc. ;  
puis 1 cc. *Adultes* : 1 cc.

**Laboratoires ROBERT et CARRIERE**

37, rue de Bourgogne — PARIS.

---

# VACCINOTHÉRAPIE ATOXIQUE CÉPÈDE

Hyperleucocytose et phagocytose spécifique exaltée.  
Médication causale naturelle.

## Innocuité absolue.

Vaccin Ac. Sa (acné).....	Cépède.
Vaccin Bg. Pf. S. P. E. S. Ca (coqueluche et complications).....	Cépède.
Vaccin C. (colibacillaire).....	Cépède.
Vaccin C. E. (coli-entérococcique).....	Cépède.
Vaccin C. E. S. (diarrhée).....	Cépède.
Vaccin C. S. E. S. (entérite et entérocolite).....	Cépède.
Vaccin E. (entérococcie).....	Cépède.
Vaccin E. S.....	Cépède.
Vaccin E. Sa.....	Cépède.
Vaccin G. (gonococcie).....	Cépède.
Vaccin G. S. E. S. (blennorrhagie).....	Cépède.
Vaccin G. C. S. E. S. (affections blennorrhagiques de l'homme et de la femme).....	Cépède.
Vaccin G. C. S. E. S. Psd.....	Cépède.
Vaccin Mo (Morax) (conjonctivite aiguë).....	Cépède.
Vaccin Mo. Sa. (Morax-Staphylo) (conjonctivite mixte).....	Cépède.
Vaccin Mo. P. Sa. (Morax-Pneumo-Staphylo) (conjonctivite mixte).....	Cépède.
Vaccin P. E. S. (pneumonie).....	Cépède.
Vaccin Pb. S. P. E. S. Ca.....	Cépède.
Vaccin Pb. S. P. E. S. Ca. Py (Oûite).....	Cépède.
Vaccin Pf. S. P. E. S. Ca. (grippe et complications).....	Cépède.
Vaccin Pf. Pb. S. P. E. S. Ca. (Asthme).....	Cépède.
Vaccin S (érysipèle).....	Cépède.
Vaccin Sa (furoncles).....	Cépède.
Vaccin S. Sa (peau-ostéomyélite).....	Cépède.
Vaccin S. E. S (puerperalité).....	Cépède.
Vaccin S. P. E. S (100 millions).....	Cépède.
Vaccin S. P. E. S (400 millions).....	Cépède.
Vaccin S. P. E. S. Ca. (catarrhe).....	Cépède.
Vaccin S. P. E. S. Ca. 100.....	Cépède.
Vaccin S. P. E. S. Ca. Pz. (Ozène).....	Cépède.

Tous curovaccins atoxiques sur demande  
de MM. les médecins

La caractéristique de la méthode Cépède réside dans la suppression totale de la phase vaccinale négative. Dans les curovaccins Cépède ci-dessus (désignés par les initiales des microbes servant à leur préparation) les toxines microbiennes sont toujours éliminées ou anéanties. L'injection sous-cutanée n'entraîne aucune réaction ni aucun phénomène morbide général ou local surajouté.

La boîte de 10 ampoules : 30 francs au public.

## Institut de Biologie appliquée

57, 59, 60, rue Mathurin-Régnier et 47, rue Bague

PARIS (XV<sup>e</sup>) — Téléph. : Ségur 11-40

Adresse télégraphique : Ibacépède — PARIS

Dans toutes les pharmacies.

Adoptée par les Hôpitaux.



## **VACCINS**

### **(Bruschettini).**

2 vaccins sont préparés selon la méthode très originale et très personnelle du professeur BRUSCHETTINI, de Gênes, par les

**Laboratoires FOURNIER Frères.**

7, rue Biscornet — PARIS.

1<sup>o</sup> Un vaccin Antipyogène polymicrobien polyvalent s'appliquant à toutes les infections dues aux pyogènes communs. Son absence à peu près totale de réactions, tant générales que locales ou focales, en fait le type de vaccin d'urgence.

2<sup>o</sup> Un vaccin Antigonococcique avec ses applications spécifiques.

### **Posologie.**

Ces 2 vaccins s'emploient à une dose moyenne d'une ampoule par jour et il est particulièrement recommandé de répéter les injections dans les cas graves. Cette posologie leur est particulière.

Sur demande il est envoyé littératures et échantillons ainsi qu'une trousse de vaccinothérapie d'urgence : trousse métallique contenant seringue, aiguilles et ampoules.

**Laboratoires FOURNIER Frères**

7, rue Biscornet — PARIS.

## VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

Stock-vaccins constitués par des émulsions de cultures traitées par le fluorure de sodium, injectables par la voie sous-cutanée ou intramusculaire, sans réaction appréciable. Action polyvalente.

### Nomenclature et Indications :

*Néo-Dmègon* : Antigonococcique. (voir p. 656).

*Néo-Dmesta* : Antistaphylococcique.

*Néo-Dmètys* : Anticoquelucheux. (voir p. 656).

*Aplexil* : Complications grippales.

Société Parisienne d'Expansion Chimique  
« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône  
86, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## VACCINS BACTERIENS I. O. D.

(Procédés RANQUE et SENEZ)

### Prophylaxie — Vaccinothérapie.

**VACCIN** : Antityphoïdique.

- Antistaphylococcique.
- Polyvalents.
- Pneumo-streptococcique.
- Anticoquelucheux.
- Antigonococcique.
- Antistreptococcique.
- Anticolibacillaire.
- Antimélitococcique.

Injectables en injections sous-cutanées.

Vaccin-Pansements non injectables.

(polyvalent).

Dépositaires généraux :

**DEFFINS**, 40, faubourg Poissonnière — PARIS.

**LABORATOIRE de BIOLOGIE MÉDICALE**

16, rue Dragon — MARSEILLE.

**HAMELIN**, 16 ter, rue Burdeau — ALGER.

**AVIGNON et HAYAT**, 9, rue Malta-Srira — TUNIS.

*Pour littérature et échantillons :*

16, rue Dragon — MARSEILLE.

## VACCINS CLIN

### Composition :

Constitution à l'aide de souches sélectionnées et fréquemment renouvelées ; concentration élevée en microbes ; stérilisation au moyen du peroxyde d'hydrogène : stabilisation parfaite.

### Mode d'emploi :

Les Vaccins Clin sont présentés en ampoules titrées d'une capacité uniforme de 1 cc. C'est afin d'éviter la complication qu'entraîne la mesure de fractions petites et variables de centimètre cube, et aussi pour éviter les erreurs qui peuvent résulter d'une telle mesure, que les ampoules sont toutes de 1 cc. en suivant l'ordre des ampoules numérotées de 1 à 5 (la dilution maximale n° 5 étant répétée six fois).

Injectons sous-cutanées ou intramusculaires, toutes les 48 heures ou tous les trois jours.

- 1° Vaccin Clin antistaphylococcique.
- 2° Vaccin Clin antistreptococcique.
- 3° Vaccin Clin antigonococcique :
  - a) monomicrobien ; b) polymicrobien.
- 4° Coli-Entéro Vaccin Clin :
  - a) injectable ; b) buccal.
- 5° Vaccin Clin anticoquelucheux.
- 6° Pneumo-broncho Vaccin Clin.

**Laboratoires CLIN**  
**PARIS.**

# VACCINS POLYVALENTS

du Docteur RENARD

pour le traitement des Infections Oculaires.

**Composition.** — *Vaccin n° 1* : Staphylocoques, Streptocoques, Massues, Entérocoques, Gonocoques, Pneumocoques, Filtrat de B. Pyocyanique.

*Vaccin n° 2* : Même formule, mais sans Gonocoques.

**Indications.** — *Vaccin n° 1* : Conjonctivites purulentes graves.

*Vaccin n° 2* : Infections post-opératoires ou traumatiques, Infections palpébrales ou orbitaires.

**Posologie.** — *Nouveau-né* : 1/4 de cc. le premier jour.

*Adultes* : 1/3 de cc. le premier jour.

Les jours suivants, augmenter les doses suivant réaction.  
Consulter la notice.

**Laboratoires ROBERT et CARRIERE**

37, rue de Bourgogne — PARIS.

---

## VACCINS-RONCHÈSE AMPHO-VACCINS

Lysat bactérien, ou filtrat de cultures, et bactéries entières.

**Avantages.** — L'association lysat microbien et microbes entiers détermine *rapidement* la formation d'antitoxines et provoque des phénomènes de défense contre l'infection (agglutination puis neutralisation de l'élément infectant), aboutissant à l'état d'immunité. Par leur double composition, les Ampho-Vaccins constituent un perfectionnement remarquable de la vaccinothérapie.

### AMPHO-VACCINS INJECTABLES

Par cc. : lysat de 2 milliards de germes et 200 millions de germes entiers stérilisés et stabilisés.

**Anti-infectieux.** — *Staphylocoques, Streptocoques, Pneumocoques, Colibacilles, Entérocoques, Bacilles pyocyaniques.*

Toutes infections générales ou locales. Vaccin général des affections thermiques même avant le diagnostic précis.

**Antistaphylococcique.** — *Staphylocoques.*  
Furoncles, Anthrax, Ostéomyélites, Impétigo, Acné, Folliculites, Staphylococcémies.

**Intestinal.** — *Colibacilles, Entérocoques, Proteus, Bacillus bifidus, Bacilles pyocyaniques.*

Tous états intestinaux aigus ou chroniques.

**Pulmonaire.** — *Pneumocoques, Pneumobacilles, Streptocoques, Staphylocoques, Entérocoques, Micrococcus catarrhalis, Cocco-bacilles de Pfeiffer.*

Pneumonie, Broncho-pneumonie, Bronchites, Grippe, certains Asthmes, Sinusites, Otites, Conjonctivites.

**Urinaire.** — *Colibacilles, Entérocoques, Staphylocoques.*

Toutes infections de l'appareil urinaire.

**Posologie :**

<i>Adultes.</i>	{	1 <sup>re</sup> injection .....	1/4 de cc.
		2 <sup>e</sup> — .....	1/2 cc.
		3 <sup>e</sup> inject. et suiv...	1 cc.
<i>Enfants.</i>	{	1 <sup>re</sup> injection .....	1/8 de cc. (II gttes)
		2 <sup>e</sup> — .....	1/4 de cc.
		3 <sup>e</sup> inject. et suiv...	1/3 ou 1/2 cc. selon l'âge.

Injections journalières pour les doses d'essai, tous les 2 ou 3 jours pour les suivantes. Injections sous-cutanées ou intramusculaires. L'injection intra-veineuse est possible si elle est jugée nécessaire. Délivrés en boîtes de 6 ampoules de 1 cc. 5.

Prix : 25 francs.

**AMPHO-VACCINS A INGÉRER**

Par cc. : lysat de 1 milliard de germes et 1 milliard de germes entiers stérilisés et stabilisés.

**Anti-infectieux.** — *Staphylocoques, Streptocoques, Pneumocoques, Colibacilles, Entérocoques, Bacilles pyocyaniques.*

Toutes infections générales ou locales, Dermatoses, Vaccination pré- ou post-opératoire.

**Antistaphylococcique.** — *Staphylocoques.*

Furoncles, Anthrax, Ostéomyélites, Impétigo, Acné, Folliculites, Staphylococcémies.

**Antityphoïdique T. A. B.** — *Bacilles d'Eberth, Bacilles para A et B, Colibacilles, Entérocoques, Proteus, Bacilles pyocyaniques.*

Agent curatif remarquable des infections typhique et para-typhiques et, grâce à l'association microbienne étendue, des affections générales indéterminées d'origine intestinale.

**Intestinal.** — *Colibacilles, Entérocoques, Proteus, Bacillus bifidus, Bacilles pyocyaniques.*

Auto-intoxications d'origine intestinale, Entérites, Appendicites, Cholécystites, Syndrome entéro-rénal, certains Rhumatismes, Insuffisance hépatique, Préparation des malades avant les interventions abdominales, préparation aux Accouchements.

**Pulmonaire.** — *Pneumocoques, Pneumobacilles, Streptocoques, Staphylocoques, Entérocoques, Micrococcus catarrhalis, Cocco-bacilles de Pfeiffer, Bacilles pyocyaniques.*

Grippe, Bronchite, Pneumonie, Broncho-pneumonie, certains Asthmes, Sinusites, Otites, Conjonctivites.

**Urinaire.** — *Colibacilles, Entérocoques, Staphylocoques.*

Toutes infections de l'appareil urinaire.

### **AMPHO-VACCINS A INGÉRER**

#### **Posologie habituelle :**

*Adultes et adolescents :* 2 à 3 ampoules par jour, de préférence loin des repas.

*Enfants :* 1 à 2 ampoules par jour.

La posologie du *Vaccin intestinal* varie selon qu'il s'agit d'un cas aigu ou chronique ; elle est la suivante :

*Cas aigus :* 1 ampoule le matin à jeun, 1 le soir en se couchant, pour les *adultes* ; 1 ampoule par jour en 2 fois, pour les *enfants*.

*Cas chroniques et auto-intoxications :* Pour *adultes et enfants d'âge moyen* : 1 ampoule par jour le matin pendant 8 jours, puis 1 ampoule tous les 3 ou 4 jours.

#### **Présentation :**

L'Ampho-Vaccin à ingérer intestinal est délivré en boîtes de 8 ampoules de 5 cent. cubes.

Les autres Ampho-Vaccins à ingérer sont présentés en boîtes de 10 ampoules de 2 cent. cubes.

Prix : 25 francs.

### **AMPHO-VACCINS PANSEMENTS**

Filtrat de culture additionné par cent. cube de un milliard de germes entiers stérilisés et stabilisés.

**Antipyogène.** — *Staphylocoques, Streptocoques, Colibacilles, Entérocoques, Bacilles pyocyaniques.*

Furoncles, Anthrax, Abscesses, Dermatoses infectieuses, Interventions abdominales, Curettages, Cancers du col.

**Mode d'emploi.** — Mettre sur la plaie une compresse imbibée de vaccin. Un à deux pansements par jour. *Pour les cavités :* Imbiber une mèche de vaccin-pansement et l'introduire dans la cavité à traiter.

#### **Deux présentations :**

Ampoules de 10 cc. Prescrire : Ampho-Vaccin, pansement antipyogène.

Ampoules de 2 cc. Prescrire : Ampho-Vaccin antipyogène pour petits pansements.

**Rhino-pharyngien.** — *Pneumocoques, Pneumobacilles, Entérocoques, Streptocoques, Micrococcus catarrhalis, Cocco-bacilles de Pfeiffer, Staphylocoques.*

Affections du nez, du pharynx, des oreilles, de la mastoïde, de la conjonctive.

Traitement abortif du coryza. Rhino-prophylaxie de la grippe.

Présenté en ampoules qui se transforment en appareil d'instillation par l'adjonction de tétines livrées avec les ampoules.

**Posologie.** — 3 à 4 instillations par jour, ou encore des pulvérisations dans la journée, et 2 instillations, 1 le matin, 1 le soir.

Délivré en boîtes de 6 ampoules de 2 cent. cubes auto-instillables. Prix: 20 francs.

**Ampho-Tablettes** (Comprimés à base d'ampho-vaccin rhino-pharyngien). Voir page 38.

**Pyo-Amphogel** (Gelée molle à base d'Ampho-Vaccin pansement antipyogène). Voir page 833.

**Laboratoires des Ampho-Vaccins.**

A.-D. RONCHESE, Docteur en pharmacie,  
6, rue Rothschild — NICE.

---



## VACCINS " STÉNÉ "

**Vaccin antifuronculeux « Sténé ».** — Traitement de la furonculose et des affections à staphylocoques de la furonculose et des affections à staphylocoques.

(En injections sous-cutanées, ampoules de 1 cc. — en comprimés.)

La boîte de 5 ampoules. Prix public : 20 francs.

**Bouillon-vaccin antifuronculeux « Sténé »,** pour pansements.

La boîte de 5 ampoules. Prix public : 20 francs.

**Vaccin anti-coryza « Sténé » polyvalent.** — Traitement des Coryzas aigu et chronique, des pharyngites, angines, rhinites et de l'ozène.

Le tube. Prix public : 8 francs.

**Ovules-Vaccin « Sténé ».** — Métrites, Salpingo, ovarites, pertes blanches.

La boîte. Prix public : 18 francs.

**Vaccin « opératoire » Sténé.** — Préventif des complications infectieuses post-opératoires. En ampoules de 1 cc. pour injections sous-cutanées.

**Bouillon-Vaccin « opératoire » Sténé.** — Pour pansements.

**Vaccin antipyogène Sténé.** — Pour le traitement des plaies. Préventif et curatif de l'infection des plaies de toutes natures.

En ampoules de 1 cc. pour injections sous-cutanées.

En Bouillon-Vaccin pour pansements.

**Vaccin Antistaphylococcique « Sténé »**

**Bouillon-Vaccin Antistaphylococcique « Sténé ».**

En ampoules de 1 cc. pour injections sous-cutanées.

En bouillon-vaccin pour pansements.

**Laboratoires « STÉNÉ »**

2, place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>).

Téléph. : Archives 46-47. Adr. télégr. ; Sténé 21 Paris.

## VACLYDUN

Lysats vaccins du Dr Louis Duchon.

Adoptés par les hôpitaux de Paris.

Le Vaclydun est un vaccin d'un type entièrement nouveau. Il est obtenu par un procédé exclusivement biologique. Utilisation des propriétés du bacille pyocyanique qui lyse les germes, neutralise leurs toxines (en particulier, la toxine diphtérique), ce qui permet sa stérilisation par filtration sur bougie serrée. Il est donc un vaccin « vivant ».

### BRONCHO-VACLYDUN

**Composition.** — Lysat polyvalent (B. Diphtériques, Streptocoques, Pneumocoques, Staphylocoques, B. de Pfeiffer, M. Catarrhalis, Colibacilles).

**Indications.** — *Enfants, adultes, vieillards* : Grippe, Bronchites profondes, Congestions pulmonaires, Broncho-pneumonies (Rougeole, Coqueluche, Diphtérie), Vaccination pré-opératoire et Accidents pulmonaires post-opératoires, Suppurations pleuro-pulmonaires non fétides.

**Posologie.** — 1<sup>re</sup> Injection 1/2 de cc., les suivantes : 1 cc. tous les jours jusqu'à apyrexie, puis tous les deux jours.

Prix : 40 francs.

### GONO-VACLYDUN

**Composition.** — Lysat de Gonocoques (Souches sélectionnées).

**Indications.** — Urétrites, métrites. Complications de la blennorrhagie : Rhumatisme, Epididymite, Prostatite, etc...

Prix : 25 francs.

### STAPHYLO-VACLYDUN

**Composition.** — Lysat de Staphylocoques.

**Indications.** — Furonculose, Anthrax, Abscess et lymphangites du sein, Pleurésies purulentes à Staphylocoques, Staphylococcémies.

### STREPTO-VACLYDUN

**Composition.** — Lysat de Streptocoques hémolytiques.

**Indications.** — Erysipèle, Lymphangites, Pleurésies purulentes à streptocoques, grandes Infections à Streptocoques.

**PYO-VACLYDUN**

**Composition.** — Lysat de streptocoques et de staphylocoques.

**Indications.** — Suppurations : Phlegmons, abcès, panaris, adéno-phlegmons, Plaies infectées, Fractures ouvertes, Pyodermites du nourrisson : Pemphigus, etc...

**COLI-VACLYDUN**

2 Formes : Injectable, Buvable

**Composition.** — Lysat de Colibacilles (Souches variées).

**Indications.** — Pyélonéphrites, Colibacilloses.

**Posologie.** — *Coli injectable* (ampoules de 1 cc.)

1<sup>re</sup> injection : 3/4 de cc. Les suivantes : 1 cc. Tous les jours, puis tous les deux jours.

*Coli voie buccale (non injectable)* ampoules de 3 cc.

1<sup>er</sup> jour : 1/2 ampoule dans un demi-verre d'eau sucrée. 2<sup>e</sup> jour : 3/4 d'ampoule ; ensuite une ampoule par jour pendant 8 à 10 jours.

**VACCINATION LOCALE****Rhino-Vaclydun**

**Composition.** — Lysat des germes pathogènes du rhino-pharynx.

En application sur la muqueuse nasale et pharyngée détermine une immunité cellulaire locale.

**Indications.** — Coryza, rhino-pharyngites, adénoïdites, Angines, Prophylaxie des complications des maladies contagieuses (Grippe, Rougeole, Coqueluche, Diphtérie, etc.).

**Posologie.** — En instillations ou mieux en pulvérisations locales, 3 à 4 fois par jour. (Le Rhino-Vaclydun n'est pas injectable).

**VACLYDERM**

**Composition.** — Le Vaclyderm est le Pyo-Vaclydun incorporé à un corps gras.

**Indications.** — Réalise une vaccinothérapie cutanée locale. Toutes les Dermites, Furonculose, Anthrax, Impétigo, Folliculites, Erysipèle, etc.

**Mode d'emploi.** — En applications locales, 2 à 3 fois par jour. Peut être associé à la vaccination profonde.

**Laboratoires CORBIÈRE**

27, rue Desrenaudes — PARIS.

Téléph. : Carnot 78-11. — Télég. : Pantuto 74 Paris.

## VACUOLINE

### Traitement de la Constipation.

Deux formes présentant des propriétés différentes.

**Granulé-Laxatif** à effet rapide. Goût agréable. Huile de ricin dissimulée, magnésie et chocolat.

**Indications.** — Constipation aiguë et chronique.

**Adultes :** 1 à 3 cuill. à café. — **Enfants :** 1/2 ou 1/4 de doses.

**Émulsion.** — Huile de paraffine et mucilage d'algues marines. Crème délicieuse.

**Indications.** — Constipation, entérocologie, etc., excellente pour enfants et nourrissons, recommandée pendant la grossesse et l'allaitement.

**Adultes :** 1 cuill. à soupe matin et soir dans un liquide chaud ; **enfants et nourrissons :** 1/2 à 1 et 2 cuill. à café.

**Opo-Vacuoline.** — Traitement opothérapique composé, Sucres intestinaux associés à une émulsion de gélose, agar et paraffine. Goût agréable.

**Indications.** — Constipations chroniques ou aiguës. Insuffisance duodénale.

1 à 3 cuillerées à café au milieu des repas.

Prix de chaque flacon : 15 francs.

**Laboratoires DECHOSAL**

39, rue de la Gare — BONDY (Seine).

## VAGOSÉDYL

Sédatif du vague.

Dosage.

1 comprimé =	{	Phényléthylmalonylurée .....	} aa 0 gr. 017.
		Extrait de Jusquiame, titré en alcaloïdes.	
		Extrait de Valériane fraîche stabilisée...	
		Oxyde de zinc par voie humide.....	

Équivalence.

3 comprimés (pro die)	{	Pilules de Méglin.....	n° 1.
équivalent sensiblement à		Phényléthylmalonylurée..	0 gr. 05

**Posologie.** — Les doses varieront suivant les cas de 2 à 5 comprimés par jour à prendre au début des repas.

**Indications principales.** — Hypervagotonie, Spasmophilie, Algies et Spasmes viscéraux, Entéralgie, Gastronévroses, Aérophagie, Mal de Mer, Troubles réflexes des Ptoses, Malaises en rapport avec la menstruation, la grossesse, la ménopause, Symptômes subjectifs du cœur (Vrais et Faux Cardiaques), Hypertension par artério-spasme et ses conséquences, Toux nerveuses, Dyspnées spasmodiques, Asthme infantile. Angoisses, Nervosisme, Mélancolie anxieuse, Excitation psychique, Tremblements, Prurits, Incontinence d'urine, Troubles du sommeil.

**Laboratoires du VAGOSÉDYL.**

20, rue des Martyrs — PARIS (IX°).

**G. COUSSINET, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**

Ancien interne des Asiles de la Seine, Licencié ès sciences.

## VALBORNINE ROGIER

(Iso-Valérianate de Bornyle Bromé.)

**Perles.** — 3 à 6 par jour avant les repas ;  
ou, pour l'insomnie, 2 perles le soir, deux  
heures après un léger repas.

**Propriétés.** — Antispasmodique énergique  
et puissant sédatif du système nerveux,  
régulateur de la circulation et de la respi-  
ration.

**N. B.** — La Valbornine n'est pas un sopori-  
fique. Le sommeil n'est régularisé qu'au  
bout de quelques jours par sédation du  
système nerveux.

Le flacon : 10 fr.

**Henry ROGIER**

**Docteur en pharmacie.**

56, boulevard Péreire — PARIS.

## VALBROL

Essai de rajeunissement de la Formule de Meglin.

### Composition :

Extrait alcoolique de valériane <i>stabilisée</i> .....	0 04
Extrait alcoolique de jusquiame.....	0 01
Extrait alcoolique de passiflore.....	0 03
K Br .....	0 05
Extrait alcoolique de cratægus .....	0 03
pour une dragée de 0 gr. 16.	

40 dragées par étui — Prix en France : 12 fr.

**Propriétés :** Activité due à la valériane stabilisée et à l'association jus-  
quiame-passiflore, beaucoup moins toxique que la jusquiame employée  
seule, aux doses thérapeutiques (H. Leclerc). Le cratægus agit syner-  
giquement.

**Indications.** — Etats nerveux : angoisse, mélancolie, anxiété. Insom-  
nie, quelle qu'en soit l'origine : surmenage, éthyilisme, affections car-  
diaques ou vasculaires, digestives, génitales.

**Posologie :** Etats nerveux : 1 à 2 dragées par jour.

Insomnie : 1 à 3 dragées le soir au coucher.

A avaler sans croquer avec une boisson chaude.

**Laboratoires MAYOLY-SPINDLER**

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

A Bruxelles : LE MARINEL, pharmacien, 273, rue Victor-Rauter.

## VALEDYL

**Propriétés thérapeutiques.** — Traitement phytothérapique des névropathes, cardiopathes.

**Indications.** — Insomnies, vertiges, néurasthénie, états spasmodiques, états névropathiques troubles cardiaques.

**Formule.** — Extraits stabilisés de valériane, de Passiflore, de cratoegus, acide diacétylbarbiturique sodique, alcoolature de ballotte, teinture de jusquiame.

**Forme.** — Le Valedyl est présenté sous forme de liquide sirupeux sans aucune odeur.

**Mode d'emploi.** — En cas de troubles nerveux ou cardiaques, 1 cuillerée à café avant les 3 repas. En cas d'insomnie, 1 à 4 cuillerées à café le soir au coucher.

Prix du flacon au public : 16 francs.

**Laboratoire HOCQUETTE**

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine — PARIS.

Téléphone : Diderot 04-71.

## VALÉRAL PUY

Liquide ou capsules

Bromovalérianate sodique alcalin.

Alcoolat de cratœchus et passiflora frais.

Succédané plus actif des Valériانات et des Bromures, tolérance absolue, odeur, saveur agréables, action fidèle et soutenue, pas d'accoutumance ni dépression.

*Véritable spécifique des Névroses convulsives douloureuses spasmodiques, Phobies, Névralgies, Insomnies, Crampes, Vertiges.*

**Dose.** — Une cuillerée à soupe ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral. 2 à 3 cuillerées à soupe dans 1/4 de verre d'eau sucrée par jour, dont une le soir.

Envoi de littérature : **Laboratoire PUY**  
à GRENOBLE (Isère).

## **VALERIANATE GRIGNON**

**à odeur dissimulée.**

**Composition.** — Contient tous les principes actifs de la plante fraîche.

**Forme.** — Liquide de goût agréable, l'odeur de valériane étant absolument masquée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antinerveux, antispasmodique.

**Dose et mode d'emploi.** — 2 à 3 cuillerées à café par jour.

**Pharmacie GRIGNON**

2, rue Duphot — PARIS.

---

**VALÉRIANATE PIERLOT**

Liquide ou en capsules.

**RÊTE TOUJOURS ET MALGRÉ  
TOUT**

l'unique préparation efficace et inoffensive, résumant tous les principes sédatifs et névrosthéniques de la valériane officinale.

Neurotrope, actif, sédatif, inoffensif, il rétablit toujours l'équilibre du système nerveux en supprimant l'excitabilité morbide des neurones.

**Posologie :**

1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée ou non, le soir avant de se coucher et le matin à jeun.

---

**H. RIVIER**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

26 et 28, rue Saint-Claude — PARIS.



## VALÉRIANE BYLA

(Sédatif régulateur du système nerveux.)

Renferme tout le suc inaltérable de la *plante fraîche et vivante*, stabilisé et concentré. Ne contient ni acide valérianique libre, ni ammoniacque combinée.

**Propriétés thérapeutiques.** — Stimulant des centres nerveux supérieurs affaiblis, dépresseur de l'excitabilité réflexe exagérée. Anti-épileptique, antispasmodique, analgésique, hypnotique.

**Indications.** — Névroses, hystéries, épilepsie, insomnies nerveuses, névralgies, neurasthénie, troubles de la ménopause, convulsions des enfants, palpitations, tachycardie, etc.

**Mode d'emploi.** — 3 cuillerées à café par jour.

**Les Établissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

## VALÉRIANE GMET

**Composition.** — Extrait total obtenu exclusivement à l'aide de racines de valériane sans adjonction d'acide valérianique ou d'autres produits de synthèse.

**Propriétés.** — Puissant toni-sédatif du système nerveux central et périphérique.

Odeur conservée (indice de son activité) mais *goût peu prononcé*. Bien acceptée par les femmes et les enfants.

**Indications.** — Tous les états d'excitation et de dépression nerveuse. Névrose, Insomnie, Épilepsie. Chorée, Nervosisme, Convulsions, Terreurs nocturnes, Cauchemars. Dans la neurasthénie, lui adjoindre le *Composé Gmet*. (Voir page 244).

**Posologie.** — 1 à 2 cuillerées à café avant les repas.

**Laboratoire GMET**

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX<sup>e</sup>).

## VALÉRIANE PACHAUT

Préparation liquide contenant les principes actifs de la valériane fraîche sans addition d'aucun hypnotique ou stupéfiant.

**Indications.** — Névroses, états spasmodiques, insomnies.

**Posologie.** — 1 à 4 cuillerées à café par jour.

La Valériane liquide PACHAUT est inodore et d'une saveur agréable.

**Laboratoires PACHAUT**  
130, Bd Haussmann — PARIS.

---

## VALÉRIANOSE GIGON

**Composition.** — Extrait de valériane fraîche stabilisée et pepsine.

**Forme.** — Pilules glutinisées.

**Indications thérapeutiques.** — Sédatif du système nerveux, Antispasmodique, Anti-névralgique.

**Mode d'emploi et doses.** — 4 à 6 pilules par jour. Solubilité dans l'intestin.

## PEPTO-VALÉRIANE

Solution sans odeur d'extrait de valériane fraîche stabilisée et pepsine.

De 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures.

**Laboratoire des Produits du Dr GIGON**

**A. FABRE, pharmacien**  
25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## VALÉRINODOR MALMANCHE

**Composition.** — Préparation liquide sirupeuse contenant par cuillerée à café : 0 gr. 05 d'extrait sec de Valériane stabilisée, 0 gr. 50 d'extrait fluide de *Passiflora incarnata*, 0 gr. 15 de Véronal sodique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Puissant sédatif du système nerveux central. Tolérance parfaite. Sommeil calme sans nausées au réveil.

**Indications.** — Insomnies, Palpitations, Spasmes musculaires, Excitation psychique, Angoisse, Chorée, Convulsions, Toux nerveuse.

**Posologie.** — 2 à 3 cuillerées à café par jour, pur ou dans une infusion de tilleul.

Prix au public : 14 francs.

**Laboratoire MALMANCHE**  
Pharmacien, Docteur ès sciences,  
101, avenue de Paris,  
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

## VALÉRIUM PAUL THIBAUT

Dragées de *Valérianate de Cérium*, sans odeur, de P. Thibault, licencié ès sciences physiques, ancien président de la Société de pharmacie de Paris. Le meilleur sédatif régulateur du système nerveux. Action particulièrement élective sur le grand sympathique.

**Indications.** — Troubles gastriques d'origine névropathique, Dyspepsies nerveuses, Vomissements chroniques, Vomissements incoercibles de la Grossesse, Insomnies, Névralgies, Neurasthénie, Mal de Mer, Hoquet.


**Posologie.** — Prescrire 2 dragées le matin et 2 dragées dans le milieu de la journée. Dans les affections chroniques, prescrire, si possible, 2 dragées 2 à 3 heures avant les troubles. Continuer le traitement 10 à 12 jours. Cesser 2 à 3 jours et reprendre.

Les dragées de Valérium P. Thibault sont dosées à 0,05 de principe actif.

**Laboratoire R. J. SOUDAN**  
Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.  
Ex-Interne des Hôpitaux de Paris.  
6, rue Rosenwald — PARIS (XV°).

## VALÉROBROMINE LEGRAND

**Composition.** — Éthers-Sels de l'Acide  $\alpha$  Bromovalérianique



**Avantages.** — La VALÉROBROMINE LEGRAND (*brome organique*) offre, par rapport aux bromures (*brome minéral*), des avantages de même ordre que les Cacodylates et les Glycérophosphates (*arsenic et phosphore organiques*), par rapport aux arseniates et aux phosphates (*arsenic et phosphore minéraux*). Elle possède, contrairement au valérianate d'ammoniaque, une régularité d'action constante, et sa toxicité, quatre fois moindre que celle de ce produit, est nulle aux doses usitées. Effets plus nets et plus durables que les bromures et les valérianates, sans avoir à redouter, quelles que soient la durée du traitement et les doses employées, les inconvénients trop connus de ces produits.

**Indications.** — Toutes les névroses : Épilepsie, Insomnies nerveuses, Hystérie, Migraines, Vertiges, Coqueluche, Neurasthénie, Troubles mentaux de la ménopause, etc.

**Formes.** — *Liquide* : 0,50 de bromovalérianate de soude par cuillerée à café. 2 à 6 cuillerées à café par jour. — *Capsules* : 0,25 de bromovalérianate de magnésie par capsule enrobée de gluten, *ne se dissolvant que dans l'intestin*. 4 à 12 capsules par jour. — *Dragées* : 0,125 de bromovalérianate de Galacol. 8 à 24 dragées par jour. Très recommandées contre la toux et l'insomnie des tuberculeux.

DARRASSE

13, rue Pavée — PARIS (IV<sup>e</sup>).

## VALÉROMENTHOL

Préparation à base de *suc frais de valériane*  
combiné à l'éther mentholique  
de l'acide valérianique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Tous les avantages des bromures sans aucun de leurs inconvénients. Calmant par excellence. Antispasmodique sûr. Antidote de la douleur, des troubles nerveux et des états pathologiques de la neurasthénie.

**Indications thérapeutiques.** — Neurasthénie, Hystérie, Insomnie, toutes affections nerveuses.

**Mode d'emploi.** — 3 à 5 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau ou d'infusion.

Prix au public : 14 francs.

Laboratoire du VALÉROMENTHOL

10, rue Poncelet — PARIS

Tél. : Wagram 37-58.

## VALÉRONAL

Solution ou comprimés.

Sédatif puissant et inoffensif  
des troubles nerveux, Psychopathies.

Hypnotique doux sans odeur.

Antispasmodique.

Par cuillerée à café ou par comprimé.

Véronal sodique très pur..... 0 gr. 15

Extrait physiologique de Valériane fraîche  
par plasmolyse ..... 5 cc.

**Dose sédatif.** — 1 cuillerée à café ou 1 comprimé  
2 à 3 fois par jour.

**Dose hypnotique.** — 1 cuillerée à café ou 1 comprimé  
avant le dernier repas et 2 ou 3 au coucher  
dans infusion.

Pas de contre-indication.

Prix : Solution : 16 francs.

Comprimés : 13 francs.

**Laboratoire BERGER**

14, rue des Pyramides — PARIS.

## VALTHÈNE

(Gouttes)

Antispasmodique puissant.

**Indications.** — Toux laryngées, coqueluche, asthme,  
toux rebelles des tuberculeux.

**Composition.** — Macération alcoolique prolongée  
de drosera, cochenille et plantes fraîches.

*Ne contient aucun toxique. Goût agréable.*

**Posologie.** — *Doses moyennes* à prendre dans une  
petite quantité d'eau sucrée et à répéter 4 à 5 fois  
par jour.

Enfants au-dessous d'un an...	V à X gouttes.
— de 1 an à 5 ans .....	X à XX —
— au dessus de 5 ans....	XX à LX —

Adultes .....	L à LX —
---------------	----------

Flacon de 30 cc. Prix : 11 fr. 50 (exempt d'impôt).

**Laboratoire de la VALTHÈNE**

A. VALAT

51, rue de Tourtille — PARIS (XX<sup>e</sup>).

# VANADARSINE GUILLAUMIN

## GOUTTES

**Composition.** — Solution d'arséniate de Vanadium au centième.

**Propriétés.** — Puissant stimulant de l'appétit, sans aucune action néfaste sur l'estomac et les intestins. Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces. Sous son influence le teint redevient frais.

**Indications.** — S'emploie avec succès dans la pré-tuberculose et la tuberculose, la chorée, le rachitisme des enfants, les états anémiques, chlorotiques, dans la neurasthénie, les dépressions nerveuses, le surmenage, le paludisme, les leucémies et les convalescences.

**Mode d'emploi.** — La *Vanadarsine* s'administre aux mêmes doses que la liqueur de Fowler : dose moyenne, X gouttes dans un peu d'eau avant les 2 principaux repas.

Prix ; 12 francs.

# VANADARSINE GUILLAUMIN

## AMPOULES

(Sérum Vanadarsiné).

**Composition.** — Ampoules contenant 0 gr. 002 arséniate de vanadium par cent. cube..

**Propriétés.** — Solution très stable, indolore, parfaitement tolérée en injections hypodermiques. Reconstituant globulaire sanguin de premier ordre, oxydant énergique, excite l'appétit, augmente le poids et les forces et stimule les combustions organiques.

**Indications.** — Chlorose, anémie, pré-tuberculose, tuberculose, chorée, rachitisme, paludisme, syphilis, asthénie, leucémies, neurasthénie, surmenage, convalescence, anorexie.

**Mode d'emploi.** — *Adultes* : Injecter 1 à 3 cent. cubes par jour ou tous les deux jours.

*Enfants* : Injecter selon l'âge.

Faire une vingtaine d'injections. Après 8 à 10 jours de repos recommencer le traitement si nécessaire.

Se prescrit en ampoules de 1 cc. (prix 15 fr.), et de 3 cc. (dose forte) (prix 20 fr.).

**Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN**

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

## VANADINE CHEVRIER

**Composition :**

Solution d'acide vanadique chloratée.

**Propriétés :**

Stimulant de l'appétit.

**Indications.**

S'emploie dans la prétuberculose, la tuberculose, l'anémie, la neurasthénie, et les affections de l'estomac.

**Mode d'emploi :**

VI à X gouttes dans une cuillerée d'eau, avant le repas.

**Docteur G. CHEVRIER**

21, faubourg Montmartre — PARIS.

---

## VANUCLÉOL

**Composition.** — Nucléophosphate de Vanadium strychnarsiné.

**Formes pharmaceutiques.** — 1° Ampoules ; 2° Gouttes.

**Indications.** — Oxydant par le Vanadium, leucosthénique par les nucléines, le **VANUCLÉOL** s'emploie dans les cas d'Asthénies, Surmenage, Tuberculose et Prétuberculose, Anémie, etc...

**Mode d'emploi.** — Trois séries de douze injections journalières, séparées par un repos de 8 jours.

*Gouttes : XX gouttes à chaque repas.*

*Echantillon et littérature sur demande.*

**Laboratoires LACROIX**

MEROBIAN et FILS, successeurs.

37, rue Pajol — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

## VARILAXINE

Groupe cinq laxatifs différents : Rhubarbe, Cascara, Podophyllin, Rhamnus, Tamarin, mais d'action équivalente.

Chaque boîte renferme 5 tubes, numérotés de 1 à 5.

**Doses et mode d'emploi.** — Avaler, sans les croquer, deux Comprimés avant le repas du soir, en alternant du n° 1 au n° 5, pour reprendre au n° 1 le sixième jour, et continuer la variation.

**Propriétés thérapeutiques.** — Action laxative toujours identique. — Jamais d'accoutumance ni d'irritation. — Tolérance parfaite. — Innocuité absolue.

Prix : 10 francs la boîte.

**Laboratoire de la VARILAXINE**  
164, rue Saint-Honoré — PARIS.

---

## VARISCLÉRINE

(Ampoules)

**préparées selon les indications du**  
**Professeur Sicard**

Injections sclérosantes intravariqueuses,  
sans accidents, sans succès.

**Varisclérine A :** Salycyl de soude.

**Varisclérine B :** Quinine.

Prix de la boîte de 12 : 30 fr.

Prix spéciaux au corps médical.

**Laboratoire Angelini**  
61, rue de Seine — PARIS.  
Tél. : Littré 47-76.



## VASCUROL

(dragées)

Traitement de l'hypertension et des troubles de la ménopause.

**Composition.** — Gui, cratægus, formine iodée, scille, pyrole, extraits laxatifs et opothérapiques.

**Indications.** — Hypertension, Presclérose et Artério-sclérose. Troubles de la ménopause. Varices. Hémorroïdes. Obésité.

**Mode d'emploi.** — 2 dragées au début de chacun des deux principaux repas

**Laboratoire P. GUÉRIN**

MEULAN (Seine-et-Oise).

---

## VASOLAXINE

Huile de vaseline pure.

**Dose :**

*Adultes :* 1 cuillerée à soupe en se levant à jeun et le soir en se couchant.

*Enfants :* 1 cuillerée à café.

Aromatiser, si jugé nécessaire, avec menthe, citron, cognac, etc.

**Indications :**

Constipation, Entérites, Appendicites chroniques, Hémorroïdes.

Le flacon : 12 francs.

**Laboratoires FOURNIER Frères**

7, rue Biscornet — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## VASO-NEURINE

Extrait de Jaborandi et Chlorure de magnésium.

**Forme.** — Gouttes.

### Indications thérapeutiques.

*Troubles circulatoires :* Migraines, Congestions broncho-pulmonaires, Hémoptysies, Vertiges, Bourdonnements d'oreilles.

*Troubles glandulaires :* Congestions thyroïdienne, ovarienne, pancréatique ; Troubles sécrétoires, salivaires et cutanés.

*Troubles sensitivo-moteurs :* Arythmie, Tachycardie, Névralgisme facial, Névro-dermites.

**Mode d'emploi.** — VIII à XV gouttes, 2 à 3 fois par jour dans un peu d'eau, en commençant par la dose la plus faible.

Après les repas, matin, midi et soir.

**Prix de vente au public :** 16 francs le flacon.

**Laboratoire de Pathologie Générale de Paris**  
5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Tél. : Auteuil 35-25.

---

## VÉGANINE

Le médicament à action renforcée.

**Analgésique — Antipyrétique — Antigrippe.**

Comprimés d'un procédé de fabrication nouveau, assurant une désagrégation immédiate.

### Composition :

Phosphate de Codéïne ...	0 gr. 01	} par comprimé.
Acide acétylsalicylique ..	0 gr. 25	
Phénacétine.....	0 gr. 25	

### Action thérapeutique et indications :

La Véganine, composée d'après la théorie de l'association médicamenteuse, possède tous les avantages de chacun de ses composants, sans en avoir les inconvénients isolés :

Sédatif puissant par la Codéïne.

Analgésique par l'acide acétylsalicylique.

Analgésique et antithermique par la Phénacétine

Elle constitue un excellent agent thérapeutique à utiliser dans les maladies par refroidissement, courbatures fébriles, grippe et sa toux réflexe, rhumatismes, névralgies, céphalées, douleurs dentaires, également utile en neurologie (états anxieux).

Sa double action, synergique d'activité et diminutive de toxicité, permettra d'atteindre le résultat recherché avec des doses faibles et sans phénomène d'intolérance.

### Doses et Mode d'Emploi :

1 à 6 comprimés par 24 heures, à prendre de préférence avec café ou thé.

### Deux Modèles :

Le tube de 10 comprimés : 6 francs.

Le tube de 20 comprimés : 10 francs.

Prière d'adresser toutes demandes de renseignements et d'échantillons aux :

**Laboratoires SUBSTANTIA S. A.**

**F. Guillemoteau, pharmacien**

13, rue Pagès — SURESNES.

## VÉGÉPHOS

**Composition.** — Phosphore organique, *extrait de l'embryon de blé.*

**Propriétés.** — Récalcifiant supérieur aux phosphates de chaux, directement assimilable. Agent phosphoré, contribue à la formation du squelette, du noyau cellulaire, de la substance nerveuse.

**Indications.** — Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Tuberculose, Rachitisme, Déminéralisation.

Utile dans : convalescence, grossesse, allaitement.

**Formes.** — Cachets à 0,60 : boîtes de 20. — Granulé à 12 p. 100. — Poudre.

**Mode d'emploi.** — 1 ou 2 cachets par jour ; 1 à 2 cuillerées à café de granulé par jour ; dose moyenne, poudre 0 gr. 60 à 1 gr. 20 en une ou deux fois.

Cachets : au public : 11 fr.

Granulé : — : 13 fr.

**Pharmacie Centrale de France**

21, rue de Nonnains-d'Hyères — Paris (IV<sup>e</sup>).

## VÉGÉTOL EXTERNE

Médication micro-balsamique.

Spécifique des infections locales de la peau et des muqueuses.

**Composition.** — Complexe liquide renfermant les constituants de plusieurs essences (thym, aspic, citronnelle etc.) et les produits de réaction de l'acide picrique sur ces constituants.

**Propriétés.** — Produit non toxique, microbicide, décongestionnant, analgésique et cicatrisant, grâce à l'action de l'acide picrique, des essences et de leurs dérivés.

**Indications.** — Plaies, furoncles, anthrax, panaris. Affections des yeux, du nez, de la gorge, des oreilles. Maladies gynécologiques (en injections). Maladies des voies urinaires en injections et en instillations.

**Laboratoire du Végétol**

8, rue des Quatre-Fils — PARIS.

Téléphone : Archives 65-65.

## VEGUVA

**Composition.** — Aliment hydrocarboné riche en vitamines A, B, C, renferme, à l'état de poudre impalpable, la totalité des substances azotées, des sels minéraux et de la cellulose des épinards, carottes et tomates.

**Forme.** — Poudre.

**Indications.** — *Nourrissons* : anorexie, arrêt de croissance, troubles du développement, troubles nutritifs aigus et chroniques, alimentation de transition pour passer du régime lacté au régime mixte.

*Adultes* : Régime achloruré, alcalose.

**Doses.** — *Nourrissons* : une mesure.

*Adultes* : deux à trois mesures à répéter plusieurs fois dans la journée.

Délayer le Veguva à l'aide d'un liquide bouilli et refroidi (lait, eau, bouillon), puis l'incorporer à l'alimentation déjà prête.

Ne pas faire cuire.

**Laboratoires WANDER**  
CHAMPIGNY-SUR-MARNE.

## VEINHORMONES LOGEAIS

**Composition.** — *Veinhormones* est une association de tous les principes actifs dont les noms sont énumérés ci-dessous :

Hamamélis, *Æsculus hippocastanum*, *Genista Scoparia*, *Cupressus sempervirens*.

**Indications.** — Varices. Ulcères variqueux. Phlébites. Hémorragies. Dysménorrhée. Troubles congestifs de la puberté et de la ménopause. Traitement interne des hémorroïdes (Voir aussi *Suppositoires* et *Pommade Logeais*).

**Propriétés.** — Sédatif puissant des douleurs hémorroïdales, régularise la circulation du sang. C'est un vaso-constricteur des capillaires ; son action est élective sur les veines.

**Mode d'emploi.** — De X à XXX gouttes dans un peu d'eau, avant les trois principaux repas, suivant les indications du médecin.

**Prix au public** : le flacon : 13 fr. Franco : 14 francs.

**Laboratoires Emile LOGEAIS**  
24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE.  
Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.

## VEINOPOSINE

Régénérateur du système artério-veineux.

**Composition.** — Surrénales, Hypophyse, Ovotest, Thyroïde, Extrait d'Hamamélis, Cratœgeus, Cœsculus, Viburnum, Valériane.

**Indications.** — Congestion sanguine sous toutes formes, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Vapeurs, Migraines, Troubles ovariens de la Puberté et de la Ménopause.

**Formes.** — Pilules et gouttes.

### Dose :

*Pilules* : 4 à 6 par jour aux repas.

*Gouttes* : X à XXX deux fois par jour aux principaux repas.

Prix : *Pilules et gouttes* : 12 francs.

**Laboratoire Moderne  
d'Opothérapie et Biologie Médicale**  
40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE.

## VEINOSÉRUM

**Indications.** — Retour d'âge, Varices, Phlébites, Œdèmes, Hémorroïdes, et tous états congestifs.

1° *Forme gouttes* : Formule très active à base d'extraits de plantes *stabilisées* par procédé spécial (capsicum, gui, marron d'Inde, hamamélis, rhamnées).

Doses : XX gouttes matin et soir, 15 jours par mois. — 15 fr.

2° *Forme liqueur*, à base de citrates alcalins, urotropine et extraits de rhamnées.

Doses : 1 cuill. à soupe matin et soir, 15 jours par mois. — 12 fr.

**Laboratoires ABADIE-TANZI,**  
3, Place Intérieure Saint-Michel  
TOULOUSE.

## VEINOSINE

Traitement spécifique complet des affections veineuses.

Comprimés à base de : Hamamélis virginica, Marrons d'Inde, Citrate de soude, Glandes thyroïde et hypophyse.

**Indications.** — Hyposphyxie, Phlébites aiguës et chroniques, Insuffisance valvulaire de la saphène, Varices, Varices de la grossesse, Pseudo-varices par troubles des glandes à sécrétions internes, Hémorroïdes, Troubles de la vie génitale chez la femme, Puberté, Ménopause.

**Doses.** — Trois comprimés avant les repas de midi et du soir.

**Laboratoires LEBEAULT**

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## VEINOTROPE

**Propriétés thérapeutiques.** — Traitement des troubles veineux.

**Indications.** — Varices. Varicosités, Hémorroïdes, Ulcères variqueux, Troubles de la Ménopause et de la Puberté.

### Composition.

#### A. — *Veinotrope. M.*

(Usage masculin, comprimés roses).

Para-thyroïde.....	1 milligr.
Orchitine.....	35 —
Surrénale .....	5 —
Pancréas .....	10 centigr.
Hypophyse .....	1 milligr.
Noix vomique.....	5 —
Extrait Hamamélis, Marron d'Inde.	15 milligr.

#### B. — *Veinotrope. F.*

(Usage féminin, comprimés violets.)

Para-thyroïde.....	1 milligr.
Ovarine .....	35 —
Surrénale .....	5 —
Pancréas .....	10 centigr.
Hypophyse .....	1 milligr.
Noix vomique.....	5 —
Extrait Hamamélis, Marron d'Inde.	15 milligr.

**Mode d'emploi.** — 2 comprimés 1 heure avant les principaux repas. 3 semaines de traitement, 1 semaine de repos.

**Formule F :** interrompre pendant la période menstruelle.

Prix de vente au public : 15 francs.

## VEINOTROPE POUDRE

Ulcères variqueux et plaies en général.

Extrait embryonnaire.....	1 gr.
Protéoses hypotensives du Pan-	
créas.....	3 gr.
Calomel.....	4 gr.
Talc stérile q. s. pour.....	100 gr.

Poudrer, après lavage au sérum physiologique et recouvrir de gaze stérile.

Prix de vente au public : 20 francs.

**Laboratoires LOBIOA**

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).



## VÉNECINE

### Composition :

Préparée par un procédé physico-chimique breveté, présente sous forme d'eau, à l'état de complexe colloïdal stable, et de solution, les éléments essentiels nécessaires à la cellule vivante : calcium, sodium, potassium, fer, silice, strontium, chlore, carbone, soufre.

### Propriétés :

La Vénecine est la seule préparation stable contenant du soufre assimilable et fixable par la cellule vivante. Grâce à cette propriété et à sa charge électrique élevée, elle active les échanges et favorise l'activité humorale et tissulaire. C'est un excitant de la croissance et des glandes endocrines.

### Indications :

Chez l'enfant et l'adolescent : arrêt et retard du développement, maladies par carence, anémie, troubles endocriniens.

Chez l'adulte : troubles de la nutrition, rhumatisme chronique, goutte, certaines dermatoses, troubles endocriniens, arthritisme, asthénie, neurasthénie, maladie de Basedow.

Chez le vieillard : artériosclérose, sénilité.

### Présentation :

Forme liquide concentrée en flacons de 200 cc.  
En ampoules injectables de 10 centimètres cubes.

### Posologie :

Forme liquide concentrée : 2 cuillerées à café dans un verre à bordeaux d'eau ordinaire trois fois par jour à distance des repas.

Ampoules : tous les deux jours une injection intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée.

Continuer le traitement pendant deux ou trois semaines.

### Prix :

1 flacon de Vénecine concentrée...	14 fr.
1 boîte de 10 ampoules.....	20 —
1 boîte de 5 ampoules.....	12 —

**Compagnie Française de la VÉNECINE**

7, rue des Italiens — PARIS.

## VÉRALGINE

*Spécifique contre l'élément douleur.*

*Sédatif et analgésique à action ultra-rapide et prolongée.*

Association moléculaire d'analgésiques vrais (Phénétine, Amidopyrine) à action élective sur les centres corticaux de la douleur avec le Sonéryl dérivé barbiturique, étudié par MM. les Professeurs Carnot et Tiffeneau, agissant sur les pseudo-centres de Sherington. Cette association renforce et, selon l'expression de Burgi, potentialise l'action curative de chaque constituant, procurant ainsi une rapidité et une durée d'action remarquables avec des doses très faibles et sans aucune intolérance ni réaction cutanée.

**Indications.** — Toutes douleurs, Céphalées, Névralgies, Coliques néphrétiques ou hépatiques, Goutte, Névrites, Rhumatismes, Zona, Sciatique, Migraines des hypertendus, Dysménorrhées, etc., et en art dentaire : Périostite, Pulpite, Interventions, Extractions, Fraises, etc...

Les comprimés portent un trait de division permettant de fractionner les doses.

**Posologie.** — Adultes 1 à 2 comprimés ou cachets.

Enfants 1/4 ou 1/2 comprimé.

Ces doses peuvent être répétées 2 à 3 fois par 24 heures.

Comprimés : 7 francs. Cachets : 6 francs.

Laboratoire du **MAINGUY**

**M. BASSIN**, Docteur en pharmacie - **BONDY** (Seine).

*Échantillons sur demande.*

## VÉRIANE BURIAT

**Composition.** — Préparation liquide contenant par cuillerée à café : 0 gr. 12 amide barbiturique diéthyle et 1 gr. Valériane fraîche et **INODORE**.

**Indications.** — Hypnotique fidèle, inodore et sédatif du système nerveux central parfaitement toléré par les estomacs délicats. Sommeil calme, réveil normal.

**Posologie.** — Comme sédatif : 2 à 5 cuillerées à café espacées dans les 24 heures.

Comme hypnotique : 2 à 5 cuillerées à café 3 heures avant le moment du sommeil, dans une infusion ou eau sucrée.

Prix : 14 fr.

Laboratoire **BURIAT**

25, rue Copernic — **PARIS** (XVI<sup>e</sup>).

## VERMIFUGE CORNET

**Composition.** — Macération dans un liquide hydro-alcoolique de plantes anthelminthiques (semen-contra, mousse de corse, fougère mâle, etc.) de produits médicamenteux et d'huiles essentielles.

**Forme.** — Liquide, de conservation indéfinie.

**Indications thérapeutiques.** — Destruction de tous les vers intestinaux (ascarides, oxyures, trichocéphales).

### Doses et mode d'emploi :

Jusqu'à 1 an .....	1/2 cuillère à café.
De 1 à 8 ans.....	1 — —
De 8 à 15 ans.....	2 — —
Adultes .....	1 à soupe.

Le matin à jeun dans un peu d'eau sucrée, ces doses doivent être données régulièrement tous les huit jours.

**Laboratoires SERRE,**  
7, place Pey-Berland — BORDEAUX.

## VERMIFUGES SORIN

Elixir Vermifuge, Sédatif, Anticonvulsif de Ch. Sorin.

### Composition :

Santoninate de soude.....	0 gr. 05
Bromure de sodium.....	0 gr. 10
Éther sulfurique .....	0 gr. 01
Teinture de safran .....	0 gr. 01
Alcoolat vulnérable.....	1 gr. 50
Sirop aromatisé.....	3 gr. 50
Pour une cuillerée à café.	

Médicament spécifique contre les vers et les convulsions des enfants, par sa teneur élevée en santoninate de soude, plus efficace que la santonine et 100 fois moins toxique.

**Mode d'emploi.** — *Préventif* : le matin au réveil.

*Curatif* : au moment des crises : 1/2 cuillerée à café jusqu'à 1 an, 1 cuillerée à café de 1 an à 4 ans, 2 cuillerées à café de 4 à 10 ans.

Prix : 8 francs le flacon.

### Oxytoires CH. SORIN

Suppositoires spécifiques contre les Oxyurés vermiculaires.

**Composition** : Artemisine, Thymol, beurre de cacao. 1 oxytoire dans l'anus le soir au coucher.

Prix : 9 francs la boîte enfants ou adultes.

**Laboratoires des VERMIFUGES SORIN**  
BLAIN (Loire-Inférieure).

## VERMIRÈNE AUDIBERT

Macération de semen-contrà d'Alep de *choenopodium anthelmenthicum* et de *pyrethrum anthemis*, présentée sous forme de sirop de fraise aromatisé à la vanille. Agréablement accepté par enfants et adultes. Ne nécessite ni diète, ni régime et n'offre pas les inconvénients de la Santonine.

### Posologie :

*Enfants de 1 à 5 ans* : Une cuillerée à café le matin à jeun pendant 3 jours consécutifs.

*Enfants de 5 à 10 ans* : Une cuillerée à dessert.

*Adultes* : Une à deux cuillerées à soupe.

En cas de crise aiguë, doubler les doses.

Prix : 6 francs.

**M. AUDIBERT, Docteur en Pharmacie**  
Cinq-Cantons — BAYONNE.

## VERNIS A LA DIACHUSINE

### Arsénicale.

Traitement externe des Néoplasmes, Cancroïdes, Cancer épithélial de la face.

Le Vernis à la Diachusine arsénicale s'adresse aux cancroïdes en général, surtout aux petits cancroïdes de la face.

**Mode d'emploi.** — On commence à déterger l'ulcération cancroïdale de ses croûtes à l'aide de compresses humides, puis on pratique l'assèchement exact à l'aide d'un tampon d'ouate hydrophile. Cela fait, à l'aide d'un pinceau, on recouvre de vernis à la Diachusine arsénicale la surface ulcérée de façon qu'il dépasse et recouvre largement ses bords ordinairement épaissis. Il n'y a plus rien à faire alors, qu'attendre que la croûte formée se détache spontanément, ce qui arrive généralement du quinzième au vingtième jour. Une palpation minutieuse permet alors de s'assurer qu'il ne reste aucune induration suspecte, auquel cas on devrait recourir à une nouvelle application de vernis.

**Remarque.** — Si la tumeur a une surface plus étendue qu'une pièce de deux francs environ, il est préférable de faire des applications successives sur les diverses parties constituant le néoplasme et de mettre un intervalle de neuf à dix jours entre les deux applications.

Prix : 15 francs le flacon.

**Laboratoires A. LEJEUNE.**  
142, rue de Picpus — PARIS (XII<sup>e</sup>).

## VERONIDIA BUISSON

Solution de diéthylmalonylurée associée à l'extrait de *Passiflora incarnata* dans un véhicule synergique et agréable au goût. Chaque cuill. à soupe de solution ou chaque comprimé renferme 0 gr. 25 de principe actif.

**Propriétés thérapeutiques.** — Sédatif idéal de l'hyperexcitabilité nerveuse dans toutes ses manifestations : Névroses diverses, Palpitations, Phobies, Insomnies, Névrose d'angoisse, etc.

**Dose.** — 2 cuill. à café comme antispasmodique dans le courant de la journée. — 1 à 2 cuill. à soupe ou comprimés comme hypnotique, le soir au coucher.

Prix de vente au public : 18 fr. (solution). Le tube de comprimés : 14 fr. 50.

Prix médical : 12 fr. 15 (solution). Le tube de comprimés : 9 fr. 80.

**Société Générale d'Applications Thérapeutiques**  
**THERAPLIX**

*Pierre BRETEAU, Pharmacien*

Membre de l'Académie de Médecine

157, rue de Sèvres — PARIS (XV<sup>e</sup>).

---

## VERRULYSE

**Composition.** — A base de glycérophosphates (phosphate vital) de chaux, fer, manganèse, magnésie, hydrofluosilicate de soude, charbon végétal et quinquina.

**Formes.** — Poudre légèrement comprimée en petits cachets.

Boîte de 60 cachets constituant le traitement complet pour les enfants de plus de 8 ans et les adultes.

Demi-boîte de 30 cachets constituant le traitement complet pour les enfants de moins de 8 ans.

**Dose et mode d'emploi.** — *Pour les enfants de plus de 8 ans et les adultes.* — 1 cachet par jour pendant 60 jours, au début d'un repas (toujours le même de préférence).

*Pour les enfants de moins de 8 ans.* — 1 cachet tous les deux jours (30 cachets en 60 jours) ou mieux : 1/2 cachet par jour délayé dans une cuillerée de potage ou tout autre aliment, pendant 60 jours.

**Propriétés.** — 1<sup>o</sup> **Effet local.** — Au bout de 10 à 15 jours, les verrues prennent une teinte rosée sur le pourtour, et deviennent parfois le siège d'une légère démangeaison ; puis elles grossissent un peu, reprennent ensuite leur couleur et leur grosseur normales et disparaissent dans le mois qui suit la fin du traitement par élimination ou par résorption progressive, sans laisser de cicatrices. En cas de guérison dès les premières semaines, comme cela se produit quelquefois, le traitement doit néanmoins être continué jusqu'au bout, afin d'éviter les récidives.

2<sup>o</sup> **Effet général.** — Reconstituant. Amélioration très nette chez les enfants de l'entrain, de l'appétit, du teint.

**Indications.** — Traitement spécifique des verrues et autres papillomes (larynx, organes génitaux, etc.).

Paraît exercer une action favorable contre d'autres productions épidermiques, pour lesquelles une expérimentation plus étendue est en cours.

Aucune contre-indication. Après l'emploi d'une première boîte, le traitement peut être prolongé et même renforcé sans inconvénient dans les cas exceptionnels où cela est nécessaire (jusqu'à 6 cachets par jour dans les cas de verrues rebelles ou de tumeurs malignes).

**Établissements JACQUEMAIRE**

**M. MIGUET, docteur en pharmacie.**

**VILLEFRANCHE (Rhône).**

## VERTICURINE

**Composition.** — Silicate de soude, chimiquement pur.

**Action.** — Hypotensive-antiathéromateuse déchlorurante, ramène les viscosités à la normale, fait disparaître les symptômes cérébraux.

**Indications.** — Artério-sclérose, Angine de poitrine, Troubles cérébraux, Otite scléreuse, Hypertension, Aortite, Bourdonnements, Sclérose cardiaque, Pré-sclérose, Vertiges, Ménopause.

**Formes et doses.** — 1° *Liquide* : chaque cuillerée à soupe représente 1 gr. de silicate assimilable. Dose : 1 cuillerée à soupe aux deux principaux repas ; 2° *Comprimés* : chaque comprimé renferme 0 gr. 50 de silicate assimilable. Dose : 2 comprimés à chacun des principaux repas.

*Nous recommandons de préférence la solution dorénavant préparée sans goût désagréable.*

Verticurine, liquide : le flacon, 18 francs.

Verticurine, comprimés : le flacon, 14 francs.

**Laboratoire L. GRIAS, Pharmacien de 1<sup>re</sup> cl.**

47, rue Féray — CORBEIL (S.-et-O.)

## VÉSICATOIRE ROSE BESLIER

**Au Cantharidate de Soude.**

Le **Vésicatoire Rose Beslier** à base de Cantharidate de Soude, produit chimique stable défini, pur, aseptique, offre au médecin l'avantage de mettre à sa disposition un **Vésicatoire aseptique, indolore, fidèle, et sans toxicité pour l'appareil rénal.**

**Indications.** — Bronchites, pleurésies, pleurites, pneumonie, réactions douloureuses des tuberculeux, péritonite, hydarthrose, arthrite, névralgies, sciatique, etc.

**Présentation.** — Pour éviter toute manipulation, toute substitution, le **Vésicatoire Rose Beslier** est délivré exclusivement en pochettes unitaires contenant un carré de 10×10.

Chaque carré mis sous pochette à l'usine, parvient ainsi sans souillures sur l'épiderme du malade.

**M. COQUELU, Pharmacien-Fabricant**  
DIGOIN.

## VICHY-PURGATIF

Association de l'Eau alcaline naturelle de Vichy avec les Sulfates de Soude et de Magnésie (75 gr. par 1/2 litre).

Recommandée dans tous les états inflammatoires de l'intestin, dans l'obésité, les maladies du foie, de l'estomac, le manque d'appétit.

*Dose purgative* : prendre le 1/3, la moitié, les 3/4 ou même la bouteille entière, suivant l'âge ou la constitution de la personne.

*Dose laxative* : Un verre à bordeaux ou un demi-verre le matin à jeun.

### Administration :

11, rue Joseph-Bara — PARIS.

### Exploitation :

111, rue du Maréchal-Pétain — VICHY.

## VIGARDYNE

(ferment lactique actif).

**2 Formes.** — *Culture liquide*, en boîtes de 4 flacons de 60 cc. : La boîte : 16 francs.

*Comprimés* : en boîtes de 48 comprimés : La boîte : 12 francs.

**Indications thérapeutiques.** — Affections gastro-intestinales. Entérites sous toutes ses formes, Diarrhées des adultes et nourrissons, Embarras gastriques et intestinaux, Auto-intoxications.

**Posologie.** — *Culture liquide* : a) *Adultes et enfants* : La moitié d'un flacon 1/2 heure avant chaque repas, dans un peu d'eau sucrée. b) *Nourrissons* : 4 à 8 cuillères à café par jour avant les tétées.

*Comprimés* : a) *Adultes et enfants* : 8 à 10 comprimés par jour avant les principaux repas, délayés dans un peu d'eau sucrée ou de lait tiède. b) *Nourrissons* : 2 comprimés avant chacune des principales tétées.

Echantillons et Littérature :

**Laboratoire VIGARDYNE**

11, rue des Garennes — CHATOU (S.-et-O.).

Dépôt général pour la France :

**Office Commercial Pharmaceutique**

71, rue du Temple — PARIS.



## VIGOSTEROL

Irradié.

**Composition.** — Ergostérine activée par les rayons ultra-violets. Nucléinate de Manganèse. Phosphate tricalcique d'origine végétale. Extrait de glandes surrénales.

**Indications.** — Le rachitisme de l'enfant et de l'adulte. L'Ostéomalacie et la déminéralisation des femmes enceintes et fatiguées par l'allaitement. Les dystrophies et la débilité de l'enfance. Toutes les infections déminéralisantes et en premier lieu la tuberculose non congestive et les tuberculoses locales, les convalescences de la grippe.

**Mode d'emploi.** — 2 cuillerées à café, deux fois par jour pour les adultes.

1 cuillerée à café 3 fois par jour de 7 ans à 15 ans.

1 cuillerée à café 2 fois par jour de 2 ans à 7 ans.

**Laboratoires BRICHARD et Fils**  
BAR-LE-DUC (Meuse).

---

## VIN DE BAUDON

Antimonio-phosphaté.

**Composition.** — Contient le phosphate de chaux sous une forme non acide, éminemment assimilable. Cette assimilation se trouve exaltée par la présence de l'antimoine qui forme avec le phosphate une véritable combinaison organique et qui agit lui-même par ses vertus propres, comme excitant et régulateur du bon fonctionnement de l'appareil digestif.

**Avantages.** — Son goût agréable le fait accepter avec plaisir par les malades.

**Indications thérapeutiques.** — Affaiblissement général, anémie, lymphatisme, rachitisme, scrofule, croissance, suppurations prolongées, maladies des os, grossesse, allaitement, etc.

**Posologie.** — Un verre à madère pour les adultes et un verre à liqueur pour les enfants à prendre au moment des repas ; on peut en prendre selon les cas jusqu'à 4 ou 5 par jour.

Prix : 18 francs.

**Laboratoire VAUDIN et GUILLAUMIN**  
Docteurs en Pharmacie, 12, rue Charles-V — PARIS.

## VIN DE BUGEAUD

Toni-nutritif.

Malaga vieux. Quinquina. Cacao.

### Indications :

Faiblesse générale, Anémie,  
Surmenage, États consomptifs, Diabète,  
Convalescence des maladies aiguës,  
Anémie palustre, etc.

### Dose :

Un verre à madère aux deux principaux  
repas.

**Laboratoires LEBEAULT**

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III<sup>e</sup>).

---

## VIN DE CARNÉOSE

Vin supertonique.

**Composition.** — Quina-cola-coca, lacto-phosphate, condurango, plasma musculaire.

**Propriétés thérapeutiques.** — Super-toni-nutritif rapide et sûr. Ne fatigue pas l'estomac.

**Posologie.** — *Adultes* : 1 verre à madère  
3 fois par jour avant les repas.

*Enfants* : demi-dose.

Prix :

Le litre : 24 francs.

Le demi-litre : 15 francs.

**USINES DU BLOSSET**

MOULINS-SUR-YÈVRE (Cher).

## VIN DE CHASSAING

### à la pepsine et à la diastase

S'emploie dans toutes les affections stomacales provenant d'une insuffisance de digestion, à la dose d'un ou deux verres à liqueur immédiatement après le repas.

**CHASSAING, LE COQ et C<sup>ie</sup>**

1, Quai Aulagnier

ASNIÈRES (Seine)

---

## VIN ET SIROP NOURRY

Iode et tannin en combinaison stable.

**Applications thérapeutiques.** — 1° Lymphatisme dans toutes ses manifestations osseuses et ganglionnaires. — 2° Voies respiratoires : Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques. — 3° Gynécologie : Formation des jeunes filles, Ménopause, Aménorrhée, Dysménorrhée. — 4° Convalescences, Intoxications chroniques, Anorexie. — 5° Artériosclérose : Athéromes, Anévrisme de l'aorte. Angine de poitrine. — 6° Affections thyroïdiennes. — 7° Syphilis tertiaire.

**Formes.** — Vin et sirop dosés à 5 centigr. d'iode et 10 centigr. de tanin par cuill. à soupe de 15 gr. (15 milligr. par cuillère à café.)

**Doses.** — La dose moyenne à prescrire est : *Adultes* : une cuill. à soupe ; *Adolescents* : une cuill. à dessert ; *Enfants* : une cuill. à café, au moment des principaux repas.

**Nota.** — En raison de la réaction que le Vin Nourry peut avoir sur le métal de certaines cuillères, il est bon d'employer un verre à liqueur ordinaire préalablement gradué, une fois pour toutes avec des cuillerées d'eau.

**Laboratoires CLIN — PARIS.**

## VIN GIRARD

Iodo-tannique phosphaté.

**Nature.** — Le *Vin Girard* est la meilleure formule des préparations iodo-tanniques phosphatées consacrées par l'usage. — Un verre à madère de *Vin Girard* contient :

Iode .....	0 gr. 075 mgr.
Tannin .....	0 gr. 50 cgr.
Lactophosphate de chaux ....	0 gr. 75 cgr.

**Mode d'emploi.** — 1 ou 2 verres à madère par jour pour une grande personne ; demi-dose pour enfant.

**Propriétés thérapeutiques.** — Tonique et reconstituant, augmente la phagocytose.

**Indications.** — Lymphatisme, scrofule, tuberculose au 1<sup>er</sup> degré, engorgements ganglionnaires, convalescences.

**Laboratoire A. GIRARD**

48, rue d'Alésia — PARIS.

## VIN RAIMOA TONIC

**Composition.** — Champagne. Chlorure de magnésium, 0,80 par bouteille. Stimulants digestifs aromatiques divers.

**Indications.** — Mal de mer. Vomissements même dénommés incoercibles. Atonie générale, notamment d'origine digestive. Surmenage physique ou intellectuel. Cancer.

**Mode d'emploi :**

*Enfants* : De 2 cuillerées à café à 2 verres à madère en 24 heures.

*Adultes* : Comme stimulant, 2 flûtes en 24 heures ; comme excitant, jusqu'à une demi-bouteille par 24 heures.

**Laboratoire des Produits Raimoa.**

**COLLIGNON-SAVERS**

264, boulevard Voltaire — PARIS.

Téléph. : Diderot 54-96.

## VIOFORME CIBA (et ovules au Vioforme)

Iodochloroxyquinoléine. Succédané de l'iodoforme, inodore, non irritant : antiseptique et kératoplastique.

**Indications.** — Plaies atones. Ulcères variqueux, Eczémas, Escarres, Brûlures.

**Doses.** — En poudre, 2 à 3 gr. pour une application. Pommade de 2 à 10 p. 100. Se formule magistralement, ou :

Boîte poudreuse : 12 francs.

**Ovules au Vioforme.** — Antiseptiques, analgésiques, décongestionnants, désodorisants, résolutifs : métrites, vaginites, etc.

La boîte de 6 : 13 francs.

**Laboratoires CIBA — O. ROLLAND**  
109-113, Bd de la Part-Dieu — LYON.

## VIOSTEN

**Composition.** — Huile de foie de morue concentrée, Vitamines (ergostérol et lipoides irradiés), Phosphatides, (glycéro phosphate de choline), Ether benzylocinnamique.

**Injections en 1 cc. — Comprimés. — Granulé.**

**Indications.** — Anémies, Asthénies, Convalescences, Tuberculoses, Rachitisme.

Chez les nourrissons, employer la Zymatine irradiée (ergostérinée).

**Doses.** — *Enfants* : Au-dessous d'un an : 1 cc. tous les 4 jours. — 1 comprimé par jour, pendant les repas. 1/2 cuillerée à café de granulé par jour avant le repas principal.

De 1 à 3 ans : 1 cc. tous les 3 jours. — 2 comprimés par jour, pendant les repas. — 1 cuillerée à café de granulé par jour.

De 3 à 12 ans : 1 cc. tous les 2 jours. — 4 comprimés par jour, pendant les repas. — 2 cuillerées à café de granulé par jour avant les repas.

Au-dessus de 12 ans : 1 cc. tous les jours. — 6 comprimés par jour pendant les repas. — 3 cuillerées à café de granulé par jour avant les repas.

*Adultes* : 1 à 2 cc. par jour. — 6 comprimés par jour pendant les repas. — 3 cuillerées à café de granulé par jour avant les repas.

Prix : Comprimés, 15 fr. — Ampoules, 20 fr. — Granulé, 15 fr

**LABORATOIRES LESCENE**

PARIS, 58, rue de Vouillé. — LIVAROT (Calvados).

Téléph. : Vaugirard 08-19.

## VIOXYL MOUNEYRAT

**Puissant accélérateur  
de la nutrition générale.**

**Indications.** — Asthénies diverses, Cachexies, Convalescences, Maladies consomptives, Anémie, Chloro-anémie, Lymphatisme, Scrofule, Tuberculose, Neurasthénie, Asthme, Diabète.

**Formes.** — Elixir et Granulé.

**Posologie.** — *Adultes* : Débuter par 2 cuillerées à café par jour, une le matin, une le soir, soit au moment, soit dans l'intervalle des repas. Au bout de 3 ou 4 jours, porter cette dose à 3 cuillerées à café par jour.

*Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

**Établissements MOUNEYRAT**

12, rue du Chemin-Vert,  
VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine).

---

## VISCO-SÉRUM

Sérum reminéralisateur nerveux sensibilisant, isotonique, isovisqueux.

**Indications thérapeutiques.** — Tous les états de dépression du système nerveux et de l'appareil cardio-vasculaire.

**Présentation :**

*Ampoules* : Boîte de 10 ampoules : 18 fr.

*Gouttes* : Flacon de 20 grammes : 18 fr.

**Posologie.** — Une ampoule de 5 cc. tous les deux jours (une cure comprend deux séries de 10 piqûres). Gouttes : XX à chaque repas.

**Laboratoire G. FERMÉ**

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (Xe).

R. C. Seine 143-981.

## VISCO-VEINE

### Indications :

Affections veineuses. Varices. Hémorroïdes. Ménopause.

### Posologie :

XL gouttes aux repas.

### Laboratoires FOSSET

21, Grande-Rue — MONTFERMEIL  
(Seine-et-Oise).

---

## VISCUM ZYMA

**Composition.** — Dialysé de baies, feuilles et tiges de Gui blanc, obtenu selon le procédé original du Prof. GOLAZ.

**Propriétés.** — Le *Viscum Zyma* abaisse la pression sanguine, agit comme tonique du cœur et favorise l'élimination des chlorures et de l'urée.

**Indications.** — *Convient dans tous les états morbides associés à l'hypertension : artério-sclérose, urémie, albuminurie de la grossesse ; est également indiqué dans certains cas d'épilepsie.*

**Mode d'emploi.** — S'emploie à la dose de XX à XXX gouttes, diluées dans un peu d'eau, avant les repas (2 à 3 fois par jour).

### Laboratoires « ZYMA »

4, rue Bellart — PARIS (XV<sup>e</sup>).

## VITACALCINE

### « Moncour »

Complexe opothérapique irradié.

**Composition.** — Vitamines, Lipoides et Cholestérine du foie et de la moelle rouge des os frais, ainsi que les éléments minéraux de ces derniers.

Les mordants physiques (radiations ultra-violettes), endocrinien (parathyroïde et surrénale) et minéraux (nucléinate de manganèse) en assurent la fixation.

**Indications.** — Toutes maladies déminéralisantes et hyposthénisantes telles que : Prébacillose, Bacillose, Cachexie, Rachitisme, Décalcifications dentaires et osseuses, Neurasthénie, etc.

**Posologie.** — *Adultes* : 2 à 8 comprimés par jour.

*Enfants* : 1 à 4, suivant l'âge.

Le traitement sera prolongé aussi longtemps que nécessaire, la Vitacalcine n'étant pas toxique.

**Laboratoire « MONCOUR »**

49, avenue Victor-Hugo — BOULOGNE (Seine).  
Téléphone : Molitor 08-47.

## VITADONE

Vitamines A et D.

**Composition.** — Association de la *vitamine A* de croissance et anti-infectieuse et de la Vitamine D anti-rachitique, titrées physiologiquement (1 goutte de Vitadone = 8 unités de vitamine A et 80 unités de Vitamine D).

**Propriétés thérapeutiques.** — La Vitadone remplace *intégralement* l'huile de foie de morue dans toutes ses indications. Elle en contient tous les principes actifs, mais *en quantités infiniment plus considérables*.

**Indications.** — La Vitadone est indiquée dans tous les troubles de la croissance, la déminéralisation, les divers troubles de l'ossification, la scrofule, le lymphatisme, les états de maigreur, les pyodermites, la pré-tuberculose, etc...

**Posologie.** — En flacons de 24 cc., solution dans l'huile d'olives. — *Nourrissons* : XX gouttes. — *Enfants* : XL gouttes. — *Adolescents et adultes* : LX gouttes par jour, à mélanger à l'alimentation ordinaire, et dans du lait, pour les tout petits.

**Les Établissements BYLA,**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.



## VITAMINOL

1° *Malté* ; 2° *Elixir*.

**Composition.** — Réunit en une préparation facile à prendre les Vitamines B et les acides aminés (tryptophane, lysine, etc.) indispensables à la croissance et à l'entretien de l'organisme.

**Propriétés thérapeutiques.** — Apporte à l'organisme des facteurs de croissance et d'équilibre. *Complète la ration alimentaire.*

**Indications.** — *Adultes* : Tous les sous-alimentés, entre autres les dyspeptiques au régime des pâtes alimentaires, les convalescents. Les femmes enceintes, nourrices (2 cuillerées à soupe par jour 1/2 heure avant les repas). *Enfants* : les enfants nourris artificiellement et généralement tous les enfants en période de croissance (2 cuillerées à café à 4 cuillerées à dessert suivant l'âge, dans un peu d'eau tiède ou de bouillon non salé). Le Vitaminol (malté) permet le maltage facile des bouillies.

**Les Établissements BYLA,**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS. R. C. Seine 71895.

## VITAMORRHUINE

**Composition.** — Principes actifs de l'huile de foie de morue (vitamines A et D) associés au phosphore et au calcium sous forme de granulés au cacao.

Une cuillerée à café de Vitamorrhaine équivaut à une cuillerée à soupe d'huile de foie de morue type. Préparation vérifiée au point de vue de son activité biologique.

**Indications.** — Rachitisme, Scrofule, Débilité, Lymphatisme, Tuberculose.

**Doses.** — *Enfants* : de 3 mois à 1 an ; 1 cuillerée à café par jour (dans du lait) ; de 1 à 5 ans : 2 cuillerées à café par jour ; de plus de 5 ans : 3 cuillerées à café par jour. *Adultes* : 4 cuillerées à café par jour.

**Pharmacie Centrale de Belgique. S. A.**

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

## VITAMYL

**Composition.** — Extrait concentré de Vitamines A. B. C. préparé à froid à partir de levures sélectionnées de plantes fraîches.

**Indications.** — Troubles d'avitaminose chez les nourrissons et les enfants (dyspepsies, anémies). Troubles de l'appétit, troubles du développement, diabète, affections cutanées, tuberculose.

### Mode d'emploi :

*Nourrissons* : 1 cuillerée à café par jour.

*Enfants* : de 1 à 5 ans, 2 cuillerées à café par jour.

*Adultes* : 3 cuillerées à café par jour.

A prendre pur ou de préférence dans un demi-verre d'eau.

**Laboratoire des produits Amido**

**A. BEAUGONIN, pharmacien**

4, place des Vosges — PARIS (IV<sup>e</sup>).

---

## VITARGYL

**Composition et propriétés.** — Vitellinate d'argent spécial dosé à 20 p. 100 d'argent. Petites masses cristallines très solubles dans l'eau. La solution de Vitargyl est neutre, ne précipite pas par les chlorures en solutions isotoniques, ne coagule pas l'albumine.

**Action thérapeutique.** — Antiseptique puissant, sédatif, et décongestif externe. Action non corrosive, parfaitement indolore.

**Application.** — Pouvoir microbicide énergique, propriétés excitantes sur les éléments réparateurs des tissus.

Serecommande particulièrement pour les traitements abortifs des affections des yeux, du nez et de la gorge, et également dans le traitement de la blennorrhagie.

Pour les besoins de l'urologie, gynécologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, est présenté sous forme pure et en préparations (crayons, ovules, suppositoires, ampoules et flacons compte-gouttes).

**Fabricants : POINTET et GIRARD**

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.

## VITASTÉROL

« *Aucune médication à base d'ergostérine irradiée seule, ne peut prétendre remplacer l'huile de foie de morue.* »

Lesné, Clément et Simon  
(*Compte rendu de la Société de biologie, Paris, mars 1928.*)

Huile de foie de morue d'activité garantie et constante, dont les éléments actifs (*facteur de croissance, facteur antirachitique et calcofixateur*) ont été éprouvés sur le rat blanc soumis à un régime rachitigène.

**Un gramme de cette huile renferme un minimum de 50 unités antirachitiques** (Méthode de dosage des D<sup>rs</sup> Lesné et Clément).

Chaque flacon porte la date du contrôle biologique effectué.

Présentée en un **flacon de grès**, rigoureusement opaque aux radiations solaires ou autres, susceptibles d'en altérer l'activité, cette huile est de conservation pratiquement indéfinie et **peut être prescrite en été comme en hiver.**

**Indications.** — **Toute déficience en calcium** (Tuberculose pulmonaire, osseuse, ganglionnaire, Spasmophilie, Rachitisme).

**Troubles de la croissance** (Hypotrophie pondérale et staturale, Insuffisances endocriniennes).

**États de dénutrition. Consolidation des fractures, Convalescences, Allaitement, Avitaminoses.**

**Doses.** — **Nourrissons :** XV à XX gouttes par jour.

*Enfants :* 1 à 2 cuillerées à café par jour.

*Adultes :* 1 cuillerée à bouche par jour.

**F. GUILBERT, pharmacien,**  
10, rue du Collège — ARRAS (Pas-de-Calais).

*Dépôt :*

**Office Commercial Pharmaceutique**  
71, rue du Temple — PARIS (III<sup>e</sup>).

## VITERGOMINE

(Vitamine D).

**Composition.** — Ergostérol irradié dissous dans de l'huile d'olive et incorporé au saccharure de glycérophosphate de chaux à 5 p. 100.

**Action.** — L'Ergostérol irradié constitue un véritable catalyseur du calcium.

**Indications.** — Rachitisme, Troubles de l'ossification, Carie dentaire, Ostéomalaccie, Prétuberculose et Etats de déminéralisation.

**Doses.** — Par cuillerée à café de 1 gramme environ de granulés.

*Enfants* : jusqu'à 5 ans, 1 cuillerée à café par jour ; de 5 à 10 ans, 2 cuillerées à café par jour ; de plus de 10 ans, et pour les *adultes* : 3 cuillerées à café par jour.

**Pharmacie Centrale de Belgique. S. A.**  
12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

---

## VIVOLÉOL

Huile de foie de morue sélectionnée, non irradiée, garantie active et riche en vitamines :

(Facteur antirachitique et facteur de croissance.)

(Contrôle biologique rigoureux).

**Forme.** — Liquide.

### Indications :

Troubles de la croissance, de l'ossification, de la dentition, Etats de dénutrition, Lymphatisme, Convalescences.

### Posologie :

*Enfants — Nourrissons :*

XV à XXX gouttes par jour, jusqu'à 1/2 cuillerée à café.

*Jusqu'à 3 ans :*

1/2 à 1 cuillerée à café.

*Au-dessus de 3 ans :*

1 à 2 cuillerées à café suivant l'âge.

*Adultes :*

1 cuillerée à soupe par jour.

*N. B. — Le Vivoléol peut être pris à toute époque de l'année.*

Prix : 15 francs.

### Laboratoire du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie.

Ex-Interne en Pharmacie — Lauréat des Hôpitaux. — Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux.

24 et 26, rue de Fécamp — PARIS (XII<sup>e</sup>).

Tél. : Diderot 28-96.

## VOCALDOP

Thérapeutique laryngologique.

- 1° La *poudre Vocaldop* réunit en une seule prescription une *inhalation* et un *gargarisme*.

Une cuillerée à café de *poudre Vocaldop*

+  $H^2O$  = Inhalation (respiration nasale).  
+ chaude = Gargarisme (bain buccal).

Inhalation sans alcool. Thèse de Doctorat.

- 2° Le *cachet Vocaldop* représente une synergie médicamenteuse adaptée aux trois qualités de la voix parlée et chantée : timbre, puissance, résistance.

### Indications :

Enrouement, Surmenage vocal, Pharyngite, Laryngite.

### Prescriptions :

Deux inhalations par jour, 2 à 3 cachets par jour pendant 15 jours.

**Laboratoire laryngologique du Dr Cordier**  
222, faubourg Saint-Martin — PARIS.

## VULCASE

(Comprimés).

Laxatif-dépuratif.

Soufre organique. Opothérapie biliaire.

**Propriétés thérapeutiques.** — Combat la constipation par action directe sur le foie, n'irrite pas l'intestin, ne provoque pas d'accoutumance.

**Indications.** — CONSTIPATION. Affections du FOIE et de l'Intestin. Dermatoses. Arthritisme.

**Mode d'emploi.** — Prendre 2 comprimés, soit le matin à jeun, soit vers 17 heures.

Prix au public : 11 francs.

**Laboratoires P. BRISSON et C<sup>ie</sup>**  
157, rue Championnet — PARIS (XVIII<sup>e</sup>).

## VULNÉRINE DU D<sup>r</sup> BERGEN

**Principes actifs.** — Camphre associé au Phénol, Naphtol, Précipité blanc, Ether éthylpyramido-benzoïque, Oxyde de zinc, etc.

### Forme :

Emplâtre semi-fluide en tube d'étain de 50 cc.

**Indications.** — *Ulcères variqueux*, plaies atones, Brûlures, Eczémas, Cancroïdes, Lupus, Erysipèle, Engélures, Impétigo, etc.

### Pansement précieux :

Ni sec, ni humide, ni adhérence, ni macération. Calmant. Epidermisant incomparable. Les brûlures guérissent sans douleurs et sans laisser de cicatrices.

### Mode d'emploi :

1 ou 2 applications par jour. Recouvrir avec le papier à pansement spécial qui accompagne chaque tube de Vulnérine, puis coton hydrophile et bande. Jamais d'imperméable. Nettoyage à l'éther du pourtour de la plaie.

Prix du tube : 12 fr.

**Laboratoire DUCOQ** — LANGEAIS (Indre-et-Loire).  
R. C. Chinon, 2059.

---

## WISMUTHANE VELY

**Composition.** — Poudre à base de Carbonate de bismuth chimiquement pur, Carbonate de calcium chimiquement pur, Carbonate de Magnésium chimiquement pur, Codéine phosph. (traces), Kaolin chimiquement pur (préparation spéciale).

**Indications.** — Pansement gastro-intestinal, aérophagie, crises douloureuses de l'estomac, ulcus, sténoses pyloriques, spasmes, colites. Désinfection du tube digestif. Régulateur des selles.

### **Posologie :**

*Affections de l'estomac :* 1 cuillerée à café aux trois repas.

*Constipation :* 1 à 2 cuillerées à soupe le matin à jeun.

### **Laboratoire des produits Vely**

132, avenue Victor-Hugo — PARIS (XVI<sup>e</sup>).

Tél. : Passy 87-85.

---



## LA YAOURTINE

Culture sèche des ferments du Yaourt.

**Composition.** — Ferments bulgares sélectionnés, protégés, par un enrobage spécial, de l'action oxydante de l'air et de l'humidité (Procédé Nestlé).

**Formes.** — Dragées et granulé.

**Propriétés thérapeutiques.** — Spécifique de l'auto-intoxication intestinale et de ses répercussions cutanées, rénales et hépatiques.

**Posologie.**

*Nourrissons.* — 1 à 2 cuillerées à café par jour.  
Yaourtine granulée.

*Enfants et Adultes.* — Cas aigus : 2 à 4 cuillerées par jour Yaourtine granulée. Cas chroniques : 10 à 12 dragées par jour.

A prendre à jeun avec lait bouilli, 1 heure avant le repas.

**L.-J. MOUNIER, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe**

18, place de Laborde — PARIS (VIII<sup>e</sup>).

Tél. : Laborde 18-20.

---

**YO-ANDROL****Impuissance.****Composition :**

Vitamine E. Orchilipoïdes. Antéro-Hypophysine, etc.

**Dose :**

6 à 9 pilules par jour.

**Contre-indication :**

Adénome de la prostate.

**Homologue féminin : YO-GYNINE**

**Laboratoire ISCOVESCO**

107, rue des Dames — PARIS (XVII<sup>e</sup>)

Tél. : Galvani 07-09.

Adresse télégraphique :

Lipoïdes PARIS 54.

## ZOHOL

**Propriétés thérapeutiques.** — Reconstituant.

**Indications.** — Anémie, Surmenage, Phosphaturie, Convalescences.

1<sup>re</sup> Forme : En granulés.

**Composition :**

Hypophosphite de chaux..... 0 gr. 06

— fer ..... 0 gr. 06

— manganèse.... 0 gr. 06

**Mode d'emploi.** — 1 cuillerée à café à chacun des principaux repas.

2<sup>e</sup> Forme : En ampoules.

**Composition :**

Hypophosphites composés..... 0 gr. 18

Eau physiologique Q. P..... 2 cc.

**Mode d'emploi.** — Le contenu d'une ampoule chaque jour en injection sous-cutanée.

Prix de vente au public.

Ampoules : 16 fr. Granulés : 12 fr.

**Laboratoires « LOBICA »**

46, avenue des Ternes — PARIS (XVII<sup>e</sup>).

---

# ZOMINE

du professeur CH. RICHET.

Plasma musculaire de bœuf sec et total.

Stimulant de la nutrition en même temps qu'aliment riche en vitamines et facilement assimilable, la Zomine provoque une véritable *régénération musculaire*.

Doses :

1 gramme	{	1/2 cuillerée à café de	2 à 4 ans.
par	{	1	— — 4 à 6 —
année d'âge	{	1	— 1/2 — 6 à 8 —
ou	{	2	— — 8 à 12 —

*Enfants* : La Zomine donne aux enfants *anémiques* ou en *période de croissance* les *vitamines* et la ration élevée d'*albuminoïdes* dont ils ont besoin. Voir : *Orthozomine*).

*Adultes* : La Zomine est un *aliment médicament* recommandé dans toutes les *anémies*, *convalescences*, *états de grossesse* et d'*allaitement*.

Dose : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

*Prétuberculose et Tuberculose* : Dans les premières périodes de la tuberculose, la Zomine provoque une augmentation de poids des malades traités en même temps qu'une amélioration de l'état général.

Dose : 4 à 6 cuillerées à café (ou 2 cuillerées à soupe) par jour.

La Zomine étant très légère, il faut remplir largement les cuillers sans se contenter d'affleurer les bords comme avec un liquide.

*La Zomine doit se prendre dans des aliments tièdes ou froids.*

Zomine	{	Le petit flacon.....	23 fr.
intégrale.	{	Le grand flacon.....	45 —
	{	La boîte de 4 grands flacons...	170 —

*Zomine sucrée* : en paillettes dosées à 50 p. 100 de Zomine intégrale.

Doses : double des doses de Zomine intégrale.

Le flacon : 25 fr. : La boîte de 4 flacons : 95 fr.  
(Voir *Orthozomine*).

**Laboratoires LONGUET**  
34, rue Sedaine — PARIS.

**ZOMO-MUSCULOSINE BYLA**

(sèche)

**EXTRAIT SEC**, préparé dans le vide et concentré, de chair musculaire de bœuf, à haut pouvoir métabolique.

**Propriétés thérapeutiques.** — Antibacillaire, toni-nutritif, excitant physiologique.

**Indications.** — Convalescence, anémies, tuberculose, neurasthénie, etc.

**Doses et mode d'emploi.** — Un demi à un tube par jour, délayé dans une tasse de bouillon à peine tiède, ou mélangé à de la purée de légumes, ou encore à de la confiture.

**Les Établissements BYLA**

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

---

## ZYMATINE LESCÈNE

Poudre sucrée.

**Composition.** — Ferments, Galactozymases, Alcalinité titrée, Carbono-phosphates, Mg. Ca. Na. Lactose.

**Propriétés.** — Déconstipant, Cholagogue alcalin, Maternise le lait de vache, Fluidifie le caséum, le peptonifie. Réminéralise. Empêche les fermentations intestinales.

**Indications.** — *Enfants* : Constipation, Vomissements, Gastro-entérite; Intolérance lactée, Maladies de la nutrition, Dermatoses.

*Adultes* : Constipation, Vomissements, Hyperchlohydrie, Ulcères de l'estomac, Affections hépatiques.

**Doses.** — *Enfants* : 2 à 6 mesures par jour dans lait (biberons), eau, bouillies (Eviter température supérieure à 50°). Dans la *constipation*, on peut augmenter les doses sans danger jusqu'à effet.

*Adultes* : 1 à 2 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau avant ou après chaque repas, 2 à 3 fois par jour.

**Constipation.** — 2 cuillerées à café 3 ou 4 fois par jour.

Prix au public : 12 francs.

## ZYMATINE IRRADIÉE

Poudre sucrée.

**Composition.** — Zymatine, Ergostérol irradié, Nucléinate de Ca.

**Indications.** — Avitaminose, Rachitisme, Prétuberculose, Dénutrition, Déminéralisation, Spasmodophilie.

**Doses :** *Enfants.*

Jusqu'à 6 mois : 1 mesure matin et soir.

— 1 an : — — midi et soir.

Au-dessus de 1 an : 2 mesures matin et soir.

On peut augmenter les doses sans danger :

*Adultes* : 1 à 2 cuillerées à café 2 à 3 fois par jour.

Prix au public : 10 fr. et 18 fr.

**Laboratoires LESCENE**

PARIS, 58, rue de Vouillé. — LIVAROT (Calvados).

Téléph. : Vaugirard 08-19.

## ZYMOGASTRINE KERVAN

Auxiliaire puissant des fonctions digestives.

**Forme.** — Poudre.

**Composition.** — Mélange légèrement effervescent de sels alcalins associés à des ferments digestifs.

### Mode d'emploi :

A. *Adultes.* — Le matin à jeun : une cuillerée à café délayée dans un demi-verre d'eau.

Dans la journée : une cuillerée à café, soit : une demi-heure avant les deux repas (nausées, fringales, aigreurs, pyrosis), soit : une heure après les repas (comme saturant de l'acidité gastrique primitive ou secondaire).

B. *Nourrissons.* — Une pincée dans un peu d'eau bouillie avant chaque prise d'aliments.

**Indications.** — Tous états nauséux, états vésiculaires, mal biliaire, dyspepsies de tous ordres. Grossesses nauséuses, vomissements des nourrissons.

Sans contre-indications.

Prix de vente au public : 12 fr.

**Laboratoire KERVAN**

81-83, avenue Ledru-Rollin — PARIS (XII<sup>e</sup>).

---





3<sup>e</sup> Partie

---

# **NOMENCLATURE NOMINALE DES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES MÉDICALES**

avec les adresses de leurs  
Fabricants

---

Les noms des produits précédés d'un astérisque figurent dans la 2<sup>e</sup> partie du présent ouvrage avec leurs compositions, propriétés thérapeutiques, indications et posologies.



## A

- Abactériol**  
**\*Absuric**  
**\*Acécoline-Acecolex**
- Acépiline Rambaud**  
**\*Acésine Guillaumin**  
**Acétosulfol Huerre**  
**\*Acétylarsan**
- \*Acide oléique P. Thibault**  
**Acidural Dupraz**  
**\*Acimyl Monimart**  
**\*Acobella**  
**\*Acodros**
- \*Acoégénol**  
**\*Acolitol**
- \*Actine**
- Actinophore**  
**Actipyrine**  
**\*Adipolysine**
- Adolan**  
**Adolol**  
**Adolose Legrand**  
**\*Adonal Vicario**  
**Adonidine Clin**
- \*Adoverne Roche**  
**\*Adral**
- Adréna Vincent**  
**Adrénaline Byla**  
**\*Adrénaline Clin**
- \*Adrénaline Invar**  
**Adrénargol**
- \*Adrénine Mialhe**  
**Adrénocalcine**
- 54, bd Jacquemain, Bruxelles  
 19, r. Drouot, Paris.  
 Labor. L. LEMATTE &  
 G. BOINOT, 52, r. La  
 Bruyère, Paris.  
 38, r. Gay-Lussac, Paris.  
 13, r. Cherche-Midi, Paris (VI<sup>e</sup>).  
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.  
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-  
 Temple, Paris.  
 6, r. Rosenwald, Paris.  
 (Voir : Oléocidase.)  
 41, r. Etienne-Marcel, Paris.  
 23, r. Grand-Cerf, Meaux.  
 191, fg St-Antoine, Paris.  
 BOUVELOT, 62, r. d'An-  
 tibes, Cannes (A.-M.).  
 CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).  
 LANCOSME, 71, av. Victor-  
 Emmanuel-III, Paris.  
 60, r. Vieux-Pont de Sèvres,  
 Billancourt.  
 84, av. de Saint-Mandé, Paris.  
 9, r. Victor-Letalle Paris.  
 A. ROLLAND, 88, r. de la Vil-  
 lette, Paris.  
 45, r. du Marché, Neuilly.  
 Dr LALAUURIE, Cuxac-d'Aude.  
 2, r. des Trois-Frères, Paris.  
 17, bd Haussmann, Paris.  
 20, r. des Fossés-St-Jacques,  
 Paris.  
 21, place des Vosges, Paris.  
 Lab. ROBERT & CARRIÈRE,  
 37, r. de Bourgogne, Paris.  
 14, av. Mac-Mahon, Paris.  
 26, av. Observatoire, Paris.  
 20, r. des Fossés-Saint-Jacques,  
 Paris.  
 21, r. Nonnains-d'Yvères, Paris.  
 BRESSIER, 102, r. Vincent,  
 Marseille.  
 8, r. Favart, Paris.  
 L. ADAM, à Granville (Manche).

- Adrénol Total** (voir ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.  
Lipoides)  
\***Adrénoléine** FALVY, 40, r. des Acacias, Paris.  
14, r. de Clichy, Paris.  
**Adrénophyséine** 26, av. Observatoire, Paris.  
**Adrénopituine** Byla 20, r. du Laos, Paris.  
\***Adrépatine** Laleuf 9, r. de la Perle, Paris.  
**Adrialgine** 9, r. de la Perle, Paris.  
**Adrianine** 12, bd St-Martin, Paris.  
\***Aérophagyl** 9, r. Boissonnade, Paris.  
\***Æthone-Falcoz** Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.  
**Afatyl** Lab. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.  
\***Agamétol** 25, bd Beaumarchais, Paris.  
**Agar du Dr Gigon** RÉAUBOURG, 1, r. Raynouard, Paris.  
\***Agarase** GILBERT, 6, r. du Laos, Paris.  
**Agaricine** Clauss 7, r. Biscornet, Paris.  
**Agaryl** Fournier MERMINOD, 49, r. du Paradis, Paris.  
\***Agesulf** 21, r. Cacheux, Boulogne-sur-Seine.  
**Aglo** PATRICE à Vichy.  
**Aglucol** FOUCHERE, Rive-de-Gier (Loire).  
**Agobyl** 24-26, r. de Fécamp, Paris.  
\***Agocholine** Zizine 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.  
\***Agomensine** Ciba 43, r. de Saintonge, Paris.  
**Agonol** Cognet 119, r. Nationale, Lille.  
**Aigue d'Or** Sté Rég. de l'Ouest, à Rennes.  
**Aimaquinase** 55, r. Chabrol, Paris.  
\***Airoglyce** 21, pl. des Vosges, Paris.  
\***Airol Roche** Sarlat (Dordogne).  
**Akésol** Musi 9, r. de la Gare, Levallois-Perret.  
\***Albuplast** Vigier 1 bis, r. Molitor, Paris.  
**Albuol** Leisyn WANDER, 151 bis, rte de Joinville, Champigny (Seine).  
\***Alcacyl** 47, r. de la Boule-d'Or, Romilly (Aube).  
**Alcaderma** 27, r. Desrenaudes, Paris.  
\***Alcalinose** Lab. DOR, 17 bis, av. Parmen-tier, Paris.  
\***Alcamfétol** GLORY, 38 bis, bd Beaumar-chais, Paris.  
**Alcasodine** 74, r. de Rome, Marseille.  
**Aldhylène** 37, r. de la Fédération, Paris.  
**Aldine** 15, r. d'Argenteuil, Paris.  
**Aldogène** Carteret 39, r. de la Gare, Bondy (Seine).  
**Aldor** 45, r. du Marché, Neuilly (Seine).  
\***Alepsal** Genévrier 51, r. Gay-Lussac, Paris.  
\***Alexime** 47, r. Colbert, Tours.  
**Algaliment** 12, r. de la République, Puteaux.  
**Algarine** Nyrdhal

- Algarol  
 \*Algatan  
 Alghiogyl  
 \*Algocratine Lancosme  
 Algodigestine  
 Algolane Poulenc  
 \*Algophagine  
 \*Alibourine  
 Alimavèna  
 Alimentine Mory  
 Aliment Mono  
 \*Aliment Tinardon  
 \*Allisatine Sandoz  
 \*Allium Coirre  
 \*Allocaïne Lumière  
 \*Allochrysine Lumière  
 \*Allonal Roche  
 \*Allophaquina  
 \*Aloïne Houdé  
 \*Aloplastine  
 \*Aloysine Gouzène  
 \*Alsodine  
 \*Althine  
 Altsara  
 \*Alucol Wander  
 \*Alunozal  
 Alzine  
 Amandol  
 \*Amborhinol  
 Ambrine  
 Ambrosia  
 \*Amibiasine  
 \*Amidal  
 Amidon Planche  
 \*Amino-Sel Byla  
 \*Amiphène  
 Amipyrine  
 Amirargol  
 Ampélamine  
 Ampelodine Bernhard  
 Amphosthène  
 \*Ampho-Tablettes Ron-  
 chèse  
 71, r. du Commerce, Paris.  
 3-9, r. des Alouettes, Nanterre  
 (Seine).  
 Usine du Blosset, Moulins-sur-  
 Yèvre (Cher).  
 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.  
 PONCET, à Limoges.  
 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.  
 UNIS-SPES, 14, r. Demarquay,  
 Paris.  
 Lab. B. E. A., Belfort.  
 Bourg-la-Reine (Seine).  
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.  
 7, r. de Sèze, Paris.  
 17, r. Cadet, Paris.  
 3 et 5, r. de Metz, Paris.  
 5, bd Montparnasse, Paris.  
 23, c. de la Liberté, Lyon.  
 23, c. de la Liberté, Lyon.  
 21, pl. des Vosges, Paris.  
 3, r. Watteau, Courbevoie.  
 9, r. Dieu, Paris.  
 Lab. Biologique de l'Île-de-  
 France, 3, r. Laugier, Argen-  
 teuil.  
 139, r. de Paris, Pantin.  
 Lab. B. C. L., 29, faub. de Bour-  
 gogne, Orléans.  
 3, r. Barbette, Paris.  
 151, r. St-Maur, Paris.  
 151 bis, rte de Joinville, Cham-  
 pigny (Seine).  
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-  
 Temple, Paris.  
 285, av. Jean-Jaurès, Lyon.  
 5, av. des Tilleuls, Paris.  
 276, r. Lecourbe, Paris.  
 48, bd La-Tour-Maubourg, Paris  
 6, r. des Vinaigriers, Paris.  
 58, r. de Miromesnil, Paris.  
 4, pl. des Vosges, Paris.  
 2, r. Volney, Paris.  
 26, av. de l'Observatoire, Paris.  
 CARRON, 69, r. St-Cloud,  
 Clamart (Seine).  
 GAILLON, 113, bd Voltaire,  
 Paris.  
 AMICROS, 9, bd Edgar-Quinet  
 Paris.  
 7, r. de l'Arbre-Sec, Lyon  
 11, r. Lafayette, Paris.  
 132, av. Victor-Hugo, Paris.  
 6, r. Rothschild, Nice.

- \*Amphotonyl  
 \*Ampho-vaccins de Ronchèse  
 \*Ampolases-opolases  
 Ampoules de benzoate et bi-iodure Hg. Vigier  
 Ampoules bi-iodure Hg. Midy  
 \*Ampoules Boissy  
 Ampoules Cantonnet  
 Ampoules Churchill  
 \*Ampoules de Digalène  
 Ampoules Dubé  
 Ampoules Egralène Brisson  
 Ampoule huile soufrée Brisson  
 \*Ampoules névrosthé-  
 niques Dausse  
 \*Ampoules de Pantopon  
 Ampoules Optima  
 \*Ampoules Reipar  
 Ampoules Romon  
 Ampoules Seti Brisson  
 \*Ampoules de Sécacor-  
 nine  
 \*Ampoules de Spasmal-  
 gine  
 \*Ampoules de Théobryl  
 \*Ampoules Suracti-  
 vantes Leisyn  
 Ampoules Sigmuth  
 Ampoules d'Uriage  
 Ampoules V.-E. Dou-  
 mer  
 \*Amunine  
 Amyliodine  
 \*Amylodiastase Thépé-  
 nier  
 Anacidase  
 \*Anaclasine Ranson  
 Analgénine  
 Analgine dentaire  
 Analgol  
 \*Anapeptone Vassal  
 \*Anaquintine Lescène
- 20, r. du Bourg, Laon.  
 6, r. Rothschild, Nice (A.-M.).  
 163, r. de Flandre, Paris.  
 VIGIER, 12, bd Bonne-Nou-  
 velle, Paris.  
 4, . du Colonel-Moll, Paris.  
 49, r. Hoche, Courbevoie.  
 BELIERES, 19, r. Drouot, Pa-  
 ris.  
 12, r. Castiglione, Paris.  
 HOFFMANN LA ROCHE, 21,  
 pl. des Vosges, Paris.  
 MILLOT, 54, r. de la Bien-  
 faisance, Paris.  
 157, r. Championnet, Paris.  
 id.  
 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).  
 Hoffmann-la-Roche et C<sup>ie</sup>,  
 21, pl. des Vosges, Paris.  
 Gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
 DRAPIER, à Lucquy (Ard.).  
 6, r. Bridaine, Paris.  
 157, r. Championnet, Paris.  
 21, pl. des Vosges, Paris.  
 id.  
 id.  
 1 bis, r. Molitor, Paris.  
 BRISSON, 157, r. Championnet  
 Paris.  
 15, Champs-Élysées, Pari.  
 BOMEL à Annonay (Ardèche).  
 BYLA, 26, av. de l'Observatoire,  
 Paris.  
 163, r. de Flandre, Paris  
 12, r. Clapeyron, Paris.  
 MEUNIER, Auxerre (Yonne).  
 121, av. Gambetta, Paris.  
 17, r. Cadet, Paris.  
 FANDRE, 4, fg Stanislas,  
 Nancy.  
 D<sup>r</sup> LALAURIE, Cuxac-d'Aude.  
 28, r. Hôpital-Militaire, Lille.  
 à Livarot (Calvados) et 58, r. de  
 Vouillé, Paris.

- Anasepsine J. Muraire** 3, r. des Laitières, Vincennes.  
**Anatoxine diphtérique** Institut Pasteur, 22 rue Dutot, Paris.
- \*Anaural** Lab. LAMAR, pl. Forbin, Aix (B.-du-Rh.).
- Androbion Netter** 100, bd Sébastopol, Paris.
- \*Androcalcion** CORTIAL, 15, bd Pasteur, Paris.
- Androcrinol** Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
- Andropolycrinol** Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
- \*Androstine Ciba** 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- Andryl Vicario** 17, bd Haussmann, Paris.
- \*Anégrine Rivier.** 26-28, r. St-Claude, Paris.
- \*Anéo Leisyn** 1 bis, r. Molitor, Paris.
- Anéol** 25, r. Petits-Hôtels, Paris.
- Anestile Bengué** 47, r. Blanche, Paris.
- \*Anexol** DROUET & PLET, à Rueil (Seine-et-Oise).
- \*Angiolympe** 4 bis, r. Hébert, Courbevoie.
- \*Angiosedine** BEAU, r. des Archives, Paris.
- Angiosthénine** 5, av. de Tilleuls, Paris.
- \*Angioxyl du Dr Roussel** 97, r. de Vaugirard, Paris.
- \*Aniodol** 3-9, r. des Alouettes, Nanterre (Seine).
- \*Anoïde** 116, bd Haussmann, Paris.
- Antacidyl** DURET & RÉMY, à Asnières (Seine).
- \*Antalgol Dalloz** 13, bd La Chapelle, Paris.
- \*Antasthène** 54, fg St-Honoré, Paris.
- \*Antasthme Cibrand** 199, av. Victor-Hugo, Auber-  
villiers.
- \*Antélobine Byla** 26, av. de l'Observatoire, Paris
- \*Anthema** SPECIA, 86, r. Vieille-du-  
Temple, Paris.
- \*Anthraxone** Institut de Microbiologie, à  
Sarrebbruck et 23, r. du Caire,  
Paris.
- \*Antialgos Christiaens** r. du Ch.-de-Mars, à Reims.
- \*Antiasthmatique** DOMERGUE, Agen (L.-et-G.)
- Anti-asthmatiques du Dr Cléry** Lab. du Dr CLÉRY, 53, bd  
St-Martin, Paris.
- \*Antiasthme Bengalais** FAGARD, 44, r. d'Aguesseau,  
Boulogne-sur-Seine.
- \*Antiasthmine** 66, r. Nationale, Lille.
- Anticalculose** HUGON, 208, av. Michel-Bizot,  
Paris.
- \*Antidiabétique Monavon** 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
- \*Antiépileptique de Liège** 48, r. Claude-Lorrain, Lille.
- \*Antifuronculeux** DOMERGUE, Agen (L.-et-G.).

- Antigastralgique**  
Winckler
- \***Antigénines**  
**Antigrippal** Demay  
\***Antigrippine** Midy
- Antimucose** Mariani  
**Antipaludique**
- Antipaludique** Lumière  
\***Antiphi**  
\***Antiphlogistine**
- Antiphlogosine**  
**Antiphymase** Meurico
- \***Antiphymique** Vadam  
**Antipiol**  
**Antipsorine**  
**Antipur**  
**Antipyrine** U. R.  
\***Antirrhoïde** Bélières  
\***Antisciatique**
- Antiseptinol**
- Antiseptique - Alcalin**  
Gros  
\***Antivirus**
- Antixénol**  
**Antodyne** Poulenc  
\***Antonal**
- Anuline**  
**Anurol**  
\***Anusol**
- \***Anxiol**  
**Anytal** Brisson  
**Apaludol**  
\***Aphloïne**
- \***Aphosal**  
\***Apioline** Chapoteaut  
**Aplexil**  
**Apocynine** du Dr Des-  
champs  
\***Appetyl**
- Aprol** Vigier  
\***Apsophol**  
**Apyrexine** Optima
- MIDY & C<sup>ie</sup>**, 4, r. du Colonel-  
Moll, Paris.  
1, pl. Lucien-Herr, Paris.  
42, r. des Martyrs, Paris.  
**MIDY et C<sup>ie</sup>**, 4, r. du Colonel-  
Moll, Paris.  
41, bd Haussmann, Paris.  
**COUTURIEUX**, 18, av. Hoche,  
Paris.  
23, c. de la Liberté, Lyon.  
**CAPIN**, Roquefort (Landes).  
11, r. du Petit-Parc, St-Maur  
(Seine).  
126, r. de la Pompe, Paris.  
Union chimique Belge, 61, av.  
Louise, Bruxelles.  
111 bis, r. de Turenne, Paris.  
18, r. Méridien, Bruxelles.  
14, r. Gravel, Levallois (Seine).  
121, av. de St-Ouen, Paris.  
86, r. Vieille-du-Temple, Paris.  
19, r. Drouot, Paris.  
**CHAMBON**, pl. Francheville,  
Périgueux.  
**C. BARON**, aux Sables-d'Olonne  
(Vendée).  
13, pl. Delille, Clermont-Fer-  
rand.  
La Biothérapie, 131, r. Cam-  
bronne, Paris.  
74, r. de Lourmel, Paris (XV<sup>e</sup>).  
86, r. Vieille-du-Temple, Paris.  
Lab. **CARESME**, 2, q. Paul-  
Bert, Tours.  
10, r. de l'Union, Clichy.  
25, r. Petits-Hôtels, Paris.  
Lab. du Dr **MIALHE**, 8, r.  
Favart, Paris.  
**FALVY**, 40, r. des Acacias, Paris.  
157, r. Champignonnet, Paris.  
**AUCLAIR**, à Aigurande (Indre).  
15, r. des Immeubles-Indus-  
triels, Paris.  
48 bis, av. Mozart, Paris.  
8, r. Vivienne, Paris.  
86, r. Vieille-du Temple, Paris.  
**LALEUF**, 20, r. du Laos,  
Paris.  
Lab. Biologique de l'Île-de-  
France, 3, r. Laugier, Argen-  
teuil.  
12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.  
40, r. des Carmes, Orléans.  
**OPTIMA**, Gde-Rue au Bois,  
Bruxelles.



- \*Aquintol Lab. du Dr MIALHE, 8, r. Favart, Paris.
- \*Arachise Lab. BÉLIERES, 19, r. Drouot, Paris.
- Arapal La Biothérapie, 121, r. Cambronne, Paris.
- \*Arcanan CRUET, 13, r. Miollis, Paris.
- Archésine Trouette- 15, r. des Immeubles-Industriels, Paris.
- Perret
- \*Ardogène 9, r. du Temple, Enghien (Seine-et-Oise).
- Argent colloïdal élec- MARONNEAU-MOREL, 156, r. trique des Fauvelles, Courbevoie.
- Argent colloïdal Nyr- 12, r. de la République, Puteaux.
- dhal
- \*Argybil LANCOSME, 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
- \*Argycuprol 4 bis, r. Hébert, Courbevoie (Seine).
- \*Arhémapectine Gallier 38, bd Montparnasse, Paris.
- \*Arhéol Astier 45, r. du Dr-Blanche, Paris.
- \*Arhine Lambiotte Fr. 20, r. Dumont-d'Urville, Paris (XVI<sup>e</sup>).
- Aristargol 8, r. du Petit-Musc, Paris.
- \*Armosine ROUX, 58, r. de Maubeuge, Paris.
- Aromalt KARCHER, 139, r. des Pyrénées, Paris.
- \*Arquéritol LESURE, 70, r. du Bac, Paris.
- \*Arrhéнал Adrian 9, r. de la Perle, Paris.
- Arrhéналитine Bureau 86, bd Port-Royal, Paris.
- Arrhéнаiques Clin 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- \*Arrhéномartiол Clin 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- \*Arrhéнуclène Bergevin à Châteaudun (Eure-et-Loir).
- Arsallyl ROUX, 58, r. de Maubeuge, Paris.
- \*Arsaminol Clin 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- Arsébényl Meurice Union Chimique Belge, 61, av. Louise, Bruxelles.
- Arsenic Organique COIRRE, 5, bd Montparnasse, Paris.
- Glasser
- \*Arséniode BURIAT, 25, r. Copernic, Paris.
- Arsenion Couturieux 18, av. Hoche, Paris.
- Arsénobenzol Billon 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.
- Arseno-fer Henry 39, r. Sclessin, Liège.
- \*Arsénos-Solvant 19-21, r. Van-Loo, Paris.
- Arsétonyl CALMEL-DOMERGUE, 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
- Arsiodyle CHASSAIGNE, Ruffec (Charente).
- Arsiquinine Lemaitre 12, r. Vavin, Paris.
- \*Arsi-Strychnal Longuet 34, r. Sedaine, Paris.
- Arsoplasmine 52, r. La Bruyère, Paris.

\***Arsycodyle Leprince**  
 \***Arsylène Roche**  
**Arsynal Legrand**  
 \***Artérase**  
 \***Arterion Vincardi**

\***Artérioveinine**  
**Arthridol**

**Arthri-sel**  
**Arthritose**  
 \***Artoradine**

**Arvensyl**

**Arzonil**  
 \***Ascéine**

**Ascéose**  
 \***Asciatine**  
**Asclérogénol**

\***Asclérosol**

\***Ascoléine Rivier**  
**Aseptampoules**  
**mesnil**  
**Aseptène**

\***Aseptone**

\***Aseptoradol**

**Aseptorhine**  
**Asepturol**  
**Aspiphan**  
**Aspirine U. R.**  
**Aspirine Vicario**  
**Asquirol Poulenc**  
**Astasol Douetteau**  
**Astéine Biron**  
**Asthmacidine**

**Asthmatyl**  
**Asthmo-Actine**  
**Asthmor**

**Asthmyl**

\***Asthmylose**  
**Atemnol**  
**Atensyl**

\***Athérollysine**  
**Atihal**

62, r. de la Tour, Paris.  
 21, pl. des Vosges, Paris.  
**GREMY**, 14, r. de Clichy, Paris.  
**GILBERT**, 6, r. du Laos, Paris.  
**VIGUIER**, 42, av. Borriglionne,  
 Nice.

121, av. St-Ouen, Paris.  
**D<sup>r</sup> FRAYSSE**, 47, r. de Neuilly,  
 Nanterre.

22, rue Morère, Paris.  
 La Biomarine, à Dieppe (S.-Inf.).  
 Lab. de Radiumthérapie, 25, r.  
 Vaneau, Paris.

**GERDA**, 163, bd Croix-Rousse,  
 Lyon.

143, Gde-Rue Guillotière, Lyon.  
**CIBA**, 109-113, bd de la Part-  
 Dieu, Lyon.

20, r. Rambuteau, Paris.  
 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.  
 3, pl. Intérieure St-Michel, Tou-  
 louse.

**F. CARTIER**, 1, r. de la Marti-  
 nière, Lyon.

26, r. St-Claude, Paris.  
 10, r. du Plâtre, Paris.

**COUDERT**, 116, av. Ledru-  
 Rollin, Paris.

Lab. **MOULIN**, 50, r. de Répu-  
 blique, Puteaux (Seine).

Etabl. **LABORADIUM**, 33, r.  
 St-Jacques, Paris.

21, r. Feydeau, Paris.  
 86, bd Port-Royal, Paris.

26, r. Ste-Claire, Mulhouse.  
 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.

17, bd Haussmann, Paris.  
 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.

20, fg St-Honoré, Paris.  
 10, r. Lafayette, Grenoble.

**OPTIMA**, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.

3, r. du Pont, Epinal.  
**BERTHON** à Dornes (Nièvre).

88, av. J.-B.-Clément, Bou-  
 logne-sur-Seine.

**ROUSSELET**, 9, bd de la Répu-  
 blique, Noisy-le-Sec (Seine).

2, r. Lesdiguières, Paris.  
 126, r. de la Pompe, Paris.

**DORANTOWICZ**, 17 bis, av.  
 Parmentier, Paris.

Lab. **JONIDS**, Dijon (Côte-d'Or).  
 5, pl. Miremont, Vienne (Isère).

- Atlasantol**  
**\*Atolysan**  
**\*Atophan Cruet**  
**\*Atophanyl**  
**\*Atoquinol Ciba**  
**Atoxyl Poulenc**  
**Atrabiline Gory**  
**\*Atural**  
**Auriculine**  
**Aurion Couturieux**  
**Autogénol**  
**Auto Inhalation Legras**  
**Auxergyl**  
**\*Avanazol Couturieux**  
**Avistyl**  
**\*Azigol**  
**\*Azotyl**  
**\*Azufrol Couturieux**  
**\*Azym**
- MARONNEAU-MOREL**, 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.  
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.  
 13, r. Miollis, Paris (XV<sup>e</sup>).  
**Lab. CRUET**, 13, r. Miollis, Paris (XV<sup>e</sup>).  
 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.  
 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.  
**JOOSS**, Montreuil (Seine).  
 35, r. de Paris, Clichy.  
 21, r. Feydeau, Paris.  
 18, av. Hoche, Paris.  
 57, r. Edgar-Quinet, Nantes.  
 28, r. Monge, Dijon.  
 89, r. du Cherche-Midi, Paris.  
 18, av. Hoche, Paris.  
 11, r. Lepic, Paris.  
**Thévenot**, 21, r. des Roses, à Dijon.  
 46, av. des Ternes, Paris.  
 18, av. Hoche, Paris.  
**PARET**, 22, r. Guibal, Marseille.

## B

- \*Babeurre de Lafaye**  
**Babeurre Lactella**  
**\*Babeurre Nutricia**  
**Babutyrose**  
**Baby-Bala**  
**Baby-Ossine**  
**Bacilacrine**  
**\*Backérine**  
**Bacté-Coli-Phage**  
**\*Bacté-Phages**  
**\*Bactériophages Leclerc**  
**Bacté-Staphy-Phage**  
**\*Bactioxyné**  
**Bains de Brides**  
**Bains carbogazeux de Royat**
- Ferme de « La Faye »**, Marllhes (Loire).  
 à Tourcoing.  
 65, bd Sébastopol, Paris.  
 59, bd Gambetta, Tourcoing.  
**BRICHARD** et fils, Bar-le-Duc (Meuse).  
**Billy-Montigny** (Pas-de-Calais).  
 50, r. de la République, Puteaux.  
 4, pl. des Vosges, Paris.  
 37, r. Bourgogne, Paris.  
 id.  
 10, r. Vignon, Paris.  
 37, r. Bourgogne, Paris.  
 15, r. d'Argenteuil, Paris.  
 46, r. Pierre-Charron, Paris.  
**Royat** (Puy-de-Dôme).

- \*Bains carbogazeux** 4, r. d'Ilzach, Mulhouse.  
**Wolo**  
**\*Bain Carré** LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris.  
**\*Bain Salvia** 101, av. Mozart, Paris.  
**\*Bains médicamenteux** D<sup>r</sup> FAYES, 199, r. St-Denis Paris.  
**Bakolyse** 122, r. Cherche-Midi, Paris.  
**\*Baldisedan** 133, r. Lecourbe, Paris.  
**\*Ballotyl** 113, bd Voltaire, Paris.  
**\*Balmiga** 18, r. Pierre-Curie, Paris.  
**Balsamiode** 19, c. Morand, Lyon.  
**Balsamiodol** 10, r. Washington, Paris.  
**\*Balsamol Lescène** à Livarot (Calvados) et 58, r. de Vouillé, Paris.  
**Balsapector** 15, r. Catulienne, St-Denis (Seine).  
**Balsocirase** 6, pl. Cambronne, Paris.  
**\*Balsoforme** SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.  
**Bandes ulcérophiles** 6 ter, r. Voltaire, La Garenne-Colombes.  
**Nozan**  
**Banikol** 12, r. des Apennins, Paris.  
**Bardane stabilisée** 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).  
**Dausse**  
**Bardanyl**  
**Barèges Fagard**  
**Barkyl**  
**Baromyl**  
**\*Baume Adol**  
**Baume Agerca**  
**Baume Antex**  
**Baume Apard**  
**\*Baume Aroma**  
**\*Baume Bengué**  
**\*Baume D<sup>r</sup> Baissade**  
**Baume D<sup>r</sup> Blancard**  
**Baume Boeglin**  
**Baume Darnoe**  
**\*Baume Delacour**  
**Baume de Dentition**  
**Baume Dolora**  
**\*Baume Duret**  
**Baume du D<sup>r</sup> Gigon**  
**Baume Lartigo**  
**Baume Lorol**

4, r. d'Ilzach, Mulhouse.  
 LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris.  
 101, av. Mozart, Paris.  
 D<sup>r</sup> FAYES, 199, r. St-Denis Paris.  
 122, r. Cherche-Midi, Paris.  
 133, r. Lecourbe, Paris.  
 113, bd Voltaire, Paris.  
 18, r. Pierre-Curie, Paris.  
 19, c. Morand, Lyon.  
 10, r. Washington, Paris.  
 à Livarot (Calvados) et 58, r. de Vouillé, Paris.  
 15, r. Catulienne, St-Denis (Seine).  
 6, pl. Cambronne, Paris.  
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.  
 6 ter, r. Voltaire, La Garenne-Colombes.  
 12, r. des Apennins, Paris.  
 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).  
 4, imp. de Béarn, Paris.  
 44, r. d'Aguessau, Boulogne-sur-Seine.  
 30, r. Bobillot, Paris.  
 Sté française d'Extension Bio-Chimique, St-Quentin.  
 L. GIROUD, 78, c. de la Liberté, Lyon.  
 30, r. Bobillot, Paris.  
 Lab. DEBRUERES, 86, r. Victor-Hugo, Revin (Ard.).  
 27, bd de Courtais, Montluçon (Allier).  
 1, pl. Victor-Hugo, Paris.  
 16, r. Ballu, Paris.  
 Saint-Loup, près Marseille (Bouches-du-Rhône).  
 114, av. Jean-Jaurès, Paris.  
 26, r. Ste-Claire, Mulhouse.  
 HUBERT, Romorantin (L.-et-C.).  
 56, bd Péreire, Paris.  
 32, fg Montmartre, Paris.  
 50, r. de la République, Pu-teaux.  
 ROUTIER, 20, r. St-Lazare Paris.  
 25, bd Beaumarchais, Paris.  
 78, fg Saint-Denis, Paris.  
 ZÉDAIRE, à Grenoble.

- Baume Marta  
 \*Baume de la Mater-  
 nité  
 Baume Merveilleux  
 Baume Oco  
 Baume Pélérine  
 Baume de Port-Royal  
 \*Baume Rhodia  
 Baume Robemard  
 Baume Saihel  
 \*Baume Saint-Antoine  
 \*Baume Selenia  
 \*Baume Suelta  
 Baume Tetyl  
 Baume Victor  
 \*Baumolacpinine  
 \*Béatol  
 \*Beef Lavoix  
 \*Belhémène  
 \*Belladenal Sandoz  
 Belladone Dausse  
 \*Bellafole Sandoz  
 \*Bemax  
 Benedictus (Produits)  
 Benzhermyl  
 Benzoate de Naphtol  
 \*Benzo-Bismuth Millot  
 Benzocalyptol  
 Benzocarbène  
 \*Benzoflorine Julien  
 \*Benzo - iodhydrine  
 Bruel  
 Benzolactine  
 Benzo-Lactol  
 \*Benzophosphine  
 Christiaens  
 \*Benzoquinol  
 Benzo-Ringyl  
 Benzothymol  
 \*Benzyanyl  
 \*Benzylocalcium  
 \*Benzylol  
 Berkendyl  
 \*Béryline du D<sup>r</sup> Fayès  
 BONNAURE, à Alais (Gard),  
 11, r. Joseph-Bara, Paris.  
 RAVAUD, 6, pl. de Bretéuil,  
 Paris.  
 87, r. Lafayette, Paris.  
 3, r. de la Perle, Paris.  
 MOREL, 2, av. Gambetta,  
 Choisy-le-Roi.  
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-  
 Temple, Paris.  
 D<sup>r</sup> PACHEBAT, Bayonne.  
 70, Grand'Rue, Sèvres.  
 38, r. Soult, Tarbes (H.-P.).  
 DAVID & ses fils, 49, r. de  
 Bitche, Courbevoie.  
 16, r. Henri-Regnault, Cour-  
 bevoie.  
 GAUTIER, 13, r. Dorian, Paris.  
 PELAUD & BAYLE, La Cour-  
 tine (Creuse).  
 4, r. d'Illzach, Mulhouse.  
 46, av. des Ternes, Paris.  
 5, av. Victoria, Paris.  
 Lab. de Sérothérapie, 76, r.  
 Escudier, Boulogne-s.-Seine.  
 3-5, r. de Metz, Paris.  
 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).  
 3-5 r. de Metz, Paris.  
 5, r. de la Paix, Paris.  
 74, r. Lamareck, Paris.  
 36, q. Fulchiron, Lyon.  
 FRAUDIN, 4, av. Desfeux,  
 Boulogne-sur-Seine.  
 54, r. Bienfaisance, Paris.  
 213, r. St-Honoré, Paris.  
 FOUCHERE, Rive - de - Gier  
 (Loire).  
 105, r. de Rennes, Paris.  
 36, r. de Paris, Colombes (Seine).  
 38, r. Albouy, Paris.  
 10, r. du Parc-Royal, Paris.  
 2, r. du Champ-de-Mars, Reims.  
 1, r. Alexandre-III, Dunkerque.  
 9, r. Boissonnade, Paris.  
 50, r. de la République, Pu  
 teaux.  
 37, r. de Bourgogne, Paris.  
 Lab. DOR, 17 bis, av. Parmen-  
 tier, Paris.  
 37, r. Galilée, Paris.  
 61, av. Louise, Bruxelles.  
 199, r. St-Denis, Paris.

Bestol du D<sup>r</sup> Lavoué  
 \*Bétul-Ol Midy  
 \*Bexinine Amblard  
 Bi-98

Biantero:

\*Biarsol

\*Biazan  
 Bibromure de Hg Vi-  
 cario

\*Bi-Citrol Marinier  
 Bicollyre  
 Bigynol

\*Bi-Iodural Novat  
 Bi-iodure Cros  
 Bi-iodures Domergue  
 Bi-iodure Midy  
 Bi-iodure Souffron

\*Bilexabol

\*Biléyl Fournier

\*Biliase Raby

\*Biliboldo

\*Bilifluine

Biliode

\*Biliogastrine Chevillon

Bilioi Bouty

Biliose Vichy

\*Bilirhéine

\*Bilivaccin

Billeros

Billirgyl

Bilolive

Biminéral Reynaud

Binol Roger

Biocalcine

\*Biocalcose

\*Biocholine

Biocrine

Bioderma

\*Biodermyl Monal

\*Biodynamine

\*Bioentérase

Biogastrine

\*Biogénol Demasles

Biogésine Rochard

\*Biolactyl Fournier

Rennes (Ille-et-Vilaine).

4, r. du Colonel-Moll, Paris.

à Cunlhat (Puy-de-Dôme).

MARONNEAU-MOREL, 156, r.  
 des Fauvelles, Courbevoie.

Lab. chimie physiologique, 37, r.  
 Tivoli, Bordeaux.

Lab. ORRILLARD, 245, r. de  
 Vaugirard, Paris.

1, pl. Lucien-Herr, Paris.

17, bd Haussmann, Paris.

159, r. de Flandre, Paris.

276, r. Lecourbe, Paris.

54, r. de Paris, Charenton.

BOMEL, Annonay (Ardèche).

12, r. de Nice, Paris.

20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.

4, r. du Colonel-Moll, Paris.

157, r. de Sèvres, Paris.

156, r. des Fauvelles, Courbevoie.

7, r. Biscornet, Paris.

à Asnières (Seine).

Lab. LAMAR, pl. Forbin, Aix  
 (B.-du-R.).

Lab. STENE, 2, pl. des Vosges,  
 Paris.

32, bd Beaumarchais, Paris.

CHEVILLON, 99, r. de Paris,  
 Massy (S.-et-O.).

3, r. Dunkerque, Paris.

PATRICE à Vichy.

41, r. Etienne-Marcel, Paris.

La Biothérapie, 131, r. Cam-  
 bronne, Paris.

33, r. Rennequin, Paris.

30, r. Miromesnil, Paris.

GILBERT, 6, r. du Laos, Paris.

DURAND, à Aigues-Mortes.

177, bd St-Germain, Paris.

AUGIER, 2-4, r. des Lom-  
 bards, Paris.

LEMATTE & BOINOT, 52, r.  
 Labruyère, Paris.

ROBERT et CARRIERE, 37, r.  
 de Bourgogne, Paris.

122, fg St-Honoré, Paris.

Gonneville-la-Mallet (S.-Inf.).

6, r. Bridaine, Paris.

17, r. Cadet, Paris.

58, r. de Miromesnil, Paris.

1, bd Henri-IV, Paris.

à Vienne (Isère).

à Lorient.

7, r. Biscornet, Paris.

- Biomagnésium** 20, fg St-Honoré, Paris.  
**Bionergyl** 16, r. St-Gilles, Paris.  
**Bionucléine** 4, imp. de Béarn, Paris.  
**\*Biophorine Girard** 48, r. d'Alésia, Paris.  
**Biophosphine** DEPOUILLY, Le Creusot.  
**Biophylactine** 116, av. Berthelot, Vienne (Isère).  
**\*Biophytol** 90, av. des Ternes, Paris.  
**\*Bioplasmyl** LE DAVAY, 2, r. Notre-Dame, Guingamp (Côtes-du-Nord).  
**Bioplastina Serono** 6, r. des Ursulines, Paris.  
**\*Biopulmol** Lab. Termes, Miramont de Guyenne (Lot-et-Garonne).  
**Bio-Sel** COUENON, Lamalou (Hérault).  
**\*Biosine le Perdriel** 11, r. Milton, Paris.  
**Biotose Ciba** 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.  
**\*Biotrignon** 8, r. Pierre-Girard, Paris.  
**Bioxyol** Hussigny (M.-et-M.).  
**Biozol** 25, r. Drouot, Paris.  
**Biquinyl Meurice** Union Chimique Belge, 61, av. Louise, Bruxelles.  
**Bircol Mauchant** 14, r. de Birague, Paris.  
**Bi-Ricin** 72, route de Châtillon, Malakoff.  
**Bi Roche** 21, pl. des Vosges, Paris.  
**Biscam-Gabail** 5, r. Lefebvre, Paris.  
**Biscals Fraudin** 4, av. Desfeux, Boul.-sur-Seine.  
**Biscopaks Clin** 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.  
**Biscottes Delft** 45, r. Grange-aux-Belles, Paris.  
**Biscottes Grégoire** 24, r. du Bois, Clichy (Seine).  
**Biscottes Rabiet** 55, ch. d'Antin, Paris.  
**Biscuits régénérateurs du Dr J. Brown** 44, r. Damrémont, Paris.  
**Bisermol** VIGIER, 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.  
**\*Bis-ka-ma** DURET & REMY, Asnières (Seine).  
**Bismétine Clin** 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.  
**\*Bismhydral** LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris.  
**Bismupaine** 194, r. de Rivoli, Paris.  
**\*Bismusodine** 60, r. Auguste-Comte, Lyon.  
**\*Bismutartrol** RAVAUD, 6, pl. de Breteuil, Paris.  
**\*Bismuth Desleaux** 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.  
**Bismuth léger Adrian** 9, r. de la Perle, Paris.  
**Bismuth Perroud** 7, r. des Archers, Lyon.  
**\*Bismuth Tulasne** 68, bd Malesherbes, Paris.  
**Bismuth 25** OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
**\*Bismuth du Dr Quesneville** 12, r. de Buci, Paris.  
**\*Bismuthion Couturieux** 18, av. Hoche, Paris (XVI<sup>e</sup>).  
**\*Bismuthoïdol Robin** 13, r. de Poissy, Paris.

- Bismuthyl « Meurice »** 61, av. Louise, Bruxelles.  
**Bisquina** GAUTIER, 13, r. Dorian, Paris.  
**Bissine** DECAUD, St-Hilaire-des-Loges (Vendée).  
**\*Bissol** GAUTIER, 13, r. Dorian, Paris.  
**\*Bivatol** Lab. Chimiothérapie, 89, r. du Cherche-Midi, Paris.  
**Bivigor** SCOTT, 38, r. du Mont-Thabor, Paris.  
**Blastéase** 21, pl. des Vosges, Paris.  
**Blécao Jacquemaire** à Villefranche (Rhône).  
**\*Blédine Jacquemaire** à Villefranche (Rhône).  
**\*Blennopiat** GIROUD, 78, c. de la Liberté, Lyon.  
**\*Blennosine** INSTITUT de MICROBIOLOGIE, Sarrebruck et 23, r. du Caire, Paris.  
**Blennotoxyl** 172, r. d'Alésia, Paris.  
**Bléomaltine** AXAREL, 15, r. Catulienne, St-Denis (Seine).  
**Blocs Vécór** 64, r. de la Folie-Méricourt, Paris.  
**Blokao** BLOCH, à Tomblaine (M.-et-M.).  
**Bluetine** MEILLER,umières (Haute-Loire).  
**Bokanol** 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.  
**Bolcitol** 18, r. Ferdinand-Flocon, Paris.  
**\*Boldine Houdé** 9, r. Dieu, Paris.  
**Boldo-Basma** 9, pl. Félix-Faure, Paris.  
**Boldo Glucine Chapoteaut** 8, r. Vivienne, Paris.  
**\*Boldo-Gmet** 27, fg Montmartre, Paris.  
**Boldoïne Eparvier** 26, Grande-Rue St-Clair, Lyon.  
**\*Boldolactol** A. SALLES, 11, bd de Strasbourg, Paris (X<sup>e</sup>).  
**\*Boldorhéine** D<sup>r</sup> CHAPELLE, 8, r. Vivienne, Paris.  
**\*Boldo-Verne** à Grenoble (Isère).  
**\*Boléase Monal** 6, r. Bridaine, Paris.  
**Bolène Lambda** 95, bd Magenta, Paris.  
**Bonbons Lucas (Vermifuges)** JOUBERT & SIBASSIÉ, Nantes.  
**Bonbons vermifuges Royer** LAUMONNIER, 225, r. St-Martin, Paris.  
**\*Boréol** 21, r. Feydeau, Paris.  
**\*Boricine Meissonnier** LOGEAI, 22 bis, r. de Silly, Boulogne-sur-Seine.  
**Bornyval** 2, r. des Lions, Paris.  
**Boro-borax Vigier** 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.  
**\*Borocalcyl Thévenot** 21, r. des Roses, Dijon.  
**\*Borosodine Lumière** 23, c. Liberté, Lyon.  
**\*Borostyrol** MAYOLI, 1, pl. Victor-Hugo, Paris.  
**Borotropine Sevin** 6, r. Chevallier-de-la-Barre, St-Quentin.



- \*Bouchons Radioactifs Emania 14, r. de la Pépinière, Paris.
- \*Boues Radioactives Emania 14, r. de la Pépinière, Paris.
- Boues Radioactives de Putejan - les - Bains (Tchécoslovaquie). 45, r. du Marché, Neuilly.
- Boues radioactives Rhemda 51, r. d'Alsace, Courbevoie.
- Bougies Américaines LOGEAI, 24, r., de Silly, Boulogne-sur-Seine.
- Bougies Chaumel 78, fg St-Denis, Paris.
- Bougies radioactives Rhemda 51, r. d'Alsace, Courbevoie.
- Bougies Raynal 12, r. de Nice, Paris.
- \*Boules Quiès 47, bd Victor, Paris (XV<sup>e</sup>).
- Bouragar BONNAURE, à Alès (Gard).
- Bourgène Blanc CELLIER, 8, r. de Loge, Montpellier.
- \*Bouteilles Radioactives Emania 14, r. de la Pépinière, Paris.
- Bovavèna Bourg-la-Reine (Seine).
- Bov'Cardiac FUMOUE, 78, fg St-Denis, Paris.
- Bov'Bilic id.
- Bov'hepatic id.
- Bradygastrine DUCLOY et C<sup>ie</sup>, Arques (P.-de Calais).
- Brévanyl 15, q. de Bourbon, Paris.
- \*Bridas-les-Bains 46, r. Pierre-Charron, Paris.
- Bridia id.
- \*Bromadyl Vicario 17, bd Haussmann, Paris.
- Bromalbin Adrian 9, r. de la Perle, Paris.
- \*Broméine Montagu 49, bd Port-Royal, Paris.
- Bromhyl P. Peyre 42, av. de Breteuil, Paris.
- \*Bromiase Couturieux 18, av. Hoche, Paris.
- Bromidia 5, r. de la Paix, Paris.
- Bromidine Henry 39, r. Sclessin, Liège.
- Bromocarpine Rocher 32, r. Grenelle, Paris.
- Bromogastrine 4, imp. de Béarn, Paris.
- \*Bromogénol Pépin. à Courbevoie (Seine).
- \*Bromomaisine 6, r. Rosenwald, Paris.
- \*Bromone Robin 13, r. de Poissy, Paris.
- Bromopirine PATRICE, à Vichy.
- \*Bromostrontiane MERMINOD, 49, r. du Paradis, Paris.
- Bromovaleron Henry 39, r. Sclessin, Liège.
- \*Bromovose Lab. MADYL, 14, r. Miro-mesnil, Paris.
- Bromure de camphre Clin 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- Bromure d'éthyle OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- Bromure Laroze 2, r. des Lions, Paris.
- Bromures Pachaut 130, bd Haussmann, Paris.

- Bromure de sodium du**  
**D<sup>r</sup> Gigon**  
 \***Bromures Souffron**  
 \***Bronchitol**  
**Broncho-Baume**  
 \***Bronchodermine**  
 \ **Bronchogénine**  
**Bronchoplastre**  
**Bronchoseptol**  
 \***Broncosol**  
**Brôséyl**  
**Brunyl**  
**Bucchu-Basma**  
**Buccochlore**  
 \***Bucmine**  
**Buétol Paris**  
 \***Bulgarine Thépénier**  
**Bulles d'Haley**  
 \***Bursol**  
**Bylierine**
- 25, bd Beaumarchais, Paris.  
 157, r. de Sèvres, Paris.  
 H. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.  
 34, r. Turgot, Narbonne.  
 34, bd de Olichy, Paris.  
 229, c. Gambetta, Lyon.  
 CAVAILLES, 34, r. Turin, Paris.  
 Lab. E. LAURIAT, à la  
 Garenne-Colombes (Seine).  
 Lab. BRÉSIL, 12, r. St-Gilles,  
 Paris.  
 40, r. des Acacias, Paris.  
 17, r. de Berri, Paris.  
 9 pl. Félix-Faure, Paris.  
 BEAUCHAMP, 5, c. St-Louis,  
 Marseille.  
 WARIN, 4, ch. de la Muette,  
 Paris.  
 4, r. Lamotte-Picquet, Paris.  
 12, r. Clapeyron, Paris.  
 60, r. St-Guilhem, Montpellier.  
 COUSSINET, 20, r. des Mar-  
 tyrs, Paris.  
 37, r. de Marly, Rueil (S.-et-O.).

## C

- \***C. 40 Drouet et Plet**  
**Cachets Adol**  
**Cachets antigrippe**  
**Cachets Atlantis**  
**Cachets Canol**  
 \***Cachets du D<sup>r</sup> Boveil**  
**Cachets C. A. S.**  
**Cachets Céli**  
**Cachets Charvoz**  
 \***Cachets Cy-trône**  
**Cachets Dellé**  
**Cachets digestifs du**  
**D<sup>r</sup> Bern**
- 37, r. Marly, Rueil (Seine).  
 GIROUD, 78, c. de la Liberté,  
 Lyon.  
 D<sup>r</sup> FLAMAND, 6, pl. Olichy,  
 Paris.  
 66, r. Paradis, Marseille.  
 5, r. des Lyonnais, Paris.  
 1, r. Lassalle, Lyon.  
 49, r. de Metz, Nancy.  
 LANDES, à Gramat (Lot).  
 3, chem. du Vallon, Lyon-  
 Caluire (Rhône).  
 Lab. de l'Adour, 38, r. Soult,  
 Tarbes.  
 LENAOUR, à Quimperlé (Finis-  
 tère).  
 3, pl. Intérieure St-Michel,  
 Toulouse.

- Cachets du D<sup>r</sup> Ducoq** Usine du Blosser, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- Cachets du D<sup>r</sup> Faivre** à Lyon.
- Cachets Fercocq** 16, r. Maison-Brûlée, St-Maur.
- Cachets Gau** 87, r. de la République, St-Mandé (Seine).
- \*Cachets Kanytan** 76, r. de Sèvres, Paris.
- Cachets minéralg** Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- Cachets opothérapiques Byla** 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- Cachets Pachaut** 130, bd Haussmann, Paris.
- Cachets parégoriques** BERNHARD, 11, r. Lafayette, Paris.
- Cachets Prodiges** 12, r. Grande, Evreux.
- Cachets Pyrana** 26, ch. de la Madeleine, Nantes.
- \*Cachets réparateurs** HÉRIN, 228, r. de Lille, La Madeleine.
- \*Cachets Roche de Thiocol** HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, 21, pl. des Vosges, Paris.
- Cachets de Roux** 56, r. des Minimes, Marseille.
- Cachets Tugrip** Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- Cacodylate Vigier** 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
- \*Cacodyle Gonnon** 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
- Cacodyle Mars** 21, r. Alsace-Lorraine, Lyon.
- \*Cacodyline Jammes** 86, r. Michel-Ange, Paris.
- Cacocylo Phosphate vital Jacquematre** à Villefranche (Rhône).
- Cacticardine D<sup>r</sup> Conraux** à Caudebec (Seine-Inférieure).
- Cæcaline Gagnière** à Clermont-Ferrand.
- Cafacétyl-Codéine** BÉGLIN, 26, r. Ste-Claire, Mulhouse.
- Caféine Houdé** 9, r. Dieu, Paris.
- \*Caféine Invar** 21, r. Nonnains d'Hyères, Paris.
- Cafiodine** 25, r. Petits-Hôtels, Paris.
- Calcéose Boillot** 9, r. St-Paul, Paris.
- Calciclo** 4, imp. de Béarn, Paris.
- \*Calcifixine Bureau** 86, bd Port-Royal, Paris.
- Calcigénie** 88, bd St-Denis, Courbevoie (Seine).
- Calciline** 21, r. Violet, Paris.
- \*Calcional** LEMATTE & BOINOT, 52, r. La Bruyère, Paris.
- Calci-Ostéline** 46, r. Claude-Lorrain, Lille.
- Calcitanol** 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
- Calcitine** DIGNE fils à Fréjus (Var).
- \*Calcium Sandoz** 3-5, r. de Metz, Paris.
- Calco-céril** 16, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.
- \*Calcoléol** Produits SCIENTIA, 21, r. Chaptal, Paris.
- \*Calcomagnésie** 47, r. Bokanowski, Asnières.
- Calcophore** 6, r. Raoul-Berton, Bagnolet.

**Calcothéobromine**

**\*Calcozymase**

**\*Calmag. Na.**

**Calmigorge**

**Calmitine**

**\*Calmosuppos**

**Calogyre**

**\*Calomel Vicario**

**Calox**

**Camphemol**

**\*Camphodausse**

**Camphoral Aguetant**

**\*Campho - Spartéine**  
**Dubois**

**\*Camphostyl**

**\*Camphro-SalylFraisie**

**\*Camphydryl Robin**

**\*Cantéine Bouteille**

**\*Caoglands**

**\*Caparlem**

**Capillairai**

**\*Capsellase**

**Capsoléol**

**Capsorhinol**

**, Capsovules Diplos**

**\*Capsules Bardet**

**Capsules Bonnefond**

**\*Capsules Bruel**

**Capsules Cognet**

**\*Capsules Dartois**

**Capsules de Gonosan**

**Capsules d'Euviscol**

**Capsules Dieu**

**Capsules Enos**

**Capsules Goubaux**

**Capsules Gurgol**

**Capsules d'Hojasol**

**Capsules d'Ichtyol Vi-**  
**gier**

**\*Capsules Joret et Ho-**  
**molle**

**\*Capsules de Morrhuine**  
**Puy**

**\*Capsules Noguès**

49, r. de Paradis, Paris,  
32, quai Voltaire, Bezons (S.-et-  
Oise).

SUBSTANTIA, 13, r. Pagès,  
Suresnes.

à Thury-Harcourt (Calvados).

BILLEBAUD, Paray-le-Monial  
(S.-et-L.).

BOIVERT, La Mothe-St-  
Heraye (Deux-Sèvres).

IMBERT, à Toulon (Var).

17, bd Haussmann, Paris.

5, r. de la Paix, Paris.

1, pl. Morand, Lyon.

4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).

36, q. Fulchiron, Lyon.

52, r. Montesquieu, Asnières.

LACROIX, 37, r. Pajol, Paris.

8, r. Jasmin, Paris.

13, r. de Poissy, Paris.

23, r. des Moines, Paris.

10, r. Poncelet, Paris.

Lab. Lorrain de Pr. Synthé-  
tiques Purs, Etain (Meuse).

ARQUEVAUX, Etampes (S.-  
et-O.).

13, pl. Delille, Clermont-Fer-  
rand.

Lab. ANIMAT, à Nîmes (Gard).

17, r. Chomel, Paris.

18, r. Pierre-Curie, Paris.

76, r. de Sèvres, Paris.

49, bd Port-Royal, Paris.

36, r. de Paris, Colombes (Seine).

43, r. de Saintonge, Paris.

6, r. Abel, Paris.

2, r. des Lions, Paris.

44, r. d'Aguesseau, Boulogne-  
s.-Seine.

2, r. Marché des Blancs-Man-  
teaux, Paris.

Lab. BAPAUME, 85, av. de  
Neuilly, Neuilly-sur-Seine.

2, r. du Champ-de-Mars, Reims.

JEHAN & BRERA à Montau-  
ban (Lot-et-Garonne).

19, r. Ferdin.-Duval, Paris.

12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.

165, r. St-Honoré, Paris.

Grenoble (Isère).

11, r. Joseph-Bara, Paris.

- Capsules Ovigéniques** 50, r. de la République, Puteaux.  
**Capsules Pautauberge** 10, r. de Constantinople, Paris.  
**Capsules Pneumal** 172, r. d'Alésia, Paris.  
**\*Capsules Préga** DEHAUSSY, 66, r. Nationale, Lille.  
**\*Capsules Raquin** 78, fg St-Denis, Paris.  
**Capsules salolées** LACROIX, 31, r. Philippe-de-Girard, Paris.  
**Capsules Sérafon** 9, r. de la Perle, Paris.  
**\*Capsules Taetz** 2, r. Lesdiguières, Paris.  
**Capsules Therpinol** 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
**Capsules Vigier** 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.  
**Carbaine Clin** 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.  
**\*Carbiscalcoïdes** MONTAGU, 49, bd Port-Royal, Paris.  
**Carbarseno** 49, bd Port-Royal, Paris.  
**\*Carbatropine** id.  
**Carbeserine** 49, bd Port-Royal, Paris.  
**\*Carbocitrol** 64, bd Barbès, Paris.  
**Carboïodine** 18, av. Daumesnil, Paris.  
**\*Carbolactyl** 19, r. de Fleurus, Paris.  
**\*Carbolin** MIDY, 4, r. du Colonel-Moll, Paris.  
**Carbomagnesol** Lab. ASCO, 63, r. de Charonne, Paris.  
**\*Carbométine** 229, c. Gambetta, Lyon.  
**Carbonal** 14, r. Cantin, Courbevoie.  
**\*Carbonate de Bismuth** 3, r. Sébastien-Gryphe, Lyon.  
**Carbonate de Chaux** 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris.  
**Lancosme**  
**\*Carbonésie** 12, bd St-Martin, Paris.  
**\*Carbos** Lab. E. MILLET, Rambouillet (Seine-et-Oise).  
**\*Carbosanis** 49, bd Port-Royal, Paris.  
**\*Cardialgine Dubois** 16, bd Péreire, Paris.  
**\*Cardibaine** 6, r. d'Assas, Paris.  
**Cardiocrinol** Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.  
**\*Cardiosthénine** Dr CHAPELLE, 8, r. Vivienne, Paris.  
**Cardiotonic** GREMY, 14, r. Clichy, Paris.  
**Cardiotonine** COUDERT, 116, av. Ledru-Rollin, Paris.  
**Cardiotonine** OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
**\*Cardyl** SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.  
**\*Carminase** Produits FAYÈS, 199, r. St-Denis, Paris.  
**Carnéose Dr Spès** Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).  
**\*Carnine Lefrancq** 78, fg St-Denis, Paris.  
**\*Carypaïne** CROC, 57, av. Jean-Jaurès, St-Fons.  
**Cascara Alexandre** 41, r. de Rome, Paris.

- \*Cascara Midy  
 \*Cascarine Leprince  
 Caseoline Girard  
 Cassitol  
 \*Catalyl Mg.  
 Catalysine du D<sup>r</sup> Vi-  
 querat  
 \*Cataplasme du D<sup>r</sup> Le-  
 lièvre  
 Cataplasme Electrique  
 Morgin  
 Cataplasme Optima  
 \*Catéményl  
 Cathiode Brisson  
 Causyth  
 Ced roc.  
 Cédro-Méthyle  
 Cédryl  
 Cellopansements  
 Cellules Paret  
 Cemag  
 \*Centrosérum Grosjean  
 Cephcemétine  
 Cerdesol  
 \*Céréales-Bébé  
 \*Céréaline Tulivet  
 Céréalose  
 \*Cérébrine Fournier  
 Cérébrocrinol  
 \*Cérébroïl Leisyn  
 Cérébrosthénine Dalin  
 Cérédine Loudenot  
 Céréol Gigon  
 \*Céréossine  
 Cérévisine  
 \*Cérinil  
 \*Cériomine  
 Cersomine  
 Cervol  
 \*Cetemol  
 \*Cethocal  
 4, r. du Colonel-Moll, Paris.  
 62, r. de la Tour, Paris.  
 48, r. d'Alésia, Paris.  
 14, r. de Birague, Paris.  
 40, av. des Deux-Gares, Antony  
 (Seine).  
 FREYSSINGE, 6, r. Abel, Paris.  
 12, av. Grande-Armée, Paris,  
 (XVII<sup>e</sup>).  
 46, r. Dauphine, Paris.  
 gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
 D<sup>r</sup> G. LALAUURIE, à Cuxac-  
 d'Aude (Aude).  
 157, r. Championnet, Paris.  
 BOISSY, 49, r. Hoche, Cour-  
 bevoie (Seine).  
 19-21, r. Van-Loq, Paris.  
 PIALOUX, 55, r. de Chabrol,  
 Paris.  
 IMMUNOS, av. des Sources,  
 Nice.  
 La Cellophane, Bezons (S.-et-O.).  
 22, r. Guibal, Marseille.  
 D<sup>r</sup> LALAUURIE, Cuxac-d'Aude.  
 36, r. de Malte, Paris.  
 44, r. Gambetta, Biarritz.  
 18, r. Favart, Paris.  
 FAVRICHON, à St-Sympho-  
 rien-de-Lay (Loire).  
 52, r. de Poissy, St-Germain-en-  
 Laye.  
 Lab. ASTIER, 45, r. du  
 Docteur-Blanche, Paris.  
 147, bd Montparnasse, Paris.  
 Lab. ISCOVESCO, 107, r. des  
 Dames, Paris.  
 1 bis, r. Molitor, Paris.  
 49, quai St-Vincent, Lyon.  
 106, av. du Roule, Neuilly-sur-  
 Seine.  
 25, bd Beaumarchais, Paris.  
 DEHAUSSY, 66, r. Nationale,  
 Lille.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 16, r. Ste-Croix-de-la-Breton-  
 nière, Paris.  
 id.  
 18, r. Favart, Paris.  
 19, r. de Fleurus, Paris.  
 15, r. d'Argenteuil, Paris.  
 8 bis, r. J.-J.-Rousseau, Fonte-  
 nay-sous-Bois.

- \*Cétrarose Gigon 25, bd Beaumarchais, Paris (IV<sup>e</sup>).
- \*Charbon Fraudin 4, av. Desfeux, Boulogne-sur-Seine.
- \*Charbon Tissot 34, bd de Clichy, Paris.
- Chardyl Meurice 61, av. Louise, Bruxelles.
- Chaulmorhuat Po- 21, r. Marbeuf, Paris.
- maret
- \*Chéloïdine DORANTOWICZ, 17 bis, av. Parmentier, Paris.
- \*Chenanthol HINGLAIS, à Epernay.
- \*Chéralys comprimés 12, r. des Sts-Pères, Paris.
- Chlocçi L. ADAM, Granville (Manche).
- Chlomag 71, r. St-Jacques, Paris.
- Chlorakin 37, r. de Bourgogne, Paris.
- Chloral anisé Iida 17, r. du Bouloi, Paris.
- \*Chloral bromuré Du- DURIÉZ, 20, pl. des Vosges, bois Paris.
- \*Chloral-Geranée GROSJEAN, 36, r. de Malte, Paris.
- \*Chloralosane KUHLMANN, 145, bd Haussmann, Paris.
- \*Chloramine FREYSSINGE, 6, r. Abel, Paris.
- \*Chloraseptine OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- \*Chloréthyle Bengué 16, r. Ballu, Paris.
- \*Chlorhydropeptine Dr COIRRE, 5, bd Montparnassé, Paris.
- Chlorhydrol FOUCHÉ, Houdan (S.-et-O.).
- \*Chloridia Produits Dannech 64, r. des Tournelles, Paris.
- \*Chlorinol 40, r. des Acacias, Paris.
- \*Chlormagnésium Fisch 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
- \*Chlorobacilline TULIVET, St-Germain-en-Laye.
- \*Chlorobyl 46, av. des Ternes, Paris.
- \*Chloro-Calcion MICHELS, 9, r. Castex, Paris.
- Chloroforme anesthé- USINES DU RHONE, 86, r. sique Vieille-du-Temple, Paris.
- Chloroforme (am- OPTIMA, Gde-Rue au Bois, poules) Bruxelles.
- Chloroforme Lam - 20, r. Dumont d'Urville, Paris.
- biotte frères
- Chloroma 4, imp. de Béarn, Paris.
- \*Chloro-Magnésion 52, bd du Temple, Paris.
- \*Chlorosulfol Vigier 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
- Chlorure ammonium BRÉANT, 4, r. de Clichy, Paris P. L.
- Chlorurol PIALOUX, 55, r. de Chabrol, Paris.
- Chlory-choline 22, r. Morère, Paris.
- \*Cholécystine VINCENT, 14, av. Mac-Mahon, Paris.
- \*Choléine Camus DARRASSE, 7 à 13, r. St-Maurice, Nanterre (Seine).

**\*Choléine lactique**

Choléitoires Byla

**\*Cholélyse Carbou****\*Choléoboldine Thévenot****\*Choléo-Combretol****\*Choléokinase****\*Choléolactol Daguin****\*Cholergine**

Cholestériodine

**\*Choline Roche**

Cholotoxine

**\*Chophytol**Chromo - Thermo -  
Thérapie**\*Chrysemine**

Chymosine Fisch

**\*Cibalgine**

Cigares Gicquel

Cigarettes anti-asthm.

Cigarettes du Dr Cléry

Cigarettes Espic

Cigarettes Indiennes

Grimault

Cigarettes Schulze

**\*Cigarettes Zani**

Cimalvol

**\*Cimatryl****\*Cinalose**

Cineyl Grysa

**\*Cinnozyl Clin**

Cinol

**\*Cipromarol**

Citrase du Dr Gigon

Citrase

Citraspirine

**\*Citrocarbine****\*Citrofluyl****\*Citrolargol****\*Citropaine**

Citropeptol

Citrosalol

**\*Citrosodine**

Citro-thymo}

DARRASSE, 7 à 13, r. St-Maurice, Nanterre (Seine).

26, av. de l'Observatoire, Paris.

8, r. Jean-du-Bellay, Paris.

21, r. des Roses, Dijon.

37, r. de la Fédération, Paris

DURET & RÉMY, Asnières  
(Seine).

5, r. des Remises, St-Maur.

8, r. de la Source, Paris.

52, r. La Bruyère, Paris.

21, pl. des Vosges, Paris.

CHAUMONT-CAZALS, à Vichy  
(Allier).

ROSA, 1 pl. Champerret, Paris.

12, av. du Maine, Paris.

15, r. d'Argenteuil, Paris.

4, r. d'Illzach, Mulhouse.

Lab. CIBA, 109-113. bd de la  
Part-Dieu, Lyon.Produits DANNÉCH, 64, r. des  
Tournelles, Paris.ESCOUFLAIRE, Baisieux  
(Nord).

18, r. de Maubeuge, Paris.

20, r. St-Lazare, Paris.

8, r. Vivienne, Paris.

44, r. d'Aguesseau, Boulogne-  
s.-Seine.52, r. de Poissy, St-Germain-  
en-Laye.

3, bd Beaumarchais, Paris.

4, pl. Royale, Nantes.

TAVERNIER, 32 r. de l'Ouest,  
Paris.

7, r. St-André, Le Mans (Sarthe).

20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.

Lab. IMMUNOS, av. des  
Sources, Nice.

12, r. de la République, Puteaux.

25, bd Beaumarchais, Paris.

37, r. de Bourgogne, Paris.

22, bd Sébastopol, Paris.

WARIN, 4, ch. de la Muette,  
Paris.

4, ch. de la Muette, Paris.

LEBEAULT, 5, r. Bourg-l'Abbé,  
Paris (III<sup>e</sup>).

304, r. St-Jacques, Paris.

80, r. du Rocher, Paris.

57 bis, av. Motte-Picquet, Paris.

34, r. Sedaine, Paris.

49, r. de Bitche, Courbevoie.



- Citrovanille**  
**\*Clisémine Longuet**  
**\*Clonazone Daufresne**  
**Cloranol**  
**\*Clupéyl**
- Coagulène Ciba**  
**\*Coaltar Le Beuf**  
**Coca Gmet**  
**\*Cocaïne Midy**  
**Coccidal Grémy**  
**Codarsyl**
- \*Codocol**  
**\*Codoforme Bottu**  
**Colargyl**  
**Colarsé**  
**Colchiflor Vial**  
**\*Colchi-Sal Midy**  
**\*Colitique**  
**Collo-Bacilline**  
**Collobiases Dausse**  
**Colloïdes Amicros**  
**Colloïdes Clin**  
**\*Colloïdine**  
**\*Colloïdogénine**  
**Colloïl Leisyn**  
**\*Collo-iode Dubois**  
**Colloïxols (Voir : Complexes colloïdaux)**  
**Collophérine Bapt**  
**Collosol Pépin**  
**Collothiol**  
**\*Colluborine**  
**\*Collutoire V.-E. Doumer**  
**\*Collyres Chibret**
- Collyre des Alpes Vica-rio**  
**Collyres stérilisés Clin**  
**Coloplastre**  
**Coluval**  
**Combrétine Boquillon**  
**\*Comitiol**
- \*Complexes colloïdaux Dr Riquoir**  
**\*Complextraits**
- \*Composé Gmet**  
**\*Compressif Beslier**  
**\*Comprisés Adrian**  
**\*Comprisés d'Alibour**
- LENOIR, 5, r. Ste-Isaure, Paris.**  
**34, r. Sedaine, Paris.**  
**40, r. Thiers, Le Havre.**  
**58, r. Miromesnil, Paris.**  
**Pharmacie PANIER, à Malolles-Bains.**  
**13, bd de la Part-Dieu, Lyon.**  
**11, r. Milton, Paris.**  
**27, fg Montmartre, Paris.**  
**4, r. du Colonel-Moll, Paris.**  
**14, r. de Clichy, Paris.**  
**DUBOIS, 52, r. Montesquieu, Asnières.**  
**20, r. des Martyrs, Paris.**  
**35, r. Pergolèse, Paris.**  
**49, r. de Bitché, Courbevoie.**  
**49, r. Thiers, Boulogne-s.-Mer.**  
**8, r. Vivienne, Paris.**  
**4, r. du Colonel-Moll, Paris.**  
**41 à 47, r. du Dr-Blanche, Paris.**  
**11, r. Mansart, Paris.**  
**4, r. Aubriot, Paris.**  
**9, bd Edgard-Quinet, Paris.**  
**20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.**  
**LALEUF, 20, r. de Laos, Paris.**  
**10, r. de l'Orne, Paris (XV<sup>e</sup>).**  
**1 bis, r. Molitor, Paris.**  
**16, bd Péreire, Paris.**  
**49, r. de Paradis, Paris.**
- 4, r. de l'Alma, Asnières.**  
**116, bd Haussmann, Paris.**  
**20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.**  
**223, r. St-Martin, Paris.**  
**BOMEL, Annonay (Ardèche).**
- 5, r. St-Hérem, Clermont-Ferrand.**  
**17, bd Haussmann, Paris.**
- 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.**  
**34, r. de Turin, Paris.**  
**5, r. de la Paix, Paris.**  
**12, r. de Nice, Paris.**  
**GRORICHARD, 12, pl. de la Révolution, Besançon.**  
**Etabl. MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.**  
**HUCKEL, à Héricourt (Haute-Saône)**  
**27, fg Montmartre, Paris.**  
**COQUELU, Digoïn (S.-et-L.).**  
**9, r. de la Perle, Paris.**  
**DURET & RÉMY, à Asnières (Seine).**

- Comprimés Alla**
- Comprimés Anta**
- \* Comprimés Aqua Pura**
- Comprimés Chéralys**
- Comprimés de Gibert**
- Comprimés Galac**
- Comprimés Garga**
- Comprimés Guillaumin**
- \* Comprimés gynécologiques Merminod**
- Comprimés Kléos**
- Comprimés Maver**
- Comprimés Néothorium Millot**
- \* Comprimés Neyret**
- \* Comprimés de Panto-laxine du Dr Boveil**
- Comprimés du Prof. Pénieres**
- Comprimés Roy**
- \* Comprimés Salvé**
- \* Comprimés de Thiocol Roche**
- Comprimés Ultraspi-rine**
- \* Comprimés Vichy-Etat**
- Conarsynol**
- Condurango Gmet**
- Condurango granulé Astier**
- Conhydrargol**
- \* Conjonctol**
- Convallamarine**
- Copraxe**
- Coqluplaste**
- Coqueluchyl**
- \* Coramine**
- \* Coréine**
- Corps Thyroïde Mon-cour**
- Coryza-Ouate**
- Cosmargyre**
- \* Gratægine**
- LAPEYRE, Neuvic-s.-l'Isle (Dordogne).**
- 178, r. Montmartre, Paris.
- ROBERT & CARRIERE, 37, r. de Bourgogne, Paris.**
- 12, r. des Saints-Pères, Paris.
- 19, r. d'Aubagne, Marseille.
- LAMBERT, pl. du Chatelet, Orléans.**
- OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.**
- 13, r. Cherche-Midi, Paris.
- 49, r. du Paradis, Paris.
- 2, r. des Cordeliers, Meung-sur-Loir.
- Etabl. WOLLACKER & C<sup>ie</sup>, 31, r. St-Georges, Paris.**
- 54, r. de la Bienfaisance, Paris.
- 35, r. de la Bourse, Lyon.
- 1, r. Lassalle, à Lyon.
- COUPAT, Ussel (Corrèze),**
- 81, bd Suchet, Paris.
- Lab. RICHER, 7, av. Marceau, Paris.**
- HOFFMANN-LA ROCHE, 31, pl. des Vosges, Paris.**
- Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).**
- G. PRUNIER & C<sup>ie</sup>, 4, r. de la Coutellerie, Paris.**
- 12, pl. Puget, Toulon.
- 27, fg Montmartre, Paris.
- 45, r. du Docteur-Blanche, Paris.
- 12, pl. Puget, Toulon.
- Lab. des Etabl. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.**
- DEGLAUDE, 6, r. d'Assas, Paris.**
- 77, bd de Grenelle, Paris.
- COQUELU, Digoïn (S.-et-L.).**
- 3, r. du Pont, à Epinal.
- Lab. CIBA, 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.**
- 8, r. de la Source, Paris.
- à Boulogne-sur-Seine.
- 14, av. de Paris, Biarritz.
- THÉVENOT, 21, r. des Roses, Dijon.**
- 46, r. de la Barrière, Elbeuf.

- Cratægol**  
**Cratægus Bocquillon**  
 \***Cratægus Gmet**  
 \***Crayons Antifissure**  
**Crayon à la chrysarobine Vigier**  
**Crayons Chaumel**  
**Grayons néothorium Millot**  
 \***Créagenol Corbière**  
 \***Crédone Dehaussy**  
**Crémasepta**  
 \***Crème de Bismuth Quesneville**  
**Crème de lainine Vigier**  
**Crème de Sapolan**  
 \***Crème Graziana**  
 \***Crème résolutive du Dr Rap**  
**Crémo-plastol Dumesnil**  
**Créoformine**  
 \***Créoline Pearson**  
 \***Créosol Dubois**  
 \***Créosoforme Lam-biotte Frères**  
 \***Créosote soluble Vacheron**  
 \***Crescol**  
 \***Crésentyl**  
 \***Crésopirine**  
 \***Crésyl Jeyes**  
**Crinocalcine**  
 \***Crisalbine**  
  
 \***Cristolax**  
  
**Croquettes Marida**  
 \***Cryogénine Lumière**  
 \***Cryptargol Lumière**  
**Crypthermol**  
 \***Crypthiol**  
  
 \***Crysiodal**  
  
**Crystol**  
**Cupranine Léger**  
**Cuprase-Ducatte**  
**Cupressus Dausse**  
**Cuprifer**  
**Cuprion Couturieux**  
**Cuprocithine**
- 14, r. Eug.-Delacroix, Paris.  
 10, r. du Bac, Paris.  
 27, fg Montmartre, Paris.  
 DOMERGUE, Agen (L.-et-G.).  
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.  
  
 78, fg St-Denis, Paris.  
 54, av. de la Bienfaisance, Paris.  
  
 27, r. Desrenaudes, Paris.  
 66, r. Nationale, Lille.  
 Dr LALAURIE, Cuxac-d'Aude.  
 12, r. de Buci, Paris.  
  
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.  
  
 34, r. de Turin, Paris.  
 15, r. Catulienne, St-Denis.  
 34, r. de Turin, Paris.  
  
 10, r. du Plâtre, Paris.  
  
 18, r. de Jouvence, Dijon.  
 J. MIDY, 41, r. de Courbevoie, La Garenne (Seine).  
 20, r. du Laos, Paris.  
 20, r. Dumont-d'Urville, Paris (XVI<sup>e</sup>).  
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
  
 157, r. de Sèvres, Paris.  
 1, pl. Lucien-Herr, Paris.  
 2, pl. des Vosges, Paris (IV<sup>e</sup>).  
 35, r. de Fr.-Bourgeois, Paris.  
 HATIER, à St-Etienne.  
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.  
 151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine).  
 1, Jardin-Anglais, Le Raincy.  
 23, c. de la Liberté, Lyon.  
 23, c. de la Liberté, Lyon.  
 6, r. Nationale, Lille.  
 RENARD, 35, rue de Paris, Clichy (Seine).  
 La Biothérapie, 131, r. Cambronne, Paris.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 2, bd de Russie, Vichy.  
 191, r. St-Honoré, Paris.  
 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).  
 à La Ferté-Macé (Orne).  
 18, av. Hoche, Paris.  
 GREMY, 14, r. Clichy, Paris.

**Curaluès D<sup>r</sup> Lafay**

**Curatyl Laennec**

- \*Curatine Brunet
- \*Curatoxine
- Curgol Vicario
- \*Curiode
- \*Curiosan
- Curocalcine
- \*Curogène
- \*Curovaccins atoxiques  
Cépède (Voir Vaccinothérapie)
- \*Curoxyure
- Cuscutine Foulon
- Custodine
- Cyanargyre

**Cyanaulol du D<sup>r</sup> Gigon**

- \*Cyanhermine
- Cyanhermyl Dalin
- Cyanure Ercé
- Cynarine Estèbe
- \*Cynulol Rosa
- Cypridol
- Cystitol
- \*Cytobiase
- \*Cyto-choline Corbière
- \*Cyto-Manganol

**Cytopan**

**Cytoplasmine Ducatte**

**Cytosal**

- \*Cyto-Serum Corbière
- Cytotropines

**Cytuline Couturieux**

**LECOQ & FERRAND, 54, ch. d'Antin, Paris.**

**COUDERT, 116, av. Ledru-Rollin, Paris.**

23, r. des Ecoiffes, Paris.

114, r. du Temple, Paris.

17, bd Haussmann, Paris.

17 bis, av. Parmentier, Paris.

156, r. Fauvelles, Courbevoie.

11, bd de Strasbourg, Paris.

18, r. des Tribunes, Versailles.

60, r. Mathurin-Régnier, Paris.

Lab. B. E. A., Belfort.

Ermont (S.-et-O.).

19, r. St-Bazile, Marseille.

**GUILLAUMIN, 13, r. du Cherche-Midi, Paris.**

25, bd Beaumarchais, Paris.

37, r. de la Fédération, Paris.

1, r. de la Martinière, Lyon.

37, r. de Bourgogne, Paris.

à Villefranche-du-Lauragais.

1, pl. Champerret, Paris.

8, r. Vivienne, Paris.

57, r. du Cherche-Midi, Paris.

24, r. de Charenton, Paris.

27, r. Desrenaudes, Paris.

**CORBIÈRE, 27, r. Desrenaudes, Paris.**

54, r. de Paris, Charenton.

8, pl. de la Madeleine, Paris.

54, r. St-Blaise, Paris (XX<sup>e</sup>).

27, r. Desrenaudes, Paris.

**FOURNIER (Fr.), 7, r. Bis-cornet, Paris.**

18, av. Hoche, Paris.

## D

**Daturasolène**

**Déclonal**

\*Deesrpa

2 pl. du Théâtre-Français, Paris.

**SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.**

41, r. de Rome, Paris.

- \*Delbiase 8, r. Vivienne, Paris.
- Delbosel 18, r. Vivienne, Paris.
- \*Delcaine Roques 36, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.
- Déméteros 163, r. de Flandre, Paris.
- Denisia Brisson 157, r. Championnet, Paris.
- Denisoline Brisson id.
- Dento Stalys 64, r. La Boétie, Paris.
- Dentoxyl HAUTDIDIER, 37, r. Galilée, Paris.
- Dépuratif Berry Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- Dépuratif Dubreuil 172, r. Alésia, Paris.
- Dépuratif Dumesnil 10, r. du Plâtre, Paris.
- \*Dépuratif Kromelinck 19, r. Drouot, Paris.
- \*Dépuratif Rob-Lechaux 49, r. de Maubeuge, Paris.
- Dépuratine 50, r. de la République, Puteaux.
- \*Dépuriode ANGELINI, 61, r. de Seine, Paris.
- Dépurlaxyl 229, cours Gambetta, Lyon.
- Dermadésine 41, r. St-Pierre, Caen.
- Dermajic R. MONIMART, 23, r. du Grand-Cerf, Meaux.
- Dermaline Corbière 27, r. Desrenaudes, Paris.
- Dermathorium Rhem-da 51, r. d'Alsace, Courbevoie.
- Dermodiol 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse
- \*Dermodulcis 229, cours Gambetta, Lyon.
- \*Dermofagine 15, pl. Godefroy-de-Bouillon, Boulogne-sur-Mer.
- Dermogène 10, r. de l'Union, Clichy.
- \*Dermoplastol 10, r. du Plâtre, Paris.
- Dermopode Evreux (Eure).
- \*Dermoradol Établ. LABORADIUM, 33, r. St-Jacques, Paris.
- \*Dermo-rhinistol ROLLAND, 88, r. de la Villette, Paris.
- \*Dermo-Stalys 64, r. La Boétie, Paris,,
- Dermotyol Le Naour, Quimperlé (Finistère).
- \*Désensibilysine BÉLIERES, 19, r. Drouot, Paris.
- \*Desitin Établ. MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.
- Détensyl av. Walkanaer, Nice.
- \*Détergine D<sup>r</sup> BOURDEAU, à Parthenay.
- Diabésia 50, r. de la République, Puteaux.
- \*Diabétifuge 21, r. Chaptal, Paris.
- \*Diabétuline V. CHARRET-TOMASI, St-Just-sur-Loire (Loire).
- \*Diachusine 142, r. de Picpus, Paris.
- (Voir Vernis à la Diachusine.)
- \*Diadermine 12, r. Vavin, Paris.
- \*Dial Ciba 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.

- \*Dialacétine Ciba** 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- \*Dialyl Brunot** 16, r. Boulainvilliers, Paris.
- Dialyses Golaz** 4, r. Bellart, Paris.
- Diardyscol** 86, bd Port-Royal, Paris.
- Diasana** 61, r. Vandamme, Paris.
- \*Diasclérol** 42, r. du Mont-Cenis.
- \*Diasés** 6, bd de Strasbourg, Paris.
- Diasténine Grémy** 14, r. de Clichy, Paris.
- \*Diastogène** DEHAUSSY, 66, r. Nationale, Lille.
- \*Diasto-Pepsine Richepin** Lab. Dr. TISSOT, 34, bd de Clichy, Paris.
- \*Diathermie** La Verrerie Scientifique, 12, av. du Maine, Paris.
- \*Dicaliode** 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
- \*Didial Ciba** 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- \*Diéménal** 18, r. de Beaune, Paris.
- \*Diénol** 18, r. de Beaune, Paris.
- \*Digalène Roche** 21, pl. des Vosges, Paris.
- Digeryl** 137, av. Parmentier, Paris.
- Digestif Capmartin** 2, r. Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris.
- \*Digestif Harvey** 101, av. de Paris, Rueil (S.-et-O.)
- Digestif Henry** 39, r. Sclessin, Liège.
- Digestif Pinel** à Bonnelles (Seine-et-Oise).
- Digestirol** 25, r. des Petits-Hôtels, Paris.
- \*Digestonic** Produits Scientia, 21, r. Chaptal, Paris.
- \*Digibaine Deglaude** 6, r. d'Assas, Paris.
- Digicardine** Lab. IMMUNOS, av. des Sources, Nice.
- \*Digifoline Ciba** 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- \*Digimialbaine** MIALHE, 8, r. Favart, Paris.
- Digistabiline** P. C. B., 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
- Digitale Dausse** 4, r. Aubriot, Paris.
- Digitale Écalé** 157, r. de Sèvres, Paris.
- Digitaline Homollé & Quévenne** 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- \*Digitaline cristallisée de Nativelle** 27, r. de la Procession, Paris.
- \*Digitaline cristallisée du Dr Mialhe** 8, r. Favart, Paris.
- \*Digitaline Invar** 21, r. Nonnains-d'Hyères, Paris.
- Digitalis Purpurea** OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- Dimétol Vicario** 17, bd Haussmann, Paris.
- Dimol** Bois-Colombes (Seine).
- Diocaïne** 113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- Diiodoforme Taine** 9, r. de la Perle, Paris.
- \*Dioradin** 37, r. de la Fédération, Paris.
- \*Dioséine Prunier** 1, quai Aulagnier, Asnières.

- Dippol**  
**Dismenine Henry**  
**Disménol**  
**\*Dismine Favrot**  
  
**\*Disolurane Vély**  
**Disurol**  
**Disuryl**  
**\*Ditagel**  
**Djurnal**  
  
**Diurédausse**  
**\*Diurégine**  
  
**\*Diurène**  
**Diuréol**  
  
**\*Diurétique Gmet**  
**Diurobromine**  
**\*Diurocalcine Gros**  
  
**Diurocardine**  
**Diurocystine**  
**Di-Uroiodine**  
**Dmégon (Néo)**  
  
**\*Dmelcos**  
**Dmesta (Néo)**  
**Dmetys (Néo)**  
  
**\*Doloma**  
**\*Dolophos**  
**Dolosol**  
**\*Dolysine Rochereau**  
**Dosarter**  
**Dosotol**  
**\*Dosurine (Trousses)**  
**Dozéol Deglaude**  
**\*Dragées Adrian**  
**Dragées anticatar-**  
**rhales**  
**\*Dragées Bengué**  
**Dragées Carbonel**  
**Dragées de Charbon**  
**Fraudin Magnesie**  
**Dragées de fer Cognet**  
**Dragées de fer Rabu-**  
**teau**  
**Dragées Demazières**  
**Dragées de Royat**  
  
**Dragées Dubourg**  
**Dragées Efgé**  
**\*Dragées Elkin**  
  
**\*Dragées ferro-ergotées**
- 87, r. Denfert-Rochereau, Paris.**  
**39, r. Sclessin, Liège.**  
**SAUTER, Bellegarde (Ain).**  
**Lab.H. FERRÉ, 6, r. Dombasle,**  
**Paris.**  
**132, av. Victor-Hugo, Paris.**  
**42, r. des Martyrs, Paris.**  
**23, r. des Moines, Paris.**  
**89, rue du Cherche-Midi, Paris.**  
**TORAUDE, 22, r. de la Sor-**  
**bonne, Paris.**  
**4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).**  
**CHARRET-TOMASI, St-Just-**  
**sur-Loire (Loire).**  
**15, r. d'Argenteuil, Paris.**  
**COUDERT, 116, av. Ledru-**  
**Rollin, Paris.**  
**27, fg Montmartre, Paris.**  
**285, av. Jean-Jaurès, Lyon.**  
**13, pl. Delille, Clermont-Fer-**  
**rand.**  
**285, av. Jean-Jaurès, Lyon.**  
**285, av. Jean-Jaurès, Lyon.**  
**45, bd Lafayette, Calais.**  
**SPECIA, 86, r. Vieille-du-**  
**Temple, Paris.**  
**id.**  
**id.**  
**id.**  
**29, pl. Bossuet, Dijon.**  
**COLMANT, à Caudry (Nord).**  
**FOIRET, à Montargis (Loiret).**  
**Salbris (L.-et-Ch.).**  
**156, r. des Fauvelles, Courbevoie.**  
**54, r. de Paris, Charenton,**  
**16, r. Charlemagne, Paris.**  
**6, r. d'Assas, Paris.**  
**9 et 11, r. de la Perle, Paris.**  
**6, r. Louis-Blanc, La Garenne-**  
**Colombes.**  
**16, r. Ballu, Paris.**  
**15, r. d'Argenteuil, Paris.**  
**4, av. Desfeux, Boulogne-s.-S.**  
  
**43, r. de Saintonge, Paris.**  
**COMAR & C<sup>ie</sup>, 20, r. des**  
**Fossés-St-Jacques, Paris.**  
**131, r. de Vaugirard, Paris.**  
**26, av. de Royat, Chamalières**  
**(P.-de-Dôme).**  
**43, r. de Saintonge, Paris.**  
**40, av. Secrétan, Paris.**  
**DEPRUNEAUX, 18, r. de**  
**Beaune, Paris.**  
**MANNET, Loudun (Vienne).**

- Dragées Fernel  
 \*Dragées Gélinau  
 Dragées Gesta  
 \*Dragées Gmet  
 Dragées Grimaud  
 \*Dragées du Dr Hecquet  
 Dragées hépatiques  
 Dragées d'iodurine  
 Dragées Japat  
 Dragées de Luchon  
 Dragées de Masthophilie Annic  
 \*Dragées Lumeval  
 Dragées menthol-box, cocaïne  
 \*Dragées Névrosthéniques « Yse »  
 Dragées Northon  
 Dragées Nyrthol  
 Dragées Pautauberge  
 Dragées de Prasion  
 Dragées Phlébos  
 Dragées pulmonaires Giry  
 Dragées St-André - Mayniel  
 Dragées Séranti  
 Dragées Somedo  
 Dragées Tasch  
 \*Dragées Tonicardiaques Le Brun  
 Droserine Merminod  
 \*Dryco (Lait sec)  
 Duodénase  
 Dusart sirop, solution  
 Dynabiose  
 Dynamocalcine  
 Dynamoferol  
 Dynergyl Féminy  
 Dynos  
 \*Dyspeptine Hepp  
 Dyspeptol  
 \*Dysthène
- 76, bd Haussmann, Paris.  
 MOUSNIER, 9, bd Carnot, Bourg-la-Reine.  
 43, av. la République, Paris.  
 27, fg Montmartre, Paris.  
 La Courtine (Creuse).  
 49, bd Port-Royal, Paris.  
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
 252, fg St-Martin, Paris.  
 21, r. Tronchet, Paris.  
 à Montbron (Charente).  
 52, bd du Temple, Paris.  
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
 65, r. Louis-Blanc, Paris.  
 CACHAT, Evian-les-Bains (Haute-Savoie).  
 12, r. de la République, Puteaux.  
 10, r. de Constantinople, Paris.  
 14, r. Eug.-Delacroix, Paris.  
 229, cours Gambetta, Lyon.  
 49, r. de Metz, Nancy.  
 85, r. Turbigo, Paris.  
 7 à 13, r. St-Maurice, Nanterre (Seine).  
 à Meudon (Seine-et-Oise).  
 4, r. d'Illzach, Mulhouse.  
 155, bd Magenta, Paris.  
 47, r. de Paradis, Paris.  
 3, r. St-Roch, Paris.  
 12, r. de Nice, Paris.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 6, r. d'Alsace, Grenoble.  
 CHAVIALLE, Sèvres (S.-et-O.).  
 PIALOUX, 55, r. de Chabrol, Paris.  
 COUDERT, 116, av. Ledru-Rollin, Paris.  
 4, imp. de Béarn, Paris.  
 Le Chesnay (Seine-et-Oise).  
 PATRICE, Vichy.  
 47, r. Bokanowski, Asnières.



## E

- Eatan**  
**Eau du Boulou**  
**Eaux de Châtel-Guyon**  
**Eau de Lorraine**  
  
**Eau d'Enghien**  
**Eau Sova**  
**Ebanyl**  
**Ectobiase Bonnay**  
  
**\*Eczéda**  
  
**Eczémacure**  
**\*Eczosec**  
  
**\*Edistol**  
**Edo-vaccins**  
  
**Edulcoral**  
**Egralene**  
  
**Eitreb-embrocation**  
  
**\*Ektogan**  
**\*Elastoplate**  
**\*Elatine Bouin**  
  
**\*Elbon Ciba**  
  
**\*Electrargol Clin**  
**Electrauro Clin**  
**\*Electrocuprol**  
**Electro Hg**  
**Electromanganol**  
**\*Electromartiol**  
**Electropalladiol**  
**Electro-platinol**  
**Electro-Rhodiol**  
**\*Electrosélénium**  
**\*Eleodermine**  
**\*Elgine Julien**  
**\*Elixir Bonjean**  
  
**Elixir Briel**  
**Elixir Bryol**
- 34, r. Vignon, Paris.  
 117, r. Beauducheu, Bordeaux.  
 6, sq. de l'Opéra, Paris.  
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.  
 10, r. Caumartin, Paris.  
 3, r. Volney, Paris.  
 59, r. Nollet, Paris.  
 112, Grande-Rue, Nogent-sur-  
 Marne (Seine).  
 35, r. des Blancs-Manteaux,  
 Paris.  
 121, av. St-Ouen, Paris.  
 35, r. des Blancs-Manteaux,  
 Paris.  
 40, r. des Carmes, Orléans.  
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-  
 Temple, Paris.  
 PATRICE, à Vichy.  
 P. BRISSON & C<sup>ie</sup>, 157, r.  
 Championnet, Paris.  
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.  
 12, r. Lamartine, Paris.  
 4, r. d'Illzack, Mulhouse.  
 44, r. d'Aguesseau, Boulogne-  
 sur-Seine.  
 109-113, bd de la Part-Dieu,  
 Lyon.  
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.  
 id.  
 COMAR & C<sup>ie</sup>, id.  
 COMAR & C<sup>ie</sup>, id.  
 COMAR & C<sup>ie</sup>, id.  
 COMAR & C<sup>ie</sup>, id.  
 COMAR & C<sup>ie</sup>, id.  
 COMAR & C<sup>ie</sup>, id.  
 COMAR & C<sup>ie</sup>, id.  
 COMAR & C<sup>ie</sup>, id.  
 38, r. Soult, Tarbes (H.-P.).  
 105, r. de Rennes, Paris.  
 FAURE & DUSSUEL, Aix-les-  
 Bains.  
 17, bd St-Marcel, Paris.  
 97, av. Ledru-Rollin, Paris.

- Elixir de Catéchiode**  
**\*Elixir Déret**
- Elixir digestif de pep-**  
**sine Grimault**  
**\*Elixir Duchamp**  
**\*Elixir Ducro**  
**Elixir Duret**  
**\*Elixir Dussaud**  
**\*Elixir eupeptique Tisy**
- Elixir eupnéique Mar-**  
**tin Mazade**  
**Elixir de fer Kœnig**  
**\*Elixir ferro ergoté**  
**Elixir Fleig**  
**Elixir Gelm**  
**Elixir Glassér**  
**Elixir Glover**  
**Elixir Godfrin**  
**\*Elixir Grez**  
**Elixir Hela**  
**Elixir hépatique Henry**  
**Elixir Houde**  
**\*Elixir Hymel**
- \*Elixir iodépuratif Pé-**  
**pin**  
**Elixir Mannet à l'Io-**  
**dure de Potassium**  
**Elixir Mannet à l'Io-**  
**dure de Sodium**  
**Elixir Mariani**  
**\*Elixir du Dr Mialhe**  
**Elixir de Pepto-Car-**  
**dine**  
**Elixir Percy**
- Elyxir polybromuré**  
**Baudry**  
**Elixir polybromuré**  
**Yvon**  
**\*Elixir Spark**  
**\*Elixir Spes**  
**Elixir supertonic Stel-**  
**la**  
**Elixir du Dr Thermes**
- \*Elixir thiogaïacolé Ar-**  
**quevaux**  
**Elixir tribomuré Man-**  
**net**  
**Elixir vermifuge Chia-**  
**rini**  
**Elixir Virenque**
- 16, r. du Petit-Musc, Paris.  
 COMAR & C<sup>ie</sup>, 20, r. des  
 Fossés-St-Jacques, Paris.  
 8, r. Vivienne, Paris.
- 16, r. Rocroy, Paris.  
 20, pl. des Vosges, Paris.  
 12, r. de Nice, Paris.  
 52, r. de Rome, Marseille.  
 VAUDIN & GUILLAUMIN,  
 12, r. Charles-V, Paris.  
 St-Raphaël (Var).
- 37, av. Marceau, Paris.  
 MANNET, Loudun (Vienne).  
 18, r. Ferdinand-Flocon, Paris.  
 Dr LALAUURIE, Cuxac-d'Aude.  
 à Turkeim (Haut-Mhin),  
 13, r. de Minimes, Paris.  
 6, r. de Paris, Joinville-le-Pont.  
 49, r. Maubeuge, Paris.  
 77, bd de Grenelle, Paris.  
 39, r. Sclessin, Liège.  
 9, r. Dieu, Paris.  
 DUTEIL, 90, av. de St-Ouen,  
 Paris.
- 146, bd Haussmann, Paris.  
 Loudun (Vienne).  
 Loudun (Vienne).
- 41, bd Haussmann, Paris.  
 8, r. Favart, Paris.  
 5, av. des Tilleuls, Paris.
- M. AUBANEL, Pointe-Rouge,  
 Marseille.  
 8, r. Vivienne, Paris.
- 5, r. de la Feuillade, Paris.
- 19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.  
 10, imp. Milord, Paris.  
 Usine du Blosset, Moulins-sur-  
 Yèvre (Cher).  
 Produits Dannech, 64, r. des  
 Tournelles, Paris.  
 Etampes (Seine-et-Oise).
- Loudun (Vienne).  
 Aix-en-Provence.
- 131, r. Vaugirard, Paris.

- \*Elixir de Virgine Nyr-dhal
- Elixir Vital Quentin
- \*Elkin Dragées et Granulés
- \*Elzévir Dentition
- Emapirine Toraude
- Embrocation Roche
- Embryonine du D<sup>r</sup> Barré
- \*Emerson's Bromo-Seltzer
- Emétinol Vié
- \*Emgé Lumière
- \*Emplatres R. Cavallès
- Emplâtre Duret
- Emulsion Bonnefond
- Emulsion Marchais
- Endocalcase
- Endocrisines Fournier
- \*Endopancrine
- Endoxidine
- Energétènes végétaux
- Byla
- Energetyl
- \*Energine Iodée de Berck
- \*Energine Phosphorée de Berck
- Energinoze D<sup>r</sup> Frayssé
- \*Enésol Glin
- Engeluröl
- \*Eniode Lefebvre
- Ennego
- Eno's Fruit Salt
- Entalva
- \*Enteralthine
- Entérième Brisson
- Entériode
- \*Entéro-Antigènes
- \*Enterobyl Dehaussy
- \*Entérohépatine
- Enteropraxines Abry
- \*Entéroseptyl Clérambourg
- \*Entérovaccin Lumière
- \*Entéroxin Leclerc
- Entérozone
- Entérozyme
- Enuczéma
- \*Enzypan
- 12, r. de la République, Puteaux.
- MOUSNIER, à Sceaux.
- DEPRUNEAUX, 18, r. de Beaune.
- H. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.
- 22, r. de la Sorbonne, Paris.
- 5, r. de la Paix, Paris.
- HAMEL, 10, pl. Thiers, Le Mans.
- 62, av. Champs-Élysées, Paris.
- 7, r. St-Yves, Rennes.
- 23, c. de la Liberté, Lyon.
- 34, r. de Turin, Paris (VIII<sup>e</sup>).
- 61, r. de Vaugirard, Paris.
- MONTAGU, 49, bd Port-Royal, Paris.
- 11, r. Mission-France, Marseille.
- 74, r. des Jacobins, Amiens.
- 7, r. Biscornet, Paris.
- 48, r. de la Procession, Paris.
- HUGUES, 105, bd Malesherbes, Paris.
- 26, av. l'Observatoire, Paris.
- 137, av. Parmentier, Paris.
- 21, r. St-Leu, Amiens.
- 21, r. St-Leu, Amiens.
- 47, r. de Neuilly, Nanterre.
- 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- 22, r. de Vienne, Paris.
- 2, r. Duphot, Paris.
- 37, r. de Bourgogne, Paris.
- 4<sup>ter</sup>, r. Barbès, Courbevoie.
- LUMIERE, 23, c. de la Liberté, Lyon.
- 3, r. Barquette, Paris (III<sup>e</sup>).
- 157, r. Championnet, Paris.
- 39, r. de Clichy, Paris.
- 31, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- 66, r. Nationale, Lille.
- 77, bd de Grenelle, Paris.
- 14, r. Gravel, Levallois-Perret.
- 10, r. St-Antoine, Paris.
- 23, c. de la Liberté, Lyon.
- 10, r. Vignon, Paris.
- 56, bd Pereire, Paris.
- 52, r. Labruyère, Paris.
- 53, r. Bourgogne, Orléans.
- ALEXANDRE, 41, r. de Romè, Paris.

Eparseno  
Ephédrine Béral  
Ephédrine Proba

\*Epholéine

\*Epicral

Epidosine Grémy  
Epoqualine François

\*Eranol

Erbamil

\*Erцерhinol

\*Ergorone

Ergot de seigle Dausse

Ergotine Bonjean

\*Ergotine Lamante

Ergotine Yvon

Ergotinine Tanret

Erystypticum Roche

\*Erythra Dyn

Erythroluès

Erséol Prunier

\*Esculéol

Eska

Essence Algérienne

Essence Japonaise

Estomon

Etain Amicros

Ether amyvalérianique

Ether anesthésique

Ether pour narcose

Ethervalérianique Vial

Ethoforme

Etoléase

\*Eubiol

Eucalcium

Eucalinhal

Eucalyptéol Anthoine

\*Eucalyptine Lebrun

\*Euchol

\*Eucytol

Eudermyl

\*Eudynol

\*Eufosyl Vély

\*Eugaline

86, r. Vieille-du-Temple, Paris.  
194, r. de Rivoli, Paris.

FALVY, 40, r. des Acacias,  
Paris.

id.

LAMBERT, 6, r. de Long-  
champ, Vichy.

14, r. de Clichy, Paris.

16, c. Gambetta, Lyon.

45, r. de l'Echiquier, Paris.

105, bd Malesherbes, Paris.

37, r. de Bourgogne, Paris.

SPECIA, 86, r. Vieille-du-  
Temple, Paris.

4, r. Aubriot, Paris.

99, r. d'Aboukir, Paris.

M. PARIS, 1, r. Lassalle, Lyon.

5, r. Lafeuillade, Paris.

10, r. du Commandant-Rivière,  
Paris.

21, pl. des Vosges, Paris.

5, r. Claude-Decaen, Paris.

LECOQ & FERRAND, 14, r  
Gravel, Levallois-Perret.

6, r. de la Tacherie, Paris.

16, r. Henri-Regnault, Cour-  
bevoie.

76, r. Orfila, Paris.

pl. de l'Entonnoir, Berck-Plage.

MAUGER, 79, r. Legendre,  
Paris.

5, r. de la Paix, Paris.

9, bd Edgard-Quinet, Paris.

G. BRUEL, 36, r. de Paris,  
Colombes (Seine).

SPÉCIA, 86, r. Vieille-du-  
Temple, Paris.

OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
Bruxelles.

8, r. Vivienne, Paris.

18, r. de Jouvence, Dijon.

CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).

116, av. Ledru-Rollin, Paris.

50, bd de Paris, Marseille.

228, r. de Lille, La Madeleine.

8, r. Vivienne, Paris.

155, boul. Magenta, Paris.

95, bd Magenta, Paris.

1, pl. Victor-Hugo, Paris.

4, imp. de Béarn, Paris.

F. CARTIER, 1, r. de la Mar-  
tinière, Lyon.

132, av. Victor-Hugo, Paris.

191, fg St-Antoine, Paris.

**\*Eugastrol**

Eugéine Prunier

Euglyma

**\*Eugynol Grandval**

Eukénol Clément

Eukinase Carrion

**\*Eumictine Leprince****\*Euonymine Thibault**

Eupatorine

**\*Eupaveryl**

Eupectoral

**\*Eupeptique Monavon****\*Euphon**

Euphonol Aguetant

**\*Euphorine, D<sup>r</sup> Chabaud**

Euphorol Loudenot

**\*Euphoryl**

Euphrénine Bastia

**\*Euphytose****\*Euplasmol**

Eupnéol

**\*Eupnine Vernade**

Eupnogénol

**\*Eurectol**

Euréka-Cooky

Euréka-Lax

Eurexine

Eurhéine

Eurhéose

**\*Euronal**

Eurythmine Dethan

**\*Eusomnine Bélières**

Eutectyl

**\*Eutensyl Grémy**

Evatmine Carrion

**\*Evine****\*Evolaxine**

Lab. BOUTROY, 8, r. de Passy, Paris.

6, r. de la Tacherie, Paris.

7, r. des Petits-Carreaux, Paris.

12 et 14, r. Féry, Reims.

7, pas. Thionville-Paris.

54, fg St-Honoré, Paris.

62, r. de la Tour, Paris.

6, r. Rosenwald, Paris.

Lab. d'Allopathie générale, Brignais (Rhône).

PACHAUT, 130, bd Haussmann, Paris.

ARQUEVAUX, Etampes (S.-et-Oise).

14, r. Victor-Hugo, Lyon.

1, pl. Victor-Hugo, Paris.

36, quai Fulchiron, Lyon.

FAURE et DUSSUEL, à Aix-les-Bains.

106, av. du Roule, Neuilly-sur-Seine.

114, r. du Temple, Paris.

1, pl. Carnot, Lyon.

Lab. MADYL, 14, r. de Miromesnil, Paris.

VALENTIN, 79, rue de Wazemmes, Lille.

THÉVENOT, 21, r. des Roses, Dijon.

7 à 13 r. St-Maurice, Nanterre (Seine).

116, av. Berthelot, Vienne (Isère).

PERROCHON, 57, r. Origet-Tours.

74, r. du Château, Boulogne-s.-Seine

74, r. du Château, Boulogne-sur-Seine.

D<sup>r</sup>-Petit, Angoulême.

7, pas. Thionville, Paris.

COUDERT, 116, av. Ledru-Rollin, Paris.

15, r. d'Argenteuil, Paris.

11, r. Al.-de-Neuville, Paris.

19, r. Drouot, Paris.

108, r. du Maréchal-Pétain, Vichy.

14, r. de Clichy, Paris.

54, fg St-Honoré, Paris.

3, r. de la Perle, Paris.

Lab. du D<sup>r</sup> LAURENT, GÉRARD, 40, r. de Bellechasse, Paris.

**\*Evonyl****Excytol****Exhepa****Exol Cognet****Exolysés Byla****\*Exonéról****\*Extrait de céréales  
Adrian****\*Extrait Hamyd****Extrait Juvinium****\*Extrait de Malt Fran-  
çais Déjardin****Extrait de Malt Grütli****Extrait du D<sup>r</sup> Rap****Extraits Montcour****Extraits totaux Choay  
Extrait surrenal Meu-  
rice****Extrait de Yogourth  
Ilgaz****BONTHOUX, Villefranche-sur-  
Saône****MARTINET, 16, r. du Petit-  
Musc, Paris.****39, r. Fondaudège, Bordeaux.****43, r. de Saintonge, Paris.****26, av. Observatoire, Paris.****8, r. de Passy, Paris.****9 et 11, r. de la Perle, Paris.****GMET, 27, fg Montmartre,  
Paris.****2, pl. de la Duchesse-Anne,  
Nantes.****10, r. Parent-de-Rozan, Pa-  
ris (XVI<sup>e</sup>) (Voir Malt.)****139, av. de Verdun, Issy-les-  
Moulineaux.****34, r. de Turin, Paris.****49, av. Victor-Hugo, Boulogne-  
sur-Seine.****48, r. Théophile-Gautier, Paris.****61, av. Louise, Bruxelles.****13, r. Nouvelle, Charenton.****F****\*Facmine Longuet****\*Fango Fisch et C<sup>ie</sup>****Fantine Adoue****\*Farine alimentaire  
Suckine****Farines Benedictus****\*Farine de malt Heude-  
bert****\*Farines de régime  
Bloch****Farines Favrichon****Farine lactée Heude-  
bert****Farine lactée Nestlé****\*Farine lactée diastasée  
Salvy****34, r. Sedaine, Paris.****4, r. d'Illzach, Mulhouse.****à Pauillac (Gironde).****12, av. Steph.-Mallarmé, Paris,  
et 16, r. Berthelot, Le Havre.****74, r. Lamarck, Paris.****85, r. de Saint-Germain, Nah-  
terre.****à Tomblaine, près Nancy.****à St-Symphorien-de-Lay (Loire).****85, r. de St-Germain, Nanterre****6, av. Portalis, Paris.****4, r. Lambrechts, Courbevoie.**

- Farines Maltées Jam-**  
**met**  
**Farine maltée Vial**  
**Farré-Cure**  
**Fébrifuge**  
**Fébriline**  
**\*Félamine Sandoz**  
**Félargent**  
**\*Félicol**  
**Felsol**  
**\*Féminadène**  
**Fémilogiandol**  
**Fénucine**  
**\*Fenugrène**  
**Fer-Arsenic**  
  
**Férarsényl**  
**\*Fer Bravais**  
**Fer Girard**  
**Fer Henry**  
**Fer injectable Roussel**  
**Fériode Byla**  
**Fer Jaquemaire**  
**\*Fer Larcade**  
**Fer Leras**  
**Fer Manganèse Ami-**  
**cros**  
**Fermentérol Milan**  
**Fermentéryl**  
**Ferments de Backer**  
**Ferment Boss**  
  
**\*Ferment pur de raisin**  
**Jacquemin**  
**Ferments organiques**  
**Zévor**  
**\*Fer-Ovarine Vitalis**  
**\*Feroxal Buisson**  
**Fer Quévenne**  
**Fer Rabuteau**  
  
**Ferrocalbiose**  
**Ferrocalcine**  
**\*Ferrocodile et Ferrico-**  
**dile Leprince**  
**Ferroneurol**  
  
**Ferropeptone**  
**\*Ferrophytine Ciba**  
  
**Ferroplasma**  
**Ferrygène Carrau**  
**Ferydal**  
  
**Fibrinine**
- 47, r. Miromesnil, Paris.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 29, r. Mogador, Paris.  
 MOLIERE, à Constantine.  
 4, fg Stanislas, Nancy.  
 5, r. de Metz, Paris.  
 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.  
 10, r. Vignon, Paris.  
 pl. Homme-de-Fer, Strasbourg.  
 120, r. Lecourbe, Paris.  
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.  
 pl. du Châtelet, Orléans.  
 2, pl. des Vosges, Paris.  
 AUCHER, La Ferté-Macé  
 (Orne).  
 GAUTIER, 13, r. Dorian, Paris.  
 16, r. de Rocroy, Paris.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 39, r. Sclessin, Liège.  
 MOUSNIER, à Sceaux.  
 26, av. l'Observatoire, Paris.  
 à Villefranche (Rhône).  
 151, r. Lafayette, Paris.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 9, bd Edgard-Quinet, Paris.  
  
 15, r. d'Argenteuil, Paris.  
 40, r. des Acacias, Paris.  
 3, r. des Laitières, Vincennes.  
 Lab. G. CESAR & B. BOSS,  
 Besançon (Doubs).  
 à Malzéville-Nancy (M.-et-M.).  
  
 COIRRE, 5, bd Montparnasse,  
 Paris.  
 38, bd de Charonne, Paris.  
 157, r. de Sèvres, Paris.  
 26, r. Petit, St-Denis.  
 20, r. des Fossés-St-Jacques,  
 Paris.  
 ROUSSY, Viroflay (S.-et-O.).  
 GUÉRIN, Meulan (S.-et-O.).  
 62, r. de la Tour, Paris.  
  
 TERMES, Miramont-de-  
 Guyenne (Lot-et-G.).  
 17, r. Cadet, Paris.  
 109-113, bd de la Part-Dieu,  
 Lyon.  
 VIVIEN, 6, r. Abbeville, Paris.  
 34, bd de Clichy, Paris.  
 ROY, 29, av. Charras, Clermont-  
 Ferrand.  
 37, r. de Bourgogne, Paris.

- Ficatine**  
**Fidulax Warin**  
**Figadol Vivien**  
  
**Filhosa**  
**\*Fixase**  
  
**Fixine Grémy**  
**Fixogène Loudenot**  
  
**\*Flavuroil**  
  
**Flévar**  
  
**Floravène**  
**Floréases**  
**Florhamélis**  
**\*Florhépatine**  
**Florisana**  
**\*Fludiose**  
**Fluène**  
  
**Fluérase**  
  
**Fluidbos**  
**Fluidol**  
  
**\*Fluobyl**  
**\*Fluodyle**  
**Fluoformol Gonin**  
**Fluol**  
  
**Fluoram**  
**Fluoridia**  
**\*Fluosalyl**  
  
**\*Fluveinose Mauchant**  
**\*Fluxines (gouttes)**  
  
**Fœnugol**  
**Foie - Endocrisines**  
**Fournier**  
**\*Folestrine**  
**\*Follicormone buccale**  
  
**\*Folliculine Choay**  
**\*Folliculine Crinex**  
**Folliovarine Laleuf**  
**\*Fondants Dausse**  
**Forcéase**  
**\*Forcival**  
**Fordynol**  
  
**\*Foriod**
- 85, r. Turbigo, Paris.  
 4, chaussée de la Muette, Paris.  
 62, r. du Cardinal-Lemoine, Paris.  
 133, r. Lecourbe, Paris.  
 PARET, 22, r. Guibal, Marseille.  
 34, r. Sedaine, Paris.  
 106, av. du Roule, Neuilly-sur-Seine.  
 STÉNÉ, 2, pl. des Vosges, Paris.  
 TORAUDE, 22, r. de la Sorbonne, Paris.  
 MORTIER & C<sup>ie</sup>, Bordeaux.  
 20, fg Poissonière, Paris.  
 CAVY à Montluçon (Allier).  
 7, av. Marceau, Paris.  
 26, av. des Klauwaerts, Bruxelles.  
 TÉTARD, à Beauvais.  
 LANDRIN, 12, r. de la République, Puteaux.  
 FOUCHÈRE, Rive-de-Giers, (Loire).  
 24, c. Lafayette, Lyon.  
 22 bis, r. de Sully, Boulogne-s.-Seine.  
 38, bd Bourdon, Neuilly-Paris.  
 10, r. Pierre-Ducreux, Paris.  
 60, r. Saussure, Paris.  
 COUDERT, 116, av. Ledru-Rollin, Paris.  
 17, r. du Bouloi, Paris.  
 50, r. de Lille, Tourcoing.  
 BEAUGOURDON, 43, av. Kléber, Paris.  
 14, r. de Birague, Paris.  
 E. BONTHOUX, Villefranche-sur-Saône.  
 18, r. Ferdinand-Flocon, Paris.  
 7, r. Biscornet, Paris.  
  
 GRÉMY, 14, r. de Clichy, Paris.  
 HINGLAIS, 30, r. de Miro-mesnil, Paris.  
 48, r. Théophile-Gautier, Paris.  
 18, r. St-Amand, Paris.  
 20, r. du Laos, Paris.  
 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).  
 GILBERT, 6, r. du Laos, Paris.  
 6, r. Bridaine, Paris.  
 13, r. du Général-Foy, St-Etienne.  
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.



- Formadermine** SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.
- Formagol Bouty** 3, r. Dunkerqu . Paris.
- Form tine** OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- \*Formine Adrian** 9 r. de la Perle, Paris.
- \*Formint** MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.
- Formitrol Wander** 151 bis, r. de Joinville, Champigny.
- \*Formocarbine** T TARD,   Beauvais.
- \*Formocarbos** MILLET,   Rambouillet.
- \*Formocitrine** 37, av. Jules-Coutant, Ivry-s.-Seine.
- Formogastrine** 21, r. Alsace-Lorraine, Lyon.
- Formo-Vaccins** LUCINIA, 154 bis, r. Breteuil, Marseille.
- Formule Jacquemaire** Villefranche (Rh ne).
- 60
- Formyl** 23, r. Val ry-Meunier, Pau.
- \*Fornose** Lab. CHAVIALLE, 70 Gde-Rue, S vres (S.-et-O.).
- \*Fortossan Ciba** 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- \*Forxol** BAILLY, 15-17, r. de Rome, Paris.
- \*Fosfoxyl Carron** 69, r. de St-Cloud, Clamart (Seine).
- Fostrychnol Chante-reau** 8, r. de Constantinople, Paris.
- \*Fosyls Carron** 69, r. St-Cloud, Clamart (Seine).
- Fraikola** 4, r. des Carmes, Paris.
- \*Francoplaste Kraus** 37, r. Godot-de-Mauroy, Paris.
- Frangol ine**   Aigurande (Indre).
- Frangulose Flach** 6, r. de la Cossonnerie, Paris.
- \*Freinix** 157, r. de S vres, Paris.
- Freinolut ine** 2, r. des Deux-Ponts, Paris.
- Fr ne Gmet** 27, fg Montmartre, Paris.
- Frialine Gr my** 14, r. de Clichy, Paris.
- Fructia (Brides-les-Bains)** 46, r. Pierre-Charron, Paris.
- Fructines Vichy** 49, av. Wagram, Paris.
- Frugeolines Vichy** 1 et 3, r. Laffoque, Vichy.
- Fruits de R gime** J. MIDY, 41, r. de Courbevoie
- Tilloy** La Garenne (Seine).
- Fruxatyl** TORAUDE, 22, r. de la Sorbonne, Paris.
- Fucobiline Prothi re** 55, r. Auguste-Comte, Lyon.
- \*Fucoglycine** 11, r. Milton, Paris.
- Fucophosphine** COUGET,   Olonzac (H rault).
- \*Fucosine Prothi re** 55, r. Auguste-Comte, Lyon.
- Fuculose** 223, r. St-Martin, Paris.
- \*Fucus Gmet** 27, fg Montmartre, Paris.

**Fumigator Gonin**  
**Furunculase**  
**Furunculine** ·  
**\*Furol**  
**Furosyl**

60, r. Saussure, Paris.  
 94, bd des Batignolles, Paris.  
**COUGET**, à Olonzac (Hérault).  
 5, r. Chauveau-Lagarde, Paris.  
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.

## G

**Gabiol**  
**Gadéinol**  
**Gadilène Vasseur**  
**Gadiodine Labesse**  
**Gadoferrol**  
**\*Gaduamine**  
**\*Gaduase**  
**Gaïacalcine Latour**  
**Gaïacodil Godard**  
**Gaïacol phosphaté Pau**  
**tauberge**  
**Gaïacomalt**  
**Gaïacophosphal Clin**  
**Gaïarsénan Ducatte**  
**Gaïarsol Bouty**  
**\*Galabactéine**  
**\*Galactésia**  
**Galactina**  
**Galactogènes Jolivet**  
**\*Galactogil**  
**Galazène**  
**\*Galicrm**  
**\*Galliodine**  
**\*Galyt Naline**  
**\*Gambéol**  
**Gamostyl**  
**\*Ganderma**  
**Gangliosane**  
**\*Gardenal**

**Sté française d'Extension Bio-**  
**Chimique, St-Quentin.**  
 6, bd Arago, Paris.  
 114, r. Faïdherbe, Boulogne-s.-  
 Mer.  
 36, r. des Lices, Angers.  
 93, r. Nollet, Paris.  
**RENARD**, 35, r. de Paris,  
 Clichy (Seine).  
 Lab. **SERVIER**, à Orléans.  
 17, pl. des Vosges, Paris.  
 18, r. Chernovitz, Paris.  
 165, r. St-Denis, Courbevoie.  
**U. C. E. P.**, 5, r. Labroque,  
 Strasbourg.  
 20, r. des Fossés-St-Jacques,  
 Paris.  
 191, r. St-Honoré, Paris.  
 3, r. de Dunkerque, Paris.  
 154 bis, r. Breteuil, Marseille.  
**AXAREL**, 15, r. Catulienne,  
 St-Denis.  
 68, r. Phalsbourg, Le Havre.  
 140, fg St-Honoré, Paris.  
**PROGIL**, 6, bd Strasbourg, Paris.  
 15, q. Bourbon, Paris.  
 20, r. Dumont-d'Urville, Pa-  
 ris (XVI<sup>e</sup>).  
 71, r. Ste-Anne, Paris.  
 12, r. du Chemin-Vert, à Ville-  
 neuve-la-Garenne.  
 42, r. Emile-Deschanel. Cour-  
 bevoie.  
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.  
 42, r. Emile-Deschanel, Cour-  
 bevoie.  
 2, allées Spach, Strasbourg.  
**SPECIA**, 86, r. Vieille-du-  
 Temple, Paris.

- Gargarinal**  
**Gasterinase**  
**Gastérine Frémont**  
**Gastérophiline**
- \* **Gastrépatine**
- \* **Gastricine du Dr Du-**  
**hourcau**
- \* **Gastrocalcine**
- \* **Gastrocaol**
- Gastrocarbone**
- \* **Gastropansement**
- \* **Gastropeptyl**  
**Gastrophiline**
- Gastroplasme**  
**Gastro-Sodine**  
**Gastrotherib**
- Gastrozymase Bouty**  
**Gastryl**
- \* **Gatercodéine**
- \* **Gaurol**
- Gayacolchine**  
**Gaze Anadhère**
- \* **Gaze Néolée**  
**Gelagar**
- Gelax**  
**Gelée antidiarrhéique**  
**Lumière**  
**Gélicrème Dumesnil**  
**Gélicurine**
- \* **Gélobarine**
- Géloboldine**  
**Gélocalcase**  
**Gélocalcine**  
**Gelodelbiase**
- \* **Gélogastrine**
- Gélo-Pansement Byla**
- \* **Gélo-Pansements gas-**  
**tro-intestinaux**
- \* **Gélor**
- \* **Gélotanin**
- Usine du Blosset, Moulins-sur-**  
**Yèvre (Cher).**  
 77, bd de Grenelle, Paris.  
 à Vichy (Allier).  
**AMBLARD à Cunlhat (P.-de-**  
**Dôme).**  
 Lab. B. C. L., 29, fg de Bour-  
 gogne, Orléans.  
 6, r. Louis-Blanc, La Garenne-  
 Colombes (Seine).  
 17, r. Cadet, Paris.  
**BENDERITTER, à Vendôme**  
**(Loir-et-Cher).**  
 Saint-Louis (B.-du-Rhône).  
 Dr ZIZINE, 24-26, r. de Fécamp,  
 Paris.  
 40, r. des Acacias, Paris.  
 53, bd de Verdun, Fontenay-  
 sous-Bois.  
**MILLET, à Rambouillet.**  
 21, r. Violet, Paris.  
**LA BIOTHÉRAPIE, 131, r.**  
**Cambronne, Paris.**  
 3, r. de Dunkerque, Paris.  
 108, r. Maréchal-Pétain, Vichy.  
**DOMERGUE, Agen (L.-et-G.).**  
 30, r. Armand-Sylvestre, Cour-  
 bevoie.  
 40, r. Bienfaisance, Paris.  
**CAVAILLES, 34, r. de Turin,**  
**Paris.**  
 35, r. Pergolèse, Paris.  
 Etabl. WOLLACKER & C<sup>ie</sup>,  
 31, r. St-Georges, Paris.  
 137, av. Parmentier, Paris.  
 23, c. de la Liberté, Lyon.  
 10, r. du Plâtre, Paris.  
**AUDIBERT, Cinq-Cantons, à**  
**Bayonne.**  
**SPECIA, 86, r. Vielle-du-**  
**Temple, Paris.**  
 4, imp. de Béarn, Paris.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 121, av. de St-Ouen, Paris.  
 Lab. Pharmacologie Générale  
 8, r. Vivienne, Paris.  
**LICARDY, 38, bd Bourdon,**  
**Neuilly-sur-Seine.**  
 26, av. Observatoire, Paris.  
 8, av. de Grammont, Tours.  
 63, r. Faisanderie, Paris.  
 Lab. CHOAY, 48, r. Théo-  
 phile-Gautier, Paris.

**\*Gélotube 29****Gelsémium Dausse****\*Génacide****\*Génatropine****\*Génergosine****\*Génésérine****Genêt Gmet****\*Genhyoscyamine****Génolactine****\*Génomorphine****\*Génoscopolamine****\*Genosthéniques****\*Génostrychnine****Genovital****Géodyl****\*Geranine****Geraseptol****Gercecure****Gerdabyl****Germocalcine****\*Germoclasine****\*Germose****Germosine Lumière****Germyl****Girasiol Dumesnil****Givrinol****Gladyl****\*Glandocalcyl****\*Glaxo****Globépal****Globugénol****Globules Hébert****\*Globules Fumouze****Globules Laincar****\*Globules Romon****Globules Secrétan****\*Gloma (Malt Wander)****\*Glottyl**

49, r. de Bitche, Courbevoie (Seine).

4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).

MONTAGU, 49, bd Port-Royal, Paris.

4, pl. des Vosges, Paris.

Lab. JONIDS, Dijon (Côte-d'Or).

Lab. AMIDO, 4, pl. des Vosges, Paris.

27, fg Montmartre, Paris.

4, pl. des Vosges, Paris.

3, bd Courcelles, Paris.

4, pl. des Vosges, Paris.

4, pl. des Vosges, Paris.

id.

id.

3, r. Dulong, Paris.

J. ROBERT, 39, r. de Bourgogne, Paris.

12, av. de la Grande-Armée, Paris.

12, r. Vavin, Paris.

AMBLARD, Cunlhat (P.-de-Dôme).

GERDA, 163, bd Croix-Rousse, Lyon.

29, r. de Metz, Toulouse.

GAUTIER, 13, r. Dorian, Paris (XII<sup>e</sup>).

LEBEAULT, 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.

23, cours de la Liberté, Lyon.

9, r. Petitot, Dijon.

10, r. du Plâtre, Paris.

14, r. d'Auge, Caen.

66, r. Nationale, Lille.

40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.

RISSA, 46, r. Claude-Lorrain, Lille.

BOUTY, 3, r. de Dunkerque, Paris.

Lab. COMTOS, Fesches-le-Châtel (Doubs).

à St-Lô (Manche).

78, fg St-Denis, Paris.

LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris.

MONAL & C<sup>ie</sup>, 6, r. Bridaine, Paris.

J. LOGEAIS, 22 bis, r. de Silly, Boulogne-sur-Seine.

151 bis, rte de Joinville, Champigny (Seine).

85 bis, r. du Ranelagh, Paris.

- \* **Glucalcium R. X.** ROUX, 58, r. de Maubeuge, Paris.
- Glucoflavine** 10, r. des Fleurs, Ronchin (Nord).
- \* **Glutaspirine** MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.
- Glutéokina** MAZURE, 3, r. de Vouillé, Paris
- Glutinettes d'Aspirine** 14, r. des Pyramides, Paris.
- Glycalcion** 21, r. Feydeau, Paris.
- Glycérine créosotée** 3, bd St-Martin, Paris.
- phosphatée Catillon**
- Glycéro-bromurine** OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles,
- Glycéro-iodurine** id.
- Glycéro-ovarine** id.
- \* **Glycérophosphate Dal-loz** 13, bd de la Chapelle, Paris.
- Glycérométhylarsénié** 6, r. Dombasle, Paris.
- Glycérophosphates de chaux granulé Girard** 48, r. d'Alésia, Paris.
- Glycérophosphates effervescents** LE PERDRIEL, 11, r. Milton, Paris.
- Glycérophosphates Freyssinge** 6, r. Abel, Paris.
- Glycérophosphates Jacquemaire** à Villefranche (Rhône).
- \* **Glycérophosphate Robin** 13, r. de Poissy Paris.
- Glycéro-Thyroidine** OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- Glycéro-Tribromurine** OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- Glycogène** 8, r. Vivienne, Paris.
- Glycobl** 4, pl. des Vosges, Paris.
- Glycocarpine** DALIN, 49, q. St-Vincent, Lyon.
- Glycogène Clin** 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
- Glycojasol** 19, r. Ferdinand-Duval, Paris.
- \* **Glyco-lactimase Cou-turieux** 18, av. Hoche, Paris.
- \* **Glyco. M.** 3, av. Lowendal, Paris.
- Glyco-phénique du Dr Déclat** 6, r. de la Tacherie, Paris.
- Glycophosphates granulés Astier** 45, r. Docteur-Blanche, Paris.
- Glyco-Phytol** 3, r. Chanez, Paris.
- \* **Glyco-Thymoline** 5 bis, r. des Haudriettes, Paris.
- \* **Glyctone phosphatée Charrière** ARQUEVAUX, à Etampes (Seine-et-Oise). ☞
- \* **Glykolaine Robin** 13, r. de Poissy, Paris.
- \* **Glyphospher** 56, ch. Combe-Blanche, Lyon.
- \* **Gmet (Extraits)** 27, fg Montmartre, Paris.
- \* **Gobérol** CHARMAISON, 35, av. de Royat, Clermont-Ferrand.

- Golarsyl Meurice**  
**\*Gomenol**  
**Gometer**
- \*Gonacrine**
- \*Gonagone**
- Gonéine (Capsules)**
- Gonocure**  
**Gonurob B**  
**Gorgéine**
- \*Gosiérine Dalloz**  
**Gossyl**  
**Goudrinhal**  
**Goudroline**
- Goudron Freyssinge**  
**Gouttes amères de Baumé**  
**Gouttes antirhumastimales Wagner**
- \*Gouttes Antispasmodiques Dausse**
- \*Gouttes Arsénosténiques Dausse**
- Gouttes Blagny**  
**Gouttescalciques Zanit**
- Gouttes d'Yzeurol**  
**Gouttes Efgé**  
**Gouttes Esurine**
- \*Gouttes halogènes du Dr Bern**
- Gouttes Iodopectiques Narud**
- \*Gouttes livoniennes**
- Gouttes Le-Lo Tsé Isberg**  
**Gouttes du Dr Ludlam**
- \*Gouttes Magalo**
- \*Gouttes Malone**  
**Gouttes Milko**  
**\*Gouttes Nican**  
**\*Gouttes Paidophiles du Dr Guiraud**  
**Gouttes Pectosérum**
- Gouttes Perettes**  
**\*Gouttes Phosphosténiques Dausse**  
**\*Gouttes Pilka**
- 61, av. Louise, Bruxelles.**  
**48, r. des Petites-Ecuries, Paris.**  
**ROBERT et CARRIERE, 37, r. de Bourgogne, Paris.**  
**SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.**  
**CARRION, 54, fg St-Honoré-Paris.**  
**A. GUILLAUMIN, 13, r. Cherche-Midi, Paris.**  
**SAUBA, 1, r. d'Enghien, Paris, 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.**  
**FOIRET, à Montargis (Loiret).**  
**13, bd la Chapelle, Paris.**  
**4, imp. de Béarn, Paris.**  
**228, r. de Lille, La Madeleine**  
**POINTET et GIRARD, 30, r. des Francs-Bourgeois, Paris.**  
**6, r. Abel, Paris.**  
**Dr GIGON, 25, bd Beaumarchais, Paris.**  
**107, av. de la Reine, Boulogne-sur-Seine.**  
**4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).**  
**4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>)**  
**Pamela, Forges-les-Eaux (S.-I.).**  
**3, pl. Intérieure St-Michel, Toulouse.**  
**26, av. de Tourville, Paris.**  
**40 av, Secrétan, Paris.**  
**Dr R. PETIT, Angoulême.**  
**3, pl. intérieure St-Michel, Toulouse.**  
**38, r. N.-D.-de-Nazareth, Paris.**  
**15, r. Immeubles-Industriels, Paris.**  
**F. BOUVIER, 31, bd de la Villette, Paris**  
**17, r. Cadet, Paris.**  
**Etabl. GOY, 23, r. Beautreillis, Paris.**  
**VINCENT, à Ancenis (L.-Inf.).**  
**CLUZEL, 60, c. E.-Zola, Lyon.**  
**CANTIN, à Palaiseau (S.-et-O.).**  
**10, imp. Milord, Paris.**  
**3, pl. Intérieure St-Michel, Toulouse.**  
**42, av. de Breteuil, Paris.**  
**4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>)**  
**Lab. ZYMA, 4, r. Bellart, Paris.**

- Gouttes Reynaud**  
**Gouttes Sap**  
**\*Gouttes Scandinaves**  
**Gouttes Schmit anti-convulsives**  
**Gouttes Sclérocourine**  
**Gouttes Vigor**  
**\*Gouttes de Séru**  
**Goyl Meurice**  
**\*Grains céphalgifuges**  
**\*Grains d'Evian**  
**Grainsgelin**  
**Grains Miraton**  
**Grains de santé du Dr Franck**  
**\*Grains de Vals**  
**Gramalt**  
**\*Granions de Fouard**  
**Granulé Bravais**  
**Granulé calmatrenkel**  
**\*Granulé Caresmel**  
**Granulé du Dr Mous-saud**  
**Granulé Girard**  
**\*Granules 3 cachets**  
**Granules d'Aloïne**  
**Granules de Boldine**  
**Granules Chanteaud**  
**Granules Chevrier**  
**Granules Colchicine**  
**Granules Crosnier**  
**Granules de Digitaline**  
**Granulé de Panphosphates**  
**\*Granules de Pantofort du Dr Boveil**  
**Granules du Dr Papillaud**  
**Granules Homolle & Quévenne**  
**Granules Houdé**  
**Granules Hydrastinine**  
**Granules Hyosciamine**  
**Granules Spartéine**
- DURAND, Aigue-Mortes** (Gard).  
 83, r. des Martyrs, Paris.  
**Dr H. PHILIPPE**, 14, r. du Palais-Grillet, Lyon.  
**G, Vilas à Châlons-sur-Marne.**  
**CHAUVIN, Aubenas** (Ardèche).  
 26, ch. de la Madeleine, Nantes.  
 69, r. de Sèvres, Paris.  
 61, av. Louise, Bruxelles.  
 88, r. de la Villette, Paris.  
**PERROCHON**, 57, r. Origet, Tours.  
**Dr LALAUURIE, Cuxac-d'Aude.**  
 6, r. Rosenwald, Paris.  
 59, r. Nollet, Paris.  
 11, r. Joseph-Bara, Paris.  
**CHASSAIGNE, Ruffec** (Ch.-I.).  
 61, r. Gaston-Laurian, Montreuil (Seine).  
 3, r. Mogador, Paris.  
**LEMATTE**, 52, r. La Bruyère, Paris.  
 2, quai. Paul-Bert, Tours.  
**H. RIVIER**, 26, r. St-Claude, Paris.  
 48, r. d'Alésia, Paris.  
**Dr COIRRE**, 5, bd Montparnasse, Paris.  
**OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.**  
 id.  
 (Voir : Produits Chantéaud).  
 21, fg Montmartre, Paris.  
**OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.**  
 6, r. Chanoinesse, Paris.  
**OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.**  
 119 bis, av. Chemin-de-Fer, Rueil (S.-et-O.).  
 1, r. Lassalle, à Lyon.  
**GIGON**, 25, bd Beaumarchais, Paris.  
 14, r. des Beaux-Arts, Paris.  
 9, r. Dieu, Paris.  
**OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.**  
 id.  
 id.

<b>Granulé</b>	<b>pulmonaire</b>	49, r. de Metz, Nancy.
<b>Giry</b>		
<b>Granulé</b>	<b>dépuratif</b>	3, r. Watteau, Courbevoie.
<b>Künckel</b>		
<b>Granulé</b>	<b>Tinardon</b>	17, r. Cadet, Paris.
<b>*Granules</b>	<b>des Vosges</b>	11, r. Lafayette, Paris.
<b>*Grassyl</b>		157, r. de Sèvres, Paris.
<b>Graumanyl</b>	<b>Meurice</b>	61, av. Louise, Bruxelles.
<b>*Gripopal</b>		19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
<b>*Grippol</b>		INSTITUT DE MICROBIOLOGIE, à Sarrebruck.
<b>Guarana</b>	<b>Grimault</b>	8, r. Vivienne, Paris.
<b>*Guéthural</b>		Lab. PEPIN & LEBOUcq, Courbevoie (Seine).
<b>*Gui</b>	<b>Byla</b>	26, av. Observatoire, Paris.
<b>*Gui</b>	<b>Gmet</b>	27, fg Montmartre, Paris.
<b>Guilyl</b>		4, imp. de Béarn, Paris.
<b>*Guipsine</b>	<b>Leprince</b>	62, r. de la Tour, Paris.
<b>*Guitose</b>		F. CARTIER, 1, r. de la Martinière, Lyon.
<b>Gunose</b>		D <sup>r</sup> LALAURIE, Cuxac-d'Aude.
<b>Gynaicéol</b>		17, r. Cadet, Paris.
<b>*Gynalthine</b>		3, r. Barbette, Paris (III <sup>e</sup> ).
<b>Gynaseptone</b>		BRÉANT, 4, r. de Clichy, Paris.
<b>Gynéose</b>		14, r. des Pyramides, Paris.
<b>*Gynergène</b>		Etabl. SANDOZ, 5, r. de Metz, Paris.
<b>Gynévrine</b>		4, imp. de Béarn, Paris.
<b>*Gynocalcion</b>		Lab. CORTIAL, 15, bd Pasteur, Paris.
<b>Gynocrinol</b>		Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
<b>Gynohypophysol</b>		id.
<b>Gynoluteol</b>		id.
<b>Gynolysats</b>		4, imp. de Béarn, Paris.
<b>*Gynopausine</b>		42, du Mont-Cenis, Paris.
<b>Gynophiline</b>		DOUARD, Uzel (C.-du-N.).
<b>Gynopolycrinol</b>		Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
<b>Gynoster</b>		133, r. Lecourbe, Paris.



## H

- Haemaboeol**
- Hamamélidine**
- \***Hamaméline** Roya 41, r. de Rome, Paris.  
 \***Hamaméliode** 17, r. Cadet, Paris.  
**Hamamélis** Dausse 4, r. Aubriot, Paris.  
 \***Hamamélis** Gmet 27, fg Montmartre, Paris.  
 \***Hamamélis** Grandval 12-14, r. Féry, à Reims.  
**Hansénol** 116, bd Haussmann, Paris.  
 \***Hectargyre** Naline à Villeneuve-la-Garenne.  
 \***Hectine** Naline id.  
 \***Hélénine** du Dr Korab 12, r. de l'Isly, Paris.  
**Hélieurone** BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.  
**Héliosodine** 249, r. de Vaugirard, Paris.  
**Héliostérine** LAROZE, 54, rue de Paris, Charenton (Seine).  
**Hélital** 15, pl. Nationale, Dieppe.  
**Helmazil** 7, av. Marceau, Paris.  
**Helminthyl** 14, r. Gravel, Levallois-Perret.  
**Hémabéol** 72, av. Kléber, Paris.  
**Hémabione** MOURGUES, chemin Neuf, Ganges (Hérault).  
 \***Hémagène** Tailleur SEVENET, 10, r. Le Chapelais, Paris.  
 \***Hémagénine** Giraud pl. de l'Eglise, Argenteuil.  
**Hémaldine** BILLEBAUD, Paray-le-Monial (Saône-et-Loire).  
**Hémarsyl** du Dr Roux CAILLAU, à Argentat (Corrèze).  
**Hématéol** 81, r. Le Corrège, Bruxelles.  
 \***Hématoéthyrôïdine** 54, Fg St-Honoré, Paris.  
**Hematogénine** DEMASLES, Vienne (Isère).  
**Hématogénol** 37, r. Galilée, Paris.  
 \***Hémato-iodine** 2, pl. des Vosges, Paris.  
**Hématopan** 37, r. du Canal, Bruxelles.  
 \***Hématoquina** Tran- Ch. GAUTIER, 13, r. Dorian, toul Paris.  
 \***Hémaxol** Lab. JONIDS, Dijon.  
 \***Hémoantitoxine** F. CARTIER, 1, r. de la Martinière, Lyon.  
**Hemobiose** M. AUBANEL, Pointe-Rouge, Marseille.  
 \***Hémocalciopectine** BOUDIER, 37, r. de Bourgogne, Paris.

- \*Hémo - Cyto      Sérum Labor. CORBIERE, 27, r.  
     Corbière      Desrenaudes, Paris.  
 Hémoocléine Lafay 54, ch. d'Antin, Paris.  
 \*Hémodrome LANCOSME, 71, av. Victor  
     Emmanuel-III, Paris.  
 \*Hémoductyl LÉCARTY, 38, boul. Bour-  
     don, Paris-Neuilly.  
 \*Hemofer LOBRY, 6, r. Parrot, Paris.  
 Hemoferrine OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
     Bruxelles.  
 \*Hémofixine 4, r. Beaurepaire, Paris.  
 \*Hémofluidol Lab. LÉONARDON, Arcachon,  
     Hémogénase à Courpière (Puy-de-Dôme).  
 \*Hémogénol Dausse 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).  
     Hémoglobine Bovel 101, av. Mozart, Paris.  
     Hémoglobine Dalloz 13, bd de la Chapelle, Paris.  
 \*Hémoglobine Des- 9, r. Paul-Baudry, Paris (VIII<sup>e</sup>).  
     chiens  
     Hémoglobine Star 2, r. Marché-des-Blancs-Man-  
     teaux, Paris.  
 \*Hémoglyne Thuau 22, fg St-Michel, Angers.  
 \*Hémo-Hépatext TAILLANDIER, 107, av. Jean-  
     Jaurès, Paris.  
 \*Hemoluol 6, r. Dombasle, Paris.  
     Hémoneurol Cognet 43, r. de Saintongé, Paris.  
 \*Hémopanbiline Annonay (Ardèche).  
 \*Hémopausine 16, r. du Petit-Musc, Paris.  
 \*Hémopectal A. FALVY, 40, r. des Aca-  
     cias, Paris.  
 \*Hémo-Phagostyl A. PARIS, 4, r. La Motte-  
     Piquet, Paris.  
 \*Hémophiline Planche 2, r. Volney, Paris.  
 \*Hémoplase Lumière 23, cours de la Liberté, Lyon.  
     Hémopoïne Dr SCHOLL, à Gembloux,  
     Belgique.  
 \*Hémorroïdine 1, r. Alexandre-III, Dun-  
     kerque.  
     Hémosédine 19, r. de Fleurus, Paris.  
     Hemoserosan TORAUDE, 22, r. de la Sor-  
     bonne, Paris.  
     Hémosine 89, bd Sébastopol, Paris.  
 \*Hémostra Roche 21, pl. des Vosges, Paris.  
 \*Hémostyl Dr Roussel 97, r. de Vaugirard, Paris.  
 \*Hémotal UNIS-SPES, 14, r. Demarquay,  
     Paris.  
 \*Hémotonine 157, r. de Sèvres, Paris.  
     Hémot-Tonikéine 52, r. La Bruyère, Paris.  
 \*Hémoveine BRICHARD, à Bar-le-Duc.  
     Hémozol 12, boul. Saint-Martin, Paris.  
     Hémyne 13, r. de la République, Yzeure-  
     Moulins (Allier).  
 \*Hemypnal 109-113, bd de la Part-Dieu,  
     Lyon.  
     Hényl 31, av. Foch, La Garenne-  
     Colombes.

- Hépabyl** TORAUDE, 22, r. de la Sorbonnè, Paris.
- Hépacoline** 25, r. Petits-Hôtels, Paris.
- \*Hépanème** 54 fg St-Honoré, Paris (VIII<sup>e</sup>).
- \*Héaphos** 31, r. des Francs-Bourgeois, Paris (IV<sup>e</sup>).
- Héparadénine** OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- \*Héparbiline** id.
- Héparène** 30, r. Denis-Papin, Blois.
- \*Héparmone Byla** 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- \*Hépathemo** 9, r. Paul-Baudry, Paris.
- Hépatine Bouty** 3, r. Dunkerque, Paris.
- \*Hépatismine** 41, r. d'Amsterdam, Paris.
- \*Hépato-Byl** 8, r. de la Source, Paris.
- Hépatocrinol** Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
- \*Hépatodiase** UNIS-SPES, 14, r. Demarquay, Paris.
- Hépatogènes Charvoz** 3, chem. du Vallon, Lyon-Caluire.
- Hépatolax** 83, bd de la Villette, Paris.
- Hepatoseptyl** 108, r. Maréchal-Pétain, Vichy.
- Hépato-Sérine** 22, r. Guillaume-le-Conquérant, Caen.
- \*Hépatosodine** DURET & RÉMY, Asnières (Seine).
- Hépatotanie** 14, r. de Clichy, Paris.
- \*Hépatozyl** 40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.
- \*Hépatrol** 31, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- Héracléine** COUTURIEUX, 18, av. Hoche, Paris.
- \*Héracléol** Lab. des Etabl. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.
- \*Hergénol** GROS, 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
- Hermarsinol** 66, r. Nationale, Lille.
- Hermomuthol** 66, r. Nationale, Lille.
- \*Hermophényl** 23, cours. de la Liberté, Lyon.
- Hermostyrum** WARIN, 4, chaussée de la Muette, Paris.
- Héroïne Vicario** 17, bd Haussmann, Paris.
- Hétérolysine** OLIVIERO, 87, r. Denfert-Rochereau, Paris.
- Héxachol** 26, r. Sainte-Claire, Mulhouse.
- \*Hexafel** 47, r. Bokanowski, Asnières.
- Hexaformine** 123, pl. Beauvoisine, Rouen.
- \*Hexotal** 18, r. Ernest-Rousselle, Paris.
- Hippo-Carnis** LE GALLO, à Auray (Morbihan).
- Hippoplasine du Dr** BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- \*Hipposarcine Roy** 56, ch. Combe-Blanche, Lyon.

- \***Hirudinase** 114, r. du Temple, Paris.
- Histocalcine** 83, bd de la Villette, Paris.
- \***Histogénol Naline** à Villeneuve-la-Garenne.
- Hojasol** 19, r. Ferdinand-Duval, Paris.
- \***Holaseptine** 5, Grande-Rue, Cannes.
- \***Holos Deschiens** 9, r. Paul-Baudry, Paris.
- \***Holovarine** 48, r. de la Procession, Paris.
- Holuryl** A. FALVY, 40, r. des Aca-
- Hopogan** 12, r. Lamartine, Paris.
- Hordéomaltine** 10, r. Richelieu, Paris.
- Hordose** 31, r. des Pierres, Bruges (Bel-
- Hormobiline** 17 bis, av. Parmentier, Paris.
- \***Hormocline** LEMATTE & BOINOT, 52, r.
- Hormolaxine** La Bruyère, Paris.
- Hormolutéine** 16, r. du Petit-Musc, Paris.
- \***Hormotone** 2, rue des Deux-Ponts, Paris.
- Hormovarine Byla** DÉGÉCÉ, 7, r. Princesse,
- Hordénine Lauth** Paris.
- Horsine** 26, av. Observatoire, Paris.
- \***Hova (Tablettes)** 9, r. du 4-Septembre, Paris.
- Huile au Calomel Du-** 4, r. St-Anastase, Paris.
- mesnil** ZYMA, 4, r. Bellart, Paris.
- Huilaxine Gillot** 10, r. du Plâtre, Paris.
- Huile Boris** 59, r. de Châteaudun, Paris.
- \***Huile Crolas** 14, r. de Birague, Paris.
- Huile de génévrier Vial** 56, ch. Combe-Blanche, Lyon.
- \***Huile Gallina** 8, r. Vivienne, Paris.
- Huile grise Duret** 4, r. Candolle, Paris.
- \***Huile grise Ercé** 12, r. de Nice, Paris.
- Huile grise stérilisée** 37, r. de Bourgogne, Paris.
- Huile de Hogg** VIGIER, 12, bd Bonne-Nou-
- Huile Parlux** velle, Paris.
- Huiles Cholestérinées** 13, r. Paul-Baudry, Paris.
- Dausse** 65, rue Douy-Delcupe, à Mon-
- Hycal** treuil (Seine).
- Hydralin** 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).
- Hydrargyrettes Hu -** DURET & RÉMY, Asnières
- bert** (Seine).
- Hydrariode** 37, r. de la Fédération, Paris.
- Hydrastine Houdé** HUBERT, Romorantin (L.-et-
- Hydrastis Dausse** Cher).
- Hydrastis Gmet** à La Forté-Macé (Orne).
- Hydrastol** 9, r. Dieu, Paris.
- Hydrogemmine La-** 4, r. Aubriot, Paris.
- gasse** 27, faub. Montmartre, Paris.
- \***Hydrorrhéol** 222, fg St-Martin, Paris.
- Hydroxydase** 4, chaussée de la Muette, Paris.
- CORDIER, 222, fg St-Martin,**
- Paris.**
- 10, rue Blanche, Paris.**

Hygiénane	172, rue d'Alésia, Paris.
Hygiodine	16, r. du Petit-Musc, Paris.
*Hyol	Lab. NEUVILLE, 239, Fg St-Honoré, Paris.
*Hyoscyamine Houdé	9, r. Dieu, Paris.
*Hypalène	18, r. Pierre-Curie, Paris et 15, r. des Champs, Asnières.
Hypercytol	MATRAY, à Aubière (Puy-de-Dôme).
Hypergal Grémy	14, r. de Clichy, Paris.
Hypericia	3, r. Rodier, Paris.
Hypericoil	id.
Hyperityol	id.
*Hypersan	P. C. B., 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
Hyperstyl	Etabl. H. O. E., 239, r. Nationale, Villefranche - en - Beaujolais (Rhône).
Hypnase Vergelot	163, r. de Flandre, Paris.
Hypneural Cos	99, r. d'Aboukir, Paris.
*Hypnosédine	11, ch. de la Muette, Paris.
Hypnovel Vély	132, av. Victor-Hugo, Paris.
*Hypochlorine	l'Antiseptique, 48, r. de Londres, Paris.
Hypochloryl	7 bis, r. de Musset, Paris.
Hypodermozone	56, bd Péreire, Paris.
*Hypophédrine	18, r. de Beaune, Paris.
Hypophos Hurbourgne	à Montmeyan (Drôme).
Hypophosphites Chur-chill	12, r. Castiglione, Paris.
Hypophosphites Fellows	5, r. de la Paix, Paris.
Hypophydose	D <sup>r</sup> FRAYSSE, 47, r. de Neuilly, Nanterre.
Hypophyse - Endocrines Fournier	7, r. Biscornet, Paris.
Hypophysine	OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
Hypophysol	107, r. des Dames, Paris.
*Hypotan	LEMATTE & BOINOT, 52, r. La Bruyère, Paris.
Hypotensol	LABESSE, Angers (M.-et-L.).
*Hyrganol	SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.

**\*I. A. M.****Iasthol****Ibogaine Nyrdhal****\*Iloglandol Roche****Imido Roche****\*Immuniphages Gremy****\*Immunizols Grémy****\*Immuno-Antivirus****\*Immunovaccin Anti-rhumatismal****\*Indhaméline Lejeune****Indine****Inertyl****\*Infangyl Carlier****\*Infra-rouges****Inhalant de Luchon****Inhalateur Hojasol****Inhalateur et Inhalations****\*Inhalation Lancosme****Inhalation Sargétyl****Inhalatoriol****Inhalène****Iphalex****\*Inhalo-Bol****\*Inhalol****\*Inhalone****\*Inhalo-Sel****\*Inhaloxyl****Inhalyl****\*Injection Clin Strychno Phospharsinée****Injection sèche Bréra****\*Innerclean****\*Inolène****Dr LAVOUÉ, à Rennes (Ille-et-Vilaine).****Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).****12, r. de la République, Puteaux.****21, pl. des Vosges, Paris.****id.****14, r. de Clichy, Paris.****14, r. de Clichy, Paris.****61, av. Louise, Bruxelles.****BLANC, 8, av. des Sources, Nice****142, r. de Picpus, Paris.****DABAT, à Pau (Bas-Pyr.).****CHARVOZ, 3, chem. du Vallon, Lyon-Caluire.****St-Florentin (Yonne).****La Verrerie Scientifique, 12, av. du Maine, Paris.****21, r. Tronchet, Paris.****19, r. Ferdinand-Duval, Paris.****Lap. INHAL, 228, r. de Lille, La Madeleine-Lille.****71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.****STOLZ, 50, av. Edouard-Vaillant, Boulogne-sur-Seine.****57, r. Edgar-Quinet, Nantes.****à Berson (Gironde).****37, r. Galilée, Paris.****P. TAVERNIER, 32, r. de l'Ouest, Paris.****62, r. d'Antibes, Cannes (Alpes-Maritimes).****CH. DEHAY, à Arras.****P. TAVERNIER, 32, r. de l'Ouest, Paris.****4, chaus. de la Muette, Paris.****137, av. Parmentier, Paris.****20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.****JEHAN & BRÉRA, Montauban (L.-et-G.).****46, r. Pierre-Charron, Paris.****42, r. du Mont-Cenis, Paris.**

- \*Inosepta**  
**\*Inotyol**  
**\*Inoxemol**  
**Inoxine**  
**\*Institut Pasteur**  
**\*Insulanol du D<sup>r</sup> Roussel**  
**Insuline** (voir \*Endo-pancrine)  
**\*Insuline Byla**  
**\*Insuline buccale For-net**  
**Insuline Léo**  
**\*Insuliné Phyloze (Poudre et pommade)**  
**Insuliné Rogier**  
**\*Insulyl Roussel**  
**Integral Vaccin**  
**Intestase**  
**Intestinol Merminod**  
**\*Intrails Dausse**  
**\*Ioda**  
**Iodalbin Adrian**  
**Iodalia**  
**\*Iodalose Galbrun**  
**\*Iodamelis Logeais**  
**Iodaminase**  
**Iodamol**  
**Iodargol Viel**  
**Iodarsène**  
**\*Iodarsenic Guiraud**  
**Iodarsine**  
**\*Iodasclérine**  
**Iodaselle Delamarre**  
**\*Iodaseptine Cortial**  
**\*Iodassium**  
**Iodatoxine Laleuf**  
**Iode Aucher**  
**Iode liquide Lambotte**  
**\*Iodéine Montagu**  
**Iodel**  
**\*Iodentérol**  
**Iode Oberlin**  
**Iodeolaxine**  
**\*Iode Organique Boissy**  
**Iodéol Viel**  
**Iodeptol**
- D<sup>r</sup> DEBAT, 60, r. de Prony, Paris.**  
**D<sup>r</sup> DEBAT, 60, r. de Prony, Paris.**  
**D<sup>r</sup> DEBAT, 60, r. de Prony, Paris.**  
**22, av. Opéra, Paris.**  
**22, r. Dutot, Paris.**  
**97, r. de Vaugirard, Paris.**  
**26, av. Observatoire, Paris.**  
**INSTITUT DE MICROBIOLOGIE, Sarrebruck.**  
**39, r. Fondaudège, Bordeaux.**  
**48, r. de la Procession, Paris.**  
**56, bd. Péreire, Paris.**  
**97, r. de Vaugirard, Paris.**  
**12, r. Paul-Baudry, Paris.**  
**58, r. de Miromeshil, Paris.**  
**49, r. de Paradis, Paris.**  
**4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).**  
**63, r. de la Faisanderie, Paris.**  
**9, r. de la Perle, Paris.**  
**12, r. Vavin, Paris.**  
**8, r. du Petit-Musc, Paris.**  
**22 bis, r. Silly, Boulogne-sur-Seine.**  
**2, rue des Deux-Ponts, Paris.**  
**3, bd Beaumarchais, Paris.**  
**7, r. Saint-Yves, Rennes.**  
**42, av. de Breteuil, Paris.**  
**10, imp. Milord, Paris.**  
**304, r. St-Jacques, Paris.**  
**SANOVA, 41, r. d'Amsterdam, Paris.**  
**49, r. Thiers, Boulogne-s.-Mer.**  
**15, bd Pasteur, Paris.**  
**4, chaussée de la Muette, Paris.**  
**20, r. du Laos, Paris.**  
**La Ferté-Macé (Orne).**  
**OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.**  
**49, bd Port-Royal Paris.**  
**COUDERT, 116, av. Ledru-Rollin, Paris (XII<sup>e</sup>).**  
**4, r. Candolle, Paris.**  
**17, r. Cadet, Paris.**  
**OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.**  
**49, r. Hoche, Courbevoie.**  
**7, r. Saint-Yves, Rennes.**  
**4, imp. de Béarn, Paris.**

- \*Iodéyl Fournier  
 Iodex  
 \*Iodhéma  
 Iodhyrine du D<sup>r</sup> Des-  
 champs  
 \*Iodine Médol  
 \*Iodinfectol Jammes  
 \*Iodo-Bismuth Ercé  
 \*Iodo-Bismuthate de  
 Quinine  
 \*Iodocalcium  
  
 Iodocéréol Dalloz  
 Iodocol Carrion  
 Iodogalle Vial  
 Iodogéline  
 Iodo-Juglan  
 \*Iodogénol Pépin  
 \*Iodo-Maisine  
 \*Iodométine Hautdidier  
 \*Iodone Robin  
 Iodonine  
  
 Iodonion  
 Iodonoses Clin  
 \*Iodonucléol  
 Iodoplasme  
 Iodoplume  
  
 Iodosan  
 Iodosigol  
 \*Iodostarine Roche  
 Iodo-Théine Henry  
 \*Iodo-Thyroidine Catil-  
 lon  
 Iodo-Trypsine  
 Iodoveine Leduc  
 \*Iodo-Vitasine  
 Iodoxol  
  
 \*Iodural Novat  
 \*Iodurase  
 \*Iodure d'Amidon  
  
 Iodures Cros  
 Iodures Domergue  
 Iodures Foucher  
 Iodures Laroze  
 \*Iodures Pachaut  
 \*Iodure Philippe  
 \*Iodures Souffron  
 Iolase Corbière  
 Ionoïdes
- 7, r. Biscornet, Paris.  
 46, r. Claude-Lorrain, Lille.  
 4, r. Candolle, Paris.  
 49, av. Lamotte-Picquet, Paris.  
  
 J. MIDY, 41, r. de Courbevoie  
 La Garenne (Seine).  
 86, r. Michel-Ange, Paris.  
 37, r. de Bourgogne, Paris.  
 FRAISSE, 8, r. Jasmin, Paris.  
  
 Lab. Biologique de l'Ile-de-  
 France, 3, r. Laugier, Argen-  
 teuil.  
 13, bd de la Chapelle, Paris.  
 54, fg St-Honoré, Paris.  
 4, pl. Croix-Rousse, Lyon.  
 CROZET, à Cannes (A.-M.).  
 LE GALLO, à Auray (Morbihan).  
 à Courbevoie (Seine).  
 6, r. Rosenwald, Paris.  
 37, r. Galilée, Paris.  
 13, r. de Poissy, Paris.  
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.  
 9, r. Victor-Letalle, Paris.  
 20, r. d. Fossés-St-Jacques, Paris.  
 14, r. de Birague, Paris.  
 85, rue des Morillons, Paris.  
 PIALOUX, 55, r. de Chabrol,  
 Paris.  
 ZAMBELETTI, à Milan (Italie).  
 CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).  
 21, pl. des Vosges, Paris.  
 39, r. Sclessin, Liège.  
  
 3, boul. Saint-Martin, Paris.  
 46, av. des Ternes, Paris.  
 JAUME, à Tamaris (Gard).  
 H. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.  
 Lab. ISCOVESCO, 107, r. des  
 Dames, Paris.  
 BOMEL, Annonay (Ardèche).  
 18, av. Hoche, Paris.  
 LUMIERE, 23, cours de la  
 Liberté, Lyon.  
 12, r. de Nice, Paris.  
 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.  
 19, r. Grégoire-de-Tours, Paris.  
 2, r. des Lions, Paris.  
 130, bd Haussmann, Paris.  
 14, r. Palais-Grillet, Lyon.  
 157, r. de Sèvres, Paris.  
 27, r. Desrenaudes, Paris.  
 13, r. Pavée, Paris.



- \*Ionyl**  
**Iophénol**  
**\*Iosorbine**  
**Ipéca digitale Dausse**  
**\*Irénine Gonnon**  
**Irol Churchill**  
**Irovarine Tisy**  
**Irradiol**  
**\*Irrastérine Byla**  
**\*Isacène Roche**  
**Isobromyl**  
**Isorhinol**  
**\*Isotonyl (Poudre de Lausanne)**  
**\*Ivula Pearson**  
**\*Ixium**  
**\*Ixogyn**
- La Biomarine, Dieppe (Seine-Inférieure).  
 P. C. B., 12, r. du Téléphone. Bruxelles.  
 VANDA, 16, r. Ficatier, Courbevoie.  
 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).  
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
 12, r. Castiglione, Paris.  
 R. & A. FEIGNOUX, 95, r. de Turenne, Paris (III<sup>e</sup>).  
 16, r. de Rocroy, Paris.  
 26, av. de l'Observatoire, Paris.  
 21, pl. des Vosges, Paris.  
 COMAR & C<sup>ie</sup>, 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.  
 VIDAL, 46, r. de Grenelle, Paris.  
 87, r. Lafayette, Paris.  
 J. MIDY, 41, r. de Courbevoie, La Garenne (Seine).  
 157, r. de Sèvres, Paris.  
 12, r. des Apennins. Paris.

## J

- Jap**  
**\*Jécol**  
**Jecorine**  
**Jecorsan Fornet**  
**Jéjunine**  
**\*Jemalt Wander**  
**Jicémine**  
**Jovine Brisson**  
**Juglamarine**  
**Jugland Gmet**  
**Juglandine Ferrouillat**  
**\*Juglane**  
**Juglanrégine**  
**Juniodyl**
- 52, rue La Bruyère, Paris.  
 3, r. Watteau, Courbevoie.  
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
 Inst. de Microbiologie, à Sarrbruck.  
 42, av. de Breteuil, Paris.  
 151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine).  
 304, r. Saint-Jacques, Paris.  
 157, r. Championnet, Paris.  
 WARIN, 4, chaussée de la Muette, Paris.  
 27, faub. Montmartre, Paris.  
 33, r. Daguerre, Paris.  
 à Chambéry (Savoie).  
 2, r. des Alpes, à Valence.  
 THÉVENOT, 21, r. des Roses, Dijon.

**\*Juraisin Macon****Jus de raisins Challand****\*Jus de raisins Pampryl**  
(voir **\*Pampryl**)**Juvéol****Juvigor****Etabl. Œnologiques de Bour-**  
**gogne, Mâcon (S.-et-Loire).****Nuits-St-Georges (C.-d'Or).**  
**2, villa de la Terrasse, Paris.****17, r. Cadet, Paris.****Nuits-St-Georges (Côte-d'Or).****K****Kalmine****\*Kalmobrol****Kalmogastrol****\*Kaobrol****\*Kaolinase****Kaolin Crookes****Kéfir Carrion****Kéfir Caucase****Kélène****Kénapirine Chanteaud****\*Kénol****Képhaline Brunot****Képhir Salmon****\*Kerlactine****\*Kerlol Lerck****\*Kidoline****Kina-Coca-Kola****Kina Elzevir****\*Kinéchol****\*Kinectine****Kineurine Moncour****Kioféine****\*Kipsol****Kitine****\*Kluchol Remeaud****METADIER, à Tours.****60, r. Aug.-Comte, Lyon.****132, av. Victor-Hugo, Paris.****54, r. Paris, Charenton (S.).****12, bd Saint-Martin, Paris.****2, Fg St-Denis, Paris.****54, fg. Saint-Honoré, Paris.****53, r. de Spa, Bruxelles.****86, r. Vieille-du-Temple, Paris.****54, r. des Francs-Bourgeois,**  
**Paris.****MILLET & GUILLAUMIN, 8,**  
**r. Richer, Paris et 5, r. Am-**  
**broise-Thomas.****10, pl. Thiers, Le Mans.****28, r. de Trévisé, Paris.****1, rue Lassalle Lyon.****à Saint-Etienne, 63, pl. St-Roch.****GALLIER, 38, bd Montpar-**  
**nasse, Paris.****GRANVAL, 12-14, r. Fery,**  
**Reims.****Lab. des Etabl. SALLE, 4, r.**  
**Elzévir, Paris.****40, bd Saint-Ruf, Avignon.****12, r. du Chemin-Vert, Ville-**  
**neuve-la-Garenne.****49, av. Victor-Hugo, Bou-**  
**logne-sur-Seine.****53, bd de Verdun, Fontenay-**  
**sous-Bois.****64, r. La Rochefoucauld, Paris.****VIDAL, 46, r. de Grenelle, Paris.****38, r. J.-B.-Clément, Boulogne-**  
**sur-Seine.**

\*Koch-I-Cide  
Kola-fer Trouette

Kolä Gmet

\*Kola granulé Astier

Kolä granulé Roy

Kolagum

Kolamalt

Kola Midy

\*Kolä Monavon

Kola

Kolä Pichat

Kolarsine Pautauberge

\*Kolatinés

Kola Venaize

Kréazone

Kréofos Novat

\*Kreptol

Kydalose

\*Kymosine Rogier

LEISYN, 1 bis, r. Molitor, Paris.  
15, r. Immeubles-Industriels,  
Paris.

27, fg. Montmartre, Paris.

45, r. du Dr-Blanche, Paris.

81, boul. Suchet, Paris.

4, r. des Carmes, Paris.

U. C. E. P., 5, r. Labroque,  
Strasbourg.

4, r. du Colonel-Moll, Paris.

14, r. Victor-Hugo, Lyon.

OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
Bruxelles.

5, c. Charlemagne, Lyon.

10, r. Constantinople, Paris.

12, r. du Helder, Paris.

4, r. des Carmes, Paris.

TROUETTE, 15, r. des Im-  
meubles-Industriels, Paris.

BOMEL, Annonay (Ardèche).

LOUINET, 39, r. de l'Arcade,  
Paris.

DALIN, 49, quai Saint-Vin-  
cent, Lyon.

56, boul. Péreire, Paris.

## L

\*Lab-Lacto-Ferment

\*Laccodermés Brisson

\*Lachésine

\*Lacpinine

Lacténile Meurice

\*Lac-Ser

Lactagol

Lactagol Pearson

\*Lactaris

Lactate d'Hg (Voir :

Comprimés Roy)

Lactéol Boucard

Lactermel Vigier

\*Lacticholéine Tulivet

MIALHE, 8, r. Favart, Paris.

157, r. Championnet, Paris.

RENAUD, 2, r. Demours,  
Paris.

FISCH, 4, r. d'Ilzach, Mulhouse.

61, av. Louise, Bruxelles.

49, bd Port-Royal, Paris.

6, r. Rosenwald, Paris.

43, r. Pinel, Saint-Denis.

Lab. Central, 125, r. de Turenne,  
Paris.

30, r. Singer, Paris.

12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.

52, r. de Poissy, St-Germain-en-  
Laye.

Lactifère  
 Lactigélose  
 \*Lactimase Couturieux  
 \*Lactobacilline

Lactobactyl

\*Lactobyl  
 Lactocalcine  
 \*Lactochol  
 Lactocoaguline Fabre

Lacto-Diastal  
 Lacto-ferment

\*Lactofermentine  
 \*Lactolaxine Fyda  
 Lacto Mannitase  
 Lactomorrhuel

Lactophéine

Lactophorine  
 Lactophosphine  
 Lactoseptyl Legrand  
 \*Lacto-Sérum Lavril  
 Lactosérum R. M.  
 Lactosone  
 Lactozymase B.  
 Lactyl Meurice  
 Lait albumineux Mol-  
 lard

Lait allégé Dieticus  
 Lait Berna  
 Lait de cèdre Sapolan

Lait de Sapolan  
 Lait de Soufre Sapolan  
 Lait Gallia  
 Lait Gloria  
 \*Lait Guigoz  
 Lait Lepelletier  
 \*Lait Sec Lo-lo  
 \*Lait de magnésie Phil-  
 lips  
 \*Lait Mont-Blanc  
 Lait sec Nutricia  
 Lait Seklé  
 \*Laminode  
 Laminolax  
 \*Lansoyl  
 \*Lantol Couturieux  
 \*Larosan Roche  
 \*Laurenol

3, r. Capitaine-Scott, Paris.  
 DUCLOY, Arques (P.-de-C.)  
 18, av. Hoche, Paris.  
 13, r. Saint-Maurice, Nanterre  
 (Seine).

TORAUDE, 22, r. de la Sor-  
 bonne, Paris.

46, av. des Ternes, Paris.  
 7, r. des Petits-Carreux, Paris.  
 46, av. des Ternes, Paris.  
 33, r. de la Haie-Coq, Aubervil-  
 liers.

7, av. Marceau, Paris.

OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.

THEVENOT, r. des Roses, Dijon.

4, r. Lamotte-Picquet, Paris.

37, r. de Tivoli, Bordeaux.

DELPECH, 5, r. Danton,  
 Paris.

CACHAT, Evian-les-Bains (Hte-  
 Saône).

9, r. de la Gare, Levallois-Perret.

8, r. de la Pompe, Paris.

Blois (Loir-et-Cher).

15, r. Clapeyron, Paris.

6 bis, rue Monsieur, Paris.

17, r. Cadet, Paris.

52, r. La Bruyère, Paris.

61, av. Louise, Bruxelles.

25, cours Lafayette, Lyon.

15, quai de Bourbon, Paris.

199 bis, bd St-Germain, Paris.

CAVAILLES, 34, r. de Turin.  
 Paris.

id.

id.

11, r. de Prony, Paris.

19, bd. Malesherbes, Paris.

19, r. J.-J.-Rousseau, Paris.

48, r. Ampère, Paris.

123, r. de Paris, Saint-Denis.

47 bis, av. Hoche, Paris.

Rumilly (Haute-Savoie).

65, bd Sébastopol, Paris.

200, av. Michel-Bizot, Paris.

29, av. de St-Mandé Paris.

id.

5, r. de la Paix, Paris.

18, av. Hoche, Paris.

21, pl. des Vosges, Paris.

19, r. Drouot, Paris.

- Lax**  
**\*Laxadonal**  
**Laxagarine**  
**\*Laxamalt**  
**\*Laxamer Lefèvre**  
**Laxatif Châtel-Guyon**  
**Gubler**  
**\*Laxatifs Miraton**  
**Laxatine Mory**  
**Laxatone Déjardin**  
**\*Laxaul**  
**Laxia Dannec'h**  
**Laxinol-Vichy**  
**\*Laxocholéine Tulivet**  
**\*Laxogélose Tulivet**  
**Laxoil**  
**Laxoléine**  
**Laxol Fraudin**  
**Laxo-lin**  
**Laxolip Henry**  
**\*Laxopeptine Girard**  
**Laxophore Brachin**  
**\*Laxor**  
**Lebnol Thévenot**  
**Lécithine Adrian**  
**Lécithine Clin**  
**\*Lécithine Vacheron**  
**Lécithine Vial**  
**Lécithosine Rovin**  
**Lenicade Brisson**  
**Lénicure-Vichy**  
**\*Léniforme**  
**Leptandrine Royer**  
**\*Leucagine**  
**Leucaginol**  
**Leucobules Gallier**  
**\*Leucoseptyl**  
**Leucosérum**  
**Levaine**  
**Levulose Rogier**  
**Levurase**  
**\*Levure B. 17**  
**Levure Boss**  
**Levure Coixte**  
**19, av. Secrétan, Paris.**  
**LOUINET, 39, r. de l'Arcade,**  
**Paris.**  
**5, av. des Tilleuls, Paris.**  
**LICARDY, 38, bd Bourdon,**  
**Paris-Neuilly.**  
**52, rue Decamps, Paris.**  
**70, r. Legendre, Paris.**  
**6, r. Rosenvald, Paris.**  
**OPTIMA, Gde-Rue au Bois,**  
**Bruxelles.**  
**10, r. Parent-de-Rosan, Paris.**  
**pl. Guillaume-le-Conquérant, à**  
**Falaise (Calvados).**  
**64, r. des Tournelles, Paris.**  
**PATRICE, à Vichy.**  
**52, r. de Poissy, St-Germain-en-**  
**Laye.**  
**id.**  
**12, r. Beautreillis, Paris.**  
**MILLET, à Rambouillet.**  
**4, av. Desfeux, Boulogne-s.-S.**  
**182, av. de Versailles, Paris.**  
**39, r. Sclessin, Liège.**  
**48, r. d'Alésia, Paris.**  
**à Joinville (Haute-Marne).**  
**Lab. Biologique de l'Île-de-**  
**France, 3, r. Laugier, Argen-**  
**teuil.**  
**à Dijon.**  
**9, r. de la Perle, Paris.**  
**20, r. des Fossés-Saint-Jac-**  
**ques, Paris.**  
**14, r. Victor-Hugo, Lyon.**  
**8, r. Vivienne, Paris.**  
**13, r. de Poissy, Paris.**  
**157, r. Championnet, Paris.**  
**94, bd des Batignolles, Paris.**  
**26, r. Péterelle, Paris.**  
**223, r. Saint-Martin, Paris.**  
**22, r. de la Sorbonne, Paris.**  
**22, r. de la Sorbonne, Paris.**  
**38, bd Montparnasse, Paris.**  
**121, av. Gambetta, Paris.**  
**66, r. Nationale, Lille.**  
**OPTIMA, Gde-Rue au Bois,**  
**Bruxelles.**  
**56, bd Péreire, Paris.**  
**CHARMAISON, av. de Royat,**  
**Chamalières (P.-de-Dôme).**  
**8, r. de Constantinople, Paris.**  
**Lab. G. CESAR & B. BOSS, Be-**  
**sançon (Doubs).**  
**3, bd Montparnasse, Paris.**

**\*Levure de bière**

Levure de bière De-  
bouzy

Levure Déjardin

**\*Levure fraîche Myceta**

\*Levurine extractive  
Couturieux

Levuritin

Libérine

Licardet Brisson

Lientine Grémy

Limital

**\*Limol Churchill****\*Limonade Godfrin****\*Linadéline****\*Lin Tarin**

Lioncyl

Lipasonol

Lipauroi

**\*Lipiodol Lafay**

Lipobil

**\*Lipocérébrine**

Lipochol Byla

Lipocytol Grémy

**\*Lipodeterpénol Zyma**

Lipogazes dermatolo-  
giques

Lipoféine

Lipogyre Ciba

**\*Lipoides Iscovesco****\*Lipiodine Ciba**

Lipol

Lypolisine Merminod

**\*Liposeptine****\*Lipésplénine du Dr Groc**

Lipothine

Lipo-Vaccins

Liqueur d'Hermès

Liqueur Laprade

**\*Liqueur Laville****\*Liqueur peptophos-  
phorique**

Liqueur de Pittermont

Liqueur Talobre

ADRIAN, 9, r. de la Perle,  
Paris.

34, r. Sedaine, Paris.

10, r. Parent-de-Rosan, Paris.

4, r. Bellart, Paris.

18, av. Hoche, Paris.

FEIGEL, à Lutterbach  
(Haut-Rhin).

CAPIN, Roquefort (Landes).

157, r. Championnet, Paris.

14, r. de Clichy, Paris.

Lab. ROMON, 6, r. Bridaine,  
Paris.

12, r. Castiglione, Paris.

5, av. Watteau, Nogent-sur-  
Marne.

Lab. VARIOT, 151 bis, Grande-  
Rue, Villemomble.

6, r. Dombaslè, Paris (XV<sup>e</sup>).

6-8, r. Lacretelle, Paris.

30, r. N.-D.-des-Victoires, Pa-  
ris.

LECOQ et FERRAND, 14, r.  
Gravel, Levallois-Perret.

22, r. du Landy, St-Ouen.

29, pl. Wilson, à Denain.

LEMATTE et BOINOT, 52,  
r. Labruyère, Paris (IX<sup>e</sup>).

26, av. Observatoire, Paris.

14, r. de Clichy, Paris.

4, r. Bellart, Paris.

LECOQ & FERRAND, 14,  
r. Gravel, Levallois.

109-113, bd de la Part-Dieu,  
Lyon.

id.

107, r. des Dames, Paris.

109-113, bd de la Part-Dieu,  
Lyon

10, r. des Fleurs, Ronchin (Nord).

40, r. de Paradis, Paris.

2, pl. des Vosges, Paris.

40, r. d'Enghien, Paris.

JOSSE, pl. Wilson, à Denain.

32, r. de Vouillé, Paris.

12, bd Saint-Martin, Paris.

49, r. de Maubeuge, Paris.

20, r. Fossés-Saint-Jacques,  
Paris.

ADRIAN, 9, r. de la Perle,  
Paris.

2, rue de Paris, à Douai.

Saint-Girons (Ariège).

- Liqueur à la Thyroïdine Bouty** 3, rue de Dunkerque, Paris  
**Liqueur végétale Narud** 38, r. N.-D.-Nazareth, Paris.  
**Liq. organiques inject.** BOUTY, 3, r. Dunkerque, Paris.  
**Liseronine** 19, r. Drouot, Paris.  
**Listérine** 5, r. de la Paix, Paris.  
**Listose Vicario** 17, bd Haussmann, Paris.  
**\*Lita Cortial** CORTIAL, 15, bd Pasteur.  
   Paris.  
**Litharsyne Ferré** 19, r. Grégoire-de-Tours, Paris.  
**\*Lobuline** 37, r. de Bourgogne, Paris.  
**\*Loraga** 13, rue Pagès, Suresnes.  
**Lortocarbol** 86, bd Port-Royal, Paris.  
**Luargol** 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.  
**Luatine** 2, av. Parmentier, Paris.  
**Lual** BAILLY, 15, r. de Rome, Paris.  
**Luarsyl** id.  
**Luatol** 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.  
**Luchon** C<sup>ie</sup> Fermière de Luchon (Haute-Garonne).  
  
**Lucinine** 18, r. Ferdinand-Flocon, Paris.  
**\*Lucodal** 2, quai Paul-Bert, Tours.  
**\*Ludin** REY, 12, r. Montmartre, Dijon.  
  
**Lusitol** 7, passage Thionville, Paris.  
**\*Lusoforme** 15, r. d'Argenteuil, Paris.  
**Lutéovar** à Ermont (Seine-et-Oise).  
**Lux-Gaillac** av. du Mar.-Foch, Gaillac (Tarn).  
**Lycétol Vicario** 17, bd Haussmann, Paris.  
**Lyciflore** HOURTOULLE, 11, r. des  
   2-Ponts, Paris (IV<sup>e</sup>).  
  
**Lycobile** 115, r. St-Honoré, Paris.  
**Lyméogène** 26, r. Cambon, Paris.  
**Lymphactol** 4 bis, r. de Lyon, Paris.  
**\*Lysaxins L. M. L.** 37, r. de Bourgogne, Paris.  
**Lysiode Clérambourg** 10, r. St-Antoine, Paris.  
**Lysol** 65, r. Parmentier, Ivry (Seine).  
**Lysolats** 14, r. Halévy, Paris.  
**Lysomol** HENDRIX, à Anvers (Belgique).

## M

- \*Magbromyl 40, av. des Deux-Gares, Antony, (Seine).
- \*Magiodyl id.
- Maglose 178, r. Montmartre, Paris.
- Magnacalcine SANOVA, 41, r. d'Amsterdam, Paris.
- Magnebyl 126, r. de la Pompe, Paris.
- Magnécal 54, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- Magnéclo 16, r. du Petit-Musc, Paris.
- \*Magnécythine D<sup>r</sup> Tissot 24, bd de Clichy, Paris.
- \*Magnésie Bismurée SCOTT, 348, r. St-Honoré, Paris.
- \*Magnésie Durel 7, bd Denain, Paris.
- Magnésie Carlo Erba 105, bd Malesherbes, Paris.
- Magnésie D<sup>r</sup> Gustin BRISSON & C<sup>ie</sup>, 114, av. Michelet, St-Ouen.
- Magnésie hydratée 37, r. de Marly, Rueil (S.-et-O.).
- Magnésie Roy 81, bd Suchet, Paris.
- Magnésie Storke 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris.
- Magnésion 27, r. Poids-de-la-Farine, Marseille.
- Magnésium chloruré 107, av. de la Reine, Boulogne-sur-Seine.
- Magnésium Grorichard 12, pl. de la Révolution, Besançon.
- \*Magnésium Hardy 42, bd St-Marcel, Paris.
- (Sirop et Tablette-Bouillon)
- Magnésol 37, r. Galilée, Paris.
- \*Magnésio-tubes Robinet Moret-sur-Loing (S.-et-M.).
- Magnétol ROUX, 58, r. de Maubeuge, Paris.
- \*Magnétone-Sélamon 10, r. Vignon, Paris.
- Magnidia 17, r. du Midi, Vincennes.
- Magnogène 6, r. Bridaine, Paris.
- \*Magol Churchill 12, r. Castiglione, Paris.
- \*Magsalyl Mg 40, av. des Deux-Gares, Antony (Seine).
- \*Malarsan P. AUBRY, 54, r. de la Bienfaisance, Paris.
- Maltase Fanta Brasserie FANTA, 77, rte d'Orléans, Montrouge (Seine).
- Malt Barley id.



- \*Maltea Moser 8, ch. de Montbrillant, Lyon.
- \*Malt français Déjardin 10, r. Parent-de-Rosan. Paris.
- (extrait)
- Maltine Gerbay à Roanne (Loire).
- Maltine-Phénix 14, r. de Birague, Paris.
- Malt Moritz 189, r. de Vaugirard, Paris.
- Maltolax U. C. E. P., 5, rue Labroque, Strasbourg.
- Malt-Oléo 20, Fg Poissonnière, Paris.
- \*Maltosan 151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine).
- \*Malt Pailleté 6, bd de Strasbourg, Paris.
- Malt Régina 34, r. Pajol, Paris.
- Malt Strauss 12, r. Broca, Paris.
- \*Malt Wander 151 bis, route de Joinville à Champigny (Seine).
- Malzémose 18, r. de Ménilmontant, Paris.
- Mamelle Endocrisines 7, r. Biscornet, Paris.
- Fournier
- Mamelline Meurice 61, av. Louise, Bruxelles.
- Mammol Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
- Mancobène GLENARDEAU, 35, r. Coquillière, Paris.
- Mandragol GAILLON, 113, bd Voltaire, Paris.
- \*Mangaine 71, r. Sainte-Anne, Paris.
- \*Manganéol Usine du Blosset, Moulin-sur-Yèvre (Cher).
- \*Manganésia Produits Dannec'h, 64, r. des Tournelles, Paris.
- Mangano-Calcique à Saint-Amand-Montrond.
- Manganoglobine Lab. du Gastrocarbone, Saint-Louis (B.-du-Rhône).
- \*Mangano Phosphal Julien 105, r. de Rennes, Paris.
- Mangaphos 4, imp. de Béarn, Paris.
- \*Mangarsenic D<sup>r</sup> LAVOUÉ, Rennes (I.-et-V.).
- \*Mangratinés 163, r. de Flandre, Paris.
- Mannitine 62, r. Carnot, Vernon (Eure).
- Marabout 6, r. Trencavel, Béziers.
- \*Marcynase 7, r. Princesse, Paris.
- \*Marimine 191, Fg St-Antoine, Paris.
- \*Marinol à Dieppe (Seine-Inférieure).
- Mariode COURRET, 75, r. Saint-Dominique, Paris.
- Marnal 10, r. du Quatre-Septembre, Paris.
- Marron d'Inde Dausse 4, r. Aubriot, Paris.
- Marronine Huard 3, av. Orléans, Paris.
- \*Marrubène 2, pl. des Vosges, Paris.
- \*Marrubiase COMTE, 60, r. St-Guilhem, Montpellier.
- Marruséra 133, r. Lecourbe, Paris.

- Marsyle Clin**
- \***Marubor**
- Masbi**  
**Mas de la Ville**  
**Masglandol**
- \***Maté Douglas**  
**Matico de Grimault**  
**Maya Bulgare**  
**Médicament de Saint-Boes**  
**Medicoferments Boss.**  
**Medocain**
- \***Menatol**
- Menopausine**  
 \***Menosedine**  
 \***Ménovarine**  
 \***Mensusedyl**
- Mentholina**  
**Méral**  
**Mercuriaux Vigier**  
**Mercurochrome 220**
- Méroléol Salle**  
**Mesarca Roche**
- \***Mésosome**  
 \***Mésogastrine**
- Mesothine**
- Mesothorium**  
 \***Mésothorium Buisson**  
 \***Métacuprol**  
**Métalase**  
**Metasulfol Vigier**
- \***Méta-Titane**  
**Metaux colloïdaux**
- \***Méta-vaccins**  
**Métharfer Bouty**  
**Métharsinate Clin**
- Métharsol Bouty**  
 \***Méthylarisnates Bouty**  
**Méthylarsinate Vicario**  
**Méthylarsinate Vigier**  
**Métricine**
- \***Metritols**  
**Métrostyptal Grorichard**  
**Mexyl**  
 \***Mialbaïne**
- 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.**  
**VALENTIN, 1, r. d'Arras, Béthune.**  
**7, pass. Thionville, Paris.**  
**Arles-sur-Rhône.**  
**156, r. des Fauvelles, Courbevoie.**  
**62, Champs-Élysées, Paris.**  
**8, r. Vivienne, Paris.**  
**322, r. Saint-Honoré, Paris.**  
**par Orthez (Basses-Pyrénées).**  
**10, r. de la Viotte, Besançon.**  
**71, r. de la Course, Bordeaux.**  
**BAILLY, 15-17, r. de Rome, Paris.**  
**9, pl. de la Paix, Mulhouse.**  
**Demasles, à Vienne (Isère).**  
**41, r. Etienne-Marcel, Paris.**  
**AUGIER, 2, r. des Lombards, Paris.**  
**GUIGNIER, Bois-Colombes.**  
**61, av. Louise, Bruxelles.**  
**12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.**  
**AMECOUSEMA, 25, r. St-Augustin, Paris (II<sup>e</sup>).**  
**4, r. Elzévir, Paris.**  
**21, pl. des Vosges, Paris.**  
**17 bis, av. Parmentier, Paris.**  
**37, av. Jules-Coutan, Ivry-sur-Seine.**  
**RHEMDA, 51, r. d'Alsace, Courbevoie.**  
**id.**  
**157, r. de Sèvres, Paris.**  
**5, r. François-Ponsard, Paris.**  
**252, fg. St-Martin, Paris.**  
**12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.**  
**MÉTADIER, à Tours.**  
**COUTUREUX, 18, av. Hoche, Paris.**  
**MÉTADIER, à Tours.**  
**3, r. de Dunkerque, Paris.**  
**20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.**  
**3, r. de Dunkerque, Paris.**  
**3, r. de Dunkerque, Paris.**  
**17, bd Haussmann, Paris.**  
**12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.**  
**GIRARDEL, à Asnières.**  
**18, r. Pierre-Curie, Paris.**  
**12, pl. de la Révolution, Besançon.**  
**6, r. des Dames, Paris.**  
**8, r. Favart, Paris.**

- \*Micelliode 88, r. de la Villette, Paris.
- Micranyl GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
- \*Mictasol 28, r. du Four, Paris.
- \*Mictoseptol 29, fg de Bourgogne, Orléans.
- \*Mictualine CLUZEL, 60, v. E.-Zola, Lyon.
- Migrainol 16, c. Gambetta, Lyon.
- Minéraline du D<sup>r</sup> Baud 14, r. de Birague, Paris.
- Minéralogène 4, pl. Croix-Rouge, Lyon.
- \*Minergil 6, bd de Strasbourg, Paris.
- Minérol 10, r. Richelieu, Paris.
- Minérolaxine Le Tan- 15, av. de Marlioz, Aix-les-  
neur Bains (Savoie).
- \*Miroxyl 32, r. de l'Ouest, Paris.
- Mistol 98, r. de Sèvres, Paris (VII<sup>e</sup>).
- Mitigans Roxelane 38 bis, r. Raphaël, Vanves.
- Mokavène 16, r. de Rocroy, Paris.
- Molavose 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
- \*Molène 14, r. Gravel, Levallois-Perret.
- Mondorasmé 95, r. de Turenne, Paris.
- Montonic Usine du Blosset, Moulins-sur-  
Yèvre (Cher).
- \*Moranyl SPECIA, 86, r. Vieille-du-  
Temple, Paris.
- \*Moréthyl Dausse 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).
- \*Morisland CHEVILLON, 99, r. de Paris,  
Massy (S.-et-O.).
- \*Moroidol Ch. GAUTIER, 13, r. Dorian,  
Paris.
- \*Morrhualène Gautier 17 bis, av. Parmentier, Paris.
- \*Morrhuetine Jungken 105, r. de Normandie, Cour-  
bevoie (Seine).
- Morrhaine Puy à Grenoble.
- \*Morrhual 8, r. Vivienne, Paris.
- \*Morrhuxine 163, r. de Flandre, Paris.
- \*Morubiase Crosnier 6, r. Chanoinesse, Paris.
- Morubiline 32, r. Joubert, Paris.
- Moruemalt U. C. E. P., 5, r. Labroque,  
Strasbourg.
- Moruphyle BOST, Villefranche (Rhône).
- \*Moruxase Abadie 3, pl. Intérieure St-Michel,  
Toulouse.
- Mouches Albespeyres 78, fg Saint-Denis, Paris.
- \*Mucicarbos Lab. E. MILLET, à Rambouillet  
(S.-et-O.).
- \*Mucilaxine id.
- Mucilose id.
- \*Mucinum CHANTEREAU, 26 bis, r.  
Dombasle, Paris.
- Mucobarytine 12, r. des Tribunes, Versailles.
- Mucogène Astier 45, r. Docteur-Blanche, Paris.
- Mucoléine LANDON, av. Baraduc, Châtel-  
Guyon.
- \*Mucosodine 37, r. de la Fédération, Paris.
- Mugrizol Dumesnil 10, r. du Plâtre, Paris.

- Muqueuse Endocris-** 7, r. Biscornet, Paris.  
**nes Fournier**  
**Musculargyre**  
**Musculogenol**  
**\*Musculosine Byla**  
**Mustérole**  
**Mutandine**  
**\*Muthanol**  
**Muthoquinol**  
**Muxol**  
**Muxyl**  
**Mycodermine**  
**Mycolactine**  
**\*Mycolysine Doyen**  
**Mycidol Badel**  
**\*Myoden**  
**Myodine Mauchant**  
**Myo-Serum**  
**Myostone Merminod**  
**\*Myothermine**  
**Myrtanol**  
**Myrtilline Demasle**
- FEIGNOUX**, 95, r. de Turenne, Paris.  
 121, r. Victor-Hugo, Houplines (Nord).  
 26, av. Observatoire, Paris.  
 5 bis, r. des Haudriettes, Paris.  
**GREMY**, 14, r. de Clichy, Paris.  
 55, bd de Strasbourg, Paris.  
 4, impasse de Béarn, Paris.  
 Lab. **SERVIER**, à Orléans.  
 77, bd de Grenelle, Paris.  
 10, r. Parent-de-Rosan, Paris.  
 122, r. du Cherche-Midi, Paris.  
 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.  
 à Valence-sur-Rhône.  
**E. DAUPEZ**, Capvern-les-Bains (Htes-Pyr.).  
 14, r. de Birague, Paris.  
 168, bd St-Germain, Paris.  
 49, r. de Paradis, Paris.  
 47, r. Bokanowski, Asnières.  
 30, r. N.-D.-des-Victoires, Paris.  
 à Vienne (Isère).

## N

- Nader**  
**\*Nadolor**  
**\*Naïodine Logeais**  
**\*Naphtocarbine**  
**Narcotile Bengué**  
**\*Naroyl**  
**Narsénol**  
**Nasale Ymera**  
**Nasobore**  
**Nasocaine**  
**\*Nasosulfolarsan**
- 6, rue de l'Ecole, Versailles (S.-et-O.).  
 191, fg St-Antoine, Paris.  
 22 bis, r. de Silly, Boulogne-sur-Seine.  
**FAURE**, 80, r. du Rocher, Paris.  
 47, r. Blanche, Paris.  
 34, r. Sedaine, Paris.  
**SPECIA**, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.  
 28, r. de Seine, Paris.  
**BRESSIER**, 102, r. Vincent, Marseille.  
 Lab. **ANIMAT**, Nîmes (Gard).  
**DOMERGUE**, Agen (L.-et-G.).

- \*Natibaine 27, r. de la Procession, Paris.
- \*Natirose 27, r. de la Procession, Paris.
- \*Natrosyl 18, r. Pierre-Curie, Paris.
- Nazilante ANIMAT, Nîmes (Gard).
- \*Nazinette GILBERT, 6, r. du Laos, Paris.
- \*Nazophyl Darva 19, b. Bonne-Nouvelle, Paris.
- Néfitol 24, r. de Monttessuy, Paris.
- \*Néoarsite 11, r. Joseph-Bara, Paris.
- \*Néo-Arsycodile 62, r. de la Tour, Paris.
- Néo-Asclérol 45, r. Caumartin, Paris.
- Néo-Biol 4, pl. du Val, à Vanves (Seine).
- Néoby TROUETTE-PERRET, 15, r. des Immeubles-Industriels, Paris.
- Néofilhos le Perdriel 11, r. Milton, Paris.
- Néo-Calciline 21, r. Violet, Paris.
- Néo-chloral 21, Gde-Rue Argenteuil (S.-et-O.)
- \*Néo-Collargol 16, r. du Petit-Musc, Paris.
- \*Néo-Dmegon SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.
- \*Néo-Dmetys id.
- \*Néo-Dispositif Ravaut 37, r. de Bourgogne, Paris.
- Néoferrol 5, r. de Wasselone, Strasbourg.
- Néo-Galyl MOUNEYRAT, Villeneuve-la-Garenne (Seine).
- Néoglobuline 65, r. d'Hauteville, Paris.
- \*Néoiacol 105, bd Malesherbes, Paris.
- Néo-Iodure Ménard 3, r. République, Lyon.
- Néo-Kola Lumière 23, cours de la Liberté, Lyon.
- Néolactine 73, av. de Marinville, Le Parc-St-Maur (Seine).
- \*Néo-Laxatif Chapotot 56, bd Ornano, Paris.
- \*Néol Bottu 35, r. Pergolèse, Paris.
- Néolides H. B. 35, r. Pergolèse, Paris.
- \*Néolyse 55, bd de Strasbourg, Paris.
- Néo-Mésarca Roche 21, pl. des Vosges, Paris.
- \*Néo-Mg 229, cours Gambetta, Lyon.
- \*Néo-Neurosine 1, quai Aulagnier, Asnières.
- \*Néo-Pancarpine 5, r. François-Ponsard, Paris.
- \*Néophage JAMMES, 86, r. Michel-Ange, Paris.
- Néo-Phanol 26, r. Sainte-Claire, Mulhouse.
- \*Néo-physiosthénine DROUET & PLET, Rueil-Malmaison.
- Néo-Pituitairine OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- Néoplalysines 49, r. de Paradis, Paris.
- Néoquinine Falières 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- \*Néo-Rhomnol 62, r. de la Tour, Paris.
- \*Néo-Riodine Astier 45, r. Docteur-Blanche, Paris.
- Néosantal Fabris, Chambéry (Savoie).
- Néo-Serosan TORAUDE, 22, r. de la Sorbonne, Paris.
- \*Néospasmine 132, av. Victor-Hugo, Paris.
- Néo-spermine 172, rue d'Alésia, Paris.

- Néo-Sphérulines**  
 \* **Néothorium** Millot  
**Néo-Tréparséna**
- \* **Néo-Trépol**  
 \* **Néotrophène**
- Néovitalyne**
- Néphrine Bouty**  
**Néphrine Byla**  
**Néphrocrinol**
- \* **Neptal**  
**Neptol**  
 \* **Nergine Heudebert**  
 \* **Nervocithine Tissot**  
 \* **Nestosyl**  
 \* **Neubryne**  
 \* **Neurène**  
 \* **Neuréol**  
**Neurhémol Vingon**  
**Neurioure**  
 \* **Neurinase**
- \* **Neurobore**  
 \* **Neurocalcium**
- \* **Neurodose**  
**Neuroflorine Geffroy**
- Neurogaïacol Dethan**  
**Neurogénol**
- Neuroiodure Dethan**  
**Neurôlipase**  
 \* **Neuro-Moka**  
**Neuro-Pax**
- \* **Neuroplasma**
- \* **Neuroplasmine**  
 \* **Neuropol**  
 \* **Neurosine Prunier**  
**Neurosomnyl**  
**Neurosthyll**  
**Neurotanic**  
**Neurotonine**
- \* **Neurotrol Abadie**  
**Neurotrope**  
 \* **Neurotrophol Byla**
- (Voir : *Opothérapie Moncour.*)  
 54, r. Bienfaisance, Paris.  
**COMAR**, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.  
 22, r. de la Sorbonne, Paris.  
 Lab. de Chimie appliquée, 22, bd du Couchant, Nanterre (S.)  
 28, r. de l'Hôpital-Militaire, Lille.  
 3, r. de Dunkerque, Paris.  
 26, av. de l'Observatoire, Paris.  
 Labre. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.  
**SPECIA**, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.  
 (Voir : *Topique Nasal A. B. C.*)  
 85, r. Saint-Germain, Nanterre.  
 34, bd de Clichy, Paris.  
 72, r. St-Dominique, Paris (VII<sup>e</sup>).  
 10, r. St-Antoine, Paris.  
 8, r. de la Source, Paris.  
**LAFARGE**, 6, bd Arago, Paris.  
 à Auxerre (Yonne).  
 77, bd de Grenelle, Paris.  
 45, r. du Marché, Neuilly (Seine).  
 23, r. des Moines, Paris.  
 Lab. Biol. de l'Ile de France, 3, r. Laugier, Argenteuil.  
 47, r. de Neuilly, Nanterre.  
**DÉLAMARE & C<sup>ie</sup>**, Romilly-sur-Andelle (Eure).  
 11, r. A.-de-Neuville, Paris.  
 Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).  
 11, r. A.-de-Neuville, Paris.  
 23, r. d'Ouessant, Paris.  
 88, r. de la Villette Paris.  
 Cte de **GRAÜWE**, 16, r. de Rocroy, Paris.  
 16, r. Henri-Regnault, Courbevoie.  
 id.  
**FAURE**, 80, r. du Rocher, Paris.  
 1, quai Aulagnier, Asnières.  
 229, cours Gambetta, Lyon.  
 4, r., Lamotte-Picquet, Paris.  
**GREMY**, 14, r. Clichy, Paris.  
**OPTIMA**, Gde-Rue au Bois Bruxelles.  
 3, pl. Intérieure St-Michel, Toulouse.  
**MÉROBIAN**, 37, r. Pajol, Paris.  
 26, av. Observatoire, Paris.

- Neurovarol Douetteau** 20, fg. Saint-Honoré, Paris.  
**Neurovoïne** GREMY, 14, r. Clichy, Paris.  
**\*Neutralcaol** BENDERITTER, Vendôme,  
 (L.-et-Ch.).  
**\*Neutralisine Bureau** 86, bd Port-Royal, Paris.  
**Neutrol** AMICI, Saint-Sylvestre, Nice.  
**Neutrose Vichy** 49, av. de Wagram, Paris.  
**\*Névoral** R. FEIGNOUX, Lab. RAFFEY,  
 95, r. de Turenne, Paris (III<sup>e</sup>).  
**Névralgésine** DÉBORDES, à Moulins (Allier).  
**Névralgine Montsarrat** à Revel (Hte-Garonne).  
**\*Névralgol Brossard** 1, r. Cordouans, La Rochelle.  
**Névraltéine Rogier** 56, bd Pèreire, Paris.  
**Nevraltine** COUDERT, 116, av. Ledru-Rol-  
 lin, Paris.  
**Névrasite** 11, r. Joseph-Bara, Paris.  
**Nevrithone** GERDA, 163, bd de la Croix-  
 Rousse, Lyon.  
**Névropathyl Leisyn** 1 bis, r. Molitor, Paris.  
**\*Nevrosan** P. C. B., 12, r. du Téléphone,  
 Bruxelles.  
**Nevroserum** 4, fg Stanislas, Nancy.  
**\*Névrosol** 12, r. des Apennins, Paris.  
**\*Névrosthénine Freys-  
 singe** 6, r. Abel, Paris.  
**Nickobalt** 12, r. Paul-Baudry, Paris.  
**\*Nigérine Vincent** 14, av. Mac-Mahon, Paris.  
**Niketol** 156, r. de l'Université, Paris.  
**\*Nisaméline** TROUETTE, 15, r. Immeubles-  
 Industriels, Paris.  
**\*Nitium Buisson** 157, r. de Sèvres, Paris.  
**\*Nitroyl Leisyn** 1 bis, r. Molitor, Paris.  
**\*Noctisédyll** AUGIER, 2-4, r. des Lombards,  
 Paris.  
**Nopirine Vicario** 17, bd Haussmann, Paris.  
**\*Normacol** 41, r. de Rome, Paris.  
**\*Normalarine** 18, r. de Beaune, Paris.  
**Nortal Clin** 20, r. des Fossés-Saint-Jacques,  
 Paris.  
**Nosodol** 57, r. Edgard-Quinet, Nantes.  
**Nosol Aguetant** 36, q. Fulchiron, Lyon.  
**\*Novacétine Prunior** 1, qu. Aulagnier, Asnières (Seine).  
**Novaline de Montfleury** 6, r. d'Alsace, Grenoble.  
**\*Novanol** J. MIDY, 41, r. de Courbevoie,  
 La Garenne (Seine).  
**\*Novargyre Guillaumin** 13, r. Cherche-Midi, Paris.  
**Novarine Vicario** 17, bd Haussmann, Paris.  
**\*Novarsénobenzol Billon** SPECIA, 86, r. Vieille-du-  
 Temple, Paris.  
**Novarsénobenzol Cor-  
 bière** 27, r. Desrenaudes, Paris.  
**Novarsénobenzol Ercé** 37, r. de Bourgogne, Paris.  
**\*Noviode** Lab. SALVOXYL, 237, r. La-  
 fayette, Paris (X<sup>e</sup>).  
**\*Novo-Brol** 8, r. de la Source, Paris.

\*Novo-Lactol  
Novoseptine

Novoxol  
Nox

Nuclabia

Nuclarène Cognet  
Nucléarrhol Gabriel

\*Nucléarsitol Robin

\*Nucléasine

\*Nucléatol Robin  
Nuclécithine

\*Nucléigène

Nucléo-fer Girard

\*Nucléophorine

\*Nuclhémose

Nuclocithol

\*Nujol

Nurécase

Nurserine

Nutréine

Nutréol

Nutritine Déjardin

\*Nutro

\*Nutrobiase

Nutromalt

Nuxyl

Nyctal

Et. DAGUIN, St-Maur (Seine).  
57 bis, av. La Motte-Picquet,  
Paris (XV<sup>e</sup>).

18, r. Daguerre, Paris.

UNIS-SPES, 14, r. Demarquay,  
Paris.

Lab. chimie physiologique, 37,  
r. Tivoli, Bordeaux.

43, r. de Saintonge, Paris.

39, r. Sclessin, Liège (Belgique).

13, r. de Poissy, Paris.

163, r. de Flandre, Paris.

13, r. de Poissy, Paris.

Collonges-Saint-Just-sur-Loire  
(Loire).

Lab. CHEVILLON, 99, r. de  
Paris, Massy (Seine-et-Oise).

48, r. d'Alésia, Paris.

40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.

RÉMY & LECOQ, 6, pl. Cli-  
chy, Paris.

28, av. Grammont, Tours.

78, av. Champs-Élysées, Paris.

GRANDVAL, à Reims.

6, c. Joseph-Thierry, Marseille.

46, av. des Ternes, Paris.

61, r. de Seine, Paris.

109, bd Haussmann, Paris

65, bd Sébastopol, Paris.

10, r. Cimarosa, Paris (XVI<sup>e</sup>).

151 bis, route de Joinville,  
Champigny (Seine).

26, av. des Klauwaerts, Bruxelles.

DÜRET & RÉMY, Asnières.

O

Océanine

\*Ocréine Grémy

\*Odarsol

Oderma

\*Odynal Chevalier

Oenase Couturier

\*Oenophos

Oenoquinol

52, r. La Bruyère, Paris.

14, r. de Clichy, Paris.

COMAR & C<sup>ie</sup>, 20, r. des Fos-  
sés-Saint-Jacques, Paris.

Gonneville-la-Mallet (S.-Inf.).  
à Varennes-sur-Allier.

18, av. Hoche, Paris.

29, pl. Bossuet, Dijon.

12-14, r. Fery, Reims.



- Oéréliode**
- Oïo-Thyroïdine**
- Olbia**
- Oléobiline**
- Oléo-Bi-Roche**
- Oléo-Calcium**
- \* **Oléocidase**
- Oléodermine Vincent**
- Oléodine**
- \* **Oléoformine «Corbière»**
- Oléo-Iode Dubois**
- Oléojasol**
- Oléol**
- Oléolaxine**
- \* **Oléo-Mel**
- Oléomucilaxine**
- Oléo-Psyllium**
- Oléo-Sérums**
- Oléthyle Benzyle**
- Oliolase Corbière**
- Olriscin Hardy**
- \* **Olivéol Etiévant**
- \* **Onction guérygale Angelini**
- \* **Onction Leisyn**
- Ondanol**
- Onguent Hon**
- Onguent Ivula**
- Onguent Pyorrhépagine**
- Ophorine**
- \* **Ophtalmine Leprince**
- \* **Opobyl**
- \* **Opocalcium**
- \* **Opocalcium Irradié**
- Opochlorine**
- \* **Opochol**
- \* **Opodermyl**
- Opogénines**
- Opoglandéol Fray**
- \* **Opolases (voir \*Am-polases)**
- Opolaxyl Corbière**
- \* **Oponuclyl irradié Trouette-Perret**
- BOUVOT, Anvers-sur-Oise (S.-et-Oise).**
- OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.**
- MOUNEYRAT, Villeneuve-la-Garenne (Seine).**
- 2, r. Maréchal-Pétain, Nice.**
- 21, pl. des Vosges, Paris.**
- MAURES, à Port-de-Penne (Lot-et-Garonne).**
- 6, r. Rosenwald, Paris.**
- 14, av. Mac-Mahon, Paris.**
- Pont-à-Celles (Belgique).**
- 27, r. Desrenaudes, Paris.**
- 52, r. Montesquieu, Asnières.**
- 19, r. Ferdinand-Duval, Paris.**
- BRUN, Demi-Lune, Lyon (Rh.).**
- 5, av. des Tilleuls, Paris.**
- DELFOUR, Pouillon (Landes).**
- MILLET à Rambouillet (S.-et-O.).**
- Lab. ADLER, 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris.**
- Route de Cimiez, Nice.**
- 122, fg. S-Honoré, Paris.**
- 27, r. Desrenaudes, Paris.**
- 42, bd St-Marcel, Paris.**
- BRUN, Demi-Lune, Lyon.**
- 61, r. de Seine, Paris.**
- 1 bis, rue Molitor, Paris.**
- SAUBA, 1, r. d'Enghien, Paris.**
- 31, r. Illzach, Mulhouse.**
- J. MIDY, 41, r. de Courbevoie, La Garenne (Seine).**
- Croissy-sur-Seine.**
- OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.**
- 62, r. de la Tour, Paris.**
- BAILLY, 15-17, r. de Rome, Paris.**
- 121, av. Gambetta, Paris.**
- 121, av. Gambetta, Paris.**
- 23, r. d'Ouessant, Paris.**
- TÉTARD, Beauvais (Oise).**
- BENSIMON, 36, r. des Martyrs, Paris.**
- 40, r. Bellechasse, Paris.**
- DURAND, Aigues-Mortes.**
- 163, r. de Flandre, Paris.**
- 27, r. Desrenaudes, Paris.**
- 15, r. des Immeubles-Industriels, Paris.**

- Opopédol** ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
- Opopeptol** 105, bd Malesherbes, Paris.
- Opositaires opothérapiques Pellissier** 33, av. de Villiers, Paris.
- Oposynergines** 18, av. Daumesnil, Paris.
- \*Opothérapie Bouty** 3, r. de Dunkerque, Paris.
- \*Opothérapie Byla** 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- Opothérapie Carrion** 54, fg Saint-Honoré, Paris.
- Opothérapie Chaix** 10, r. de l'Orne, Paris.
- Opothérapie Chevretin** 52, r. La Bruyère, Paris.
- \*Opothérapie Choay** 48, r. Théoph.-Gautier, Paris.
- \*Opothérapie du Dr Frayssé** 47, r. de Neuilly, Nanterre (Seine).
- \*Opothérapie Fournier** 7, r. Biscornet, Paris.
- Opothérapie Fumouze** 78, fg. Saint-Denis, Paris.
- \*Opothérapie Henning** 49, r. de Paradis, Paris.
- Opothérapie "Le Pécq"** 11, r. Beautreillis, Paris.
- \*Opothérapie Moncour** 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
- Opothérapie Richard** 79, av. d'Orléans, Paris.
- Opothérapie U. T. A.** P. THIVISSEN, 13, r. Sainte-Véronique, Liège.
- \*Opothérapiques Mouricé** 61, av. Louise, Bruxelles.
- \*Opothérapiques Pellissier** 33, av. de Villiers, Paris.
- \*Opetonine** 20, r. des Martyrs, Paris.
- \*Opozones Lumière** 23, cours de la Liberté, Lyon.
- Opsine Grémy** 14, r. de Clichy, Paris.
- Opsolysine** 7 à 13, r. Saint-Maurice, Nanterre (Seine).
- \*Optalidon Sandoz** 3 et 5, r. de Metz, Paris.
- \*Orargol** Lab. AMICROS, 9, bd Edgar-Quinet, Paris.
- Orarigène** 35, av. Alsace-Lorraine, Grenoble.
- \*Orchidine** OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- Orchitine Byla** 26, av. Observatoire, Paris.
- Orchitine Mouricé** 61, av. Louise, Bruxelles.
- Orexyl** F. CARTIER, 1, r. de la Martinière, Lyon.
- Orianol** GENTON, à Petit-Quévilly (S.-Inférieure).
- Oripheol** 8, r. Richer, Paris.
- \*Ormatol** E. ROBINEAU, 80, rte des Petits-Ponts, Drancy (Seine).
- \*Ortho-Gastrine** LÉBLOND, 51, r. Gay-Lussac, Paris.
- \*Orthogénol** Lab. BÉLIERES, 19, r. Drouot, Paris.
- \*Orthozemine** LONGUET, 34, r. Sedaine, Paris.
- Osmoléine** 26, r. des Moines, Paris.

- \* **Osmo-Vaccins P. L.** Lab. BRÉANT, 4, r. de Cliehy, Paris.
- Ossical** ROBERT et CARRIERE, 37, r. de Bourgogne, Paris.
- Ostéoglandulol** 14, r. des Pyramides, Paris.
- \* **Osteline** Lab. Rissa, 46, r. Claude-Lorrain, Lille.
- Ostéo-hépatine** 8, r. de la Source, Paris.
- Ostéopeptine** DRAPIER, Lucquy (Ardennes).
- Ostomalt** 46, r. Claude-Lorrain, Lille.
- \* **Ostreine Buisson** 157, r. de Sèvres, Paris.
- \* **Otagol** 21, r. Feydeau, Paris.
- Oto-Antiscclérol** 6 pl. Cambronne, Paris.
- Oto-Draineur** 5, r. Emmanuel-Liais, Cherbourg.
- \* **Ouabaine Arnaud** 27, r. de la Procession, Paris.
- Ouabaine Deglaude** 6, r. d'Assas, Paris.
- \* **Quataplasme Langlebert** SABATIER, 10, r. Pierre-Ducieux, Paris.
- Ovaire-Endocrisines Fournier** 7, r. Biscornet, Paris.
- Ovarine** 62, r. Notre-Dame, Bordeaux.
- Ovaridine Meurice** 61, av. Louise, Bruxelles.
- Ovarids** 4, imp. de Béarn, Paris.
- Ovarigène Disdier** av. Alsace-Lorraine, Grenoble.
- Ovarine Dubois** 49, av. Lamotte-Picquet, Paris.
- Ovarine Henning Merminod** 49, r. de Paradis, Paris.
- Ovarine Meurice** 61, av. Louise, Bruxelles.
- \* **Ovarine Optima** OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- \* **Ovarine Tisy** 95, r. de Turenne, Paris.
- Ovarnon** ROBERTS, 5, r. de la Paix, Paris.
- Ovarose** 58, r. St-Placide, Paris.
- \* **Ovaro-Thyroidine** OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- Ovigénine Bouty** 3, r. de Dunkerque, Paris.
- Ovo-Cao** 2, r. de Compiègne, Paris.
- \* **Ovo-lécithine Billon** SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.
- Ovomaltine** 151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine).
- Ovothyrol** 8, r. de la Source, Paris.
- \* **Ovules Chaumel** 78, fg Saint-Denis, Paris.
- Ovules Derma** ROBIN, 13, r. de Poissy, Paris.
- Ovules Evine** 3, r. de la Perle, Paris.
- Ovules Gynol** Chaussée d'Ixelles, Bruxelles.
- Ovules Halleana** 4, imp. de Béarn, Paris.
- \* **Ovules Ivula Pearson** J. MIDY, 41, r. de Courbevoie, La Garenne (Seine).
- Ovules Magida** 56, r. des Dames, Paris.
- \* **Ovules Néothorium** MILLOT, 54, r. de la Bienfaisance, Paris.
- Ovules Patrat** 61, r. de Seine, Paris.
- \* **Ovules Roche** 21, pl. des Vosges, Paris.
- Ovules Uxora** DHAUSSY, à Mennevret (Aisne).

- \* **Ovules-Vaccin Salan-** 42, r. des Grandes-Arcades,  
   **tale** Strasbourg.  
**Ovules Vézès** 52, bd du Temple, Paris.  
**Ovunéol Bottu** 35, r. Pergolèse, Paris.  
**Oxitane** CASENEUVE, Saint-Cyprien  
   (Dordogne).  
**Oxycyanure d'hydrar-** GUILLAUMIN, 168, bd Saint-  
   **gyre** Germain, Paris.  
**Oxy-Dents C. R. S.** 264, bd Voltaire, Paris.  
 \* **Oxydothyridine Paris** 4, r. Lamotte-Picquet, Paris.  
 \* **Oxydovarine Paris** id.  
**Oxydrol** POINTET et GIRARD, 30,  
   r. des Francs-Bourgeois, Paris.  
**Oxygénase** D<sup>r</sup> CHAPELLE, 8, r. Vivienne,  
   Paris.  
**Oxygénés du D<sup>r</sup> Prim** 27, r. Fourcroy, Paris.  
**Oxygénozone** 11, r. Saint-Sabin, Paris.  
 \* **Oxy-Injecteur du** 23, av. de la Motte-Picquet, Pa-  
   **D<sup>r</sup> Fialip** ris.  
 \* **Oxyléine** 37, r. de Marly, Rueil (S.-et-O.).  
**Oxylisine** LAMBERT, 6, r. de Longchamp,  
   Vichy.  
 \* **Oxymenthol Perraudin** 21, r. Chaptal, Paris.  
 \* **Oxymuth Saca** 89, r. du Cherche-Midi, Paris.  
**Oxynargyl** BESNARD, 56, r. des Dames,  
   Paris.  
**Oxyol Leisyn** 1 bis, r. Molitor, Paris.  
**Oxyquinothéine** S. A. L. P., 91, r. Marietton,  
   Lyon.  
**Oxythymol** GLORY, 38 bis, bd Beaumar-  
   chais, Paris.  
**Oxy-Thymoline** GODFRIN, à Nancy.  
 \* **Oxytoires Sorin** TROMBETTA, à Blain (L.-Inf.).  
 \* **Ozobiase** 37, r. de Marly, à Rueil-Mal-  
   maison.  
**Ozodor** Lab. SERVIER, Orléans (Loiret)  
**Ozol** à Avignon.  
**Ozonair** 2, r. de Vienne, Paris.

## P

- Pain d'amandes au** 37, r. du Rocher, Paris.  
   **gluten frais**  
 \* **Pain essentiel Heude-** 85, r. de Saint-Germain, Nan-  
   **bert** terre (Seine).

- Pain Euréka** 74, r. du Château, Boulogne-sur-Seine.
- \***Pains spéciaux Heudebert** 85, r. de Saint-Germain, Nanterre (Seine).
- Pains de régime Mil-liat** 319, av. Berthelot, Lyon.
- Pain Redeuil** 7, r. Couche, Paris.
- Pain de santé Martin** à Montreuil-Belfroy (Mainc-et-Loire).
- Païphos** 9, r. Pérignon, Paris.
- Paloval** Pharm. de l'Etoile, Strasbourg.
- Paludase Corbière** 27, r. Desrenaudes, Paris.
- Paludol** PATRICE, à Vichy.
- \***Pampryl** 2, villa de la Terrasse, Paris.
- Panbiase antiphy -** BAILLY, 15-17, r. de Rome, Paris.
- mique**
- \***Panbiline** à Annonay (Ardèche).
- Panbromine** 17, r. Cadet, Paris.
- Pancalbiose** 1, r. Chancelier, Périgueux.
- Pancréadénine** OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- \***Pancréanne** 10, r. Poncelet Paris (XVII<sup>e</sup>).
- Pancréas-Endocrisi-nes Fournier** 7, r. Biscornet, Paris.
- \***Pancréastase Defresne** 19, r. Jacob, Paris.
- Pancréatokinase** 54, fg St-Honoré, Paris.
- Pancréatose Idon** 89, r. St-Georges, Nancy.
- Pancrébile** Dr AUBERT, 3, pl. Jussieu, Paris.
- \***Pancrépatine Laleuf** 20, rue du Laos, Paris.
- Pancrésal** SCHREIBER, av. du Bois, Luxembourg.
- \***Pancrinol du Dr Debat** 60, r. de Prony, Paris.
- Pandigitale Houdas** 26, r. Saint-Claude, Paris.
- Pandigitale** OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- \***Panfébrine** 17 bis, av. Parmentier, Paris.
- \***Pangaduine** 2, r. du Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris.
- \***Pangastrol** STOULS, 156, av. Victor-Hugo, Paris.
- \***Pangestyl Narty** 134, bd. Péreire, Paris.
- \***Panglandine Coutu-rieux** 18, av. Hoche, Paris.
- \***Panhémol** 90, av. des Ternes, Paris.
- Panhistol** 4 bis, r. de Lyon, Paris (XII<sup>e</sup>).
- Panlacto-Midy** 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
- Panlax Allard** Lab. GMET, 27, fg. Montmartre, Paris (IX<sup>e</sup>).
- Panlutéine** 2, rue des 2-Ponts, Paris.
- Panopepton** ROBERTS, 5, r. de la Paix, Paris.
- Panophytes** TROUETTE-PERRET, 15, r. des Immeubles-Industriels, Paris.

**\*Panostyl**

**Panprocol**  
**Pansérum**

**Pansomnine**

**\*Panthésine**

**Pantofort du Dr Boveil**  
(granules)

**Pantolaxine du Dr Boveil**  
(cachets)

**\*Pantopon Roche**

**Panurol Tissot**

**Panvalérase**

**Panvalerine Delattre**

**Panxylon**

**\*Papaine Trouette-Perret****\*Papaveryl****\*Papavhydrine**

**Papier Albespeyres**

**Papier du Dr Balme**

**Papier Fayard**

**Papier Gicquel**

**\*Papier iodogène Eymonnet**

**Paquets Védé**

**Paracarbochloryl**

**\*Paradoline**

**Paraffinol**

**Paraffinoléol Hamel**

**Paraformine**

**Paragar**

**\*Paragélose****\*Paralactine Byla****\*Paralaxol**

**Paralymphine**

**Paratétanine**

**\*Parathyrocalcine Moncour**

**Parathyroïde Endocrines Fournier**

**Paratoxine Ducatte**

**\*Parlax****\*Paroxyl**

199, av. Victor-Hugo, Aubervilliers.

222, r. Duguesclin, Lyon.

**BOUTY**, 3, r. de Dunkerque, Paris.

132, av. Victor-Hugo, Paris

**SANDOZ**, 3-5, r. de Metz, Paris

1, r. Lassalle, Lyon.

id.

21, pl. des Vosges, Paris.

34, bd de Clichy, Paris.

36, av. Niel, Paris.

10, r. du Bac, Paris.

**E. LOGEAIS**, 24, r. de St-Boulogne-sur-Seine.

15, r. des Immeubles-Industriels, Paris.

**Lab. ORRILLARD**, 245, r. de Vaugirard, Paris.

**MERMINOD**, 49, r. de Paradis, Paris.

78, fg Saint-Denis, Paris.

56, bd Pèreire, Paris.

94, bd Batignolles, Paris.

64 r. des Tournelles, Paris.

139 c. Tolstoï, Lyon-Villeurbanne.

2 et 4, pl. Gambetta, Paris.

76, r. Réaumur, Paris.

99, r. de Paris, Massy (S.-et-O.).

**LANDON**, av. Baraduc, Châtel-Guyon.

17, r. de Berri, Paris.

172, r. d'Alésia, Paris.

107, av. de la Reine, Boulogne-sur-Seine.

22, r. des Martyrs, Paris.

26, av. Observatoire, Paris.

**TULIVET**, 52, r. de Poissy à St-Germain-en-Laye.

32, r. de Grenelle, Paris.

17, r. Bourgelat, Lyon.

49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.

7, r. Biscornet, Paris.

31, r. des Francs-Bourgeois, Paris.

**F. LATOUR**, 71, r. Douy-Delcupe, Montreuil-sous-Bois.

**THIRIET & C<sup>ie</sup>**, 26 et 28, r. des Ponts, Nancy.

**\*Passiflorine**

**\*Passival**

Pastilles Bala  
Pastilles Brachat  
Pastilles Contre-ut

**\*Pastilles Fayès**

Pastilles Helgé  
Pastilles Houdé  
Pastilles Libéria  
Pastilles Méry  
Pastilles Midy  
Pastilles Miraton  
Pastilles Palangie  
Pastilles Paterson  
Pastilles Violettes A.  
B. C.

**Pastilles Vichy-Etat**

Pastils Meran  
Pâte Aseptor  
Pâte Berthé  
Pâte dentifrice

**\*Pâte Dermos**

Pâte Jané

**\*Pâte Mireille**

Pâtes lacto-maltées du  
Dr Jaquet

**\*Pâte Neyret**

Pâte Silka  
Pâte thionique Ram-  
baud

**\*Patholysine**

Pausodyne

**\*Paveron Dausse**

**\*Paxène**

Paxol

Pebromon Henry

Pectine

Pectoral des Dames de  
France

**\*Pelevine**

Pellicules radifères du  
Dr Vallet

**\*Pélospánines**

**\*Pelvisédol**

Penghaivar Vicario

REAUBOURG, 1, r. Raynouard,  
Paris.

H. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.

BRICHARD, Bar-le-Duc (Meuse)

5, av. Victoria, Paris.

GIRAUD & JEANDET, 217, r.

La Fayette, Paris.

199, r. St-Denis, Paris.

Dr LALAURIE, Cuxac-d'Aude.

9, r. Dieu, Paris

10, r. Cyrano-dé-Bergerac, Paris

16, r. de Rocroy, Paris

4, r. du Colonel-Moll, Paris.

6, r. Rosenwald, Paris.

8, r. Vivienne, Paris.

46, r. de Saintonge, Paris.

24, r. de Montesuy, Paris.

24, bd des Capucines, Paris.

18, r. de Maubeuge, Paris.

21, r. Feydeau, Paris.

78, fg Saint-Denis, Paris.

OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
Bruxelles.

NEYRET, 35, r. de la Bourse,  
Lyon.

2, r. Marché-des-Blancs-Man-  
teaux, Paris.

Lab. LEGENDRE & C<sup>ie</sup>, sec-  
tion D. S., Houilles (S.-et-O.).

89, r. de Rivoli, Paris.

35, r. de la Bourse, Lyon.

26, ch. de la Madeleine, Nantes.

38, r. Gay-Lussac, Paris.

142, r. de Picpus, Paris.

98, r. d'Angoulême, Paris.

4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).

MILLET & GUILLAUMIN, 8,  
r. Richer, Paris.

Lab. ORRILLARD, 245, r. de  
Vaugirard, Paris.

9, r. Sclessin, Liège.

17, r. Cadet, Paris.

119, r. de Sèvres, Paris.

3, r. de la Perle, Paris.

22, r. de la Sorbonne, Paris.

FOURNIER Frères, 7, r. Bis-  
cornet, Paris.

Pharmacie C<sup>ie</sup> de France, 21, r.  
des Nonnains-d'Hyères, Paris.

17, bd Haussmann, Paris.

**\*Pennès (Produits)**

Peptodon Henry

Pepsenca Roberts

**\*Pepsodia****\*Peptalmine****\*Pepticol**

Peptidol

Peptobrol Kopp

**\*Peptodiase****\*Pepto-fer du Dr Jaillet**

Pepto-ferrine

**\*Peptogil****\*Peptokola Robin****\*Peptonal****\*Peptonate de fer Robin**

Peptone Byla

Peptone Catillon

Peptone Chapoteaut

Peptone Cornélis

**\*Peptone Vassal**

Peptosodine

Peptosthénine Choay

Peptovaleriane du Dr  
Gigon**\*Peptozym**

Peptyl

Peraziodol

**\*Percaïne****\*Péricols Legros****\*Péristaltine Ciba**

Perles réductrices

**\*Perles Taphosote**

Pernaemon

Peroxydines

**\*Persodine Lumière**

Pertussin Salle

**\*Perubore**

Perunhyl

Pérusol

**\*Phagocytine Bureau**

Phagolysine

**\*Phagostyl****\*Phagostyl Mangané****\*Phaguryl**

Pharmetan

3, r. de Dunkerque, Paris.

39, r. Sclessin, Liège (Belgique).

5, r. de la Paix, Paris.

12, r. des Appenins, Paris.

21, r. Chaptal, Paris.

13, av. Maréchal-Foch, Dam-  
marie-les-Lys (S.-et-M.).

7, r. des Petits-Carreux, Paris.

19, r. des Foulons, Strasbourg.

ZIZINE, 24, r. de Fécamp, Paris.

DARRASSE, 13, r. Pavée, Paris.

OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois,  
Bruxelles.

6, bd de Strasbourg, Paris.

13, r. de Poissy, Paris.

DÜRET & REMY, à Asnières  
(Seine).

13, r. de Poissy, Paris.

26, av. de l'Observatoire, Paris.

3, bd Saint-Martin, Paris.

8, r. Vivienne, Paris.

OPTIMA, Gde-rue au Bois,  
Bruxelles.

28, r. Hôpital-Militaire, Lille.

12, r. Mademoiselle, Paris (XV<sup>e</sup>),

48, r. Théophile-Gautier, Paris.

25, bd Beaumarchais, Paris.

90, av. des Ternes, Paris.

COUDERT, 116, av. Ledru-  
Rollin, Paris.

37, r. de Bourgogne, Paris.

CIBA, 113, bd de la Part-Dieu,  
Lyon.

18, r. Ferdinand-Flocon, Paris.

109-113, bd de la Part-Dieu,  
Lyon.

PATRICE, à Vichy.

20, r. Dumont-d'Urville, Paris.

ROBERTS, 5, r. de la Paix, Paris.

135, r. de Rome, Paris.

23, c. de la Liberté, Lyon.

4, r. Elzévir, Paris.

1, pl. Victor-Hugo, Paris.

80, r. du Rocher, Paris.

114, r. du Temple, Paris.

86, bd Port-Royal, Paris.

14, r. Cantin, Courbevoie.

A. PARIS, 4, r. La-Motte-  
Picquet, Paris.A. PARIS, 4, r. La Motte-Pic-  
quet, Paris.BAILLY, 15-17, r. de Rome,  
Paris.

61, av. Louise. Bruxelles.



- Pharyngaseptyl**  
**Pharynxoil**  
 \***Phelaxine** Moulines  
**Phénalgéine**  
**Phénaseptyl**  
**Phénol** Bobœuf  
 \***Phiamine** Coursaget  
**Philocardine**  
**Philodermine**  
  
 \***Philogastrine**  
**Philogyne**  
  
**Philtroline**  
  
 \***Phléboguil**  
**Phlébosine** M et F.  
 \***Phlébotonine**  
  
**Phlyctol**  
**Phos**  
**Phosbiogyl**  
  
**Phoscalgène**  
  
**Phosféryl** Fournier  
**Phosiodine**  
 \***Phosoforme**  
 \***Phosol** Quinet  
 \***Phosorine**  
 \***Phosote** Lambiotte  
 \***Phospharsol**  
**Phospharsinol**  
**Phospharsyl colloïdal**  
 du Dr Pinard  
**Phosphate** Geffroy  
  
 \***Phosphate** Pinard  
 \***Phosphate** Vital de  
 Jacquemaire  
**Phosphatine** Falières  
 \***Phosphatol** Vitaminé  
 Irradié  
 \***Phosphobrom**  
**Phospho-Calcine**  
  
**Phosphodéine**  
 \***Phospho-Fluor-Beynet**  
 \***Phospho-Gaiacol** Mary  
**Phosphogénase**  
 \***Phosphogène** Favri-  
 chon  
**Phosphoglycérate** de  
 Chaux Chapoteaut  
**Phospho-Iodine**
- 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 à Villeneuve-la-Guyard (Yonne).  
 29, r. de Metz, Toulouse.  
 4, pl. Wilson, Limoges.  
 41, r. de Rome, Paris.  
 9, r. Porte-Côté, Blois (L.-et-C.).  
 25, r. Petits-Hôtels, Paris.  
 13, r. de la République, Yzeure-  
 Moulins (Allier)  
 34, r. Saint-Lazare, Paris.  
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.  
 MARTINET, 16, r. du Petit-  
 Musc, Paris.  
 H. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.  
 54, Fg St-Honoré, Paris.  
 MARTINIE, 62, av. Philippe-  
 Auguste, Paris.  
 37, r. de Bourgogne, Paris.  
 213, r. St-Honoré, Paris.  
 Usine du Blosset, Moulins-sur-  
 Yèvre (Cher).  
 LESCAROUX, à Châteauroux  
 (Indre).  
 7, r. Biscornet, Paris.  
 GRAVIER, 64, r. d'Orsel, Paris.  
 37, r. de Marly, Rueil-Malmaison.  
 143, r. du Temple, Paris.  
 VIDAL, 46, r. de Grenelle, Paris.  
 20, r. Dumont-d'Urville, Paris.  
 46, r. Pierre-Charron, Paris.  
 MORAND, à Auray (Morbihan).  
 88, bd Saint-Denis, Courbevoie.  
  
 DELAMARE & C<sup>ie</sup>, Romilly-  
 sur-Andelle (Eure).  
 88, bd St-Denis, Courbevoie.  
 à Villefranche (Rhône).  
  
 6, r. de la Tâcherie, Paris.  
 15, r. Catulienne, St-Denis  
 (Seine).  
 22, r. Poncelet, Paris.  
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.  
 132, av. Victor-Hugo, Paris.  
 165, r. Saint-Honoré, Paris  
 32, r. de l'Ouest, Paris.  
 37, r. Tivoli, Bordeaux.  
 à Saint-Symphorien - de - Lay  
 (Loire).  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 46, Gde-Rue, Boulogne-s.-Mer.

- \*PhospholéoSe Demasles Vienne (Isère).
- \*Phosphomagnésium 22, r. Poncelet, Paris.
- \*Phosphopinal Juin 10, impasse Milord, Paris.
- Phosphorescine Leker 18, r. Marbeuf, Paris.
- Phospho-Serum 62, r. Dupont-des-Loges, Rennes.
- Phosphotal Clin 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- Phospirine 37, r. de Marly, Rueil (S.-et-O.).
- Phostaniol Lab. COMTOS à Feschcs-le-Châ-tel (Doubs).
- Phostanno-Gaïacol 93, r. Nollet, Paris.
- Phostone BRÉANT, 4, r. de Clichy, Paris.
- \*Phostyl Lab. PY, 58, bd R.-Wallacé, à Puteaux.
- \*Phusasmine E. ROBINEAU, 80, rte des Pe-tits-Ponts, Drancy (Seine).
- Phydermol 70, r. Boucicaut, Fontenay-aux-Roses.
- \*Phylactone Byla 26, av. Observatoire, Paris.
- \*Phylla Dyn 5, r. Claude-Decaen, Paris.
- Phyllosan 26, r. Ste-Claire, Mulhouse.
- Physéine Grémy 14, r. de Clichy, Paris.
- Physioscyamine 44, r. Gambetta, Biarritz.
- \*Physiosthénine DROUET & PLET, 37, r. de Marly, Rueil-Malmaison.
- \*Physocrisine 7, r. Biscornet, Paris.
- Phyténérnine Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- Phyteta 7, pass. Thoinville, Paris.
- \*Phytinate de Quinine 109-113 bd de la Part-Dieu, Lyon.
- Ciba id.
- \*Phytine Ciba 26, av. Observatoire, Paris.
- \*Phytogénine Byla 3, r. Chanez, Paris (XVI<sup>e</sup>).
- Phytol 6, bd de Strasbourg, Paris.
- \*Phytolécithine PLÉ, 111 bis, r. de Turenne, Paris.
- \*Phytosplénol D<sup>r</sup> A. Petit, à Angoulême.
- Phyto-Tanin 5, bd Montparnasse, Paris.
- Phytothérapie Coirre 4, r. Bellart, Paris.
- \*Pilka (Gouttes) 2, r. du Champ-de-Mars, Reims.
- Pilules Anhépatiques 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
- Pilules antidiabétiques Midy 47, r. Blanche, Paris.
- Pilules Bengué 64, r. La Rochefoucauld, Paris.
- \*Pilules Blancard GIGON, 25 bd Beaumarchais, Paris.
- Pilules Bosredon 41, r. de Verneuil, Paris.
- Pilules de Brides GILBERT, 6, r. du Laos, Paris.
- Pilules Clauss 10, r. St-Antoine, Paris.
- Pilules Clérambourg 30, r. Louis-le-Grand, Paris.
- Pilules Coulpier 3, av. Lowendal, Paris.
- Pilules Cuticura à Annonay (Ardèche).
- Pilules Doumer LONGUET, 24, r. Sedaine, Paris.
- \*Pilules du D<sup>r</sup> Debouzy

- Pilules du Dr Moustier** St-Vallier (Drôme).
- \*Pilules du Dr Séjournet** 62, r. de la Tour, Paris.
- Pilules énergétiques Fradier** 53, bd de Verdun, Fontenay-sous-Bois.
- Pilules Eparvier** 26, Grande-Rue, Lyon.
- Pilules Gip** 41, r. Joseph-Bara, Paris.
- Pilules Hardy** 13, r. Minimés, Le Mans.
- \*Pilules héléniennes Naud** 37, r. Pajol, Paris.
- Pilules Hémabione** Lab. MOURGUES, Chemin-Neuf, Ganges (Hérault).
- Pilules d'Hermal** 28, r. Saint-Claude, Paris.
- Pilules Laville** 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- Pilules Lartigue** 78, fg. Saint-Denis, Paris.
- \*Pilules Lemary** 14, r. Palais-Grillet, Lyon.
- \*Pilules lithuranées du Dr Boveil** 1, r. Lassale, à Lyon.
- \*Pilules de Moussette** 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- Pilules Myosotis** 41, r. de Rome, Paris.
- Pilules Nella** 4, r. Jean-Goujon, Paris.
- Pilules Oco** 87, r. Lafayette, Paris.
- Pilules Panma** Dr LALAURIE, Cuxac-d'Aude.
- \*Pilules Philippe** 14, r. Palais-Grillet, Lyon.
- Pilules Pocquin** 46, r. République, Nolay (Côte-d'Or).
- Pilules Prophylactiques Christaens** 2, r. du Champ-de-Mars, Reims.
- Pilules Purgatives du Dr Dehaut** 147, faub. Saint-Denis, Paris.
- Pilules de Quassine Frémint** 6, r. Abel, Paris.
- Pilules Roya** 41, r. de Rome, Paris.
- Pilules stibiées** 2, r. Volney, Paris.
- \*Pilules V.-E. Doumer** Bomel, Annonay (Ard.).
- Pinofluol** 3, r. de Surène, Paris.
- Pinolac** ROBERTS, 5, r. de la Paix, Paris.
- Pinoléum** id.
- \*Pipérazine Midy** 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
- Pipérasol Tissot** 34, bd de Clichy, Paris.
- Piscidia Gmet** 27, fg. Montmartre, Paris.
- Pitol** 2, r. de Paris, Douai.
- Pituglandol Roche** 21, pl. des Vosges, Paris.
- \*Pituilobine Byla** 26, av. Observatoire, Paris.
- Pituitairine** OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- Pixel Koehly** 117, r. Vieille-du-Temple, Paris.
- Placenta Endocrisines Fournier** 7, r. Biscornet, Paris.
- \*Placentodose** 47, r. de Neuilly, Nanterre.
- \*Plagéine Soulas** 119, r. de Sèvres, Paris.
- \*Plasma de Quinton** 54, f. Saint-Honoré, Paris.
- Plasmocol** 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
- Plasmodine Vicario** 17, bd Haussmann, Paris.

- Plasone Vauris**  
**\*Pléxorine Vély**  
**Pluribiase**  
**\*Plurion Couturieux**  
**Pneoline**  
**Pneuma Wander**  
  
**Pneumobiol**  
**Pneumo-calcine**  
**Pneumocratol**  
**\*Pneumogéine Renard**  
**\*Pneumogénol**  
**\*Pneumo-lipase**  
**\*Pneumostyl Daguin**  
**Pneumotanic Grémy**  
**Podophylle Coirre**  
**\*Poliol Churchill**  
**Polvista**  
**\*Polybromure Gonnon**  
**Polycine**  
  
**\*Polyferments**  
**Polyformiate Coutu-**  
**rieux**  
**\*Polyiodure Gonnon**  
**\*Polyminéral Fort**  
  
**Polyna**  
**\*Polypeptonal**  
  
**Polyphorine Freyssinge**  
**Polyvaline D<sup>r</sup> Bayle**  
**Polyveinine**  
**\*Pommade adrénostyp-**  
**tique Midy**  
**Pommade Cuticura**  
**Pommade épidermo-**  
**gène**  
**Pommade de l'Esterel**  
**Pommade Forgue**  
**\*Pommade Fernet à l'In-**  
**suline**  
**Pommade Heliatol**  
**Pommades Kléos**  
  
**\*Pommade Lenoir**  
**\*Pommade Logeais**  
**Pommade Midy**  
**Pommade Néothorium**  
**Millot**  
**\*Pommade au Nestosyl**  
**\*Pommade Noelline**  
**\*Pommades ophtalmi-**  
**ques Chibret**  
**Pommade Périol**
- 72, av. Kléber, Paris.  
 132, av. Victor-Hugo, Paris.  
 21, r. Violet, Paris.  
 18, av. Hoche, Paris.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 151 bis, r. de Joinville, Cham-  
 pigny.  
 48, r. de Paris, Vichy.  
 46, av. des Ternes, Paris.  
 147, fg Saint-Denis, Paris.  
 35, r. de Paris, Clichy.  
 BURE, pl. St-Goëry, Epinal.  
 YVRARD, 17, r. Soufflot, Paris  
 à Saint-Maur (Seine).  
 14, r. de Clichy, Paris.  
 5, bd Montparnasse, Paris.  
 12, r. Castiglione, Paris.  
 6, r. Trencavel, Béziers.  
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
 GAILLON, 113, bd Voltaire,  
 Paris.  
 LALEUF, 20, r. Laos, Paris.  
 18, av. Hoche, Paris.  
  
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
 16, r. Henri Regnault, Courbe-  
 voie.  
 4, imp. de Béarn, Paris.  
 DURET et RÉMY, Asnières  
 (Seine).  
 6, r. Abel, Paris.  
 10, r. de l'Orne, Paris,  
 JAUME, Tamaris (Gard).  
 Lab. MIDY, 4, r. du Colonel-  
 Moll, Paris.  
 3, av. Lowendal, Paris.  
 53, bd de Verdun, Fontenay-  
 sous-Bois.  
 2, av. Gambetta, Choisy-le-Roi.  
 37, r. de Bourgogne, Paris.  
 INSTITUT DE MICROBIO-  
 LOGIE, Sarrebruck.  
 4, pl. Royale, Nantes.  
 2, r. des Cordeliers, Meung-  
 sur-Loire.  
 142, r. de Picpus, Paris.  
 24, r. Silly, Boulogne-sur-Seine.  
 4, r. du Colonel-Moll, Paris.  
 54, r. de la Bienfaisance, Paris.  
  
 72, r. Saint-Dominique, Paris.  
 Guingamp (C.-du-N.).  
 CHIBRET, 5, r. St-Hérem, Cler-  
 mont-Ferrand.  
 21, r. Mouton-Duvernet, Paris.

- Pommade Phlébos** 229, cours Gambetta, Lyon.  
**Pommade Poncet** 107, av. de la Reine, Boulogne-s.-Seine.
- Pommade Quartier** 34, r. de Paris, Essonne (Seine-et-Oise).
- Pommade Radioactive Raderm** 14, r. de la Pépinière, Paris.
- \*Pommade Radine** DUCLOS, Evreux (Eure).  
**\*Pommade Raimoa** 264, bd Voltaire, Paris.  
**Pommades Royer** 223, r. Saint-Martin, Paris.  
**Pommade-Vaccin Sallantale** 42, r. des Grandes-Arcades Strasbourg.  
**\*Pommade V.-E. Doumer** BOMEL, Annonay (Ard.).
- Post-Hypophyse Choay** 48, r. Théophile-Gautier, Paris.  
**\*Potion Adol** GIROUD, 78, c. de la Liberté, Lyon.
- Potion Boissel** 4, cours Circé, Bordeaux.  
**Potion Bonnet** 17, r. Cadet, Paris.  
**\*Potion des Cordeliers de Seez** 19, av. Secrétan, Paris.
- Potion du D<sup>r</sup> Henry** Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).  
**Potion Granval** 12-14, r. Fery, Reims.  
**Poudre américaine Leroy** 12, r. de la République, Puteaux.
- Poudre antiasthmaticque Henry** 39, r. Sclessin, Liège.
- \*Poudre anti-épileptique Cassarini** COLUMEAU, 19, r. St-Bazile, Marseille.  
**Poudre Cap** 2, r. Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris.
- Poudre Cutirexine** 3, r. de l'Arbre, Marseille.  
**Poudre Cytisia** AXAREL, 15, r. Catulienne, St-Denis.
- Poudre dentifrice Charlard** 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
- Poudre de Lausanne** 87, r. Lafayette, Paris.  
 (Voir : *Isotonyl*).
- Poudre de Sapolan** CAVAILLES, 34, r. de Turin, Paris.
- Poudre de viande** 15, r. des Immeubles-Industriels, Paris.
- Poudre du D<sup>r</sup> Cléry** 18, r. de Maubeuge, Paris.  
**Poudre épidermogène** 53, bd de Verdun, Fontenay-sous-Bois.
- \*Poudre Escouflaire** à Baisieux (Nord).  
**Poudre Espic** 20, r. Saint-Lazare, Paris.  
**Poudre Evine** 3, r. de la Perle, Paris.  
**Poudre Exibard** 6, r. Dombasle, Paris.  
**Poudre Fiort** 61, r. de Seine, Paris.  
**Poudre Ferromanganique** 8, r. Vivienne, Paris.
- Poudre Gast** 6, pl. Clichy, Paris.

- Poudre Génia**  
**Poudre gynol**  
**Poudre Gynule**  
**Poudre Héliatol**  
**Poudre Helvétia**  
**Poudre Klappa**  
**Poudre Lartigue**  
**\*Poudre laxative de Vichy**  
**\*Poudre Noelline**  
**Poudre Optima**  
**Poudre O. R. L.**  
**\*Poudre Paterson**  
**Poudre Pelevine**  
**\*Poudre et Pommade d'Insuline Phyloze**  
**Poudre purgative Künckel**  
**Poudre Remoro**  
**Poudre Rhodys**  
**\*Poudre Rocher laxative**  
**\*Poudre Satine**  
**Poudre Stear**  
**\*Poudre Stom**  
**\*Poudre Zani**  
**\*Pragmoline**  
**Praunase Corbière**  
**Préaléxol**  
**Précikase**  
**Précy**  
**Prélase**  
**\*Prévalidine**  
**\*Préventyl**  
**\*Prézymase**  
**\*Prises Delqué**  
**\*Probios**  
**Procuta Brisson**  
**Produits antidiabétiques Dupont**  
**Produits Benedictus**  
**Produits Billault**  
**Produits Chanteaud**  
**Produits diététiques**  
**Produits Gmet**  
**Produits Gory**  
**Produits de Malt**  
**Produits organiques Richard**  
**136, r. Chemin-Vert, Paris.**  
**316, ch. d'Ixelles, à Bruxelles.**  
**CH. DEHAY, à Arras.**  
**4, pl. Royale, Nantes.**  
**50, r. de la République, Puteaux.**  
**GIBAN, à Sens (Yonne).**  
**78, fg Saint-Denis, Paris.**  
**1, quai Aulagnier, Asnières.**  
**GUINGAMP (C.-du-N.).**  
**Gde-Rue au Bois, Bruxelles.**  
**4, r. d'Illzach, Mulhouse.**  
**46, r. de Saintongé, Paris.**  
**3, r. de la Perle, Paris.**  
**48, r. de la Procession, Paris.**  
**3, r. Watteau, Courbevoie.**  
**JÉHAN & BRÉRA, Montauban (L.-et-G.).**  
**97, bd St-Germain, Paris.**  
**19, r. Grégoire-de-Tours, Paris.**  
**11, r. Joseph-Bara, Paris.**  
**34, r. Thiers, Gray.**  
**HERIN, 228, r. de Lille, La Madeleine (Nord).**  
**52, r. de Poissy, St-Germain-en-Laye**  
**SPÉCIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.**  
**27, r. Desrenaudes, Paris.**  
**49, r. de Paradis, Paris.**  
**252, fg St-Martin, Paris.**  
**96, r. Lafayette, Paris.**  
**71, r. Ste-Anne, Paris.**  
**4, r. d'Illzach, Mulhouse.**  
**40, r. d'Enghien, Paris.**  
**LEBOIME, 32, quai Voltaire, Bezons (S.-et-O.).**  
**46, r. Pierre-Charron, Paris.**  
**1, av. Pasteur, Paris.**  
**157, r. Championnet, Paris.**  
**38, r. Rochechouart, Paris.**  
**74, r. Lamarck, Paris.**  
**4, pl. de la Sorbonne, Paris.**  
**54, r. Francs-Bourgeois, Paris.**  
**FAVRICHON, à Saint-Symphorien-de-Lay (Loire).**  
**27, fg. Montmartre, Paris.**  
**51, r. des Mathurins, Paris.**  
**5, r. Labroque, Strasbourg.**  
**79, av. d'Orléans, Paris.**

- Produits Orhino**  
**\*Produits Pennès**  
 (voir : *Pennès*)  
**Produits de Régime**
- Progyne Thelliez**  
**Prophylax**  
**Prophylaxis**
- \*Propidex**  
**\*Propidon**
- \*Prostaphile Leisyn**  
**\*Prosthénase Galbrun**  
**Protaminol Byla**  
**Protéobiol**  
**Protéol**  
**Prothéine**  
**Prothiol**  
**Protiode Grémy**  
**\*Protiodyne**  
**\*Protolysine**  
**Protyline Roche**  
**\*Proveinase**
- Provenine**  
**\*Proxytases**
- \*Proxytol**  
**Prunagar**  
**Pruneline Bost**  
**\*Prunines Sentini**  
**Pruritol Raimoa**  
**Psinase Grémy**  
**Psorialan**  
**\*Psorimangane**
- \*Psothanol**  
**Puberglandol**
- Pulcéine**  
**Pulmine Byla**  
**Pulmobryne**  
**Pulmobules Hyva**  
**\*Pulmocardine**  
**\*Pulmogyl**  
**Pulmolaxol**
- Pulmone**  
**Pulmonine Bouty**  
**Pulmopérol Marol**  
**\*Pulmosérum Bailly**  
**Pulmovaccin**  
**Pulmostéryl**
- 82, r. de la Croix-Verte, Albi.  
**BOUTY**, 3, r. de Dunkerque, Paris.  
**LA NUTRICIA**, 142, r. Frausman, Bruxelles.  
 83, r. Maubeuge, Paris.  
 6, r. des Feuillants, Marseille.  
 11, r. de la Montagne-Ste-Geneviève, Paris.  
**SPECIA**, 86, r. Vieille-du-Rempire, Paris.  
**SPECIA**, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.  
 1 bis, r. Molitor, Paris.  
 8, r. du Petit-Musc, Paris.  
 26, av. Observatoire, Paris.  
**BAILLY**, 17, r. de Rome, Paris.  
 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.  
 29, pl. Bossuet, Dijon.  
 4, r. Childebert, Lyon.  
 14, r. de Clichy, Paris.  
 29, pl. Bossuet, Dijon.  
**GAUTIER**, 13, r. Dorian, Paris.  
 21, pl. des Vosges, Paris.  
**MIDY Frères**, 4, r. du Colonel-Moll, Paris.  
 4, cité Magenta, Paris.  
**Lab. des PROXYTASES**, 97 r. de Vaugirard, Paris.  
 id.  
 71, r. St-Jacques, Paris.  
 à Villefranche (Rhône).  
**DOMERGUE**, Agen (L.-et-G.).  
 264, bd Voltaire, Paris.  
 14, r. de Clichy, Paris.  
 14, r. St-Claude, Paris.  
**MERMINOD**, 49, r. Paradis, Paris.  
 55, bd de Strasbourg, Paris.  
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.  
**LE NAOUR**, Quimperlé (Fin.).  
 26, av. Observatoire, Paris.  
 38, r. N.-Dame de Lorette, Paris.  
 12, r. Grande, Evreux.  
 57, r. Origet, Tours.  
 33, r. Lauriston, Paris.  
**GERDA**, 163, bd Croix-Rousse, Lyon.  
**Lab. DARDENNES**, Tours.  
 3, r. de Dunkerque, Paris.  
 46, r. Gandon, Paris.  
 15 et 17, r. de Rome, Paris.  
 23, r. des Moines, Paris.  
 à Châteauroux (Indre).

- Pulmostyl**
- \*Pulsamone**  
**Pulsophyle**  
**\*Pulvéol**  
**Pulvérisateur E. C. S.**  
**Pulvérisateur Vaast**  
**Pulvi-Lactéol du D<sup>r</sup>**  
 Boucard  
**Pulvinha-Pathuro**  
**Punch Novela**  
**Purgalex**  
**\*Purganol Daguin**  
**Purgatif Voux**  
**Purgelettes Roux**
- \*Purgos**  
**Purgyl Koehly**  
**\*Pyo-Amphogel**
- \*Pyoformine**  
**Pyramidon U. R.**  
**Pyran**  
**\*Pyratone**  
**\*Pyrélaïne Collas**  
**\*Pyréthane**  
**Pyridone D<sup>r</sup> Berlioz**  
**Pyrinol Vichy**  
**\*Pyri-Pyridium**
- Pyrocidine**  
**Pyroclase**
- \*Pyroléol Edet**  
**Pyrothéine**
- Lab. LESCAROUX, 3, r. Victor-**  
 Hugo, Châteauroux.  
 6, r. Dombasle, Paris.  
 4, imp. de Béarn, Paris.  
 10, impasse Milord, Paris.  
 10, r. Caumartin, Paris.  
 22, r. de l'Odéon, Paris.  
 30, r. Singer, Paris.
- LE GALLO, à Auray (Morb.).**  
 St-Julien-en-Jarez (Loire).  
 24, r. Monttessuy, Paris.  
 5, r. Remises, St-Maur (Seine).  
 31, av. Michel-Bizot, Paris.  
**ROUX, 58, r. de Maubeuge,**  
 Paris.  
 11, r. Joseph-Bara, Paris.  
 117, r. Vieille-du-Temple, Paris.  
**RONCHÈSE, 6, r. Rothschild,**  
 Nice.  
**Lab. GOBEY, 89, r. du Cher-**  
 che-Midi, Paris.  
 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.  
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.  
 71, bd Saint-Michel, Paris.  
 15, r. Augustin-Thierry, Paris.  
 18, r. Ernest-Rousselle, Paris.  
 6, r. d'Alsace, Grenoble.  
**PATRICE, à Vichy.**  
**Lab. SERVIER, Orléans (Loi-**  
 ret).  
**OPTIMA, Gde-Rue au Bois,**  
 Bruxelles.  
 21, r. des Nonnains-d'Hyères,  
 Paris.  
 id.  
 3, r. de Paris, Auxerre.
- \*Quassia-Kina Rabot**  
**Quassine Frémint**  
**\*Quassine Houdé**  
**\*Quergemol**
- 49, r. Bitche, à Courbevoie.  
 6, r. Abel, Paris.  
 9, r. Dieu, Paris.  
**BAILLY, 15-17, r. de Rome,**  
 Paris.



- Quiétol  
 Quiétyl  
 \*Quina Baron  
 Quinacinas  
 Quina-fer Mechling  
 Quina Laroche  
 Quinamagnésion  
 Quinarsan  
 \*Quinarsol Grandval  
 \*Quinby  
 Quinéase  
 \*Quinéine  
 \*Quinicardine  
 \*Quinimuthol Saca  
 Quinine Pelletier  
 Quinio-Goyl Meurice  
 \*Quinio-Stovarsol  
 Quinium Roy  
 \*Quinobrome  
 Quinobromine  
 \*Quinoforme Lacroix  
 \*Quinoïdine Duriez  
 Quinol  
 Quinolax  
 Quinopyrol  
 Quinotane Valgny  
 \*Quino-Thorium  
 \*Quinovarine  
 \*Quinquina Gmet  
 Quinquina granulé As-  
 tier  
 Quinquina Granval  
 Quinquina Watelet  
 \*Quinsal  
 \*Quinthéryl  
 \*Quinuryl  
 Quiphos Churchill  
 Le Quotidien  
 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.  
 1, pl. Victor-Hugo, Paris.  
 P. FOURNIE, 3, pl. Miséri-  
 corde, Lyon.  
 ROBERTS, 5, r. de la Paix,  
 Paris.  
 à Mulhouse.  
 COMAR, 20, r. des Fossés-  
 Saint-Jacques, Paris.  
 SAUBA, 1, r. d'Enghien, Paris.  
 22, r. de la Sorbonne, Paris.  
 12 et 14, r. Féry, Reims.  
 P. AUBRY, 54, r. Bienfaisance,  
 Paris.  
 37, r. de Marly, Rueil (S.-et-O.).  
 21, r. Chaptal, Paris.  
 27, r. de la Procession, Paris.  
 89, r. du Cherche-Midi, Paris.  
 VIAL, 8, r. Viviehne, Paris.  
 61, av. Louise, Bruxelles.  
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-  
 Temple, Paris.  
 81, bd Suchet, Paris.  
 Pharmacie centrale de France,  
 21, r. des Nonnains-d'Hyères,  
 Paris.  
 TORAUDE, 22, r. de la Sor-  
 bonne, Paris.  
 37, r. Pajol, Paris.  
 20, pl. des Vosges, Paris.  
 G. HENRY, à Vernon (Eure).  
 ROBERTS, 5, r. de la Paix,  
 Paris.  
 172, r. d'Alésia, Paris.  
 12, r. Charles-V, Paris.  
 157, r. de Sèvres, Paris.  
 OPTIMA, 78, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.  
 27, fg Montmartre, Paris.  
 45, r. du Docteur-Blanche,  
 Paris.  
 12-14, r. Féry, Reims.  
 15, av. Montsouris, Paris.  
 34, r. Thiers, Gray.  
 LÉONARDON, Arcachon (Gir.)  
 LONGUET, 34, r. Sedaine, Pa-  
 ris.  
 12, r. Castiglione, Paris.  
 A. Chartier, à Saumur.

## R

- Radiargyl**  
 \***Radiobaume Adrian**  
**Radiobiogyl**  
  
**Radiocrémeline**  
**Radiodine**  
**Radiogastrol**  
**Radiole**  
 \***Radiolysine**  
**R a d i o m a g n é s i u m**  
**Rhemda**  
 \***Radiopaque**  
  
 \***Radiophorine**  
**Radiosérum Jaboin**  
 \***Radiotétrane**  
 \***Radiotropine**  
  
**Radiovitine**  
  
**Radiovules**  
**Radipirine**  
**Radjunal Chevrier**  
**Raiforyl**  
  
**Raisin Moillard**  
**Raisin vivant (Nutro-  
 biase)**  
**Rami-gouttes**  
**Rapidoats**  
**Ravix**  
  
**Réalgose**  
**Réaline**  
 \***Réalphène Buisson**  
 \***Réargon**  
 \***Reconstituant Mary**  
 \***Rectagine**  
 \***Rectoline**  
 \***Rectopanbiline**  
  
**Rectoplasme**  
**Rectosol**  
**Recto-Vaccin Salan-  
 tale**  
**Recytile**
- 51, r. d'Alsace, à Courbevoie.  
 9 et 11, r. de la Perle, Paris.  
 Usine du Blosset, Moulins-sur-  
 Yèvre (Cher).  
 25, r. Vaneau, Paris.  
 4, r. St-Anastase, Paris.  
 12, r. Pavée, Paris.  
 25, r. Vaneau, Paris.  
 41, r. de Romè, Paris.  
 51, r. d'Alsace, Courbevoie.  
  
 HEUDEBERT, 85, r. St-Ger-  
 main, à Nanterre.  
 JOOSS, Montreuil (Seine).  
 24, r. Monttessuy, Paris.  
 40, r. Bellechasse, Paris.  
 Établ. Laboradium, 33, r. St-  
 Jacques, Paris.  
 Usine du Blosset, Moulins-sur-  
 Yèvre (Cher).  
 51 r. d'Alsace, Courbevoie.  
 9, r. Victor-Letalle, Paris.  
 21, fg Montmartre, Paris.  
 15, pl. Godefroy-de-Bouillon,  
 Boulogne-sur-Mer.  
 8, r. Lacépède, Le Havre.  
 10, r. Cimaresa, Paris.  
  
 à Levallois-Perret, 44, r. Chaptal.  
 BLOCH à Tomblaine (M.-et-M.).  
 CRAISSON, 19, r. J.-J.-Rous-  
 seau, Paris.  
 4, imp. de Béarn, Paris.  
 GUILLAUME, Issoudun.  
 157, r. de Sèvres, Paris.  
 41, r. de Rome, Paris.  
 32, r. de l'Ouest, Paris.  
 22, r. de la Sorbonne, Paris.  
 164, r. Saint-Honoré, Paris.  
 Lab. de la PANBILINE, à  
 Annonay (Ardèche).  
 MILLET, à Rambouillet.  
 164, r. St-Honoré, Paris.  
 42, r. Grandes-Arcades, Stras-  
 bourg.  
 4, r. d'Illzach, Mulhouse.

- \*Réfistine  
Régulase Efgé
- \*Regyl  
Rein- Endocrisines  
Fournier
- Remède Boss
- \*Renaleptine  
  
Renalguine
- Renetol
- Renotanic Grémy
- \*Réparateur Thuau  
Résoçaine
- \*Résurrex (Tablettes)
- \*Résyl
- \*Réthragine  
Retropituite Carrion  
Retusol
- Revitalose
- Révulsif
- \*Révulsif Boudin
- \*Révulsif Milko
- \*Révulsif Procipha  
Révulsior  
Révulsoplasme
- \*Rhagadine Bracque-  
mond  
Rhamnine Henry
- \*Rhéantine Lumière
- \*Rhéothymine
- Rhésal-Vicario
- \*Rhinadrol
- Rhinaldose  
Rhinalginol  
Rhinaseptogène
- \*Rhinaspir  
Rhinodol
- \*Rhinofluine  
Rhino-Lactéol du D<sup>r</sup>  
Boucard
- Rhinolin
- \*Rhino-Liposeptine  
Rhino-Pro  
Rhinotherme
- Rhino-Vaccin Salan-  
tale
- 20, r. du Conseil, Bruxelles.
- 40, av. Secrétan, Paris.
- 8, r. Richer, Paris.
- 7, r. Biscornet, Paris.
- PRAX, à Brest (Finistère).
- SPECIA, 86, r. Vieille-du-  
Temple, Paris.
- LONGUET, 34, r. Sedaine,  
Paris.
- DUVAL, à Falaise.
- 14, r. de Clichy, Paris.
- 22, fg. St-Michel, Angers.
- BRESSIER, 102, r. Vincent,  
Marseille.
- à Nolay (Côte d'Or).
- 109-113 bd de la Part-Dieu,  
Lyon.
- 22, r. de la Sorbonne, Paris.
- 54, fg. Saint-Honoré, Paris.
- 119 bis, av. Ch.-de-Fer, Rueil  
(Seine-et-Oise).
- D<sup>r</sup> FRAYSSE, 47, r. de Neuilly,  
Nanterre.
- 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
- 9, av. Jean-Jaurès, Joinville-  
le-Pont (Seine).
- 60, cours Emile-Zola, Lyon.
- 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
- PAULIN & BARRE, Tours.
- 371, r. des Pyrénées, Paris.
- 105, r. de Normandie, Courbe-  
voie (Seine).
- 39, r. de Sclessin, Liège.
- 23, c. de la Liberté, Lyon.
- CH. GAUTIER, 13, r. Dorian,  
Paris
- 17, bd Haussmann, Paris.
- A. FALVY, 40, r. des Acacias,  
Paris.
- 4, imp. de Béarn, Paris.
- LONGUET, 34, r. Sedaine, Paris
- PATRICE, à Vichy.
- 21, r. Feydeau, Paris.
- 50, r. de la République, Pu-  
teaux.
- 5, r. François-Ponsard, Paris.
- 30, r. Singer, Paris.
- 82, av. Malakoff, Paris.
- 2, pl. des Vosges, Paris.
- 4, cité Magenta, Paris.
- Bagnères-de-Bigorre (Htes-Pyr.)
- 42, r. Grandes-Arcades, Stras-  
bourg.

- \*Rhizotantin  
 \*Rhocya Dyn  
 \*Rhodarsan  
 \*Rhodazil  
 Rhodocaïne Coutu-  
 rieux 18, av. Hoche, Paris.  
 \*Rhoféine SPECIA, 86, r. Vieille-du-  
 Temple, Paris.  
 \*Rhomnol Leprince 62, r. de la Tour, Paris.  
 Rhubarbe comp. de 8, r. Vivienne, Paris.  
 Baudry  
 Rhumatoïdine  
 \*Ricéyl Billault  
 \*Ricigel  
 Ricinopalmine  
 \*Ricomalt  
 \*Riodine Astier  
 Rob Dussang  
 Rob Gory  
 \*Rob Oberlin  
 Roléine  
 \*Romarantyl  
 \*Rosalyl A et B  
 Rosanol  
 \*Royérine Dupuy  
 \*Rozoderme  
 \*Rubyl  
 \*Rutonal  
 Rylal Noyon  
 Rythmos Leisyn  
 \*Rythmosystol  
 56, bd, Ornano, Paris.  
 5, r. Claude-Decaen, Paris.  
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-  
 Temple, Paris.  
 id.  
 18, av. Hoche, Paris.  
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-  
 Temple, Paris.  
 62, r. de la Tour, Paris.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 39, r. de la Gare, Bondy (Seine).  
 22, r. de la Sorbonne, Paris.  
 ROBERTS & C<sup>ie</sup>, 5, r. de la  
 Paix, Paris.  
 5, bd. des Brotteaux, Lyon.  
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie  
 45, r. du Docteur-Blanche, Paris.  
 Lab. LESCAROUX, Château-  
 roux.  
 JOOSS, Montreuil (Seine).  
 TINARDON, 17, r. Cadet, Paris.  
 49, r. de Bitché, Courbevoie.  
 15, r. des Immeubles-Indus-  
 triels, Paris.  
 101, r. de Paris, Rueil (S.-et-O.)  
 L. HINGLAIS, à Epernay.  
 223, r. St-Martin, Paris.  
 11, r. des Deux-Ponts, Paris  
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-  
 Temple, Paris.  
 SPÉCIA, 86, r. Vieille-du-  
 Temple, Paris.  
 12, r. des Apennins, Paris.  
 1 bis, rue Molitor, Paris.  
 COMTE, 60, r. St-Guilhem,  
 Montpellier.

## S

- \*Sant-Aré  
 \*Salantale  
 Sté des Eaux minérales de  
 Decize (Nièvre).  
 NOTH & ANSELME, 42, Gran-  
 des-Arcades, Strasbourg.

- Salasenyli**  
**Salas-Embrocation**  
**Salbiase**  
**Salbine du Dr Fayès**  
**\*Salénal Ciba**  
  
**\*Salène Ciba**  
**Salicaïne**  
**Salicaire Dausse**  
**Salicaire Henry**  
**Salicairine**  
**\*Salicéral Clin**  
**Salicol Dussaule**  
**Saliode**  
**\*Salsanos**  
**\*Salubrine Phénix**  
**Salvacid**  
**Salvanos**  
  
**Salva-Serum**  
  
**\*Salvatyl**  
  
**\*Salvenase Legoux**  
  
**Salvone**  
**Salvocaf**  
**Salvoxyl**  
**\*Salyptol Narty**  
**\*Salysérum**  
  
**\*Sambul**  
**Sanalgine**  
  
**Sanalia**  
  
**\*Sanas**  
**\*Sandoptal Sandoz**  
**\*Sanedrine**  
  
**\*Sanex Inhalant**  
  
**Sanguifer Bouret**  
**\*Sanguil**  
**\*Sanguine irradiée**  
  
**Sangul Dubat**  
**Sanka**  
  
**\*Sanluol**  
  
**Sanocryisine**  
**\*Sanoformine**  
**\*Sanogyl**  
**\*Sanoram**
- 75, r. de Paris, St-Ouen.  
 id.  
 La Baule-sur-Mer (Loire-Inf.)  
 3, r. du 4-Septembre, Paris.  
 109-113, bd de la Part-Dieu.  
 Lyon.  
 id.  
 168, b. Saint-Germain, Paris.  
 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).  
 39, r. de Sclessin, Liège.  
 3, r. de Sévigné, Paris.  
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.  
 6, r. Abel, Paris.  
 GABAIL, 5, r. Lefebvre, Paris.  
 5, r. de la Paix, Paris.  
 14, r. de Birague, Paris.  
 MIALHE, 8, r. Favart, Paris.  
 2, r. Marché-des-Blancs-Man-  
 teaux, Paris.  
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.  
 42, r. Emile-Deschanel, Cour-  
 bevoie.  
 6, r. Louis-Blanc, La Garenne-  
 Colombes (Seine).  
 37, r. Frédéric-Fays, Lyon.  
 Villeneuve-les-Avignon (Gard).  
 237, r. Lafayette, Paris.  
 134, bd Péreire, Paris.  
 37, r. de Marly, Rueil-Mal-  
 maison.  
 à Evreux (Eure).  
 Lab. SANAL, St-Louis (Haut-  
 Rhin).  
 35, r. des Francs-Bourgeois,  
 Paris.  
 72, r. du Commerce, Paris.  
 3 et 5, r. de Metz, Paris.  
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-  
 Temple, Paris.  
 BOISSY, 49, r. Hoche, Cour-  
 bevoie (Seine).  
 87, r. Lafayette, Paris.  
 12, r. Saint-Gilles, Paris.  
 RIETHE, 40, r. des Abbesses,  
 Paris.  
 80, fg. Saint-Denis, Paris.  
 54, quai de Boulogne, Boulogne-  
 sur-Seine.  
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-  
 Temple, Paris. 3  
 39, r. Fondaudège, Bordeaux.  
 1, pl. Victor-Hugo, Paris.  
 131, r. Cambronne, Paris.  
 id.

Sanos	G. MIQUEL, 3, av. Lowendal, Paris.
Santal Blanc	Lab. IMMUNOS, av. des Sources, Nice.
Santal Bretonneau	6, r. Saint-Claude, Paris.
Santal Clin	20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
*Santal Midy	8, r. Vivienne, Paris.
*Santal Monal	6, r. Bridaine, Paris.
Santalol Montagu	49, bd Port-Royal, Paris.
Santal Oberlin	17, r. Cadet, Paris.
Santal P. Petit	12, bd Saint-Martin, Paris.
Santal Salolé Cabanès	17, r. Cadet, Paris.
Santal salolé Lacroix	13, r. Philippe-de-Girard, Paris.
Santéine Montagu	49, bd. Port-Royal, Paris.
*Santhéose	4, r. du Roi-de-Sicile, Paris.
Santogénol Caubin	62, r. Erlanger, Paris.
Santomalt	U. C. E. P., 5, r. Labroque, Strasbourg.
Sapobarbe	CAVAILLES, 34, r. de Turin, Paris.
Sapocade	id.
Sapocrème	id.
*Sapolan	id.
Sapopâte	34, r. de Turin, Paris (VIII <sup>e</sup> ).
Sapogynol	36, r. des Martyrs, Paris.
Sarco-sérum	107, r. des Dames, Paris.
Sarcolactine	28, bd de la Cluse, Genève.
*Sarcoptol	9, bd Edgar-Quinet, Paris.
Sarkol	à Dammarie-les-Lys (S-et-M.).
*Satine	11, r. Joseph-Bara, Paris.
Saturalgine	3, bd Beaumarchais, Paris.
Saturol	Laborat. DURET & RÉMY, Asnières
Sauge Gmet	27, fg. Montmartre, Paris.
Savon dentifrice Vigier	12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
Savon de Sapolan	CAVAILLES, 34, r. de Turin, Paris.
Savon Iodé Oberlin	17, r. Cadet, Paris.
Savons Denisol Brisson	157, r. Championnet, Paris.
Savons ichthyol, soufre, etc.	VIGIER, 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
Savons Michon	49, bd Port-Royal, Paris.
*Savons Mollard	2, r. du Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris.
*Savon Perusol	114, r. du Temple, Paris.
Scialine	P. C. B., 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
Sciaticure	121, av. St-Ouen, Paris.
*Scillarène	SANDOZ, 5, r. de Metz, Paris.
Scléramine Dausse	4, r. Aubriot, Paris (IV <sup>e</sup> ).
Sclérobyl	55, av. Victor-Hugo, Paris.
Sclérolysine	31, r. des Francs-Bourgeois Paris
*Sclérosérol	40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.
*Sclérosérum	114, r. du Temple, Paris.

- \*Scléroveine Hardy  
Scorogènes
- \*Scurocaïne
- \*Scuroforme
- \*Sécacornine Roche
- Sédacrine Crestey
- \*Sédarsan Optima
- Sédasthmine
- \*Sédatine Christiaens
- \*Sédatose Gigon
- \*Sédatuline
- Sedlitz Ch. Chanteaud
- Sedobore
- \*Sédobrol Roche
- Sédocardine
- \*Sédogastrine
- Sedo-gaz
- Sédogène Sallé
- \*Sédol Buisson
- Sédomens
- \*Sédoneurol
- \*Sédorhinol
- \*Sedormid Roche
- \*Sédosine
- Sédospasmine
- Sédo Viette
- Sektal Grémy
- \*Selamon
- Sels Clarks
- Sel D.
- \*Sel d'Ewald
- Sel digestif Bé Me Cé
- Sel de fruit Crolas
- \*Sélénol Couturieux
- \*Sels Le Perdriel
- \*Sel hépatique U. N.
- Arquevaux
- \*Sel de Hunt
- Sel Impérial Borotar-
- trine
- Sel Jolivet
- \*Sels du Jura
- Sels naturels de Brides
- les-Bains
- Sel de Salins-Moutiers
- Selvan
- 200, r. de Tolbiac, Paris.
- COMAR, 20, r. des Fossés-
- Saint-Jacques, Paris.
- SPECIA, 86, r. Vieille-du-
- Remp, Paris.
- id.
- 21, pl. des Vosges, Paris.
- 164, r. Saint-Honoré, Paris.
- OPTIMA, Gde-Rue au Bois,
- Bruxelles.
- 3, bd Beaumarchais, Paris.
- 2, r. du Ch.-de-Mars, à Reims.
- 25, bd Beaumarchais, Paris (IV<sup>e</sup>)
- 46, r. de la Barrière, Elbeuf.
- 54, r. Francs-Bourgeois, Paris
- (V. : Prod. Chanteaud).
- 80, r. du Rocher, Paris.
- 21, pl. des Vosges, Paris.
- Lab. BARRÉ, 7, pl. Péreire,
- Paris.
- ZIZINE, 24, r. de Fécamp, Paris
- BOUDIER, 37, r. de Bourgogne,
- Paris.
- 14, r. des Pyramides, Paris.
- 157, r. de Sèvres, Paris.
- 21, r. Alsace-Lorraine, Lyon.
- 66, r. Nationale, Lille.
- REGAGNON, 276, r. Lecourbe,
- Paris.
- 21, pl. des Vosges, Paris.
- 38, b. Bourdon, Neuilly-s-Seine.
- DEMASLES, Vienne (Isère).
- 163, r. de Flandre, Paris.
- 34, r. Sedaine, Paris.
- (Voir : Magnetone).
- 16 bis, r. Vivienne, Paris.
- DUPUY, à Montluçon (Allier).
- BRACQUEMOND, 105, r. de
- Normandie, Courbevoie.
- 21, r. Violet, Paris.
- 56, ch. de Combe-Blanche, Lyon.
- 18, av. Hoche, Paris.
- 11, r. Milton, Paris.
- à Etampes (Seine-et-Oise).
- 16, r. Boulainvilliers, Paris.
- 22, r. de l'Arcade, Paris.
- 140, fg. Saint-Honoré, Paris.
- 11, av. de l'Opéra, Paris.
- 46, rue Pierre-Charron, Paris.
- 46, r. Pierre-Charron, Paris.
- COUTURIEUX, 18, av. Hoche,
- Paris.

- Sel Vichy-Etat**  
**Selnos-Vichy**  
**Sels radioactifs Ra-**  
**diana**  
**\*Selunic**
- Sel Zem**  
**\*Sénophile**  
**Séotral Leisyn**  
**\*Sephydine**  
**Septacrol**
- \*Septicémine Cortial**  
**Septometrol**  
**Septylase**
- Séquardine Bouty**  
**Sérénol**  
**\*Serifer Laurençon**  
**Sérobél**  
**\*Séro-comprimés Mé-**  
**rieux**  
**\*Serodausse antitoxi-**  
**senyl**  
**Séroferrine**  
**Sérogyne**  
**\*Séroléine**
- \*Seroma**  
**\*Séroquinol**
- Sérosan**
- \*Séro-Sérum Rivier**  
**Serosine Boullé**
- Sérosthényl Bouty**  
**Serpoline**
- \*Sérum antiasthmati-**  
**que de Heckel**  
**Sérum antiphymique**  
**Vadam**  
**Sérum antityphoïdique**  
**de Rodet**  
**Sérum Collyre**  
**\*Sérum de Jousset**
- Sérums de l'Institut**  
**Mérieux**  
**Sérum maternel**
- \*Sérum neuropsychique**  
**Sérum Nevrotone**
- 24, bd des Capucines, Paris  
**COUBAND**, 27, r. Drouot, Paris.  
 20, pl. de la Nation, Paris.
- G. MIQUEL**, 3, av. Lowendal,  
 Paris.  
 85, r. Turbigo, Paris.  
 17, r. de Berri, Paris.  
 1 bis, r. Molitor, Paris.  
**Chabeuil (Drôme)**.  
 109-113, bd de la Part-Dieu,  
 Lyon.  
 15, bd Pasteur, Paris.  
 132, av. Victor-Hugo, Paris.  
**BRISSON & C<sup>ie</sup>**, 157, r. Cham-  
 pionnet, Paris.  
 3, r. de Dunkerque, Paris.  
 46, av. des Ternes, Paris.  
**Villefranche-sur-Saône (Rhône)**.  
**LBL** 18 r. Daguerre, Paris.  
 63, r. Victor-Hugo, Lyon.
- 4, r. Aubriot, Paris.
- 52, r. La Bruyère, Paris.  
**LBL**, 18, r. Daguerre, Paris.  
**C. BARON**, aux Sables-d'Olonne  
 (Vendée).  
 12, r. Montmartre, Dijon.  
**Ph<sup>ie</sup>** centrale de France, 21, r.  
 des Nonnains-d'Hyères, Paris.  
**TORAUDE**, 22, r. de la Sor-  
 bonne, Paris.  
 26-28, r. St-Claude, Paris.  
 12, av. de la Grande-Armée,  
 Paris.  
 3, r. de Dunkerque, Paris.  
**OPTIMA**, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.  
**CORBIERE**, 27, r. Desre-  
 naudes, Paris.  
 (Voir : Antiphymique).
- Lab. **AGUETTANT**, 36, q. Ful-  
 chiron, Lyon.  
 26, av. Observatoire, Paris.  
**BRUNEAU**, 17, r. de Berri,  
 Paris.  
 17, r. Bourgelat, Lyon.
- OPTIMA**, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.  
 191, Fg-St-Antoine, Paris.  
**P. C. B.**, 12, r. du Téléphone,  
 Bruxelles.



- \*Sérum Normet 10, r. Vignon, Paris.  
 Sérum Oliviero 87, r. Denfert-Rochereau, Paris.  
 Sérum polymicrobien ADLER, 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- \*Sérums Fraisse 8, r. Jasmin, Paris.  
 Sérum sthénique OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
- \*Sérum végétal Dr CUGUIILLERE, 19, r. des Chalets, à Toulouse.
- \*Séti P. BRISSON & C<sup>ie</sup>, 157, r. Championnet, Paris.  
 1 bis, r. Molitor, Paris.
- Sève cérébrale Leisyn
- \*Siccogyne J. MIDY, 41, r. de Courbevoie, La Garenne (Seine).
- Sicol 5 r Robert-Planquette, Paris.
- Sicopion 31, r. Saint-Georges, Paris.
- \*Sidérarsan Lab. HALLEANNA, 4, imp. de Béarn, Paris.
- Sigma-Cones 17, r. Cadet, Paris.
- Sigmoldine Grémy 14, r. de Clichy, Paris.
- Sigol à Saint-Fons (Rhône).
- \*Silguine 1, r. Raynouard, Paris.
- Silicate de soude Pellissier 33, av. de Villiers, Paris.
- \*Silicyl 18, r. Ernest-Rousselle, Paris.
- \*Silisode 9, r. Castex, Paris.
- Simocalcine CHARMASSON, à Marseille.
- \*Sinahin 15, r. d'Argenteuil, Paris.
- Sinapisme Rigollot 7-13, r. St-Maurice, Nanterre.
- \*Sinaplasme du Dr FAURE & DUSSUEL, à Aix-les-Bains.
- Sinrénaline 66, r. Nationale, Lille.
- \*Sinuzyl CHATEAU, 137, av. Parmentier, Paris.
- Sirodion 228, r. de Paris, Montreuil-sous-Bois.
- Sirop d'Aconit Ecalle 157, r. de Sèvres, Paris.
- Sirop Alba 61, r. de Seine, Paris.
- Sirop antiasthmatique BlOTTIERE, 6, r. Dombasle, Paris.
- Sirop d'Aubergier COMAR, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- \*Sirop Axaria AXAREL, 15, r. Catulienne, St-Denis.
- Sirop Bala BRICHARD, Bar-le-Duc (Meuse)
- Sirop béchique Maire 171, r. de Belleville, Paris.
- Sirop Belca THÉVENOT, r. des Roses, Dijon.
- Sirop Berthé 8, fg Saint-Denis, Paris.
- \*Sirop de Blancard 64, r. La Rochefoucauld, Paris
- Sirop Blottière 6, r. Dombasle, Paris.
- \*Sirop Brahma COULOUX, 116, r. du Pont, Auxerre (Yonne).

- Sirop Briant**  
**Sirop de Broméine**  
**Sirop Buci**  
**Sirop Burgal**  
**Sirop carbolique du**  
**D<sup>r</sup> Vialle**  
**\*Sirop composé aux Hyp-**  
**phosphites Fellows**  
**\*Sirop de Créosote Va-**  
**cheron**  
**Sirop de Dentition Al-**  
**deni**  
**Sirop Delabarre**  
**Sirop de Raifort iodé**  
**de Grimault**  
**Sirop Derbecq**  
**Sirop de digitale**  
**Sirop Diver**  
**\*Sirop Dubois au créosal**  
*(Voir : Créosal).*  
**Sirop du D<sup>r</sup> Dubreuil**  
**Sirop de Dusart**  
**Sirop D<sup>r</sup> Dusourd**  
**\*Sirop Famel**  
**Sirop ferrug. Laroze**  
**Sirop Flamand**  
**Sirop C. Frany**  
**Sirop Gabi**  
**\*Sirop Gelineau**  
**Sirop Gelvart**  
**Sirop de Gibert**  
**Sirop Gigon**  
**Sirop Girard**  
**\*Sirop de glycérophos-**  
**phates Vacheron**  
**\*Sirop Gribell**  
**Sirop Grimault**  
**Sirop Guilliermond**  
**Sirop du D<sup>r</sup> Hecquet**  
**Sirop Helgé**  
**Sirop d'Hémoglobine**  
**Byla**  
**Sirop d'Hémoglobine**  
**Grimault**  
**Sirop d'Hémoglobine**  
**Henry**  
**Sirop d'Hémoglobine**  
**Star**  
**Sirops Henry**
131. r. Vaugirard, Paris.  
 MONTAGU, 49, bd Port-Royal,  
 Paris.  
 COMAR, 20, r. des Fossés-  
 Saint-Jacques, Paris.  
 1, rue Rambuteau, Paris.  
 87, r. Lafayette, Paris.  
 5, r. de la Paix, Paris.  
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
 15, r. Catulienne, St-Denis.  
 78, faub. Saint-Denis, Paris.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 12, rue Cadet, Paris.  
 LABELONYE, 99, r. d'Aboukir,  
 Paris.  
 50, r. de la République, Pu-  
 teaux.  
 20, r. du Laos, Paris.  
 37, r. Galilée, Paris.  
 VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 16 à 22, r. des Orteaux, Paris.  
 2, r. des Lions, Paris.  
 6, pl. Clichy, Paris.  
 52, av. de la République, Paris.  
 AXAREL, 15, r. Catulienne,  
 St-Denis.  
 MOUSNIER, 9, bd Carnot,  
 Bourg-la-Reine.  
 24, r. Bagnole, Paris.  
 Maisons-Laffitte (S.-et-O.).  
 25, bd Beaumarchais, Paris.  
 48, r. d'Alésia, Paris.  
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
 19, r. Drouot, Paris (IX<sup>e</sup>).  
 VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.  
 131, r. de Vaugirard, Paris.  
 49, bd Port-Royal, Paris.  
 D<sup>r</sup> LALAURIE, Cuxac-d'Aude.  
 26, av. Observatoire, Paris.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 39, r. Sclessin, Liège.  
 2, r. Marché-des-Blancs-Man-  
 teaux, Paris.  
 39, r. Sclessin, Liège.

- Sirop Briant**  
**Sirop de Broméine**  
**Sirop Buci**  
**Sirop Burgal**  
**Sirop carbolique du**  
**D<sup>r</sup> Vialle**  
**\*Sirop composé aux Hyp-**  
**phosphites Fellows**  
**\*Sirop de Créosote Va-**  
**cheron**  
**Sirop de Dentition Al-**  
**deni**  
**Sirop Delabarre**  
**Sirop de Raifort iodé**  
**de Grimault**  
**Sirop Derbecq**  
**Sirop de digitale**  
**Sirop Diver**  
**\*Sirop Dubois au créosal**  
*(Voir : Créosal).*  
**Sirop du D<sup>r</sup> Dubreuil**  
**Sirop de Dusart**  
**Sirop D<sup>r</sup> Dusourd**  
**\*Sirop Famel**  
**Sirop ferrug. Laroze**  
**Sirop Flamand**  
**Sirop C. Frany**  
**Sirop Gabi**  
**\*Sirop Gelineau**  
**Sirop Gelvart**  
**Sirop de Gibert**  
**Sirop Gigon**  
**Sirop Girard**  
**\*Sirop de glycérophos-**  
**phates Vacheron**  
**\*Sirop Gribell**  
**Sirop Grimault**  
**Sirop Guilliermond**  
**Sirop du D<sup>r</sup> Hecquet**  
**Sirop Helgé**  
**Sirop d'Hémoglobine**  
**Byla**  
**Sirop d'Hémoglobine**  
**Grimault**  
**Sirop d'Hémoglobine**  
**Henry**  
**Sirop d'Hémoglobine**  
**Star**  
**Sirops Henry**
131. r. Vaugirard, Paris.  
 MONTAGU, 49, bd Port-Royal,  
 Paris.  
 COMAR, 20, r. des Fossés-  
 Saint-Jacques, Paris.  
 1, rue Rambuteau, Paris.  
 87, r. Lafayette, Paris.  
 5, r. de la Paix, Paris.  
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
 15, r. Catulienne, St-Denis.  
 78, faub. Saint-Denis, Paris.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 12, rue Cadet, Paris.  
 LABELONYE, 99, r. d'Aboukir,  
 Paris.  
 50, r. de la République, Pu-  
 teaux.  
 20, r. du Laos, Paris.  
 37, r. Galilée, Paris.  
 VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 16 à 22, r. des Orteaux, Paris.  
 2, r. des Lions, Paris.  
 6, pl. Clichy, Paris.  
 52, av. de la République, Paris.  
 AXAREL, 15, r. Catulienne,  
 St-Denis.  
 MOUSNIER, 9, bd Carnot,  
 Bourg-la-Reine.  
 24, r. Baignolet, Paris.  
 Maisons-Laffitte (S.-et-O.).  
 25, bd Beaumarchais, Paris.  
 48, r. d'Alésia, Paris.  
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
 19, r. Drouot, Paris (IX<sup>e</sup>).  
 VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.  
 131, r. de Vaugirard, Paris.  
 49, bd Port-Royal, Paris.  
 D<sup>r</sup> LALAURIE, Cuxac-d'Aude.  
 26, av. Observatoire, Paris.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 39, r. Sclessin, Liège.  
 2, r. Marché-des-Blancs-Man-  
 teaux, Paris.  
 39, r. Sclessin, Liège.

- Sirop Rébellion**  
**Sirop Reinwillier**  
**Sirop Rhegia**  
**\*Sirop Roche au thiocol**  
**\*Sirop Sentini**  
**\*Sirop de Sirtal**  
**\*Sirop de Teyssedre**  
**Sirop Thomas**  
**\*Sirop Tinardon**  
**Sirop tribromuré Gi-**  
**gon**  
**\*Sirop Vacheron au**  
**gaïacol**  
**Sirop Vauthier Marcq**  
**Sirop vermifuge Ré-**  
**monia**  
**Sirop Viette**  
**Sirop Zemmette**  
**Sirtal**  
  
**\*Sistomensine Ciba**  
**Sodamyl**  
**\*Soderséine**  
**\*Sodogastrol**  
**\*Sodolactine**  
  
**Sodotetrane**  
**\*Sodothioli**  
  
**\*Solmuth**  
**Solubaine Nativelle**  
**\*Solucalcine**  
  
**\*Solucamphre Dela-**  
**lande**  
**\*Soluprotine Roche**  
**\*Soluroi**  
  
**Soluté Gaube du Gers**  
**Soluthanol**  
**\*Solution Bardet**  
**Solution de bi-phos-**  
**phate de chaux**  
**\*Solutions Clin**  
**\*Solution Coirre**  
**Solution du Dr Jacobson**  
  
**Solution Fumouze**  
**Solution Henry Mure**  
**\*Solution huileuse au**  
**Nestosyl**  
**\*Solution Laroyenne**  
**\*Solution Pautauberge**  
**Solution Schoum**  
**Solution Valens**
- 6, r. Pas-de-la-Mule, Paris.  
 131, r. Vaugirard, Paris.  
 BONNAURE, Alès (Gard).  
 21, pl. des Vosges, Paris.  
 DOMERGUE, Agen (L.-et-G.).  
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.  
 34, fg d'Angoulême, Limoges.  
 2, r. Volney, Paris.  
 17, r. Cadet, Paris.  
 25, bd Beaumarchais, Paris.  
  
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
  
 98, r. du Chemin-Vert, Paris.  
 AXAREL, 15, r. Catulienne,  
 St-Denis.  
 163, r. de Flandre, Paris.  
 85, r. Turbigo, Paris.  
 COMAR & C<sup>ie</sup>, 20, r. des Fossés-  
 St-Jacques, Paris.  
 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.  
 LEGRAS, à Avranches (Manche).  
 18, r. de Beaune, Paris.  
 229, cours Gambetta, Lyon.  
 Lab. GERDA, 163, bd Croix-  
 Rousse, Lyon.  
 132, av. Victor-Hugo, Paris.  
 Labor. de Médecine Expé-  
 rimentale, Beauvais.  
 14, r. Gravel, Levallois (Seine).  
 27, r. de la Procession, Paris.  
 Dr COIRRE, 5, bd Montpar-  
 nasse, Paris  
 16, r. Henri-Regnault, Cour-  
 bevoie.  
 21, pl. des Vosges, Paris.  
 COMAR, 20, r. des Fossés-  
 Saint-Jacques, Paris.  
 54, r. de la Bienfaisance, Paris.  
 55, bd de Strasbourg, Paris.  
 76, r. de Sèvres, Paris.  
 ARSAC, Montélimar (Drôme).  
  
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.  
 5, bd Montparnasse, Paris.  
 CARRION, 54, fg St-Honoré,  
 Paris.  
 78, fg Saint-Denis, Paris.  
 à Annonay (Ardèche).  
 72, r. St-Dominique, Paris.  
  
 7, bd Denain, Paris.  
 10, r. de Constantinople. Paris.  
 19, r. St-Roch, Paris.  
 52, r. Decamps, Paris.

- Solution V.-E. Doumer** BOMEL, Annonay (Ardèche).  
**Solvochine** 4, r. d'Illzach, Mulhouse.  
**Solvosclérose** 83, bd de la Villette, Paris.  
**\*Solvuric** 14, r. de Birague, Paris.  
**Somalgine** 18, av. Daumesnil, Paris.  
**\*Somnacétine** MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.  
**\*Somnifène Roche** 21, pl. des Vosges, Paris.  
**Somnobrol** 50, r. de l'Université, Liège.  
**Somnofan** TORAUDE, 22, r. de la Sorbonne, Paris.  
**\*Somnothyrid** Lab. CANTIN, Palaiseau (S.-et-O).  
**\*Soneryl** SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.  
**\*Soporalose** POINTET & GIRARD, 30, r. des Francs-Bourgeois, Paris.  
**\*Soporigène Delqué** 46, r. Pierre-Charron, Paris.  
**\*Sornyal** 22, r. de la Sorbonne, Paris.  
**Sorol Churchill** 12, r. Castiglione, Paris.  
**Sparablanc** SAUTER, à Bellegarde (Ain).  
**\*Sparaplast Fournier** 18, r. de Jouvence, Dijon.  
**Spartéine Houdé** 9, r. Dieu, Paris.  
**\*Spasmacol** Alexandre, 41, r. de Rome, Paris.  
**Spasma Couturieux** 18, av. Hoche, Paris.  
**\*Spasmalgine Roche** 21, pl. des Vosges, Paris.  
**\*Spasmine Jolly** 1, r. Christine, Paris.  
**\*Spasmopurine** MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.  
**\*Spasmosédine** 6, r. d'Assas, Paris.  
**Spécific Brachat** Lab. chimico-pharmac., à Livry-Gargan (S.-et-O.).  
**\*Spécifique Bejean** 30, r. des Francs-Bourgeois, Paris.  
**Spécifique Broca** COUDERT, 116, av. Ledru-Rollin, Paris.  
**Spécifique Lancelot** 14, r. du Rendez-Vous, Paris.  
**Spécifique Rousset** 9, pl. de la Croix-Rousse, Lyon.  
**\*Spectrol** 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris.  
**Sphérulines - Moncour** 46, av. Victor-Hugo, Boulogne-s.-Seine.  
**(Voir Opothérapie)** MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.  
**Sphinkterol** Lab. SERVIER, Orléans.  
**Spiralgine** 23, r. de Berne, Paris.  
**Spirillan** 4, r. d'Illzach, Mulhouse.  
**Spirobismol** La Biothérapie, 131, r. Cambronne, Paris.  
**Spirogyl** BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.  
**\*Splénarmone** Lav. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.  
**Splénocrinol** 7, r. Biscornet, Paris.  
**\*Splénocrisine** 47, r. de Neuilly, Nanterre.  
**\*Splénodose**

\*Spléno-Magnésium  
 \*Splenomanganol  
 Splenotanic  
 \*Spyrolides  
 \*Stal-Kosal  
 \*Stalysine  
 \*Stanion Couturieux  
 Stanno-Bardane Henry  
 Stannolip Henry  
 \*Stannoxyd  
 Staphydx

\*Staphylagone

\*Staphylase du D<sup>r</sup>  
 Doyen

\*Staphylocide Audras

\*Staphylo-coccine Fra-  
 quet

\*Staphylotanol  
 Staréol Dupraz  
 Stasol

Stéarol

Sténergine

Sténofer Lumière

Sténo! Chanteaud

Stenon du D<sup>r</sup> Gelm

Sténophyl Vigan

\*Stéramine

Stéridrophil Wuhrlin  
 Stérilait

\*Stérinase Vincent

\*Stérogyl

\*Sthénoléine

\*Sthenoxal

Stibial

Stock-Vaccin Bovy-  
 Cantonnet

Stoechone

Stomachine

Stomacol Boulet

\*Stomal

\*Stemarine Billault

\*Stomarol

Stomaxines Roxelane

\*Stoméol Vichy

Stommol Leisyn

\*Stomobrol

FAURE, 80, r. du Rocher, Paris.  
 191, Fg St-Antoine, Paris.

GRÉMY, 14, r. Clichy, Paris.

19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.

8, r. de la Source, Paris.

41-47, r. Docteur-Blanche, Paris.

18, av. Hoche, Paris.

39, r. Sclessin, Liège.

39, r. Sclessin, Liège.

37, r. de Bourgogne, Paris.

WARIN, 4, chemin de la Muette,  
 Paris.

CARRION, 54, fg St-Honoré,  
 Paris.

LEBEAULT, 5, r. Bourg-l'Abbé,  
 Paris.

112, r. de Gerland, Lyon.

21, r. Chaptal, Paris.

55, bd. Strasbourg, Paris.

41, r. Etienne-Marcel, Paris.

LANCOSME, 71, av. Victor-  
 Emmanuel-III, Paris.

M, Bonnet, Saint-Etienne.

4, pl. des Vosges, Paris.

23, cours de la Liberté, Lyon.

(Voir : Produits Chanteaud.)

D<sup>r</sup> LALAUURIE, Cuxac-d'Aude.

103, r. Saint-Lazare, Paris.

Lab. Antiseptiques Chlorés,  
 40, r. Thiers, Le Havre

à Houdouville (Eure).

10, r. Cardinal-Mercier, Paris.

14, av. Mac-Mahon, Paris.

Lab. Chimiothérapie, 89, r. du  
 Cherche-Midi, Paris.

88, r. de la Villette, Paris.

47, r. Bokanowski, Asnières.

86, r. Vieille-du-Temple, Paris.

19, r. Drouot, Paris.

37, r. F. Fays, Lyon.

OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.

14, r. Eugène-Delacroix, Paris.

Lab. PY, 58, bd R.-Wallace,  
 à Puteaux (Seine).

22, r. de la Sorbonne, Paris.

ROLLAND, 31, r. des Francs-  
 Bourgeois, Paris.

38 bis, r. Raphaël, Vanves.

99, r. de Paris, Massy (S.-et-O.).

1 bis, rue Molitor, Paris.

4, av. Brazza, Romainville  
 (Seine).

- \*Stomophile
- \*Stomoxygène
- \*Stopral
- \*Stovaine Billon
- \*Stovarsol
- Strictoforme Dausse
- Strontium Paraf-Javal
- Stronttiurane
- \*Strophantine et Strophantus Catillon
- \*Strychnal Longuet
- \*Strychnarsitol Robin
- Strychno Cacodyl
- \*Stupho
- Succharure Leprince
- Succomusculine
- Suc-Durham
- Suckine
- Sucre Diasana
- \*Sucre Edulcor Ferré
- Suc Simon
- \*Sucroquinine
- Suc Wiandyl
- Sudyl Roberts
- Sulfarène
- \*Sulfarsenol
- \*Sulfarsinol Lefèvre
- \*Sulfarsiode
- Sulfate d'Atropine Clin
- Sulphydral Ch. Chan-teaud
- Sulfinhal
- Sulfo-benzol
- Sulfo-bore Roy
- \*Sulfobyl
- \*Sulfocrème Liless
- Sulfodelbiase
- Sulfodermol
- \*Sulfoïdol Robin
- Sulfol Charlard
- \*Sulfoleine Rozet
- Sulfo-Mésarca Roche
- Sulfo-mel du Dr Fayès
- \*Sulfo-rhinol Fayès
- Sulfostan
- Sulfoxal
- Sulfoxyne
- 17 bis, av. Parmentier, Paris.
- 6, r. du Chevalier-de-la-Barre, à St-Quentin.
- 47, r. Bokański, Asnières.
- SPECIA, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.
- id.
- 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).
- 8, r. Vivienne, Paris.
- MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.
- 3, bd Saint-Martin, Paris.
- 34, r. Sedaine, Paris.
- 13, r. de Poissy, Paris.
- 21, r. Alsace-Lorraine, Lyon.
- 38, r. Mainguy, Bondy (Seine).
- 62, r. de la Tour, Paris.
- 10, r. de l'Orne, Paris.
- 14, r. de Birague, Paris.
- (Voir : *Farine alimentaire*).
- 61, r. Vandamme, Paris.
- 19, r. Grégoire-de-Tours, Paris.
- Chalon-sur-Saône.
- GAUTIER, 13, r. Dorian, Paris.
- 27, r. Petits-Hôtels, Paris.
- 5, r. de la Paix, Paris.
- (Lab. du), à Agen.
- 19-21, r. Van-Loo, Paris.
- 52, r. Decamps, Paris.
- F. CARTIER, 1, r. Martinière, Lyon.
- 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- 54, r. Francs-Bourgeois, Paris.
- 228, r. de Lille, La Madeleine.
- 239, fg Saint-Honoré, Paris.
- 81, bd Suchet, Paris.
- Lafarge, 6 bd Arago, Paris.
- FISCH & C<sup>ie</sup>, 4, r. d'Illzach, Mulhouse.
- 8, r. Vivienne, Paris.
- FLAHAUT, 74, r. Monge, Paris.
- 13, r. de Poissy, Paris.
- 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
- à Vendôme (Loir-et-Cher).
- 21, pl. des Vosges, Paris.
- 3, r. du 4-Septembre, Paris.
- 199, r. St-Denis, Paris.
- CAVAILLES, 34, r. de Turin, Paris.
- FANYAU, 48, r. Claude-Lorrain, Lille.
- 43, r. Lafitte, Paris.

- \*Sulfureux concentré Dax**  
**\*Sulfureux Pouillet**  
**\*Sulfurine du D<sup>r</sup> Langlebert**  
**\*Sulfurion Couturieux**  
**\*Sulfuryl Monal**  
**Sulphaqua Pépin**  
**Sulphénine Trouette**  
  
**\*Super-digestif**  
**\*Supernucléine Legrand**  
**\*Supparyre du D<sup>r</sup> Faucher**  
**Supparsol**  
**Suppo-Cuivrol**  
**\*Suppo-Gynals**  
**Suppositoires Almine Louveau**  
**Suppositoires Anugeol**  
  
**\*Suppositoires au Nestosyl**  
**\*Suppositoires Chau - mel**  
**\*Suppositoires Corbière**  
**\*Suppositoires à l'Esculéol**  
**\*Suppositoires Gonnon**  
**\*Suppositoires Hymel**  
  
**Suppositoires Lama-line**  
**\*Suppositoires Logeais**  
**\*Suppositoires Midy**  
**Suppositoires Pachaud**  
**\*Suppositoires Pepet**  
**\*Suppositoires Pyrax**  
  
**\*Suppositoires Rocav**  
**Suppositoires Royer**  
**\*Suppotonic Lagoutte**  
**Suppo-Vaccin Salantale**  
**Suprarénidine**  
  
**Suractivase**  
**Suralimentine Rolland**  
**Surrénale - Endocrinses Fournier**  
**Surrénaline Bouty**  
**Surrénotanin Grémy**  
**\*Sylcase Grysa**  
**Sylvol**  
**Sylvor**
- MORELLET à Bagnoles-de-l'Orne.**  
 62, r. du Cardinal-Lemoine.  
 9, r. de la Perle, Paris.  
  
 18, av. Hoche, Paris.  
 6, r. Bridaine, Paris.  
 116, bd Haussmann, Paris.  
 15, r. des Immeubles-Industriels Paris.  
 96, r. Monge, Dijon.  
 96, r. Monge, Dijon.  
 24, bd de Clichy, Paris.  
  
 37, r. de Bourgogne, Paris.  
 Matray, Aubières (Puy-de-D.).  
 124, r. du Bac, Paris.  
 78, bd des Batignolles, Paris.  
  
**BOEGLIN, 26, r. Ste-Claire, Mulhouse.**  
 72, r. St-Dominique, Paris  
 78, fg Saint-Denis, Paris.  
  
 27, r. Desrenaudes, Paris.  
 16, r. Henri-Regnault, Courbevoie.  
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
**DUTEIL, 90, av. de St-Ouen, Paris.**  
**AFFRE, St-Mandé (Seine).**  
  
 24, r. de Silly, Boulogne-sur-S.  
 4, r. du Colonel-Moll, Paris.  
 130, bd Haussmann, Paris.  
 56, bd. Péreire, Paris.  
 Lab. Chavialle, 70, Gde-Rue, Sèvres (S.-et-O.).  
 116, bd Haussmann, Paris.  
 223, r. Saint-Martin, Paris.  
 229, cours Gambetta, Lyon.  
 42, r. Grandes-Arcades, Strasbourg.  
**OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.**  
 122, r. du Cherche-Midi, Paris.  
 41, r. d'Amsterdam, Paris.  
 7, r. Biscornet, Paris.  
  
 3, r. de Dunkerque, Paris.  
 14, r. de Clichy, Paris.  
 7, r. Saint-André, Le Mans.  
 46, r. Pierre-Charron, Paris.  
 4, q. Pasteur, Cette.



- \*Sympathyl  
 Synase  
 \*Syncaïne Clin  
 Syncrines Choay  
 \*Synergyl Vadam  
 \*Synthaline B  
 Synthol  
 26 bis, r. Dombasle, Paris.  
 40, r. des Acacias, Paris.  
 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.  
 48, r. Théophile-Gautier, Paris.  
 111 bis, r. de Turenne, Paris.  
 Lab. CRUET, 13, rue Miollis, Paris (XV<sup>e</sup>).  
 3 à 9, r. de l'Abreuvoir, Boulogne-sur-Seine.

## T

- Tablettes Boval  
 Tablettes de Brides  
 Tablettes Enurésan  
 \*Tablettes Hova  
 Tablettes oxymenthol  
 Perraudin  
 \*Tablettes Perroud  
 Tablettes Renard  
 Tablettes de Phospharsol  
 Tablettes de thyroïde  
 \*Tablettes Zeva  
 \*Taburol Monal  
 Tachygastrine  
 \*Taenifuge Bardet  
 Taenifuge des Dames de France  
 \*Taenifuge du Dr Duhourcau  
 \*Taenifuge du Dr Jacquème  
 Taenifuge Ercé  
 \*Taenifuge Kirn  
 Taenifuges Limousin  
 \*Tamar Indien Grillon  
 \*Tampol Roche  
 Tampovules Corbière  
 DEHAY, Arras (P.-de-C.).  
 41, r. de Verneuil, Paris.  
 KUNTZMANN, à Ribeaupillé (Haut-Rhin).  
 Lab. Zyma, 4, r. Bellart, Paris.  
 Lab. SCIENTIA, 21, r. Chaptal, Paris.  
 3, r. Sébastien-Gryphe, Lyon.  
 GIBAN, à Sens (Yonne).  
 17, r. Rochechouart, Paris.  
 CATILLON, 3, bd Saint-Martin, Paris.  
 60, c. Emile-Zola, Lyon.  
 6, r. Bridaine, Paris.  
 DUCLOY et C<sup>ie</sup>, Arques (Pas-de-Calais).  
 76, r. de Sèvres, Paris.  
 119, r. de Sèvres, Paris.  
 6, r. Louis-Blanc, La Garenne-Colombes (Seine).  
 CHIARINI, Aix-en-Provence.  
 31, r. de Bourgogne, Paris.  
 DANIEL-BRUNET, 8, r. de la Source, Paris.  
 10, r. du Bac, Paris.  
 DARRASSE, 13, r. Pavée, Paris.  
 21, pl. des Vosges, Paris.  
 27, r. Desrenaudes, Paris.

- Tanacétyl Clin**  
**Tanisol**  
**Tannarsol**  
**Tannurgyl**  
**Tanosal**  
**\*Tapo**  
**Tarbisol**  
**Tardospermine**  
**Tartrate Borico-potas-  
sique du Dr Gigon**  
**\*Tartrate Borico-potas-  
sique Pachaut**  
**Tartro-Bi Roche**  
**Tartrobol**  
**\*Taxol**  
**\*Tébéphaguine**  
**\*Técarine**  
**Tégéol**  
**Teinture de Cocheux**  
**Teperos**  
**Tercinol**  
**Tercolène**  
**Tercyn Chéron**  
**Térébules Gallier**  
**\*Tergyl Lamo**  
**\*Terkal Monal**  
**Ternose Trouette**  
**Terpène iodé**  
**Terpine Boveil**  
**\*Terpine Gonnon**  
**Terpinets**  
**Terpinol Adrian**  
**Tersol**  
**Teskrine**  
**Testicule - Endocrisi-  
nes Fournier**  
**Tétralgine Routhier**  
**\*Tetranitrol Roussel**  
**Tetrasthénol**  
**Tetrasulfol Vigier**  
**Testogan**  
**Thalaphyl**  
**\*Thalassotonine Vadam**  
**\*Thaolaxine**  
**Thapsia Le Perdriel**
- 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.  
 MIGNON, 119, r. de Noisy, Les  
 Lilas.  
 119, r. de Sèvres, Paris.  
 6, r. Delaborde, Paris.  
 FEIGEL, à Lutterbach (Haut-  
 Rhin).  
 Lab. MADYL, 14, r. Miromesnil,  
 Paris.  
 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.  
 MERMINOD, 49, r. de Paradis,  
 Paris.  
 25, bd Beaumarchais, Paris.  
 130, bd Haussmann, Paris.  
 21, pl. des Vosges, Paris.  
 71, r. St-Jacques, Paris.  
 46, av. des Ternes, Paris.  
 Institut de Microbiologie, Sarre-  
 bruck.  
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-  
 Temple, Paris.  
 20, r. des Martyrs, Paris.  
 36, q. Fulchiron, Lyon.  
 4, r. d'Illzach, Mulhouse.  
 158, r. Saint-Jacques, Paris.  
 14, r. de Birague, Paris.  
 à Vincennes.  
 38, bd Montparnasse, Paris.  
 26-28, r. Paul-de-Kock, Paris.  
 6, r. Bridaine, Paris.  
 15, r. des Immeubles-Industriels,  
 Paris.  
 FROSSARD, 86, r. de Varenne,  
 Paris.  
 9, pl. des Terreaux, Lyon.  
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
 8, r. Vivienne, Paris.  
 9, r. de la Perle, Paris.  
 32, r. Carnot, Beaune (Côte-d'Or).  
 89, Grande-Rue, Sens (Yonne).  
 7, r. Biscornet, Paris.  
 à Vierzon.  
 40, r. Washington, Paris.  
 19-21, r. Van-Loo, Paris.  
 12, bd Bonne-Bouvelle, Paris.  
 MERMINOD, 49, r. de Paradis,  
 Paris.  
 BOUTTET, à Ruffec (Charente-  
 Inférieure).  
 111 bis, r. de Turenne, Paris.  
 DURET & REMY, à Asnières.  
 12, r. Milton, Paris.

- \*Thébaïl 11, r. Joseph-Bara, Paris.
- \*Thé de Brides 46, Pierre-Charron, Paris.
- Thé de l'Emyrne 151, r. St-Maur, Paris.
- Thé Evine 3, r. de la Perle, Paris.
- \*Théinol Bailly 15 et 17, r. de Rome, Paris.
- \*Théisine Dubat 80, fg Saint-Denis, Paris.
- Thelygan MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.
- \*Themsaline Zyma 4, r. Bellart, Paris.
- Théobromine Guillaumin 13, r. du Cherche-Midi Paris.
- Théobromine Houdé 9, r. Dieu, Paris.
- \*Théobromine Invar 21, r. Nonnains-d'Hyères, Paris.
- Théobromine Rousseau à Ermont (Seine-et-Oise).
- Théobromine Vicario 17, bd Haussmann, Paris.
- \*Théobromose 10, r. du Plâtre, Paris.
- \*Théobryl Roche 21, pl. des Vosges, Paris.
- Théosalvine 13, r. Cherche-Midi, Paris.
- \*Théosalvose 13, r. Cherche-Midi, Paris.
- \*Théovadil 85, r. des Morillons, Paris (XV<sup>e</sup>).
- \*Théoxanthine 6, r. d'Assas, Paris.
- Thermo-bloc GAUDICHARD, à Chatellerault (Vienne).
- Thermoplaste COQUELU, Digoïn (S.-et-L.).
- Thermo-Vicardine ACHARD, 15, r. du Commerce, Riom (P.-d.-D.).
- \*Thé Suédois HERIN, 228, r. de Lille, La Madeleine (Nord).
- Thiesdyne BESNARD, 56, r. des Dames, Paris.
- \*Thigénol Roche 21, pl. des Vosges, Paris.
- \*Thiocitrol THEVENOT, 21, r. des Roses, Dijon.
- \*Thiocol Roche 21, place des Vosges, Paris.
- Thickéine 4, imp. de Béarn, Paris.
- Thionhydrol Grémy 14, r. de Clichy, Paris.
- \*Thiophyl 12, bd St-Martin, Paris.
- \*Thiorine 39, r. Fondaudège, Bordeaux.
- Thiosinamine Cognet 43, r. de Saintonge, Paris.
- \*Thiosote-Lambiotte 20, r. Dumont-d'Urville, Paris.
- Thiosyl M. BERGER, à Orléans.
- \*Thio-terpine Dalin BOITAS & C<sup>ie</sup>, 1 r. de la Martinière, Lyon.
- \*Thorium-Rhemda 51, r. d'Alsace, Courbevoie.
- \*Thoroxy 40, r. de Bellechasse, Paris.
- \*Thymo-Mentol Eupnique 13, r. de Rivoli, Paris.
- Thymus -Endocrisines Fournier 7, r. Biscornet, Paris.
- Thymine 11, ch. de la Muette, Paris.
- Thymol doré 10, impasse Milord, Paris.
- Thymoléine ABOU, 26, r. Temple, Paris.
- Thymusine Byla 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- Thyratoxine Byla id.

- Thyrénine Grémy**  
**Thyrocréine Grémy**  
**\*Thyrodose**  
**Thyroïde - Endocrisi-**  
**nes Fournier**  
**Thyroïdine Bouty**  
**Thyroïdine Byla**  
**Thyroïdine Couturieux**  
**Thyroïdine Flourens**  
**\*Thyroïdine Gory**  
  
**Thyroïdine Henning**  
  
**Thyroïdine Meurice**  
**Thyrol A.**  
**Thyroxine Henning**  
  
**\*Thyroxine Roche**  
**\*Tinctiode**  
  
**\*Tiodine Cognet**  
**Tisane Cisbey**  
**Tisanes Dausse**  
**Tisane dépurative de**  
**Cavaillès**  
**Tissus Le Perdriel**  
**\*Tochlorine**  
  
**\*Tonicalcine**  
  
**\*Tonicardine Gonnon**  
**Tonicardine**  
  
**Tonigénine**  
**\*Tonikéine Chevreton**  
**Tonilécithine Rogier**  
**\*Toni-Pectoral**  
  
**Toniphlébine Hardy**  
**Toniphosphine**  
**\*Tonique Gonnon**  
**Tonique Koenig**  
**\*Tonique Roche**  
**Tonique Zéva**  
**Toni sérum Freyssinge**  
**\*Tonudol**  
  
**\*Tonyol "F"**  
  
**Tophol**  
**Topique Bertrand**  
**Topiques Chaumel**  
**\*Topique Nasal A. B. C.**
- 14, r. de Clichy, Paris.  
 id.  
 47, r. de Neuilly, Nanterre.  
 7, r. Biscornet, Paris.  
  
 3, r. de Dunkerque, Paris  
 26, av. Observatoire, Paris.  
 18, av. Hoche, Paris.  
 62, r. N.-Dame, Bordeaux.  
 JOOSS, 7 bis, r. Général-Galliéni,  
 Montreuil (Seine).  
 MERMINOD, 49, r. de Paradis,  
 Paris.  
 61, av. Louise, Bruxelles.  
 107, r. des Dames, Paris.  
 MERMINOD, 49, r. de Paradis,  
 Paris.  
 21, pl. des Vosges, Paris.  
 ROBERT et CARRIERE, 37,  
 r. de Bourgogne, Paris.  
 43, r. de Saintonge, Paris.  
 12, bd St-Martin, Paris.  
 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).  
 34, r. de Turin, Paris.  
  
 11, r. Milton, Paris.  
 SPECIA, 86, r. Vieille-du-  
 Temple, Paris.  
 MARTINIE, 62, av. Philippe-  
 Auguste, Paris.  
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.  
 Labor, à Montrevel (Ain).  
 52, r. Labruyère, Paris (IX<sup>e</sup>).  
 56, bd Péreire, Paris.  
 ADRIAN, 9, r. de la Perle,  
 Paris.  
 200, r. de Tolbiac, Paris.  
 56, r. des Dames, Paris.  
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.  
 37, av. Marceau, Paris.  
 21, pl. des Vosges, Paris.  
 60, cours Emile-Zola, Lyon.  
 6, r. Abel, Paris.  
 LICARDY, 38, bd Bourdon,  
 Paris-Neuilly.  
 VARGAS, 5, r. Chauveau-  
 Lagarde, Paris.  
 3, r. Condillac, Grenoble.  
 à Oullins (Rhône).  
 78, fg Saint-Denis, Paris.  
 Lab. TIFFENEAU, 24, r. Mont-  
 tessuy, Paris

- Topique pyorrhépha-** Croissy-sur-Seine.  
**gine**
- Topique stomacal** 4, r. Aubriot, Paris (IV<sup>e</sup>).  
**Dausse**
- \*Toritane Lamo** 26-28, r. Paul-de-Kock, Paris.  
**\*Toritanol Lamo** id.  
**\*Total-Tonic** 29, fg Bourgogne, Orléans.  
**\*Tot'Hamelis** CHANTEREAU, 26 bis, r.  
Dombasle, Paris.
- Transpulmine** 4, r. d'Illzach, Mulhouse.  
**Tranquital** 6, r. Bridaine, Paris.  
**\*Tréparsénans** COMAR, 20, r. des Fossés-  
Saint-Jacques, Paris.
- \*Tréparsol** LECOQ & FERRAND, 14, r.  
Gravel, Levallois-Perret.  
97, r. de Vaugirard, Paris.
- \*Tréphonyl du Dr Rous-**  
**sel**
- Trépocidine** OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
Bruxelles.
- \*Trépol** 22, r. de la Sorbonne, Paris.  
id.
- \*Trépoquinol** id.  
**Tréposan** 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.  
**Trépositaires** id.
- Triase** 4, pl. des Vosges, Paris (IV<sup>e</sup>).  
**\*Tribromure Gigon** 25, bd Beaumarchais, Paris.  
**\*Tricalcine** 21, r. Chaptal, Paris.  
**\*Tridigestine Dalloz** 13, bd la Chapelle, Paris.  
**\*Tridynol** 4, pl. de Strasbourg, Lille.  
**Triféryl** 37, r. Galilée, Paris.
- \*Triganol Vigier** 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.  
**Triglandine Bouty** 3, r. de Dunkerque, Paris.  
**Triglandol Bouty** id.
- Tri-Iodo-Ercé** 37, r. de Bourgogne, Paris.  
**Trijumine Pelletier** 48, r. Jacob, Paris.  
**Trilactine** 14, r. de Birague, Paris.
- \*Trinitrine Caféinée Du-** LALEUF, 20, r. du Laos, Paris.  
**bois**
- \*Trinitrine-Papavérine** id.  
**Laleuf**
- \*Trinitrine Roussel** 10, r. Washington, Paris.  
**Trinitrine Vicario** 17, bd Haussmann, Paris.  
**\*Triradol** 55, bd Strasbourg, Paris.
- \*Triseptine** LAMBERT, 6, r. de Longchamp,  
Vichy.
- \*Trisodyl Rozet** BENDERITTER, à Vendôme.  
**Tristyl Noyon** 12, r. des Apennins, Paris.  
**Tritonine** 64, r. des Tournelles, Paris.
- Trixyl Fraudin** 4, av. Desfeux, Boulogne-s.-S.  
**Tri-Zymol** OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
Bruxelles.
- Troparin** 32, r. du Lombard, Bruxelles.  
**\*Trousses Dosurine** 16, r. Charlemagne, Paris.  
**Tryclene** 52, bd du Temple, Paris.
- \*Trynol** FALVY, 40, r. des Acacias  
Paris.

**\*Tryparsamide****\*Trypsogen****Tuberculine C. L.****\*Tubercuséine Leisyn****\*Tubérol****\*Tubes Blache****\*Tubes Chauvin****\*Tubes Dulcis****\*Tubes Ferlux****\*Tubes du Dr Guiraud****Tubes Levasseur****Tubes Sals****\*Tulle gras Lumière****\*Tulle rose Beslier****Tussomalt****Tuya Feuillé****Tymocalcine****Tympano****SPECIA**, 86, r. Vieille-du-Temple, Paris.**DÉGÉCÉ**, 7, r. Princesse, Paris.

86, r. Vieille-du-Temple, Paris.

1 bis, r. Molitor, Paris.

23, r. des Moines, Paris.

**CHAUVIN**, Aubenas (Ardèche).

Aubenas (Ardèche).

**Dr FERRY**, pl. Clichy, Montecarlo.**G. BOUSQUET**, à Albi.

10, imp. Milord, Paris.

23, r. de la Monnaie, Paris.

Oullins (Rhône).

23, c. de la Liberté, Lyon.

**COQUELU**, Digoin (S.-et-L.).**U. C. E. P.**, 5, r. Labroque, Strasbourg.**Dr BIDOT**, 4, r. du Cirque, Paris.

156, r. des Fauvelles, Courbevoie.

**CHAUVIER**, 66, r. Falguière, Paris.**U****\*Uclarsyl****Udanka****\*Ulcéobalnéine****\*Ulcéobande****\*Ulcéoplaque****\*Ulcéosine****\*Ulcéosol****Ulcérine Berger****\*Ulcérophile Nozan****Ulmaire Gmet****\*Ulmarène Gigon****\*Ultracao Laurençon****\*Ultra-Levure****Ultrargen Leclerc****\*Ultra-Violets**

89, r. du Cherche-Midi, Paris.

**Dr LALAURIE**, Cuxac-d'Aude.

10, r. du Parc-Royal, Paris.

10, r. du Parc-Royal, Paris.

10, r. du Parc-Royal, Paris.

10, r. du Parc-Royal, Paris.

10, r. du Parc-Royal, Paris.

**F. BOUVIER**, 31, bd de la Villette, Paris.

6 ter, r. Voltaire, La Garenne-Colombes (Seine).

27, fg Montmartre, Paris.

25, bd Beaumarchais, Paris.

16, r. République, Villefranche-s.-Saône.

6, r. de Naples, Paris.

10, r. Vignon, Paris.

**La Verrerie Scientifique**, 12, av. du Maine, Paris.

- \*Ultravitamine 4**  
 Uracétose  
**\*Uralysol**  
 Uraséol  
**\*Uraseptine Rogier**  
**\*Urazine**  
**\*Ur-Clar**  
 Urdol  
 Urénile Meurice  
 Uréol Ch. Chanteaud  
**\*Uricémine**  
 Uricine  
**\*Uriclarine**  
**\*Urifluine**  
 Uriloxal  
 Urilysone  
 Uri-Magnétol  
 Urisal du Dr Des-  
 champs  
**\*Urisanine**  
 Urobényl  
 Urobiose  
 Urobleu  
**\*Urobuccol Malmanche**  
 Urocarbol  
 Urocédrol  
**\*Uroclase**  
 Urocléan  
 Urococcine  
**\*Uroformine Gobey**  
 Urogène  
**\*Uroiodyne**  
 Urolan  
 Urol Neuville  
 Urolithiase  
 Urolithol  
**\*Urométhyl**  
**\*Urométine Lambiotte**  
**\*Uromil**  
**\*Urophile Bailly**  
 Uroquinase  
 LAURENÇON, 16, r. Républi-  
 que à Villefranche-sur-Saône.  
 10, r. du Parc-Royal, Paris.  
 46, av. des Ternes, Paris.  
 17, r. Cadet.  
 56, bd Péreire, Paris.  
 SPECIA. 86, r. Vieille-du-  
 Temple, Paris.  
 ROUX, 58, r. de Maubeuge, Paris.  
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.  
 61, av. Louise, Bruxelles.  
 54, r. des Francs-Bourgeois.  
 Paris. (V. : Pr. Chanteaud).  
 41, r. d'Amsterdam, Paris.  
 50, r. République, Puteaux.  
 157, r. Championnet, Paris.  
 2, pl. des Vosges, Paris.  
 108, r. Maréchal-Pétain, Vichy.  
 109-113, bd de la Part-Dieu,  
 Lyon.  
 ROUX, 58, r. de Maubeuge,  
 Paris.  
 20, r. Laos, Paris.  
 LONGUET, 34, r. Sedaine, Paris.  
 MERMINOD, 49, r. de Paradis,  
 Paris.  
 4, imp. de Béarn, Paris.  
 4, imp. de Béarn, Paris.  
 101, av. de Paris, Rueil (S.-et-O.),  
 GENTON, Petit-Quévilly (S.-  
 Inférieure).  
 GALLO, à Aurillac.  
 ALEXANDRE, 41, r. de Rome,  
 Paris.  
 ADLER, 36, r. Francs-Bour-  
 geois, Paris.  
 20, r. du Laos, Paris.  
 89, r. du Cherche-Midi, Paris.  
 Dr LALAURIE, Cuxac-d'Aude.  
 45, bd Lafayette, Calais.  
 55, bd de Strasbourg, Paris.  
 239, fg St-Honoré, Paris.  
 Sté Rég. de l'Ouest, Rennes.  
 3, pl. Intérieure St-Michel,  
 Toulouse.  
 BRESSIER, 102, r. Vincent  
 Marseille.  
 20, r. Dumont-d'Urville, Paris.  
 Dr BELIERES, 19, r. Drouot,  
 Paris.  
 15 et 17, r. de Rome, Paris.  
 DUBOIS, 52, r. Montesquieu,  
 Asnières.

\*Urosalyl

\*Urosan

\*Urozea

\*Utéramine Zyma

\*Uvargol

\*Uvé

\*Uvécline

\*Uvéphorine

\*Uvesterol

Uviostérine

GARDIOL, 6, r. Félix-Pyat, Marseille.

12, r. des Saints-Pères, Paris.

LOBRY, 6, r. Parrot, Paris.

4, r. Bellart, Paris.

MARTINIE, 62, av. Philippe-Auguste, Paris.

18, r. Saint-Amand, Paris.

Pharmacie Ambard, Carcès (Var).

37, r. Galilée, Paris.

18, r. Saint-Amand, Paris.

(Voir : Irrastérine).

## V

Vabéol

Vacciderm

\*Vaccin anti-asthma-  
tique du Pr. Minet

Vaccin antigonococci-  
que

\*Vaccin antigrippal du  
Pr. Minet

\*Vaccin anti-pneumoni-  
que du Pr. Minet

Vaccin antitubercu-  
leux Bossan

\*Vaccin Demonchy

\*Vaccin de Weill et  
Dufourt

\*Vaccinothérapie ato-  
xique Cépède

Vaccinovules

Vaccins antipollin

Vaccins Antitubercu-  
leux Vaudremer

\*Vaccins atoxiques sta-  
bilisés

\*Vaccins Bactériens  
I. O. D.

Vaccins bactériophages

\*Vaccins Bruschettini

\*Vaccins Clin

\*Vaccins de Ronchèse

Vaccins du Dr Creuzé

Vaccins Inava

Vaccins Lucinia

Vaccins microbiens  
curatifs

30, r. N.-D.-des-Victoires, Paris.  
UNIS-SPES, 14, r. Demar-  
quay, Paris.

Lab. STÉNÉ, 2, pl. des Vosges,  
Paris.

OLIVIERO, 87, r. Denfert-  
Rochereau, Paris.

2, place des Vosges.

2, place des Vosges.

Lab. des Indus. Biologiques,  
26, r. Royale, Paris.

THERAPLIX, 157, r. de Sèvres,  
Paris.

37, r. de Bourgogne, Paris.

60, r. Mathurin-Régnier. Paris.

23, r. des Moines, Paris.

26, av. Observatoire, Paris.

ST-BENOIT, 6 bis, r. Monsieur,  
Paris.

SPECIA, 86, r. Vieille-du-  
Temple, Paris.

Lab. Biochimie Médicale, 16,  
r. Dragon, Marseille.

46, r. de Verneuil, Paris.

7, r. Biscornet, Paris.

20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.

6, r. Rothschild, Nice.

1, r. Bonaparte, Paris.

26, r. Pagès, Suresnes (Seine).

(Voir : Formo-vaccins).

GREMY, 14, r. de Clichy, Paris.



- \*Vaccins Polyvalents** 37, r. de Bourgogne, Paris.  
**Renard**
- \*Vaccins Sténé** 2, pl. des Vosges, Paris.  
**\*Vaclydun** 27, r. Desrenaudes, Paris.  
**Vacodyl** 25, r. Petits-Hôtels, Paris.  
**\*Vacuoline** 39, r. de la Gare, Bondy (Seine).  
**Vadérol** DURAND, à Joigny (Yonne).  
**\*Vagosédyl** 20, r. des Martyrs, Paris.  
**Vagotonic Fournier** Institut physiologique, Vau-  
 cresson (S.-et-O.).  
 56, bd Péreire, Paris.
- \*Valbornine Rogier** MAYOLI, 1 pl. Victor-Hugo,  
 Paris.
- \*Valbrol** 191, fg St-Antoine, Paris.  
 à Grenoble (Isère)
- \*Valedyl** à Ermont (Seine-et-Oise).  
**\*Valéral Puy** 5, r. Lefebvre, Paris.  
**Valéramyl Foulon** r. Gambetta, Bolbec.  
**Valérianate Gabail** 2, r. Duphot, Paris.  
**Valergyl Doucet** 130, b. Haussmann, Paris.  
**\*Valérianate Grignon** 26, r. Saint-Claude, Paris.  
**Valérianate Pachaut** 26, av. de l'Observatoire, Paris.  
**\*Valériane Byla** 4, r. Aubriot, Paris.  
**Valériane Dausse** 27, fg Montmartre, Paris.  
**\*Valériane Gmet** 130, bd Haussmann, Paris.  
**\*Valériane Pachaut** 25, bd Beaumarchais Paris.  
**\*Valérianose Gigon** 6, r. Rosenwald, Paris.  
**\*Valerium Thibault** 101, av. de Paris, Rueil (Seine-  
 et-Oise).
- \*Valérinodor Malman-  
 che** DARRASSE, 13, r. Pavée, Paris.
- \*Valérobromine Le-  
 grand** 10, r. Poncelet, Paris (XVII<sup>e</sup>).  
**\*Valéromenthol** BERGER, 14, r. des Pyramides,  
 Paris.
- \*Valéronal** 39, r. de la Chapelle, Paris.  
**Valéthryne** 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.  
**Valimyl Clin** 53, bd Haussmann, Paris.  
**Vals St-Jean** 51, r. de Tourtille, Paris.  
**\*Valthène** 12, r. Tour-des-Dames, Paris.  
**Valtine** 4, r. du Colonel-Moll, Paris.  
**Valyl Midy** 13, r. du Cherche-Midi, Paris.
- \*Vanadarsine Guillaum-  
 min** 21, fg Montmartre, Paris.  
**\*Vanadine Chevrier** 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.  
**Vaniol** 37, r. Pajol, Paris.  
**\*Vanucléol** 12, r. Cadet, Paris.  
**Varicine** DAGRAN, 16, r. Salaire, Taras-  
 con (Bouches-du-Rhône).  
**Varicolyse** à Neuilly-sur-Seine.
- Varicure Marck** 164, r. Saint-Honoré, Paris.  
**\*Varilaxine** 61, r. de Seine, Paris.  
**\*Varisclérine** à Charost (Cher).  
**Variserum Lebon** 4, imp. de Béarn, Paris.  
**Vasculine** GUÉRIN, Meulan (S.-et-O.).  
**\*Vascurol** BRUN, Demi-Lune. Lyon.  
**Vasocônes**

- Vasoconstrictine**  
**Vasogènes**  
**\*Vasolaxine**  
**\*Vaso-Neurine**  
  
**Vaso-Rhinol**  
**Vaxa du D<sup>r</sup> Boucard**  
**\*Véganine**  
**\*Végéphos**  
**\*Végétol Fournier**  
**\*Véguva Wander**  
  
**Veinargyre**  
**\*Veinhormones Logeais**  
  
**Veinicura**  
**Veinofluine**  
**Veinoglandol**  
**Veinophiline**  
**\*Veinoposine**  
**\*Veinoserum Abadie**  
  
**\*Veinosine**  
**\*Veinotrope**  
**Veinyl**  
**Velledol Adrian**  
**\*Vénecine**  
**\*Véralgine**  
**\*Vériane Buriat**  
**Vermicure Pingeon**  
**\*Vermifuge Cornet**  
**Vermifuge des Moines**  
  
**Vermifuges Pivot**  
**\*Vermifuges Sorin**  
**\*Vermirene Audibert**  
**Vermitox**  
  
**\*Vernis à la Diachusine**  
**Verocodal Boeglin**  
**Véroginol**  
**\*Véronidia Buisson**  
**Verrucure**  
**\*Verrulyse**  
**\*Verticurine**  
  
**\*Vesicatoire rose Bes-  
lier**  
**Vésicatoires d'Albes-  
peyres**  
**Vexillan**  
**Viburnioda**  
**Viburnum Gmet**  
**\*Vichy Purgatif**
- BRUN, Demi-Lune, Lyon.**  
**43, r. Pinel, à Saint-Denis.**  
**7, r. Biscornet, Paris.**  
**Lab. Pathologie Gle de Paris, 5,**  
**r. François-Ponsard, Paris.**  
**20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.**  
**30, r. Singer, Paris.**  
**13, r. Pagès, Suresnes (Seine).**  
**21, r. Nonnains-d'Hyères, Paris.**  
**8, r. des Quatre-Fils, Paris.**  
**151 bis, r. de Joinville, Cham-  
pigny.**  
**29, r. des Jardiniers, Mon-  
treuil (Seine).**  
**24, r. de Silly, Boulogne-sur-  
Seine.**  
**42, bd Péreire, Paris.**  
**239, fg St-Honoré, Paris.**  
**156, r. des Fauvelles, Courbevoie.**  
**27, r. Poids-Farine, Marseille.**  
**40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.**  
**3, pl. Intérieure St-Michel, Tou-  
louse.**  
**5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.**  
**46, av. des Ternes, Paris.**  
**4, imp. de Béarn, Paris.**  
**9, r. de la Perle, Paris.**  
**7, r. des Italiens, Paris.**  
**38, r. du Mainguy, Bondy.**  
**25, r. Copernic, Paris.**  
**18, r. de Jouvence, Dijon.**  
**7, pl. Bey-Perland, Bordeaux.**  
**2, r. Marché-des-Blancs-Man-  
teaux, Paris.**  
**PUY, Grenoble (Isère).**  
**TROMBETTA, Blain (L.-Inf.)**  
**Cinq Cantons, Bayonne.**  
**BOULLÉ, 12, av. de la Gde-  
Armée, Paris.**  
**142, r. de Picpus, Paris.**  
**26, r. Ste-Claire, Mulhouse.**  
**101, av. Mozart, Paris.**  
**157, r. de Sèvres, Paris.**  
**6, r. d'Auteuil, Paris.**  
**MIGUET, Villefranche (Rhône).**  
**GRIAS, 47, r. Feray, à Corbeil  
(Seine-et-Oise).**  
**COQUELU, Digoïn (S.-et-L.).**  
  
**FUMOUCHE, 78, fg Saint-Denis,  
Paris.**  
**89, av. Wagram, Paris.**  
**GIRY, 49, r. de Metz, Nancy.**  
**27, fg Montmartre, Paris.**  
**11 r. Joseph-Bara. Paris.**

- Vichy Rapide**  
**\*Vigardyne**  
**Vigine**  
**Vigogastrine**  
**\*Vigostérol**  
  
**Vigotonal**  
**Vilax**  
  
**Vin à l'extrait de foie de morue**  
**Vin d'Anduran**  
**Vin Aroud**  
**\*Vin de Baudon**  
**Vin Boillaud**  
**Vin Bravais**  
**Vin de Beef Lavoisier**  
  
**\*Vin de Bugeaud**  
**\*Vin de Carnéose**  
  
**\*Vin de Chassaing**  
**Vin de Coca du Pérou**  
**Vin des Indes**  
**Vin Désyles**  
**Vinénergétique Fradier**  
  
**Vin Gallia**  
**\*Vin Girard**  
**Vin de Kola Midy**  
**\*Vin de Lavoix**  
**Vin de Moride**  
  
**Vin de Séguin**  
**Vin de Vial**  
**Vin Mariani**  
**Vin Mory**  
  
**\*Vin Nourry**  
  
**Vin Oophorine**  
**\*Vin Raimoa Tonic**  
**Vin St-Raphaël**  
**Vin Surtonique Val**  
**Notre-Dame**  
**Vin Tonic Tiffeneau**  
**Vin Tonique F. K.**  
**Vin Urané Pesqui**  
**Vin Voguet**  
**\*Vioforme Ciba**  
**Vioformol Ciba**  
**Violet Bidot**  
**\*Viosten**  
  
**\*Vioxyl Mouneyrat**
- 22, r. de l'Arcade, Paris.  
 11, r. des Garennes, Chatou.  
 AMBLARD, Cunihat (P.-de-D.).  
 222, r. Duguesclin, Lyon.  
 B R I C H A R D, Bar-le-Duc,  
 (Meuse).  
 122, bd Murat, Paris.  
 16, bd Filles-du-Calvaire, Pa-  
 ris (XI<sup>e</sup>).  
 21, Fg Montmartre, Paris.  
  
 MOUSNIER, à Sceaux.  
 6, r. Dombasle, Paris.  
 12, r. Charles-V, Paris.  
 172, r. d'Alésia, Paris,  
 3, r. Mogador, Paris.  
 Usine du Blosset, Moulins-sur-  
 Yèvre (Cher).  
 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.  
 Usine du Blosset, Moulins-sur-  
 Yèvre (Cher).  
 1, quai Aulagnier, Asnières.  
 21, Fg Montmartre, Paris.  
 61, r. de Seine, Paris.  
 Levallois-Perret (Seine).  
 53, bd de Verdun, Fontenay-  
 sous-Bois.  
 7, r. des Petits-Carreux, Paris.  
 48, r. d'Alésia, Paris.  
 4, r. du Colonel-Moll, Paris.  
 (Voir : Beef Lavoix).  
 LANDRIN, 12, r. de la Répu-  
 blique, Puteaux.  
 165, r. Saint-Honoré, Paris.  
 36, pl. Bellecour, Lyon.  
 41, bd Haussmann, Paris.  
 OPTIMA, Gde-Rue au Bois,  
 Bruxelles.  
 20, r. des Fossés-Saint-Jacques,  
 Paris.  
 Gde-Rue au Bois, Bruxelles.  
 264, bd Voltaire, Paris.  
 à Valence (Drôme).  
 Usine du Blosset, Moulins-sur-  
 Yèvre. (Cher).  
 24, r. de Monttessuy, Paris.  
 46 av. des Ternes, Paris.  
 au Bouscat-Bordeaux.  
 5, r. Eug.-Delacroix, Paris.  
 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.  
 id.  
 4, r. du Cirque, Paris.  
 D<sup>r</sup> LESCENE, 58, r. de Vouillé,  
 Paris et Livarot (Calvados).  
 Villeneuve-la-Garenne (Seine).

<b>Viridol</b>	65, r. Monge, Paris.
<b>Viriligen</b>	DÉGÈCÉ, 7, r. Princesse, Paris.
<b>Virilium</b>	MERMINOD, 49, r. Paradis, Paris.
<b>Visco-dermine</b>	FOSSET, 21, Gde-Rue, Montfermeil (Seine-et-Oise).
<b>*Viscoserum</b>	55, bd Strasbourg, Paris.
<b>Viscosodine</b>	20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
<b>*Visco-Veine Fosset</b>	FOSSET, 21, Gde-Rue de Montfermeil (S.-et-O.).
<b>*Viscum Zyma</b>	4, r. Bellart, Paris.
<b>*Vitacalcine Moncour</b>	49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
<b>Vitaderme Bergonier</b>	122, bd Murat, Paris.
<b>*Vitadone</b>	BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
<b>Vitaférine</b>	Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
<b>Vitagéine</b>	SÉGUIN 7, r. Ste-Isaure, Paris.
<b>Vital Extrait</b>	E. BASSOL, à Ste-Alvère (Dordogne).
<b>Vitamina</b>	8, r. Vivienne, Paris.
<b>Vitamine Rogier</b>	56, bd Péreire, Paris.
<b>*Vitaminol</b>	BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
<b>*Vitamorrhaine</b>	P. C. B., 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
<b>*Vitamyl</b>	4, pl. des Vosges, Paris.
<b>*Vitargyl</b>	POINTET & GIRARD, 30, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
<b>Vitasol</b>	49, r. d'Angoulême, Cognac (Charente).
<b>*Vitastérol</b>	F. GUILBERT, 10, r. du Collège, Arras (P.-de-C.).
<b>Vitazem</b>	85, r. Turbigo, Paris.
<b>*Vitergomine</b>	Pharmacie centrale de Belgique, 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
<b>Vitosine Décornez</b>	à Ornans (Doubs).
<b>Vitricine Carves</b>	à Chambéry (Haute-Savoie).
<b>Vivassol</b>	78, fg Saint-Denis, Paris.
<b>Viviodol</b>	11, r. de Marseille, Paris.
<b>Vivo-Dynergol</b>	BROTHIER, 163, r. St-Denis, Paris.
<b>*Vivoléol</b>	24, r. de Fécamp, Paris.
<b>*Vocaldop</b>	222, fg St-Martin, Paris.
<b>Vogénol</b>	13, r. de la République, Yzeure-Moulins (Allier).
<b>Voltargol Robin</b>	13, r. de Poissy, Paris.
<b>Vonol</b>	MERMINOD, 49, r. de Paradis, Paris.
<b>Vulcapil Brisson</b>	157, r. Championnet, Paris.
<b>*Vulcase Brisson</b>	157, r. Championnet, Paris.
<b>*Vulnérine Bergen</b>	DUCOQ, Langeais (I.-et-L.).

## W

- Wantor** BÉRAUD, 13, pl. de la Nation, Paris.  
**\*Wismuthane Vély** 132, av. Victor-Hugo, Paris.

## X

- Xémaderm** 59, r. Châteaudun, Paris.  
**Xylosulfol Vigier** 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.

## Y

- \*Yaourtine** 18, pl. Laborde, Paris.  
**\*Yo-Androl** ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.  
**Yogourth (Extrait de)** 23-25, r. Singer, Paris.  
**Yoghourt Karlos** à Lécluse (Nord).  
**Yoghourt Lactella** à Tourcoing.  
**Yoghourt Lagnel** 7, r. de la Pépinière, Paris.  
**Yoghourt La Maya** 280, r. St-Honoré, Paris.  
**Bulgare**  
**\*Yo-Gynine** ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.  
**Yohourth Carrion** 54, fg St-Honoré, Paris.  
**Yohimalt** U. C. E. P., 5, r. Labroque, Strasbourg.  
**Yohimbine Gilbert** 2, r. du Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris.

**Yohimbine Viscario**  
**Yprine**

**Yse**  
**Ystaline**

17, bd Haussmann, Paris.  
 4 bis, r. Hébert, Courbevoie  
 (Seine).  
 62, r. Louis-Blanc, Paris.  
 2, pl. du Th.-Français, Paris.

## Z

**Zaryl**  
**Zébo-Plastol Dumes-**  
**nil**

**Zédéno**  
**Zinc-Sulfarsénol**  
**Zingal**  
**Zistazine**

\***Zohol**  
 \***Zomine du Pr. Richet**  
**Zomol**

**Zomo-maltine**  
 \***Zomo-musculosine**  
**Byla**

\***Zymatine-Lescène**

\***Zymogastrine Kervan**

12, r. des Apennins, Paris.  
 10, r. du Plâtre, Paris.

37, r. de Bourgogne, Paris.  
 19-21, r. Van-Loo, Paris.  
 11, ch. de la Muette, Paris.  
 163, r. de Flandre, Paris.  
 46, av. des Ternes, Paris.  
 34, r. Sedaine, Paris.  
 VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.  
 172, r. d'Alésfa, Paris.  
 26, av. de l'Observatoire, Paris.

à Livarot (Calvados) et 58, r.  
 de Vouillé, Paris.  
 81-83, av. Ledru-Rollin, Paris.

4<sup>e</sup> Partie

---

**NOMENCLATURE**  
**DE**  
**SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES**  
**CLASSÉES**  
**PAR LABORATOIRES**

---





- Lab. Abadie Tanzi**, 3, pl. Intérieure St-Michel, Toulouse. — *Asclérogénol* (cachets), *Cachets digestifs* du D<sup>r</sup> Bern, *Gouttes calciques Zanit*, *Gouttes halogènes* du D<sup>r</sup> Bern, *Gouttes pectosérum*, *Moruxase*, *Neurotrol*, *Urolithol granulé*, *Veinosérum*.
- Lab. de l'Actine** (**M. Velpry fils**), 60, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres, Billancourt. — *Actine*.
- Lab. d'Actino-Biologie**, 16, r. de la République, Villefranche-sur-Saône. — *Serifer Laurençon*, *Ultracao Laurençon*, *Ultravitamine 4*.
- Lab. Adol** (**M. Giroud**), 78, cours de la Liberté, Lyon. — *Baume Adol*, *Blennopiat*, *Cachets Adol*, *Potion Adol*.
- Lab. de l'Adour**, 38, rue Soult, Tarbes. — *Baume St-Antoine*, *Cachets Cy-troène*, *Eléodermine*.
- Lab. Adrian et Cie**, 9-11, rue de la Perle, Paris. — *Adrianine*, *Adrialgine*, *Arrhénal*, *Comprimés Adrian*, *Dragées Adrian*, *Extrait de céréales Adrian*, *Formine*, *Levure de bière*, *Liqueur peptophosphorique*, *Radiobaume Adrian*, *Sulfurine* du D<sup>r</sup> Langlebert, *Toni-pectoral*, *Vellédol Adrian*.
- Lab. Pierre Alexandre**, 41, rue de Rome, Paris. — *Decorpa*, *Enzypan*, *Hamaméline Royat*, *Normacol*, *Phénol Bobeuf*, *Pilules Myosotis*, *Pilules Royat*, *Radiolysine*, *Réargon*, *Spasmacol*, *Uroclase*.
- Lab. d'Allopathie générale**, à Brignais. — *Eupatorine*.
- Lab. Amblard**, à Cunlhat (P.-de-D.). — *Bexinine*, *Gastérophiline*, *Gercecure*, *Vigine*.
- Lab. de l'Amibiasine**, 58, rue de Miromesnil, Paris. — *Amibiasine*, *Bioentérase*, *Intestase*.
- Lab. des Prod. Amido**, 4, pl. des Vosges, Paris (IV<sup>e</sup>). — *Amidal*, *Bacherine*, *Génatropine*, *Génésérine*, *Genhyoscyamine*, *Génomorphine*, *Génosthéniques*, *Génoscopolamine*, *Génostrychnine*, *Vitamyl*.
- Lab. Amicros**, 9, boul. Edgar-Quinet, Paris. — *Amirargol*, *Orargol*, *Sarcoptol*.
- Lab. H. Ammann**, 76, rue Escudier, Boulogne-sur-Seine. — *Belhemine*.
- Lab. de l'Amphotonyl**, 20, rue du Bourg, Laon (Aisne). — *Amphotonyl*.
- Lab. des Ampho-vaccins** (**Ronchèse**), 6, rue Rothschild, Nice (A.-M.). — *Ampho-pulvérisateur Ronchèse*, *Ampho-tablettes*, *Ampho-vaccin anti-infectieux*, *Ampho-vaccin anti-staphylococcique*, *Ampho-vaccin antityphoïdique T. A. B.*, *Ampho-vaccin pulmonaire*, *Ampho-vaccin urinaire*, *Ampho-vaccin intestinal*, *Ampho-vaccin pansement antipyogène*, *Ampho-vaccin pansement rhino-pharyngien*, *Pyo-amphogel*.
- Lab. Angelini**, 61, rue de Seine, Paris. — *Depuriode*, *Nutréol*, *Onction Angelini*, *Ovules Patrat*, *Poudre Fiore*, *Sirop Alba*, *Sirop Patrat*, *Vin des Indes*, *Varisclérine*.

- Lab. de l'Angiolympe**, 4 bis, rue Hébert, Courbevoie. — *Angiolympe du Dr Rous, Argycuprol, Yprine.*
- Lab. de l'Aniodol**, 3-9, rue des Alouettes, Nanterre. — *Algan, Aniodol.*
- Lab. de l'Antasthme**, 199, av. Victor-Hugo, Aubervilliers. — *Antasthme Cibrand.*
- Lab. des Antigénines**, 1, pl. Lucien-Herr, Paris. — *Antigénines, Biazan, Cresentyl.*
- Lab. « Antiphlogistine »**, 11, rue du Petit-Parc, St-Maur (Seine). — *Antiphlogistine.*
- L'Antiseptique**, 48, rue de Londres, Paris. — *Hypochlorine Pourtal.*
- Lab. des Antiseptiques chlorés**, 40, rue Thiers, Le Havre. — *Clonazone, Stéramine.*
- Lab. de l'Aphosal**, 48 bis, av. Mozart, Paris. — *Aphosal.*
- Sté d' d'Application pharmacodynamique**, 5, rue Claude-Decaen, Paris. — *Erythra Dyn, Phylla Dyn, Rhocya Dyn.*
- Sté générale d'Applications thérapeutiques « Théraplix »**, 157, rue de Sèvres, Paris. — *Bromure Souffron, Crescol Buisson, Freinix Buisson, Féroxal Buisson, Grassyl Buisson, Hémostonine Buisson, Iodure Souffron, Ixium Buisson, Mésothorium Buisson, Nitium Buisson, Ostréine Buisson, Quino-thorium Buisson, Réalphène Buisson, Sédol, Vaccin Démonchy, Véronidia Buisson.*
- Lab. L. Arquevaux, Pharmacien**, pl. de la Bastille, Etampes (S.-et-O.). — *Elixir thiogaiacolé Arquevaux, Eupeccatorial, Glyctone phosphatée Charrière, Sel hépatique U. N. Arquevaux.*
- Lab. Aseptor**, 21, rue Feydeau, Paris (II<sup>e</sup>). — *Aseptorhine, Auriculine, Boréol, Glycalcion, Otalgol Rhinaspir.*
- Lab. P. Astier**, 41-47, rue du Dr-Blanche, Paris. — *Arhéol, Condurango granulé Astier, Colitique, Glycophosphates granulés Astier, Kola Astier, Néo Riodyne, Quinquina granulé Astier, Riodyne, Stalysine.*
- Lab. Aubry**, 54, r. de la Bienfaisance, Paris. — *Malarsan, Quinby.*
- Lab. Marcel Audibert**, Cinq-Cantons, Bayonne. — *Gélicurine Audibert, Vermirène Audibert.*
- Lab. Audras**, 112, rue de Gerland, Lyon. — *Staphylocide Audras.*
- Lab. Augier**, 2, rue des Lombards, Paris. — *Biocalcine, Mensuosédyl, Noctisédyl.*
- Lab. Axarel**, 15, rue Catulienne, St-Denis. — *Balsapector, Bléomaltine, Crème Graziana, Poudre Cytisia, Galactésia, Phosphatol vitaminé irradié, Sirop Axaria, Sirop de dentition Aldeni, Sirop Gabi, Sirop Myrianis, Sirop vermifuge Remonia.*

- Lab. Bailly et Cie**, 15, rue de Rome, Paris (VIII<sup>e</sup>). — *Forxol*, *Ménatol*, *Opobyl*, *Phaguryl*, *Pulmosérum*, *Quergémol*, *Theinol*, *Urophile*.
- Lab. du D<sup>r</sup> Baissade**, Saint-Loup, Marseille (B.-du-Rh.). — *Baume du D<sup>r</sup> Baissade*.
- Lab. du Baldisedan**, 133, rue Lecourbe, Paris. — *Baldisedan*.
- Lab. Bardet**, 76, rue de Sèvres, Paris. — *Cachets Kapytan*, *Capsules Bardet*, *Solution Bardet*, *Taenifuge Bardet*.
- Lab. du D<sup>r</sup> Barey**, 37, av. Jules-Coutant, Ivry-sur-Seine. — *Formocitrine*, *Mesogastrine*.
- Lab. C. Baron**, Les Sables-d'Olonne. — *Séroléine granulée Baron*.
- Lab. Bassin**, 38, r. de Mainguy, Bondy (Seine). — *Stupho*, *Véralgine*.
- Lab. Baudry**, 68, boul. Malesherbes, Paris. — *Bismuth Tulasne*.
- Lab. B. C. L.**, 29, ig de Bourgogne, Orléans. — *Alsodine*, *Gastrépatine*, *Mictoseptol*, *Total Tonic*.
- Lab. B. E. A.**, 17, faub. des Ancêtres, Belfort. — *Alibourine*, *Curoxyure*.
- Lab. Beau**, 36, rue des Archives, Paris. — *Angiosédine*.
- Lab. J. Beaulieu**, 38, boul. de Charonne, Paris. — *Fér ovarine Vitalis*.
- Lab. du Spécifique Bejean**, 12, rue des Hospitalières-St-Gervais, Paris (IV<sup>e</sup>). — *Spécifique Bejean*.
- Lab. Belhomme**, 2, rue Tiron et 13, rue de Rivoli, Paris. — *Thymo menthol eupnique Belhomme*.
- M. Belières**, 19, rue Drouot, Paris. — *Absuric*, *Antirrhoïde*, *Arachise*, *Dépuratif Kromelinck*, *Désensibilysine*, *Eusomnine*, *Laurénol*, *Orthogénol*, *Sirop Gribell*, *Uromil*.
- MM. Benderitter et Cie**, Vendôme (L.-et-C.). — *Gastrocaol*, *Neutralcaol*, *Sulfoléine*, *Trisodyl Rozet*.
- Lab. du D<sup>r</sup> Bengué**, 16, rue Ballu, Paris. — *Baume Bengué*, *Dragées Bengué*, *Chloréthyle*.
- Lab. Berger**, 14, rue des Pyramides, Paris. — *Gynéose*, *Glutinettes d'Aspirine*, *Ostéoglandulol*, *Valéronal*.
- Lab. Bergevin**, Châteaudun (E.-et-L.). — *Arrhénuclène*.
- Lab. G. Bernhard**, 11, rue Lafayette, Paris. — *Ampélidine Bernhard*, *Cachets parégoriques Bernhard*, *Granulés des Vosges*.
- Lab. Bertaut-Blancard frères**, 64, rue de la Rochefoucauld, Paris. — *Kipsol*, *Pilules de Blancard*, *Sirop de Blancard*.

- Lab. Beytout**, 12, bd St-Martin, Paris. — *Aérophagyl*, *Carbonésie*, *Kaolinase*, *Thiophyl*, *Tisane Gisbey*.
- Lab. de Biochimie médicale** (Ch. Desgrez, Dr en pharmacie), 19-21, rue Van-Loo, Paris. — *Arsénos solvant*, *Ced-Roc*, *Sulfarsénol*, *Tétrasthénol*, *Zinc sulfarsénol*.
- Lab. Biologie appliquée** (MM. Carrion et Cie), 54, faub. St-Honoré, Paris. — *Antasthène*, *Evatmine Carrion*, *Hématoéthylroldine*, *Hépanème*, *Pancréatokinase*, *Phlébosine M. et F.*, *Gonagons*, *Plasma de Quinton*, *Staphylagone*.
- Lab. Biologique de l'Île de France**, 3, rue Laugier, Argenteuil (S.-et-O.). — *Appétyl*, *Aloplastine*, *Iodocalcium*, *Neurocalcium*, *Laxor*.
- Lab. de la Biomarine**, Dieppe (S.-Inf.). — *Arthritose*, *Ionyl*, *Marinol*.
- La Biothérapie**, 131, rue Cambronne, Paris. — *Antivirus*, *Arapal*, *Bili-vaccins*, *Crysiodal*, *Sanogyl*, *Spirogyl*.
- Lab. du Biotrignon** (M. Lorthioir), 8, rue Pierre-Girard, Paris. — *Biotrignon*.
- Lab. Bloch**, Tomblaine près Nancy (M.-et-M.). — *Blokao*, *Farines de régime*, *Rapidoats*.
- Lab. Boissy**, 49, rue Hoche, Courbevoie. — *Ampoules Boissy*, *Causyth* (comprimés), *Iode organique Boissy*, *Sanex-Inhalant*.
- Lab. R. Boitas et Cie**, 1, rue de la Martinière, Lyon. — *Cyanhermyl*, *Thio-terpine Dalin*.
- Lab. Bomel**, Annonay (Ardèche). — *Ampoules V.-E. Doumer*, *Bi-iodural Novat*, *Collutoire V.-E. Doumer*, *Iodural Novat*, *Kreofos Novat*, *Pommade V.-E. Doumer*, *Pilules V.-E. Doumer*, *Solution V.-E. Doumer*.
- Lab. Bonetti frères**, 12, rue Vavin, Paris. — *Diadermine*.
- Lab. Bottu**, 35, rue Pergolèse, Paris. — *Codoforme Bottu*, *Gaze néolée*, *Néol*, *Néolides*, *Ovunéol Bottu*.
- Lab. du Dr Boucard**, 30, rue Singer, Paris. — *Lactéol*, *Pulvi-Lactéol*, *Rhino-Lactéol*, *Vaxa*.
- Lab. Boudin**, 9, av. Jean-Jaurès, Joinville-le-Pont. — *Révuksif Boudin*.
- Lab. des Boules Quiès**, 47, bd Victor, Paris. — *Boules Quiès*.
- Lab. E. Boulle**, 12, av. de la Grande-Armée, Paris. — *Uctaplasme du Dr Lelièvre*, *Géranine*, *Sérosine Boulle*, *Vermitox*.
- Lab. du Dr Bourdeau**, Parthenay. — *Détergine*.
- Lab. Bousquet et Leroux**, 46, r. de la Barrière, Elbeuf. — *Cratœgine*, *Sédatuline*.
- Lab. Bouteille**, 23, rue des Moines, Paris. — *Cantéine*, *Disuryl*, *Neurobore*, *Tubérol*, *Vaccinovules*.
- Lab. Bontroy**, 6, rue de Passy, Paris. — *Eugastrol*, *Exonérol*.

- Lab. Bouty, 3, rue de Dunkerque, Paris.** — *Biliol, Gaiarsol, Gastrozymase, Globépal, Liqueur Bouty, Liqueurs organiques injectables, Métharfer, Métharsol, Méthylarsinales, Néphrine, Opothérapie Bouty, Ovigénine, Pansérum, Produits Pennès, Sérosthényl, Surrénaline, Thyroïdine, Triglandine, Triglandol.*
- Lab. Bouvelot, 62, rue d'Antibes, Cannes.** — *Acodros, Inhalot.*
- Lab. Bouyssou et Cie, 90, av. des Ternes, Paris.** — *Biophytol, Panhémol, Peptozym.*
- Lab. Bracquemond et Cie, 105, rue de Normandie, Courbevoie.** — *Morrhuetine Juncken, Rhagadine Bracquemond, Sel d'Ewald.*
- Lab. Branchu, 4, rue Beaurepaire, Paris.** — *Hémofixine.*
- Lab. Bréant, 4, rue de Clichy, Paris.** — *Chlorure Ammonium P. L., Gynaseptone, Osmo vaccins P. L., Phostone.*
- Lab. Ch. Brésil, 12, rue St-Gilles, Paris.** — *Broncosol, Sanguil.*
- Lab. J. Bressier, 102, rue Vincent, Marseille.** — *Adrénargol, Nasobore, Résocaïne, Urométhyl.*
- Lab. Brichard et fils, Bar-le-Duc (Meuse).** — *Baby Bala, Hémovéine, Pastilles Bala, Sirop Bala, Vigostérol.*
- Lab. Pierre Brisson, 157, rue Championnet, Paris.** — *Ampoules Egralène, Ampoules huile soufrée, Ampoules Sėti, Ampoules Sigmuth, Anytal Brisson, Cathiote Brisson, Denisia, Denisoline, Entérième Brisson, Jovine Brisson, Laccodermes Brisson, Lenicade Brisson, Licardet Brisson, Procuta Brisson, Savon Denisol Brisson, Vulcase Brisson, Vulcapil Brisson, Uriclarine Brisson, Septylase Brisson.*
- Lab. Bruel, 36, rue de Paris, Colombes.** — *Benzo iodhydrique, Capsules Bruel.*
- Lab. Bruneau et Cie, 17, rue de Berri, Paris.** — *Sénophile, Sérum de Jousset.*
- Lab. A. Brunot, 16, rue de Boulainvilliers, Paris.** — *Dialyl, Sel de Hunt.*
- Lab. des Prod. J. Bureau (Louis Laurin), 86, bd Port-Royal, Paris.** — *Arrhénalotine Bureau, Calcifixine Bureau, Neutralisine, Phagocitrine Bureau.*
- Lab. Buriat, 25, rue Copernic, Paris.** — *Arséniode Buriat, Vérianne.*
- Établ. Byla, 26, av. de l'Observatoire, Paris.** — *Amino-sel Amunine, Antélobine, Gui Byla, Hormovarine, Insuline Byla, Héparmone, Irrastérine, Musculosine, Neurotrophol, Opothérapie Byla, Paralactine, Phylactone, Phytogénine, Pituilobine, Splénarmone, Valériane, Vitadone, Vitaminol, Zomo-musculosine.*

- Lab. Caillaud**, 37, rue de la Fédération, Paris. — *Aldine*, *Choléo Combretol*, *Cyanhérmine*, *Dioradin*, *Hydralin*, *Mucosodine*.
- Lab. Calmel-Domergue**, 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse. — *Arsétonyl*, *Biodures Domergue*, *Dermodiol*, *Gonurol B.*, *Iodures Domergue*, *Pharyngaseptyl*, *Vaso-rhinol simple*, *Vaso-rhinol mentholé*, *Vaso-rhinol adrénaliné*, *Viscosodine*.
- Lab. des Calmosuppos**, La Motte-St-Heray (Deux-Sèvres). — *Calmosuppos*.
- Lab. Camuset**, 18, rue Ernest-Rousselle, Paris. — *Hexotal*, *Pyrétane*, *Silicyl*.
- Lab. Cantin**, Palaiseau (S.-et-O.). — *Gouttes Nican*, *Somnothyrid*.
- M. J. Capin**, Pharmacien, Roquefort (Landes). — *Antiphi*, *Libérine*.
- Lab. L. Carbou**, 8, rue Jean-du-Bellay, Paris. — *Cholélyse*.
- Lab. Caresmel**, 2, quai Paul-Bert, Tours. — *Antonol*, *Granulé Caresmel*, *Lucodal*.
- Lab. Carlier**, à St-Florentin (Yonne). — *Infangyl Carlier*.
- Lab. Carron**, 69, rue de St-Cloud, Clamart. — *Amiphène*, *Fosfoxyyl*, *Fosyls*.
- Lab. Carteret**, 15, rue d'Argenteuil, Paris. — *Bactioxyne*, *Cétémol*, *Chrysemine*, *Diurène*, *Euronal*, *Lusoforme*, *Sinahin*.
- Lab. Cartier**, 1, rue de la Martinière, Lyon. — *Asclérosol*, *Eudynol*, *Guitose*, *Hémoantitoxine*, *Sulfarsiode*.
- Lab. Catillon**, 3, boul. St-Martin, Paris (III<sup>e</sup>). — *Glycérine Catillon*, *Iodo thyroïdine Catillon*, *Peptone Catillon*, *Strophantine Catillon*, *Strophantus Catillon*.
- Lab. du D<sup>r</sup> R. Cavaillès**, 34, rue de Turin, Paris. — *Bronchoplastre*, *Coloplastre*, *Crème du D<sup>r</sup> Rap*, *Crème de Sapolan*, *Emplâtres Rogé-Cavaillès*, *Extrait du D<sup>r</sup> Rap*, *Gaze Anadhère*, *Lait de Cèdre Sapolan*, *Lait de Sapolan*, *Lait de soufre Sapolan*, *Poudre de Sapolan*, *Sapobarbe*, *Sapocade*, *Sapocrème*, *Sapolan*, *Sapopate*, *Savon de Sapolan*, *Sulfostan*, *Tisane dépurative de Cavaillès*.
- Lab. Central**, 125, rue de Turenne, Paris (III<sup>e</sup>). — *Lactaris*.
- Lab. Cerioma**, 16, rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris. — *Ceriril*, *Ceriomine*.
- Lab. Cesbron**, 63, rue de la Faisanderie, Paris. — *Gélor*, *Ioda*.
- Lab. du Céthocal**, 8 bis, rue J.-J.-Rousseau, Fontenay-sous-Bois. — *Céthocal*.
- Lab. Chaix**, 8-10, rue de l'Orne, Paris (XV<sup>e</sup>). — *Colloïdogénine du D<sup>r</sup> Bayle*, *Polyvaline du D<sup>r</sup> Bayle*.
- Lab. P. Chambon**, 5, pl. Francheville, Périgueux (Dordogne). — *Antisciatique P. Chambon*.

- Lab. Chantereau**, 6, rue de Naples, Paris. — *Levure B. 17*, *Ultra-levure*.
- Lab. Chantereau**, 26 bis, rue Dombasle, Paris. — *Mucrum*, *Sympathyl*, *Tot'Hamélis*.
- Lab. Chapès**, 12, rue de l'Isly, Paris. — *Hélinine de Korab*.
- Lab. Chapotot**, 56, boul. Ornano, Paris (XVIII<sup>e</sup>). — *Néo laxatif Chapotot*, *Rhizotanin Chapotot*.
- Lab. du Charbon Fraudin**, 4, av. Desfeux, Boulogne-sur-Seine. — *Benzoate de naphтол Fraudin*, *Biscols*, *Charbon Fraudin naphтолé*, *Charbon Fraudin simple*, *Dragées de charbon Fraudin magnésié*, *Laxol Fraudin*.
- Lab. Charmaison**, 26, av. de Royat, Chamalières (P.-de-D.). — *Dragées de Royat*, *Gobérol*, *Levurase*.
- Lab. V. Charret-Tomasi**, Saint-Just-sur-Loire (Loire). — *Diabétuline*, *Diurégine*.
- Lab. Chassaing Le Coq et Cie**, 1, quai Aulagnier, Asnières (Seine). — *Poudre laxative de Vichy*, *Vin de Chassaing*.
- Lab. Pierre Château**, 137, av. Parmentier, Paris. — *Digéryl*, *Energétyl*, *Gélax*, *Inhalyl*, *Sinuzyl*.
- Lab. Chatelut**, 65, rue Louis-Blanc, Paris. — *Dragées Yse*.
- Pharmacie Chaumel**, 87, rue Lafayette, Paris. — *Isotonyl Bourel* (poudre de Lausanne).
- Établ. Alfred Chauvin**, Aubenas (Ardèche). — *Acoégénol*, *Tubes Blache*, *Tubes Chauvin*.
- Lab. Chavialle**, 70, Grande-Rue, Sèvres. — *Baume Saihel*, *Dynamocalcine*, *Fornose*, *Suppositoires Pyrax*.
- Lab. Chevillon**, 99, rue de Paris, Massy (S.-et-O.). — *Bilio-gastrine*, *Moriland*, *Nucleigène*, *Paradoline*, *Stoméol Vichy*.
- Lab. du Dr Chevrier**, 21, rue du Faub.-Montmartre, Paris. — *Granulés Chevrier*, *Radjunal*, *Vanadine*, *Vin de Coca du Pérou*, *Vin à l'extrait de foie de morue*.
- Lab. Chiarini**, Aix-en-Provence (B.-du-R.). — *Tœnifuge du Dr Jaquème*.
- M. Chibret**, 5, rue St-Hérem, Clermont-Ferrand. — *Collyres Chibret « Optima »*, *Pommades ophtalmiques Chibret « Optima »*.
- Lab. Chimico-thérapeutique de Paris**, 12, rue des Apennins, Paris (XVII<sup>e</sup>). — *Ixogyne*, *Névrosol*, *Pepsodia*, *Rylal-Noyon*, *Tristyl-Noyon*.
- Lab. de « Chimie appliquée de Nanterre »**, 22, boul. du Couchant, Nanterre. — *Néotrophène*.
- Lab. Français de Chimiothérapie**, 89, rue du Cherche-Midi, — *Bivatol*, *Ditagel*, *Sterogyl*.
- Lab. Choay**, 40, rue Théophile-Gautier, Paris. — *Extraits opothérapeutiques Choay*, *Extraits injectables*, *Extraits totaux Choay*, *Folliculine Choay*, *Gélotanin Choay*, *Opothérapie Choay*, *Peptosthénine Choay*, *Post-hypophyse Choay*, *Synchrines Choay*.

- Christiaens** (Lab. de la Pharmacie de la Place-Royale), 2, rue du Champ-de-Mars, Reims. — *Antialgos Christiaens*, *Benzophosphine Christiaens*, *Capsules Goubaux*, *Pilules anhépatiques Christiaens*, *Pilules prophylactiques Christiaens*, *Sédatine Christiaens*.
- Lab. Churchill**, 12, rue de Castiglione, Paris. — *Limol Churchill*, *Magol Churchill*, *Poliol Churchill*.
- Lab. Ciba**, 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon (Rhône). — *Agomensine*, *Androstine*, *Ascéine*, *Atoquinol*, *Cibalgine*, *Coagulène*, *Coramine*, *Dial*, *Dialacétine*, *Didial*, *Digifoline*, *Diocaïne*, *Elbon*, *Ferrophytine*, *Fortossan*, *Fortossan irradié*, *Hémypnal*, *Lipiodine*, *Percaïne*, *Péristaltine*, *Phytinate de quinine*, *Phytine*, *Résyl*, *Salène-Salenal*, *Septacrol*, *Sistomensine*, *Vioforme*, *Vioformol*.
- Lab. Claëys**, 65, boul. Sébastopol, Paris. — *Babeurre Nutricia*, *Nutro*.
- Lab. Claverie**, 4, av. Brazza, Romainville. — *Stomobrol*.
- Lab. Clerambourg-D<sup>r</sup> Brunerye**, 10, rue St-Antoine, Paris. — *Entéroseptyl*, *Lysiode Clérambourg*, *Neubryne*, *Pilules Clérambourg*.
- Lab. Clin**, 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris. — *Adrénaline*, *Arrhénomartiol*, *Arsaminol*, *Electromartiol*, *Cinnozyl*, *Electrargol*, *Electrocuprol*, *Electrosélénium*, *Elixir Déret*, *Enésol*, *Injection et gouttes Clin*, *Liqueur Laville*, *Pilules de Moussette*, *Vin et sirop Nourry*, *Odarsol*, *Salicéral*, *Sirop de Sirtal*, *Solurol*, *Solutions du D<sup>r</sup> Clin*, *Syncaïne*, *Tréparsenans*, *Vaccins Clin*.
- Lab. du Clupeyl**, 69, av. Faïdherbe, Malo-les-Bains. — *Clupeyl*.
- Lab. Cluzel**, 60, cours Emile-Zola, Lyon. — *Gouttes Milko*, *Mictualine*, *Révulsif Milko*, *Tablettes Zéva*, *Tonique Zéva*.
- Lab. des Prod. Cognet (Armingeat et Cie)**, 43, rue de Saintonge, Paris (III<sup>e</sup>). — *Agonol Cognet*, *Capsules Cognet*, *Dragées de fer Cognet*, *Dragées Dubourg*, *Hemoneurol Cognet*, *Nuclarène Cognet*, *Tiodine Cognet*, *Thiosinamine Cognet*.
- Lab. du D<sup>r</sup> Coirre**, 5, boul. Montparnasse, Paris. — *Allium Coirre*, *Chlorhydropeptine*, *Granules 3 Cachets au phosphore de zinc*, *Solucalcine*, *Solution Coirre*.
- Sté des Prod. Collas et Boudault**, 15, rue Augustin-Thierry, Paris. — *Pyrélaïne Collas*.
- Lab. Raoul Columbeau**, 19, rue St-Bazile, Marseille. — *Custodine*, *Poudre Cassarini*.
- Complexes colloïdaux du D<sup>r</sup> Riquoir (Lab. Merminod et Cie)**, 49, rue de Paradis, Paris. — *Colloïxols*, *Néoplalysines*, *Préaléxol*, *Vonol*.
- Lab. des Complexextraits Huckel**, Héricourt (Hte-S.). — *Complexextraits Condurango*, *Complexextraits Convallaria*, *Complexextraits Crataegus*, *Complexextraits digitale*, *Com-*



*plextraits G. P. V., Complextraits H. H., Complextraits Kola, Complextraits Marron, Complextraits Valériane.*

**Lab. Comte**, 60, rue St-Guilhem, Montpellier. — *Bulles d'Haley, Marrubiase, Rythmosystol.*

**Lab. C. Cons**, rue des Ecoles, Chambéry. — *Juglane.*

**Consortium français de spécialités pharmaceutiques**, 13, rue du Cancera, Bordeaux. — *Eubiol.*

**Lab. Coquelu**, Digoïn (S.-et-L.). — *Compressif Beslier, Cogluplaste, Thermoplaste, Tulle rose Beslier, Vésicatoire Rose Beslier.*

**Lab. Corbière**, 27, rue Desrenaudes, Paris. — *Alcalinose, Créagénol, Cyto-choline, Cyto-manganol, Cyto-serum, Dermaline, Hémocyto-sérum, Iolase, Novarsénobenzol, Oléoformine, Oliolase, Paludase, Praunase, Sérum antiasthmaticque de Heckel, Suppositoires Corbière, Vacyldun.*

**Lab. Cornaud et Brossard**, 1, rue des Cordouans, La Rochelle. — *Névralgol Brossard.*

**Lab. Cortial**, 15, boul. Pasteur, Paris. — *Androcalcion, Gynocalcion, Iodaseptine, Lita, Septicémine.*

**Lab. Coulloux**, 116, rue du Pont, Auxerre. — *Sirop Brahma.*

**Lab. Courret**, 12, av. Stéphane-Mallarmé, Paris. — *Farine Suckine, Suckine (farine alimentaire).*

**Lab. P. Coursaget**, 9, rue Porte-Côté, Blois. — *Phiamine.*

**Lab. G. Coussinet**, 20, rue des Martyrs, Paris. — *Bursol, Codocol, Optonine, Vagosedyl.*

**Lab. Couturieux**, 18, av. Hoche, Paris. — *Anti-paludique. — Arsenion, Aurion, Avanazol, Azufrol, Bismuthion, Bromiase, Cuprion, Cytuline, Glycolactimase, Héracéline, Iodurase, Lactimase, Lantol, Levure extractive, Métaux colloïdaux, Cénase, Panglandine, Plurion, Polyformiate, Séléniol, Selvan, Spasma, Stanion, Sulfurion, Thyroïdine.*

**Lab. Croc**, 57, av. Jean-Jaurès, St-Fons. — *Carypaïne.*

**Lab. Cruet**, 13, rue Miollis, Paris. — *Arcanan, Atophan, Atophanyl, Synthaline B.*

**Lab. Cuguillière**, 19, rue des Chalets, Toulouse. — *Sérum végétal.*

**Lab. de la Curatine Brunet**, 23, rue des Ecoiffes, Paris. — *Curatine Brunet.*

**Lab. du Curogène**, 18, rue des Tribunes, Versailles. — *Curogène.*

- Lab. Daguin**, 7-13, rue Bobillot, St-Maur (Seine). — *Choléolactol*, *Novo Lactol*, *Pneumostyl*, *Purganol*.
- Lab. Dalloz et Cie**, 13, boul. de la Chapelle, Paris. — *Antalgol*, *Glycérophosphate*, *Gosiérine*, *Hémoglobine*, *Tridigésine*.
- Lab. Daniel Brunet**, 8, rue de la Source, Paris. — *Coréine*, *Cholergine*, *Hépatobyl*, *Neurène*, *Novo-Brol*, *Stal Kosal*, *Tœnifuge Kirn*.
- Lab. Danjou**, 28, rue de l'Hôpital-Militaire, Lille (Nord). — *Anapeptone*, *Peptone Vassal*.
- Prod. Dannec'h** (MM. Brun et Martineau), 64, rue des Tournelles, Paris. — *Chloridia*, *Cigares Gicquel*, *Elixir du Dr Thermes*, *Laxia Dannec'h*, *Manganésia*, *Papier Gicquel*, *Tritonine*.
- Établ. Darrasse**, 13, rue Pavée, Paris. — *Pepto-fer du Dr Jaillet*, *Tamar Indien Grillon*, *Valérobromine Legrand*.
- Lab. Darrasse**, 7-13, rue St-Maurice, Nanterre. — *Choléine Camus*, *Choléine lactique*, *Dragées Séranti*, *Eupnine Vernade*, *Lactobaciline*, *Opsolysine*.
- Lab. Daupez**, 37, rue des Lois, Toulouse (Hte-Gar.). — *Myoden*.
- Lab. Daussz**, 4, rue Aubriot, Paris. — *Ampoules névrosthéniques*, *Camphodausse*, *Fondants*, *Gouttes*, *Hémogénol*, *Intraits*, *Moréthyl*, *Paveron*, *Sérodauasse*.
- Lab. C. David et ses fils**, 49, rue de Bitche, Courbevoie. — *Baume Sélénia*, *Citro Thymol*, *Colargyl*, *Gelotube 29*, *Quassia Kina Rabot*, *Roléine*.
- Lab. du Dr Debat**, 60, rue de Prony, Paris. — *Inotylol*, *Inosepta*, *Inoxémol*, *Pancrinol*.
- Lab. Déchosal**, 39, rue de la Gare, Bondy. — *Aldor formogène*, *Rhumatodine*, *Vacuoline*.
- Etabl. Dégécé**, 7, rue Princesse, Paris. — *Hormotone*, *Trypsogen*.
- Lab. Deglaude**, 6, rue d'Assas, Paris. — *Cardibaïne*, *Digibaine*, *Theoxantine*, *Spasmosédine*.
- Lab. Dehaussy**, 66, rue Nationale, Lille. — *Anti-asthmine*, *Céréossine*, *Crédone*, *Crypthermol*, *Diastogène*, *Entérobyl*, *Gladyl*, *Hermarsinol*, *Hermomuthol*, *Leucosérum*, *Sirop et capsules Préga*, *Sédoneurol*, *Sinrénaline*.
- Lab. Dehay**, 68, rue St-Géry, Arras. — *Inhalone*, *Poudre Gynule*, *Tablettes Boval*.
- Lab. Déjardin**, 10, rue Parent-de-Rozan, Paris. — *Extrait de malt français Déjardin*, *Laxatone Déjardin*, *Levure Déjardin*, *Malt français Déjardin*, *Mycodermine Déjardin*.
- Lab. Delalande et Cie**, 16, rue Henri-Regnault, Courbevoie. — *Baume Suelta*, *Esculéol*, *Neuroplasma Fort*, *Neuroplasma Massif*, *Neuroplasmine*, *Polyminéral*, *Solucamphre*, *Suppos. à l'esculéol*.

- Lab. Delfour, Pouillon (Landes). — *Oléo-mel laxatif*.
- Lab. Deliss, 40, av. des Deux-Gares, Antony. — *Catalyl Mg*, *Magbromyl*, *Magiodyl*, *Magsalyl Mg*.
- Lab. Delorme, 33, rue Lauriston, Paris. — *Pulmogyl*.
- Lab. Demasles, 5 pl. Miremont, Vienne (Isère). — *Atihal*, *Biogénol*, *Hématogénine*, *Ménosédine*, *Myrtiline*, *Phospholéose*, *Sédospasmine*.
- Lab. Denis, 85 bis, rue du Ranelagh, Paris. — *Glottyl*.
- Lab. Denisot, 19, rue de Fleurus, Paris (VI<sup>e</sup>). — *Carbolactyl simple*, *Carbolactyl bilié*, *Cervol*, *Hémosédine*.
- Lab. Depruneaux, 18, rue de Beaune, Paris. — *Diemenal*, *Dienol*, *Dragées Elkin*, *Granules Elkin*, *Hypophédrine*, *Normalarine*, *Soderséine*.
- Lab. de la Dermofagine (L. Sagot), 15, pl. Godefroy-de-Bouillon, Boulogne-sur-Mer. — *Dermofagine*, *Raiforyl*.
- Lab. Deroubaix, 11, chaussée de la Muette, Paris. — *Hypnosédine*.
- Lab. Deschiens, 9, rue Paul-Baudry, Paris. — *Hémoglobine Deschiens*, *Holos*, *Hépathémo*.
- Lab. Descoureaux et fils, 52, bd du Temple, Paris. — *Chloro-Magnésion*, *Dragées Lumeval*, *Ovules Vézès*, *Tryclène*.
- Lab. du Dolophos, 61, rue de St-Quentin, Caudry (Nord). — *Dolophos*.
- Lab. Charles Domergue, Agen (L.-et-Gar.). — *Antiasthmatique D.*, *Antifuronculeux D.*, *Crayons antifissuré sure Domergue*, *Gatercodéine*, *Naso-Sulfolarсан*, *Prunines Sentini*, *Sirop Sentini*.
- Lab. Dor (M. Dorantowicz, Pharmacien), 17 bis, av. Parmentier, Paris. — *Alcamfétol*, *Benzylcalcium*.
- Lab. Dorantowicz, 17 bis, av. Parmentier, Paris. — *Chéloi-dine*, *Curiodé*, *Hormobiline*, *Mésoforme*, *Morrhualène Gauthier*, *Panfébrine*, *Stomophile*.
- Lab. de la Dosurine, 16, rue Charlemagne, Paris. — *Dosurine* (Trousses).
- Lab. Drapier, Lucquy (Ardennes). — *Ampoules Reipar*, *Ostéopeptine D<sup>r</sup> Drapier*.
- Lab. Drouet et Plet, 37, rue de Marly, Rueil (S.-et-O.). — *Anexol*, *Byliréine*, *C. 40 comprimé*, *C. 40 injectable*, *Magnésie hydratée*, *Néo-physiosthénine*, *Ozobiase*, *Ozobiase opothérapique*, *Oxyléine*, *Phosoforme*, *Phospirine*, *Physiosthénine*, *Quinéase*, *Rosalyl A. et B.*, *Salysérum*.
- Sté Française du Dryco, 3, rue St-Roch, Paris. — *Dryco* (lait sec).
- Lab. du D<sup>r</sup> Dubat, 80, faub. St-Denis, Paris. — *Théisine*.
- Lab. des Prod. Dubois, 16, bd Percire, Paris. — *Cardial-gine*, *Collo-iode*.

- Lab. Ducatte**, 31, rue des Francs-Bourgeois, Paris. — *Enteroantigènes Danysz, Paratoxine, Sclérolysine.*
- Lab. Duclos**, 2, rue de la Harpe, Evreux (Eure). — *Pommade Radine.*
- Lab. Ducocq**, Langeais (Indre-et-Loire). — *Vulnérine.*
- Lab. Dufayard**, 12, rue des Saints-Pères, Paris. — *Gheralys, Urosan.*
- Lab. Henri Dufour**, 40, rue des Carmes, Orléans (Loiret). — *Apsophol, Edistol.*
- Lab. du D<sup>r</sup> E. Duhourcau**, 6, rue Louis-Blanc, La Garenne-Colombes. — *Dragées anticatarrhales du D<sup>r</sup> Duhourcau, Gastricine du D<sup>r</sup> E. Duhourcau, Tœnifuge français du D<sup>r</sup> E. Duhourcau.*
- Lab. Dumesnil**, 10, rue du Plâtre, Paris. — *Aseptampoules Dumesnil, Crémo-plastol Dumesnil, Dépuratif Dumesnil, Dermo plastol Dumesnil, Gelicrème Dumesnil, Girastol Dumesnil, Huile au calomel Dumesnil, Mugrizol Dumesnil, Théobromose Dumesnil, Zébo-plastol Dumesnil.*
- Lab. Dumesny**, 6, rue Chanoinesse, Paris. — *Granules Crosnier, Sirop Crosnier, Morubiase.*
- Lab. Dumesny**, 18, rue de Maubeuge, Paris. — *Cigarettes antiasthmiques du D<sup>r</sup> Clerq, Poudre antiasthmiques du D<sup>r</sup> Clerq. Pastils Meran.*
- Lab. Durel**, 7, boul. Denain, Paris. — *Magnésie lourde de Durel, Solution Laroyenne.*
- Lab. Duret et Rémy**, 13 bis-15, rue des Champs, Asnières. — *Bis-Ka-Ma, Choléokinase, Comprimés d'Alibour, Hépatosodine, Nyctal, Peptonal, Polypeptonal, Saturool, Thaolaxine.*
- Lab. E. Duriez**, 20, pl. des Vosges, Paris. — *Choral bromuré, Elixir Ducro, Quinoïdine.*
- Lab. du D<sup>r</sup> Henri-Dussaud**, 52, rue de Rome, Marseille. — *Elixir Dussaud.*
- Lab. A. Duteil**, 90, av. de St-Ouen, Paris. — *Elixir Hymelo Suppositoires Hymel.*
- Lab. Duval**, Falaise (Calvados). — *Laxaul.*
- Sté des Eaux minérales de Decize**, 49, bd de Port-Royal, Paris. — *(Source) Saint-Are.*
- Lab. Éma**, 14, rue de la Pépinière, Paris. — *Bouchons et bouteille Radio actifs, Boues Radio actives, Pommade Radioactive « Raderm ».*
- Lab. de l'Eranol**, 45, rue de l'Echiquier, Paris. — *Eranol.*
- Lab. Escouflaire**, Baisieux (Nord). — *Cigarettes anti-asthmiques Escouflaire n<sup>os</sup> 1 et 2, Poudres anti-asthmiques Escouflaire n<sup>os</sup> 1 et 2.*

- Lab. Etienne**, 19, av. Secrétan, Paris (XIX<sup>e</sup>). — *Potion des Cordeliers de Seez*.
- Lab. général d'Etudes biologiques**, 29, pl. Bossuet, Dijon (Côte-d'Or). — *Doloma, Cenophos, Protiodyne*.
- Lab. Evine**, 3, rue de la Perle, Paris (III<sup>e</sup>). — *Baume Pélevine, Ovules Evine, Poudre Evine, Poudre Pélevine, Thé Evine*.
- Sté Française d'Extension bio-chimique**, 6, rue du Chevalier-de-la-Barre, St-Quentin. — *Baromyl, Gabiol, Stomoxygène*.
- Lab. Fagard**, 44, rue d'Aguesseau, Boulogne-sur-Seine. — *Antisthms Bengalais, Barèges Fagard, Capsules d'Euviscol, Cigarettes Schulzé, Elatine Bouin*.
- Lab. Falcoz et Cie**, 9, rue Boissonnade, Paris. — *Æthone*.
- Lab. Falvy**, 40, rue des Acacias, Paris. — *Adrénoleine, Anxiol, Broseyl, Ephédrine Proba, Epholéine, Fermentéryl, Gastropeptyl, Hémopectal, Holuryl, Rhinadrol, Synase, Trynol*.
- Lab. Fanyau**, 48, rue Claude-Lorrain, Lille. — *Anti-épileptique de Liège*.
- Lab. Faure**, 80, rue du Rocher, Paris. — *Citropeptol, Naphtocarbine, Neuropol, Perunhyl, Sedobore, Sirop Nevra, Spleno-magnésium*.
- Lab. Faure et Dussuel**, 15, av. de Marlioz, Aix-les-Bains. — *Euphorine du D<sup>r</sup> Chaboud, Elixir Bonjean, Le Sinaplasme*.
- Lab. Favrichon et Vignon**, Saint-Symphorien-de-Lay (Loire). — *Céréales Bébé Favrichon, Phosphogène Favrichon*.
- Lab. Fayès**, 199, rue St-Denis, Paris. — *Bains médicamenteux du D<sup>r</sup> Fayes. — Béryline Fayes, Carminase, Pastilles Fayes, Sulforhinol Fayes*.
- Lab. Feignoux**, 95, rue de Turenne, Paris (III<sup>e</sup>). — *Névoral, Ovarine Tisy*.
- Lab. du Feminadène**, 120, rue Lecourbe, Paris. — *Femina-dène*.
- Lab. G. Fermé**, 55, bd de Strasbourg, Paris. — *Muthanol, Néolyse, Psolhanol, Soluthanol, Staphylotanol, Tri-radol, Urolan, Viscosérum*.
- Ferme de Lafaye**, Marlihes (Loire). — *Babeurre Lafaye*.
- Lab. Ferré**, 71, bd St-Michel, Paris. — *Pyratone*.
- Lab. du D<sup>r</sup> Ferré**, 6, rue Dombasles, Paris. — *Dismine Favrot, Hémoluol, Lin Tarin, Pulsamons, Poudre Exibard, Sirop Lamoroux*.

- Lab. E. Ferré, 19, rue Grégoire-de-Tours, Paris. — *Iodures L. Foucher, Litharsyne, Poudre Rocher laxative, Sucre Edulcor.*
- Lab. du D<sup>r</sup> Ferry, pl. Clichy, Monte-Carlo. — *Tubes Dulcis.*
- Lab. du D<sup>r</sup> Fialip, 23, av. de la Motte-Picquet, Paris. — *Oxy-injecteur du D<sup>r</sup> Fialip.*
- Lab. Fisch et Cie, 4, rue d'Illzach, Mulhouse (Haut-Rhin). — *Bains carbogazeux Wolo, Baumolacpinine, Chlormagnésium, Chymosine Fisch, Elastoplaste, Fango Fisch, Lacpinine, Poudre Orl, Prévalidine, Recytile, Révulsif Procipha, Solvochine, Spirobismol, Spirobismol soluble, Sulfocrème, Tepéros, Transpulmine.*
- Lab. du Fluosalyl (M. Beaugourdon), 43, av. Kléber, Paris. — *Fluosalyl Beaugourdon.*
- Lab. de la Fluxine (M. Bonthoux), 76, rue Nationale, Villefranche (Rhône). — *Evonyl, Fluxine (Gouttes).*
- Lab. Fortéal, 3, rue Barbette, Paris. — *Althine, Entéralthine, Gynalthine.*
- Lab. A. Fosset, 31, Grande-Rue, Montfermeil (S.-et-O.). — *Viscodermine, Viscoveine.*
- Lab. H. Foucher, 77, bd de Grenelle, Paris. — *Copraxe, Elixir Héla, Entérohépatine, Gastérinase, Muxyl, Neuricure.*
- Lab. Fournie, 3, pl. Miséricorde, Lyon. — *Quina Baron.*
- Lab. A. Fournier et Cie, 147, bd de Montparnasse, Paris. — *Cérébrine Fournier.*
- Lab. Fournier et Cie, 18, rue de Jouvence, Dijon (Côte-d'Or). — *Sparaplast Fournier.*
- Lab. Fournier frères, 7, rue Biscornet, Paris. — *Bileyl, Biolactyl, Opothérapie Fournier, Pélospanines, Phycrisine, Splenocrisine, Vaccins, Vasolaxine.*
- Lab. M. Fraisse, 8, rue Jasmin, Paris. — *Campho Salyl Fraisse, Iodo bismuthate de quinine Fraisse, Sérum névrosithénique Fraisse, Sérum hypolensis Fraisse, Sérum Ferrugineux Fraisse.*
- Lab. du D<sup>r</sup> Fraysse, 47, r. de Neuilly, Nanterre. — *Arthridol du D<sup>r</sup> Fraysse, Energinoze du D<sup>r</sup> Fraysse, Hypophydoze du D<sup>r</sup> Fraysse, Opothérapie du D<sup>r</sup> Fraysse, Revitaloze du D<sup>r</sup> Fraysse.*
- Lab. Freyssinge, 6, rue Abel, Paris. — *Capsules Dartois, Chloramine, Nevrosthénine, Potyphorine Freyssinge, Quassine Frémint, Salicol Dusaule.*
- Lab. Fumouze et Cie, 78, faub. St-Denis, Paris. — *Capsules Raquin, Carnine Lefranc, Globules Fumouze, Ovules Chaumel, Suppositoires Chaumel.*

- Lab. Galbrun**, 8-10, rue du Petit-Musc, Paris. — *Aristargol*, *Iodalose Galbrun*, *Prosthénase Galbrun*.
- Lab. R. Gallier**, 38, boul. Montparnasse, Paris. — *Arhémapectine Gallier*, *Kidoline*.
- Etabl. Gallina**, 4, rue Candolle, Paris. — *Huile Gallina*, *Iodentérol*, *Iodhéma*.
- Lab. Clément Gardiol**, 6, rue Félix-Pyat, Marseille. — *Urosalyl*.
- Lab. du Gastrocarbone**, Saint-Louis (B.-du-Rh.). — *Gastrocarbone*, *Manganoglobine*.
- Lab. Ch. Gautier**, 13, rue Dorian, Paris. — *Baume Tétyl*, *Bisquina*, *Bissol*, *Férarsényl*, *Germoclasine*, *Hématoguina* *Trantoul*, *Moroidol*, *Protolysine*, *Rhéothymine*, *Sucroquinine*.
- Lab. J. Gautier**, 42, rue Emile-Deschanel, Courbevoie. — *Gambéol*, *Ganderma*, *Salvatyl*.
- Lab. Genevet**, 40, boul. St-Ruf, Avignon. — *Kinechol*.
- Lab. Génévrier**, 45, rue du Marché, Neuilly-sur-Seine. — *Adolan*, *Alepsal*, *Boues radioactives de Pistyan-les-Bains* (*Tchécoslovaquie*), *Neurinase*.
- Lab. Gerda**, 163, boul. Croix-Rousse, Lyon (Rhône). — *Arvensyl*, *Gerdabyl*, *Pulmolaxol*, *Nevrithone Daclin*, *Sodolactine*.
- Lab. des Prod. du Dr Gigon**, 25, boul. Beaumarchais, Paris. — *Cétrarose*, *Sédatose*, *Tribromure*, *Ulmarène*, *Valérianose*.
- Lab. Gilbert**, 6, rue du Laos, Paris. — *Agaricine Clauss*, *Artérase*, *Bilolive*, *Forcéase*, *Nazinette*, *Pilules Clauss*.
- Lab. A. Girard**, 48, rue d'Alésia, Paris. — *Biophorine*, *Caséoline*, *Glycérophosphate de Chaux granulé Girard*, *Laxo peptine Girard*, *Nucléofer Girard*, *Sirop Girard*, *Vin Girard*.
- Lab. Givaudan Lavirotte**, 56, chem. de Combe-Blanche, Lyon. — *Glyphospher*, *Hipposarcine Roy*, *Huile de ricin Crolas*.
- Lab. Gmet**, 27, rue du Faubourg-Montmartre, Paris. — *Boldo Gmet*, *Coca Gmet*, *Composé Gmet*, *Condurango Gmet*, *Crataegus Gmet*, *Diurétique Gmet*, *Dragées Gmet*, *Extrait Hamyd*, *Frène Gmet*, *Fucus Gmet*, *Gmet*, *Gui Gmet*, *Hamamélis Gmet*, *Hydrastis Gmet*, *Jugland Gmet*, *Kola Gmet*, *Piscidia Gmet*, *Quinquina Gmet*, *Valériane Gmet*, *Viburnum Gmet*, *Sauge Gmet*, *Ulmaire Gmet*.
- Lab. Gobey**, 89, rue du Cherche-Midi, Paris. — *Pyoformine*, *Sirop laxatif*, *Uroformine*.
- Lab. P. Godfrin**, 5, av. Watteau, Nogent-sur-Marne. — *Limonade Godfrin*.
- Lab. du Gomenol**, 48, rue des Petites-Ecuries, Paris. — *Gomenol*, *Gomenoleo* et tous produits au *Gomenol*.

- Prod. Gonnon**, 14, rue Victor-Hugo, Lyon. — *Antidiabétique Monavon*, *Cacodyle Gonnon*, *Créosote soluble Vacheron*, *Eupeptique Monavon*, *Irénine Gonnon*, *Kola Monavon*, *Lecithine Vacheron*, *Polybromure Gonnon*, *Polyiodure Gonnon*, *Sirop de créosote Vacheron*, *Sirop de glycérophosphates Vacheron*, *Sirop de Lovel*, *Sirop Vacheron au gaiacol*, *Suppositoires Gonnon*, *Terpine Gonnon*, *Tonicardine Gonnon*, *Tonique Gonnon*.
- Lab. Gouzène**, 139, rue de Paris, Pantin. — *Aloysine*.
- Établ. Goy**, 23, rue de Beautreillis, Paris. — *Gouttes Magalo*.
- Lab. Grandval**, *Quirin succ.*, 12-14, rue Féry, Reims (Marne). — *Eugynol Grandval*, *Hamamélis Grandval*, *Œnoquinol Grandval*, *Potion Grandval*, *Quinquina Grandval*, *Kina coca kola Grandval*, *Quinarsol antianémique Grandval*, *Quinarsol fébrifuge Grandval*.
- « **Les Granions de Fouard** », 61, rue Gaston-Laurian, Montreuil (Seine). — *Les Granions de Fouard*.
- Lab. Comte René de Grauwe**, 16, rue de Rocroi, Paris. — *Elixir Duchamp*, *Fer Bravais*.
- Lab. Grémy**, 14, rue de Clichy, Paris. — *Episodine Grémy*, *Eutensyl Grémy*, *Folestrine Grémy*, *Immuniderm Grémy*, *Immuniperos Grémy*, *Immuniprages Grémy*, *Immunisols Grémy*, *Ocréine Grémy*, *Thyrémine Grémy*, *Thyrocréine Grémy*.
- Lab. Grias**, 47, rue Feray, Corbeil (S.-et-O.). — *Verticurine*.
- Lab. Grignon**, 2, rue Duphot, Paris. — *Eniode Lefebvre*, *Valérianate Grignon*.
- Lab. Grorichard**, 12, pl. de la Révolution, Besançon. — *Comitiot*, *Magnésium Grorichard*, *Métrostyptal Grorichard*.
- Lab. Gros**, 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand. — *Antisep-tique alcalin Gros*, *Capsellase*, *Diurocalcine Gros*, *Diurocalcine iodurée*, *Hergénol*.
- Lab. Grosjean**, 36, rue de Malte, Paris. — *Centrosérum Grosjean*, *Chloral Géranie*.
- Lab. Grysa**, 7, rue Saint-André, Le Mans (Sarthe). — *Cineyl*, *Sylcase*.
- Lab. André Guerbet et Cie**, 22, rue du Landy, St-Ouen (Seine). — *Lipiodol Lafay*.
- Lab. P. Guérin**, 58, rue Basse, Meulan (S.-et-O.). — *Ferrocalcine*, *Vascurol*.
- Lab. André Guillaumin**, 13, rue du Cherche-Midi, Paris. — *Acésine*, *Cyanargyre*, *Novargyre*, *Théosalvose*, *Vana-darsine*.



- Lab. Halléana**, 4, imp. de Béarn, Paris (IV<sup>e</sup>). — *Bardanyl*, *Bionucléine*, *Calciclo*, *Chloroma*, *Dynos*, *Eudermyl*, *Geloboldine*, *Gossyl*, *Guilyl*, *Gynévrine*, *Gynolysats*, *Iodeptol*, *Mangaphos*, *Muthoquinol*, *Ovarids*, *Ovules Halléana*, *Polyna*, *Pulsophyle*, *Réalgose Alcaline*, *Rhinaldose*, *Sidéarsan*, *Thiokéine*, *Urobiose*, *Urobleu*, *Vasculine*, *Veinyll*.
- Lav. Hardy**, 200, rue de Tolbiac, Paris. — *Scléroveine Hardy*, *Toniphlébine Hardy*.
- Lab. Hardy**, 42, bd St-Marcel, Paris. — *Magnésium Hardy*, *Oiricin Hardy*.
- Lab. Hautdider**, 37, rue Galilée, Paris. — *Benzylol*, *Dentoxyl*, *Hématogénol*, *Inhalex*, *Iodométine*, *Magnésol*, *Sirop Dubreuil*, *Triferyl*, *Uvéphorine*.
- Lab. Heliatol**, 4, pl. Royale, Nantes. — *Cimatryl*, *Pommade Heliatol*, *Poudre Heliatol*.
- Lab. de l'Hémostyl du Dr Roussel**, 97, rue de Vaugirard, Paris. — *Hémostyl*, *Tréphonyl*.
- Lab. de l'Hépatrol (A. Rolland)** 31, rue des Francs-Bourgeois. — *Hépaphos*, *Hépatrol*, *Stomamol*.
- Lab. des Prod. français L. Hérin**, 98, rue J.-Maillotte et 228, rue de Lille, La Madeleine (Nord). — *Cachets réparateurs*, *Poudre « Stom »*, *Thé Suédois*.
- Prod. Heudebert**, 85, rue St-Germain, Nanterre. — *Farine de Malt*, *Nergine*, *Pain essentiel*, *Pains spéciaux*, *Radiopaque*.
- Lab. Hinglais**, Epernay (Marne). — *Chenantol*.
- Prod. Hinglais**, 30, rue Miromesnil, Paris. — *Follicormone buccale Hinglais*.
- Lab. Hocquette**, 191, rue du Faubourg-St-Antoine, Paris. — *Acobella*, *Eugaline*, *Marimine*, *Nadolor*, *Splenomanganol*, *Valédyl*, *Sérum neuropsychique*.
- Lab. Hoffmann La Roche et Cie**, 21, pl. des Vosges, Paris. — *Adoverne*, *Airolroche*, *Ampoules de Pantopon*, *Ampoules de Digalène*, *Ampoules de Sécacornine*, *Ampoules de Spasmalgine*, *Ampoules de Théobryl*, *Allonal*, *Arsylène*, *Cachets Roche thiocol*, *Choline*, *Comprimés Roche thiocol*, *Digalène*, *Hémostra*, *Iodostarine*, *Iloglandol*, *Isacène*, *Larosan Roche*, *Ovules Roche*, *Pantopon*, *Sécacornine*, *Sédobrol*, *Sédormid Roche*, *Sirop Roche*, *Soluprotine*, *Somnifène*, *Spasmalgine*, *Tampol*, *Théobryl*, *Tonique Roche*, *Thigénol*, *Thiocol*, *Thyroxine*.
- Lab. Houdé**, 9, rue Dieu, Paris. — *Aloïne*, *Boldine Houdé*, *Granules Houdé*, *Hyoscyamine Houdé*, *Quassine Houdé*.
- Lab. Hourquet et Vienne**, 114, rue du Temple, Paris. — *Cura-toxine*, *Euphoryl*, *Hirudinase*, *Pérusol*, *Sclérosérum*, *Savon Pérusol*.
- Lab. J. Huerre et Cie**, 9, rue de la Gare, Levallois. — *Albu-plast Vigier*.

- Lab. R. Huerre et Cie, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris.** — Acétosulfol Huerre, Aprol Vigier, Ampoule de benzoate et biiodure hg Vigier, Capsules ovariques, Capsules thyroïdes, Capsules thyrovariennes, Capsules polycrinandriques, Capsules polycrinogynes, Chlorosulfol Vigier, Crayon à la chrysarobine, Crème de laine Vigier, Huile grise Vigier, Sirop iodermol Vigier, Lactermol Vigier, Métasulfol Vigier, Poudre dentifrice Charlard, Savon dentifrice Vigier, Savon ichthyol surgras (au beurre de cacao) soufre, sulfureux, naphthol, huile de cade, naphthol soufré, essence de cèdre, essence de Ladier, etc., Sulfol Charlard, Tétrasulfol Vigier, Triganol Vigier, Xilosulfol Vigier.
- Lab. Huët, 4, pl. de Strasbourg, Lille.** — *Tridynol*.
- Lab. Hugues, 105, bd Malesherbes, Paris.** — *Endoxidine*, *Erbamil*, *Opopeptol*, *Magnésie Carlo Erba*, *Néoiacol*.
- Compagnie de l'Hydroxydase, 10, rue Blanche, Paris.** — *Hydroxydase*.
- Lab. d'Hygiène et Thérapeutique appliquées, 47, rue Bokanowski, Asnières (Seine).** — *Calcomagnésie*, *Dysithène*, *Héxafel*, *Myothermine*, *Sthénoxal*, *Stopral*.
- Igepharma, 47 bis, av. Hoche, Paris.** — *Lait de magnésie Philips*.
- Lab. Immunos, av. des Sources, Nice (A.-M.).** — *Cedryl*, *Cinol*, *Digicardine*, *Immuno-vaccins antirhumatismal*, *Santal blanc*.
- Lab. Inhal, 98, rue J.-Maillotte et 228, rue de Lille, La Madeleine (Nord).** — *Eucalinal*, *Goudrinhal*, *Sulfinhal*.
- Institut de Biologie appliquée (M. G. Cépède), 57-59-60, rue Mathurin-Régnier, Paris (15<sup>e</sup>).** — *Vaccinothérapie atoxique Cépède*.
- Institut de Microbiologie, Sarrebruck (Sarre).** — *Anthraxone Fornet*, *Blennosine Fornet*, *Grippol Fornet*, *Insuline Fornet*, *Pommade Fornet*, *Tébéphaguine Fornet*.
- Institut de recherches G. Jacquemin, Malzeville (Nancy).** — *Ferment pur de raisin Jacquemin*.
- Institut Pasteur, 22, rue Dutot, Paris.**
- Lab. de l'Iodarsenic Guiraud, 10, imp. Milord, Paris.** — *Elixir Spes*, *Gouttes païdophiles du D<sup>r</sup> Guiraud*, *Iodarsenic Guiraud*, *Tubes du D<sup>r</sup> Guiraud*.
- Lab. Iscovesco, 107, rue des Dames, Paris.** — *Adrénol total*, *Afatyl*, *Androcrinol Iscovesco*, *Andropolycrinol*, *Cardiocrinol*, *Cérébrocrinol*, *Gynocrinol*, *Gynohyphophysol*, *Gynolutéol*, *Gynopolycrinol*, *Hépatocrinol*, *Hypophysol*, *Lipoides H. I.*, *Mammol*, *Néphrocrinol*, *Opopédol*, *Splenocrinol*, *Thyrol A.*, *Sarcosérum*, *Yo-Androl*, *To-Gynine*.

- Établ. Jacquemaire**, Villefranche (Rhône). — *Blédine*, *Phosphate Vital*, *Verrulyse*.
- Lab. Jammes**, 86, rue Michel-Ange, Paris. — *Cacodyline Jammes*, *Iodinjectol Jammes*, *Néophage*.
- Lab. du Jécol**, 3, rue Watteau, Courbevoie. — *Allophaquina*, *Jécol*.
- Lab. Jicem**, 304, rue Saint-Jacques, Paris. — *Citropaïne*, *Iodarsine*, *Jicémine*.
- Lab. Jolly**, 1, rue Christine, Paris. — *Spasmine Jolly*.
- Lab. Jonids**, 9, boul. Sévigné, Dijon (Côte-d'Or). — *Athérollysine*, *Génergosine*, *Hémaxol*.
- Lab. Jooss**, 7 bis, rue du Général-Galliéni, à Montreuil (Seine). — *Thyroidine*, *Radiophorine*.
- Lab. Julien**, 105, rue de Rennes, Paris (VI<sup>e</sup>). — *Benzoflorine*, *Elgine Julien*, *Manganophosphat Julien*.
- Lab. L. Kerfyser**, 4, rue Alexandre-III, Dunkerque (Nord). — *Benzoquinol*, *Hémorroidine* (*Pommade*, *Gouttes*, *Suppositoires*).
- Lab. Kervan**, 81-83, av. Ledru-Rollin, Paris. — *Zymogastine Kervan*.
- Lab. A. Koehler**, 10, rue Cimarosa, Paris. — *Nutrobiase*, *Raisin vivant*.
- Lab. des Kolatines**, 12, rue du Helder, Paris. — *Kolatines*.
- Lab. Kraus**, 37, rue Godot-de-Mauroy, Paris. — *Francoplaste*.
- Lab. Krieger**, 121, av. de St-Ouen, Paris. — *Antipur*, *Artéριοveinine*, *Eczémacure*, *Sciaticure*.
- Etabl. Kuhlmann**, 145, boul. Haussmann, Paris. — *Chloralosane*.
- Laboradium**, 33, rue St-Jacques, Paris. — *Aseptoradol*, *Dermoradol*, *Radiotropine*.
- Lab. Lacroix**, 37, rue Pajol, Paris. — *Camphostyl*, *Pilules Hélieniennes Naud*, *Quinoforme*, *Vanucléol*.
- Lab. du Lacto-sérum Lavril**, 15, rue Clapeyron, Paris. — *Lacto-sérum Lavril*.

- Lab. Lafarge**, 6, boul. Arago, Paris. — *Neurêol*, *Sulfobyl*.
- Lab. Lagoutte**, 229, cours Gambetta, Lyon. — *Bronchogénine*, *Carbométine*, *Dépurlaxil*, *Dermodulcis*, *Dragées Phlébos*, *Néo Mg Fèvre*, *Neurosomnyl*, *Pommade Phlébos*, *Sodogastrol*, *Suppolonic*.
- Lait (Compagnie générale)**, Rumilly (Hte-Savoie). — *Lait Mont-Blanc*.
- Le Lait Guigoz**, 19, rue J.-J.-Rousseau, Paris. — *Lait en poudre Guigoz*.
- Lab. du Dr Lalaurie**, Cuxac-d'Aude. — *Adolol*, *Analcol*, *Catemenyl*, *Cemag*, *Cremasepta*, *Elixir Gelm*, *Grains gelm*, *Gunose*, *Pastilles Helge*, *Pilules Panma*, *Sirop Helge*, *Stenon du Dr Gelm*, *Udanka*, *Urogène*.
- Lab. Laleuf**, 20, rue du Laos, Paris. — *Adrépatine*, *Colloïdine*, *Folliovarine*, *Iodaloxine*, *Pancrépatine*, *Polyferments*, *Sirop Dubois au créosal*, *Trinitrine caféinée Dubois*, *Urisal du Dr Deschamp*, *Urococcine*, *Trinitrine-Papavérine Laleuf*.
- Lab. Lamar**, pl. Forbin, Aix (B.-du-Rh.). — *Anaural*, *Biliboldo*.
- Lab. Lambert**, 6, rue de Longchamp, Vichy. — *Epicral*, *Oxylisine*, *Triseptine*.
- Lab. L. Lambert**, 8, av. de Grammont, Tours. — *Gélo pansements gastro-intestinaux*.
- Lab. Lambiotte frères**, 20, rue Dumont-d'Urville, Paris. — *Arhine*, *Créosoforme*, *Galform*, *Perles Taphosote*, *Phosote*, *Thiosote*, *Urométine*.
- Lab. des Prod. Lamo**, 26-28, rue Paul-de-Koch, Paris. — *Toritane Lamo*, *Toritanol Lamo*, *Tergyl Lamo*.
- Lab. Lancosme**, 19, rue Alain-Chartier, Paris. — *Acolitol*, *Algocratine*, *Argybil*, *Bain Carré*, *Bismhydral*, *Bismuth Desleaux*, *Carbonate de chaux Lancosme*, *Globules Laincar*, *Hémodrome*, *Inhalation Lancosme*, *Magnésie Storke*, *Spectrol*, *Stasol*.
- Lab. Landrin et Cie**, 12, rue de la République, Puteaux. — *Cipromarol*, *Elixir de Virginie Nyrdahl*.
- Lab. Laug et Cie**, 2, rue du Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris. — *Capsules Dieu*, *Digestif Capmartin*, *Hémoglobine Star*, *Poudre Cap*, *Savons Mollard*, *Salvanos*, *Sirop Jane et pâte Jane*, *Vermifuge des moines*, *Yohimbine Gilbert*.
- Lab. L. Laroze**, 54, rue de Paris, Charenton (Seine). — *Bigynol*, *Cytopan*, *Dosotol*, *Héliostérine*, *Kaobrol*.
- Lab. Laryngologique Vocaldop et Hydrorrhéol**, 222, faub. St-Martin, Paris. — *Hydrorrhéol*, *Vocaldop*.
- Lab. Latour**, 71, rue Douy-Delcupe, Montreuil-sous-Bois. — *Parlax*.
- Lab. du Dr Laurent-Gérard**, 40, rue de Bellechasse, Paris. — *Evolaxine*, *Radiotétrane*, *Thoroxyl*.

- Lab. Louis Laurin, 86, av. Port-Royal, Paris. — *Asepturol*, *Diardyscol*, *Lortocarbol*, *Sirop Laurin*.
- Lab. Lavergne, 5, rue Grande, Cannes (A.-M.). — *Holaseptine*.
- Lab. du D<sup>r</sup> Lavoué, Rennes (I.-et-V.). — *I. A. M.*, *Mangarsenic*.
- Lab. Lebeault et Cie, 5, rue Bourg-l'Abbé, Paris. — *Citrolargol*, *Germose*, *Mycolysine*, *Staphylase du D<sup>r</sup> Doyen*, *Veinosine*, *Vin de Bugeaud*.
- Lab. Le Blond, 51, rue Gay-Lussac, Paris. — *Alexime*, *Ortho-Gastrine*.
- Lab. Leboime, 32, quai Voltaire, Bezons (S.-et-O.). — *Calcozymase*, *Prezymase*.
- Lab. Lebrun, 155, bd Magenta, Paris. — *Dragées toni-cardiaques*, *Eucalyptine*.
- Établ. T. Leclerc, 10, rue Vignon, Paris. — *Bactériophage Leclerc*, *Entéroxin Leclerc*, *Félicol*, *Magnétone Selamon*, *Sélamon*, *Sérum Normet*.
- Lab. Lecoq et Ferrand, 14, rue Gravel, Levallois-Perret. — *Antipsorine*, *Curalues du D<sup>r</sup> Lafay*, *Entéropraxines Abry*, *Erythrolues du D<sup>r</sup> Lafay*, *Helminthyl*, *Molène*, *Tréparsol*, *Solmuth*.
- Lab. Le Davay, 2, rue Notre-Dame, Guingamp (C.-du-N.). — *Bioplasmyl*.
- Lab. Lees, 18, rue Pierre-Curie, Paris (V°). — *Métritols*, *Suppo-gynals*.
- Lab. du D<sup>r</sup> C. Lefèvre, 52, rue Decamps, Paris. — *Laxamer*, *Solution Valens*, *Sulfarsinol*.
- Lab. Legendre et Cie, Houilles (S.-et-O.). *Pâte Mireille*, *Sirop Mireille*.
- Lab. Legoux frères, 6, rue Louis-Blanc, La Garenne-Colombes. — *Salvénase Legoux*.
- Lab. Leisyn, 1 bis, rue Molitor, Paris. — *Albuol Leisyn*, *Ampoules suractivantes Leisyn*, *Anéo Leisyn*, *Cérébroil Leisyn*, *Colloïl Leisyn*, *Koch-i-cide Leisyn*, *Névropathyl Leisyn*, *Nitroyl Leisyn*, *Onction Leisyn*, *Oxyol Leisyn*, *Prostaphile Leisyn*, *Rythmos Leisyn*, *Seotral Leisyn*, *Sève cérébralese Leisyn*, *Stommol Leisyn*, *Tubercuséine Leisyn*.
- Lab. Lejeune, 142, rue de Picpus, Paris. — *Diachusine*, *Indhaméline simple*, *Indhaméline Plurigl.*, *Patholy-sine*, *Pommade Lenoir*.
- Lab. Lematte et Boinot, 52, rue La Bruyère, Paris. — *Acecolex*, *Acecoline*, *Arsoplasmine*, *Biocalcose Chevreton*, *Calcional*, *Cholestériodine*, *Hémo-tonikéine*, *Hormocline*, *Hypotan*, *Jap*, *Lactozymase B*, *Lipocérébrine*, *Océanine*, *Séroferrine*, *Tonikéine*.
- Lab. Léonardon, rue du Casino, Arcachon (Gironde). — *Hemofluidol*, *Quinthéryl*.

- Lab. Le Perdriel, 11, rue Milton, Paris.** — *Antipyrine effervescente* Le Perdriel, *Benzoate de lithine effervescent* Le Perdriel, *Biosine* Le Perdriel, *Bromhydrate de lithine effervescent* Le Perdriel, *Carbonate de lithine effervescent* Le Perdriel, *Citrate de lithine effervescent* Le Perdriel, *Coaltar Saponiné* Le Beuf (émulsion de goudron de houille), *Fucoglycine* du D<sup>r</sup> Gressy (sirop bromo-iodo-phosphoré végétal), *Glycérophosphate de chaux effervescent* Le Perdriel, *Glycérophosphate de fer effervescent* Le Perdriel, *Glycérophosphate de lithine effervescent* Le Perdriel, *Glycérophosphate de soude effervescent* Le Perdriel, *Goudron* Le Beuf, (émulsion de goudron végétal), *Salicylate de lithine effervescent* Le Perdriel, *Taffetas Marinier* (à l'arnica, au baume du commandeur ou au collodion), *Thapsia* Le Perdriel-Reboulleau, *Toile vésicante* Le Perdriel, *Tolu* le Beuf.
- Lab. Leporeq, 9, rue du Temple, Enghien (S.-et-O.).** — *Ardogène*.
- Lab. du D<sup>r</sup> Leprince, 62, rue de la Tour, Paris.** — *Arsycodile*. *Cascarine* Leprince, *Eumictine*, *Ferrocodile* et *Ferricodile*, *Guipsine*, *Néo arsycodile*, *Néo Rhomnol*, *Ophthalmine*, *Pilules du D<sup>r</sup> Séjournet*, *Rhomnol*.
- Lab. Lerck, 63, pl. St-Roch, St-Etienne (Loire).** — *Kerlol*.
- Lab. Lescene, 58, rue de Vouillé, Paris.** — *Anaquinine Lescène*, *Balsamol*, *Viosten*, *Zymatine*.
- Lab. G. Lesourd, 18, rue Ferdinand-Flocon, Paris.** — *Bolcitol*, *Elixir Fleig Formiaté*, *Fœnugol*, *Lucinine* Borrelle, *Pericols*.
- Lab. Lesure, 70, rue du Bac, Paris.** — *Arqueritol* Lesure.
- Lab. Lettry, 69, rue de Sèvres, Paris.** — *Gouttes de Séru*.
- L. E. V. A., 26, rue Pétrelle, Paris.** — *Leniforme*.
- Lab. Licardy, 38, bd Bourdon, Neuilly-sur-Seine.** — *Fluobyl*, *Gélogastrine*, *Hémoductyl*, *Laxamalt*, *Sédosine*, *Tonudol*.
- Lab. des Lipides, 40, rue d'Enghien, Paris.** — *Liposplénine* du D<sup>r</sup> Groc.
- Lab. de la Liposeptine, 2, pl. des Vosges, Paris.** — *Fenugrène*, *Marrubène*, *Liposeptine*, *Rhino-Liposeptine*.
- Lab. Lobica, 46, av. des Ternes, Paris.** — *Azotyl*, *Béatoi*, *Chlorobyl*, *Iodo-trypsine*, *Lactobyl*, *Lactochol*, *Nutréine*, *Pneumo-calcine*, *Sérénol*, *Taxol*, *Uralysol*, *Veino-trope*, *Vin tonique « Efka »*, *Zohol*.
- Lab. Lobry, 6, rue Parrot, Paris.** — *Hemofer*, *Urozéa*.
- Lab. Emile Logeais, 24, rue de Silly, Boulogne-sur-Seine.** — *Pommade Logeais*, *Suppositoires Logeais*, *Veinhormones Logeais*.
- Lab. J. Logeais, 22 bis, rue de Silly, Boulogne-sur-Seine.** — *Boricine* Meissonnier, *Fluidol*, *Gobules Secretan*, *Iodamélis*, *Naïodine*.
- Établ. Lo-Lo, 123, rue de Paris, Saint-Denis.** — *Lait sec* Lo-Lo.

- Lab. Longuet**, 34, rue Sedaine, Paris. — *Arsi-Strychnal*, *Citrosodine*, *Clisemine*, *Facmine*, *Fixine*, *Levure de bière* du D<sup>r</sup> Debouzy, *Narcyl*, *Ortho-Zomine*, *Pilules du D<sup>r</sup> Debouzy*, *Quinuryl*, *Rénalginine*, *Rhinalginol*, *Strychnal*, *Urisanine*, *Zomine*.
- Lab. Lorrain de Produits synthétique purs**, Étain (Meuse). — *Caparlem*.
- Lab. Louinet**, 39, rue de l'Arcade, Paris. — *Laxadonal*, *Kreptol*.
- Lab. Lucinia**, 154 bis, rue de Breteuil, Marseille. — *Gala-bactéine*.
- Lab. Lumière** (Prod. chimiques spéciaux « Brevets Lumière »), 23, cours de la Liberté, Lyon. — *Allocaïne Lumière*, *Allochrysine Lumière*, *Antipaludique*, *Borosodine Lumière*, *Cryogénine Lumière*, *Cryptargol Lumière*, *Emge Lumière*, *Entérovaccin Lumière*, *Entalva Lumière*, *Gelée Lumière*, *Germosine Lumière*, *Hémo-plase Lumière*, *Hermophényl Lumière*, *Iodure d'amidon Lumière*, *Néokola Lumière*, *Opozones Lumière*, *Persodine Lumière*, *Rhéantine Lumière*, *Tulle gras Lumière*.
- Lab. Madyl**, 14, rue de Miromesnil, Paris. — *Bromovose*, *Euphytose*, *Tapo*.
- Lab. Malmanche**, 101, av. de Paris, Rueil-Malmaison. — *Digestif Harvey*, *Rosalyl A. et B.*, *Urobuccol*, *Valerinodor*.
- Lab. du Malone** (M. Vincent), Ancenis (Loire-Inf.). — *Gouttes Malone*.
- Lab. Mannet**, Loudun (Vienne). — *Dragées ferro-ergotées Mannet*, *Elixir ferro-ergoté Mannet*, *Elixir tribromure Mannet au Salol*, *Elixir Mannet à l'iodure de potassium et au Salol*, *Elixir Mannet à l'iodure de sodium et au salol*.
- Lab. Marchand et Leroy**, 40, rue d'Enghien, Paris. — *Préventyl*.
- Lab. Marinier**, 159, rue de Flandre, Paris. — *Bi-Citrol*.
- Lab. Maronneau Morel**, 156, rue des Fauvelles, Courbevoie. — *Atolysan*, *Bilexabol*, *Curiosan*, *Ricomalt*.
- Lab. A. Martin**, 24, r. de Charenton, Paris. — *Cytobiase*.
- Lab. du D<sup>r</sup> Martinet**, 16, rue du Petit-Musc, Paris. — *Hémo-pausine*, *Néo-collargol*.
- Lab. Martinie**, 62, av. Philippe-Auguste, Paris. — *Phlebotonine*, *Tonicalcine*, *Uvargol*.

- Lab. Mauchant**, 14, rue d. Birague, Paris. — *Bircol Mauchant*, *Cassitol*, *Fluveinose Mauchant*, *Iodonucléol*, *Maltine Phenix*, *Minéraline du D<sup>r</sup> C. Baud*, *Myodyne Marchant*, *Salubrine Phénix*, *Solvuric*, *Surc Durham*, *Tercolène*, *Trilactine*.
- Lab. Mayaud**, 6 ter, rue Voltaire, La Garenne-Colombes (Seine). — *Ulcérophile Nosan*.
- Lab. Mayoli Spindler**, 1, place Victor-Hugo, Paris. — *Baume Aroma*, *Borostyrol*, *Dicaliode*, *Euphon*, *Eucytol*, *Perubore*, *Sanoformine*, *Valbrol*.
- Lab. de Médecine Expérimentale**, 1-3, rue Malherbe, Beauvais. — *Fludiose*, *Formocarbène*, *Opochol*, *Sodothiol*.
- Lab. Merminod**, 49, rue de Paradis, Paris (X<sup>e</sup>). — *Calcothéobromine*, *Comprimés gynécologiques*, *Desitin*, *Formint*, *Glutaspirine*.
- Lab. du Métacuprol**, 5, rue François-Ponsard, Paris. — *Métacuprol*.
- Lab. Métadier**, 55, rue Nationale, Tours. — *Méta-vaccin*, *Méta-titane*.
- Lab. du D<sup>r</sup> Mialhe**, 8, rue Favart, Paris. — *Adrénine*, *Anusol*, *Aquintol*, *Digimialbaïne*, *Digitaline*, *Elixir Mialhe*, *Lab-lacto-ferment*, *Mialbaïne*.
- Lab. du Micelliode**, 88, rue de la Villette, Paris. — *Adipolysine*, *Dermo-rhinhistol*, *Grains céphalgifuges*, *Micelliode*, *Neuro-Moka*, *Sthenoléine*.
- Lab. Michels**, 9, rue Castex, Paris. — *Chloro-calcion*, *Silisode*.
- Lab. du Mictasol**, 28-30, rue du Four, Paris. — *Mictasol*.
- Lab. Midy frères**, 4, rue du Colonel-Moll, Paris. — *Antigrippine*, *Bétul-ol*, *Carbolin*, *Cascara*, *Cocaïne*, *Colchisal*, *Pipérazine*, *Pommade Midy*, *Proveinase Midy*, *Suppositoires Midy*.
- Établ. pharmaceutiques Jacques Midy**, 41, rue de Courbevoie, La Garenne (Seine). — *Créoline Pearson*, *Solution Ivula*, *Fruits de régime Tilloy*, *Iodine Médol*, *Novanol Jacques Midy*, *Onguent Ivula*, *Ovules Ivula*, *Siccogyne*.
- Lab. E. Millet**, Rambouillet (S.-et-O.). — *Carbos*, *Formocarbos*, *Gastroplasme*, *Laxoléine*, *Mucicarbos*, *Mucilaxine*, *Mucilose*, *Oléomucilaxine*, *Rectoplasme*.
- Lab. Millet et Guillaumin**, 8, rue Richer, Paris. — *Paxène*, *Kénol.*
- Lab. Millot**, 54, rue de la Bienfaisance, Paris. — *Ampoules Dubé*, *Benzo-bismuth Millot*, *Comprimés néothorium*, *Millot*, *Crayons néothorium Millot*, *Ovules néothorium Millot*, *Pommade néothorium Millot*, *Soluté Gaube du Gers*.
- Lab. Géo Miquel**, 3, av. Lowendal, Paris. — *Glyco-M*, *Sanos*, *Selunic*.
- Lab. Monal**, 6, rue Bridaine, Paris. — *Biodermyl*, *Boléase*, *Santal Monal au bleu de méthylène*, *Sulfuryl Monal*, *Taburol Monal*, *Terkal Monal*.



- Lab. **Moncour**, 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine. — *Opothérapie Moncour* (sphérulines et néo-sphérulines), *Parathyrocalcine Moncour*, *Vitacalcine Moncour*.
- Lab. **Mondolan**, 41, rue Etienne-Marcel, Paris. — *Bilirhéine*, *Ménovarine*.
- Lab. **René Monimart**, 23, rue du Grand-Cerf, Meaux. — *Acimyl*.
- Lab. **Monin**, 49, rue de Maubeuge, Paris. — *Dépuratif Rob. Lechaux*, *Elixir Grez*.
- Lab. **Montagu**, 49, boul. de Port-Royal, Paris. — *Broméine Montagu*, *Carbalcaloïdes*, *Carbatropine*, *Carbosanis*, *Dragées Hecquet*, *Génacide*, *Iodéine Montagu*, *Lac-Ser*, *Savons Michon*.
- Lab. **Morellet**, 95, boul. Magenta, Paris. — *Euchol Morellet*, *Sulfureux Concentré Dax*.
- Lab. **Moser et Cie**, 8, chem. de Montbrillant, Lyon (Rhône). — *Maltea Moser cristallisée*.
- Lab. **Moulin**, 50, rue de la République, Puteaux (Seine). — *Aseptone*, *Bacilactine*, *Baume Dolora*, *Benzothymol*, *Capsules ovigéniques*, *Dépuratine*, *Diabésia*, *Purgemint granulé*, *Poudre Helvetia*, *Rhinodol*, *Sirop Diver*, *Uricine*.
- Lab. **J. Moulines**, Villeneuve-la-Guyard (Yonne). — *Pré-laxine*.
- Lab. **Mouneyrat**, 12, rue du Chemin-Vert, Villeneuve-la-Garenne. — *Histogénol*, *Hectine*, *Hectargyre*, *Kinectine*, *Galyl*, *Vioxyl*.
- Lab. **Mousnier-Delerme**, 9, boul. Carnot, Bourg-la-Reine. — *Dragées du D<sup>r</sup> Gélinau*, *Sirop du D<sup>r</sup> Gélinau*.
- Lab. **Narodetzki**, 19, boul. Bonne-Nouvelle, Paris. — *Elixir Spark*, *Gripodal*, *Nazophyl Darva*, *Spyrolides*.
- Lab. **Nativelle**, 27, rue de la Procession, Paris. — *Digitaline Nativelle*, *Natibaïne*, *Natirose*, *Ouabaïne Arnaud*, *Quinicardine*, *Solubaïne*.
- Lab. **du Nestosyl**, 72, rue St-Dominique, Paris. — *Nestosyl*, *Pommade au Nestosyl*, *Solution huileuse au Nestosyl*, *Suppositoires au Nestosyl*.
- Lab. **Neuville**, 239, faub. St-Honoré, Paris. — *Hyol*, *Urol*.
- Lab. **Neyret**, 35, rue de la Bourse, Lyon. — *Comprimés Neyret*, *Pâte Dermos*, *Pâte Neyret*.
- Lab. **B. Niel**, 60, rue Auguste-Comte, Lyon (Rhône). — *Bismu-sodine*, *Kalmobrol*.
- Lab. **Noelline**, Guingamp (C.-du-N.). — *Pommade Noelline*.

- Lab. H. Nogues, 11, rue Joseph-Bara, Paris. — *Baume maternité*, *Capsules Noguès*, *Grains de Vals*, *Néoarsile Satine*, *Sirop maternité*, *Sirop Noguès*, *Thébail*.
- Lab. du Nujol, 78, av. des Champs-Élysées, Paris. — *Nujol*.
- Lab. Oberlin, 17, rue Cadet, Paris. — *Aliment Tinardon*, *Analgénine*, *Biodynamine*, *Ferropeptone Oberlin*, *Gastrocalcine*, *Gouttes D<sup>r</sup> Ludlam*, *Granulé Tinardon*, *Gynaicéol*, *Hamaméliode*, *Iode Oberlin*, *Juvéol*, *Lactosone*, *Panbromine*, *Pectine Oberlin*, *Potion Bonnet*, *Rob Oberlin*, *Santal Oberlin*, *Santal Salolé Cabanès*, *Savon iodé Oberlin*, *Sigma Cones*, *Sirop Tinardon*, *Uraséol*.
- Lab. Océana, 29, av. de St-Mandé, Paris. — *Laminiode*.
- Lab. Odilia, 42, rue du Mont-Cenis, Paris. — *Diasclérol*, *Gynopausine*, *Inolène*.
- Lab. de l'Odynal, Varennes-sur-Allier. — *Odynal*.
- Lab. Œnologiques de Bourgogne, Mâcon (S.-et-L.). — *Juraisin Macon*.
- Lab. de l'Olivéol, Tassin-la-Demi-Lune (Rhône). — *Oléol*, *Olivéol*, *Vasococones*, *Vasoconstrictine*.
- Lab. de l'Opodermyl, 36, rue des Martyrs, Paris. — *Opodermyl*.
- Lab. moderne d'Opothérapie et Biologie médicale, 40, rue Claire-Paulhac, Toulouse. — *Glandocalcyl*, *Hépatozyl Caldo*, *Nucléophorine*, *Sclérosérol*, *Veinoposine*.
- Lab. Opothérapiques Henning, (Éts Merminod, concessionnaires), 49, rue de Paradis, Paris. — *Intestinol*, *Lipolysine*, *Myostone*, *Tardospérmine*, *Testogan*, *Thelygan*, *Thyroxine*, *Thyroïdine*, *Ovarine*.
- Lab. Optima, 78-80, Gde-rue au Bois, Bruxelles. — *Alimentine Mory* (poudre), *Ampoules Optima*, *Asthmacidine* (ampoules), *Apyrexine* (comprimés), *Bismuth 25* (ampoules), *Bromure d'éthyle* (ampoules), *Cardiotonine* (liquide); *Cataplasme Optima*, *Chloraseptine* (comprimés), *Chloroforme* (ampoules), *Comprimés Garga*, *Digitalis Purpurea* (poudre), *Dragées hépatiques*, *Dragées d'iodurine*, *Dragées menthol-borax-cocaïne*, *Eau de Lorraine*, *Eitreb-embrocation* (liniment), *Ether pour narcose* (ampoules), *Formétine* (comprimés), *Glycérobromurine* (granulés), *Glycéro-iodurine* (granulés), *Glycéro-ovarine* (granulés), *Glycéro-thyroïdine* (granulés), *Glycéro-tribromurine* (granulés), *Granules d'Aloïne*, *Granules Boldine*, *Granules Colchicine*, *Granules digitaline* 1/5 de milligramme; *Granules Digitaline*, 1/10 de milligramme, *Granules hydras-*

tinine, Granules hyosciamine, Granules spartéine, Hémoferrine (Elixir), Héparadénine (comprimés), Héparbiline (granulés), Hypophysine (comprimés), Iode liq. lambotte (ampoules), Iodonine (flac. compte-gouttes), Idéolaxine, Jécorine (émulsion), Kola (granulés), Lacto-ferment (comprimés), Laxatine Mory (dragées), Levaine (granulés), Ligatures chirurgicales, Néo-pituitairine (ampoules), Neurotonine (granulés), Oiothyroïdine (comprimés), Orchidine, (comprimés), Ovarine (comprimés), Ovaro-thyroidine (comprimés), Oophorine (vin), Pancréadénine (comprimés), Pandigitale (teinture forte), Pepto-ferrine (flac. compte-gouttes), Peptone Cornélis, Phylogyne (poudre), Phospho-calcine (granulés), Phospho-calcine ferrugineuse (granulés), Pituitairine (voir Néo), Pyrocidine (comprimés), Quinovarine (dragées), Quinovarine injectable (ampoules), Salva-sérum, Sédarsan (gouttes), Serpoline (sirop), Sérum maternel (gouttes concentrées), Sérum sthénique (flac. compte-gouttes), Sirop Mory, Sirop iodo-noyer Cornélis, Sirop Jackson, Stomachine (comprimés), Stomachine (granulés), Suprarénidine (comprimés), Suprarénidine (ampoules), Tri-zymol (granulés), Toni-cardine (vin), Vin Mory, Vin Oophorine, Trépocidine (ampoules), Poudre Optima, Urdol.

**Lab. Orrillard**, 245, rue de Vaugirard, Paris. — Biarsol, Papaveryl, Paxol.

**Lab. Pachaut**, 130, boul. Haussmann, Paris. — Bromures Pachaut, Cachets Pachaut Alpha et Gamma, Eupaveryl, Pachaut, Iodures Pachaut, Suppositoires Pachaut, Tartrate borico-potassique Pachaut, Valériane liquide Pachaut.

**Sté du Pampryl**, 2, villa de la Terrasse, Paris. — Pampryl.

**Lab. de la Panbiline**, Annonay (Ardèche). — Hémopanbiline, Panbiline, Rectopanbiline.

**Lab. du Professeur Pancier**, 21, rue de Saint-Leu, Amiens. — Energine iodée de Berck, Energine phosphorée de Berck.

**Lab. du « Panostyl »**, 199, av. Victor-Hugo, Aubervilliers (Seine). — Panostyl.

**Lab. du Papier Eymonnet**, 139, cours Tolstoï, Lyon-Villeurbanne. — Papier iodogène Eymonnet.

**Lab. Paret**, 22, rue Guibal, Marseille. — Azym, Cellules Paret, Fixase et Fixase irradiée.

**Lab. Paris**, 4, rue de la Motte-Picquet, Paris. — Hémophagostyl, Lactolaxine, Oxydothyridine, Oxydovarine, Phagostyl, Phagostyl Mangané.

- Lab. Paris, 1, rue Lassalle, Lyon (La Boucle).** — *Cachets du Dr Boveil, Comprimés de pantolaxine du Dr Boveil, Ergotine Lamante, Granulés de Pantofort du Dr Boveil, Kerlactine, Pilules lithuranées du Dr Boveil.*
- Prod. Passeur, 22, rue des Martyrs, Paris.** — *Paragelose.*
- Lab. des Prod. Paterson (G. et M. Armingeat), 46, rue de Saintonge, Paris.** — *Poudre Paterson, Pastilles Paterson.*
- Lab. de Pathologie, 5, rue François-Ponsard, Paris.** — *Néopancarpine, Rhinofluine, Vaso-neurine.*
- Lab. Pautauberge, 10, rue de Constantinople, Paris.** — *Capsules Pautauberge, Dragées Pautauberge, Gaiacol Pautauberge, Solution Pautauberge.*
- Lab. Pellissier, 33, av. de Villiers, Paris.** — *Opothérapiques Pellissier, Opositoires opothérapiques Pellissier, Silicate de soude Pellissier.*
- Lab. Pépin et Leboucq, 30, rue Armand-Sylvestre, Courbevoie.** — *Bromogénol, Gaurol, Guethural, Iodogénol.*
- Lab. du Pepticol, 13, av. du Maréchal-Foch, Dammarie-les-Lys, près Melun.** — *Pepticol, Sarkol.*
- Lab. H. Perignon, 6, rue de Paris, Joinville-le-Pont.** — *Elixir Godfrin.*
- Cie française des Péroxydes, 12-18, rue Lamartine, Paris.** — *Ektogan Boquillon, Hopogan Boquillon.*
- Lab. Perrochon, 57, rue Origet, Tours (I.-et-L.).** — *Eurectol, Grains d'Evian, Pulmocardine.*
- Lab. Perroud, 3, rue Sébastien-Gryphe, Lyon.** — *Carbonate de bismuth, Tablettes Perroud.*
- Lab. E. Petit, pl. de l'Eglise, Argenteuil (S.-et-O.).** — *Hémagénine.*
- Pharmacie anglaise des Champs-Élysées, 62, av. des Champs-Élysées, Paris.** — *Emerson's Bromo Seltzer, Maté Douglas.*
- Pharmacie Centrale de Belgique, 12, rue du Téléphone, Bruxelles.** — *Digistabiline, Hypersan, Iophénol, Névosan, Scialine, Vitamorrhaine, Vitergomine.*
- Pharmacie Centrale de France, 21, rue des Nonnains-d'Hyères, Paris.** — *Adrénaline Invar, Caféine Invar, Digitaline Invar, Pyroléol Edet, Théobromine Invar, Végéphos, Pelvisédol, Pyroclase, Quinobrome, Séroquinol.*
- Pharmacie de la Place Royale, Reims (voir Christiaens).**
- Lab. de Pharmacologie générale, 8, rue Vivienne, Paris.** — *Boldorhéine, Capsules d'apioline Chapoteaut, Capsules de boldo-glucine Chapoteaut, Capsules de Colchiflor, Capsules à l'éther valériannique de Vial, Capsules d'eucalyptéol Antoine, Capsules à l'huile de génévrier de Vial, Capsules de lécithine Vial, Capsules de morrhuel Chapoteaut, Capsules de Morrhuel créosolé Chapoteaut, Capsules de Santal Midy, Cardiosthénine Cérévisine, Cigarettes indiennes de Grimault et Cie, Crystol, Cypridol, Delbiase, Delbosel, Dusart, Elixir*

*polybromuré de Baudry, Elixir digestif de pepsine de Grimault et Cie, Farine mûlée Vial, Fer Girard, Fer Leras, Gélocalcase, Géodelbiase, Glycogène, Guarana purifié de Grimault et Cie, Matico de Grimault et Cie, Oxygénase, Pastilles Palangié, Peplone de Chapoteaut, Pharynxoil, Phosphoglycérate de chaux Chapoteaut, Pnéoline, Poudre ferromanganique de Burin du Buisson, Quinine Rhubarbe comprimée de Baudry, Sirop du Dr Dusourd, Sirop d'hémoglobine de Grimault et Cie, Sirop d'hypophosph. de chaux de Grimault, Sirop Lagasse, Sirop phénique Vial, Sirop polyformiate du Dr Ph. Chapelle, Sirop de Raifort iodé de Grimault et Cie, Strontium paraf Javal, Sulfodelbiase (cachets), Terpinets, Vial, Sirop phénique, Vitamina.*

**Lab. du Dr Philippe**, 14, rue du Palais-Grillet, Lyon. — *Gouttes scandinaves, Iodure Philippe, Pilules Lemary, Pilules Philippe.*

**Lab. du Phosphopinal Juin**, 10, imp. Milord, Paris. — *Phosphopinal Juin, Pulvéol.*

**Lab. de Physiologie du Puits-d'Angle**, Le Chesnay (S.-et-O.) — *Dyspeptine Hepp.*

**Lab. de Phytothérapie de Paris**, 113, boul. Voltaire, Paris. — *Amipyrine, Ballotyl, Polycine.*

**Lab. Pialoux**, 55, rue de Chabrol, Paris. — *Airoglyce, Cédrométhyle, Chlorurol, Dynamoférol, Iodoplume.*

**Maison du Dr Pillet**, 5, av. Victoria, Paris. — *Beef Lavoix (ou Vin Lavoix), Pastilles Brachat.*

**Lab. du Dr Pinard**, 88, boul. St-Denis, Courbevoie. — *Phosphates du Dr Pinard.*

**Lab. Planche**, 3, rue Volney, Paris. — *Amidon Planche, Eau Sova, Hémophiline Planche, Pilules Stibiées, Sirop Thomas.*

**Lab. J. Plé**, 111 bis, rue de Turenne, Paris. — *Antiphymique Vadam, Phytosplénol Plé, Thalassotonine Vadam, Synergyl Vadam.*

**Lab. du Pneumogénol**, pl. St-Goéry, Epinal. — *Pneumogénol.*

**Lab. Pointet et Girard**, 30, rue des Francs-Bourgeois, Paris. — *Goudroline, Soporalose, Vitargyl.*

**Lab. Pompanon**, 62, rue du Cardinal-Lemoine, Paris. — *Figadol Vivien, Sulfureux Pouillet.*

**Lab. Porcher**, 35, rue des Blancs-Manteaux, Paris. — *Eczéda, Eczosec.*

**Lab. Probios**, 1, av. Pasteur, Paris. — *Probios vaccins.*

**Sté Progil**, 6, boul. de Strasbourg, Paris. — *Diasés, Galactogil, Malt Pailleté, Minergil, Peptogil, Phytolecithine.*

**Lab. L. Prothière**, 55, rue Auguste-Comte, Lyon. — *Fucosine.*

**Lab. des Proxylases**, 97, rue de Vaugirard, Paris. — *Angioxyl, Insulanol, Insulyl, Proxylases, Proxylol.*

- Lab. Georges Prunier et Cie**, 4, rue de la Coutellerie, Paris. — *Comprimés Vichy-Etat, Dioséine Prunier, Neurosine Prunier, Néo Neurosine Prunier, Novacétine Prunier.*
- Sté Purgos**, 11, rue Joseph-Bara, Paris. — *Vichy purgatif, Purgos.*
- Lab. Puy**, Grenoble (Isère). — *Capsules de Morrhuine, Les Vermifuges Pivot, Valéral Puy.*
- Lab. Py**, 58, boul. Richard-Wallace, Puteaux. — *Phostyl, Stomal.*
- Lab. du Dr Quesneville**, 12, rue de Buci, Paris. — *Bismuth (Crème de).*
- Lab. Quinet**, 143, rue du Temple, Paris. — *Poudre Quinobore, Phosol Quinet.*
- Lab. du Quinsal (M. Leulier)**, 34, rue Thiers, Gray (Hte-Saône). — *Quinsal.*
- Lab. Raby et Cie**, pl. de la Comète, Asnières. — *Biliase Raby.*
- Lab. de Radiumthérapie**, 25, rue Vaneau, Paris. — *Arto-radine, Radiocrémeline, Radiole.*
- Lab. Raimoa**, 264, boul. Voltaire, Paris. — *Pommade Raimoa, Vin Raimoa Tonic, Oxy-dents C. R. S., Pruritol Raimoa.*
- Lab. Ranque et Senez**, 16, rue du Dragon, Marseille. — *Vaccins I. O. D.*
- Lab. Ranson**, 121, av. Gambetta, Paris. — *Opocalcium irradié, Opocalcium, Leucoseptyl, Anaclasine.*
- Lab. Ravaud**, 6, pl. de Breteuil, Paris. — *Baume merveilleux, Bismutartrol.*
- Lab. Ravin**, 7, rue Princesse, Paris (VI<sup>e</sup>). — *Marcynase.*
- Lab. Reaumont**, 1, rue Raynouard, Paris. — *Agarase, Passiflorine, Silguine.*
- Lab. de la Refistine**, 20, rue du Conseil, Bruxelles-Ixelles (Belgique). — *Refistine.*
- Lab. Regagnon et Cie**, 276, rue Lecourbe, Paris (XV<sup>e</sup>). — *Amborhinol, Sedorhinol.*
- Lab. du Regyl**, 8, rue Richer, Paris. — *Regyl.*
- Lab. Remeaud**, 38, av. J.-B.-Clément, Boulogne-sur-Seine. — *Kluchol Remeaud.*

- Lab. Remy et Lecoq**, 6, pl. Clichy, Paris. — *Cachets anti-grippe Flamand, Nuchémose, Poudre Gast, Sirop Flamand M. Lecoq, Vagotonic Fournier.*
- Lab. Renard**, 35, rue de Paris, Clichy (Seine). — *Atural, Crypthiol, Pneumogéine.*
- Lab. Renard et Cie**, 35, rue de Paris, Clichy (Seine). — *Gaduamine.*
- M. Renaud**, 2, rue Demours, Paris. — *Lachesine.*
- Lab. du Resurrex**, 46, rue de la République, Nolay. — *Pilules Pocquin, Resurrex.*
- Lab. Revel**, 34, rue St-Lazare, Paris. — *Philogastrine.*
- Lab. Rey**, 12, rue Montmartre, Dijon (Côte-d'Or). — *Ludin, Seroma Rey.*
- Lab. Rhemda**, 57, rue d'Alsace, Courbevoie. — *Boues radio-actives Rhemda, Bougies radioactives Rhemda, Dermathorium, Mésothorium Rhemda, Mésothine, Radio Magnésium, Thorium X Rhemda.*
- Lab. du Rhinophta**, 82, rue de la Croix-Verte, Albi (Tarn). — *Produits Orhino, Tubes Ferlux.*
- Lab. Ricardou et Cie**, 46, rue Pierre-Charron, Paris. — *Bains de Brides, Brides-les-Bains, Phospharsol, Prises Delqué, Sel de Salins-Moutiers, Soporigène, Sylvol.*
- Lab. Richer**, 7, av. Marceau, Paris. — *Comprimés Salvé, Florhépatine.*
- Lab. Riethe**, 40, rue des Abbesses, Paris. — *Sanguine irradiée.*
- Lab. Rissa**, 46, rue Claude-Lorrain, Lille. — *Calci-Ostéline, Glaxo, Iodex, Ostéline, Ostomalt.*
- Lab. H. Rivier**, 26-28, rue St-Claude, Paris. — *Anégrine, Ascoléine Rivier, Séro-sérum Rivier, Valérianate Pierlot.*
- Pharmacie J. Robert (J. Boudier, succ.)**, 37, rue de Bourgogne, Paris. — *Hémocalciopectine, Sédo-Gaz.*
- Lab. Robert Dubois**, 52, rue Montesquieu, Asnières (Seine). — *Campho-spartéine, Codarsyl, Oléo-iode, Uroquinase.*
- Lab. Robert et Carrière**, 37, rue de Bourgogne, Paris. — *Adral, Ampoules Pinceaux, Bactéphages, Benzyanil, Biocholine, Chlorakin, Comprimés Aqua-pura, Cyanure indolore Ercé, Néo-dispositif du Dr P. Ravaut, Dysurol, Enneco, Erцерhinol, Fibrinine, Géodyl, Gometer, Huile grise Ercé, Iodo-bismuth Ercé, Lobuline, Novarsénobenzol Ercé, Peraziodol-phlyctol, Pommade Forge, Pulvolyseur, Sérum artificiel citraté, Solution chlorurée hypertonique, Stannoxy, Supparsol, Tœnifuge ercé, Tinctiode, Tri-iode ercé, Vaccin pneumoentérostaphylococcique de Weill et Dufourt, Vaccins Renard, Vaccins L. M. L. Xanthocol.*
- Lab. Roberts et Cie**, 5, rue de la Paix, Paris. — *Bemax, Bromidia, Calox, Coluval, Embrocation Roche, Estommon, Lansoyl, Listerine, Ovarnon, Pernaemon, Pano-*

*pepton, Pepsencia, Pinéoléum, Pinolac, Quinacinas, Quinolax, Ricigel, Salsanos, Sirop aux hypophosphites Fellows, Sudyl.*

**Lab. Robin**, 13, rue de Poissy, Paris. — *Bismuthoidol Robin, Bromone Robin, Camphydryl Robin, Glycérophosphate Robin, Glykolaïne Robin, Iodone Robin, Nucléarsitol, Nucléatol, Peptonate de fer Robin, Peptokola Robin, Strychnarsitol Robin, Sulfoïdol Robin.*

**Lab. Robinet**, Moret-sur-Loing (S.-et-M.). — *Magnéso tubes Robinet.*

**Lab. Rochereau**, Salbris (L.-et-C.). — *Dolysine.*

**Lab. Rogé Cavailès**, 116, boul. Haussmann, Paris. — *Anoïde, Elixir iodépuratif Pépin, Suppositoires Rocav.*

**Lab. Henry Rogier**, 56, boul. Péreire, Paris. — *Baume Delacour, Insuline, Kymosine Rogier, Levulose Rogier, Suppositoires Pepet, Uraseptine, Valbornine Rogier, Vitamine Rogier.*

**Lab. Pierre Rolland**, 18, rue Pierre-Curie, Paris. — *Balmiga-Hypalène, Natrosyl.*

**Lab. Romon**, 6, rue Bridaine, Paris. — *Ampoules Romon, Forcival, Globules Romon, Limitol, Magnogène, Tranquital.*

**Établ. Roques**, 36, rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris. — *Delcaine Roques.*

**Lab. Rosa**, 1, pl. Champerret, Paris. — *Chophytol Rosa, Cynurool Rosa.*

**Pharmacie Roussel**, 10, rue Washington, Paris. — *Tetranitrol Roussel, Trinitrine Roussel.*

**Lab. Routier**, 20, rue St-Lazare, Paris. — *Baume Duret.*

**La. Paul Roux**, 151, rue Lafayette, Paris. — *Fer Larcade.*

**Lab. Roux**, 58, rue de Maubeuge, Paris. — *Armosine, Arsallyl R. X., Glucalcium R. X., Magnétol Roux, Purgelettes Roux, Ur-Clar Blanc Bleu, Uri-magnétol.*

**Lab. du Rozoderme**, 11, rue des Deux-Ponts, Paris. — *Rozoderme.*

**Lab. Sabatier**, 10, rue Pierre-Ducreux, Paris. — *Fluodyle, Ouataplasme D<sup>r</sup> Langlebert,*

**Lab. Salantale**, 42, rue Grandes-Arcades, Strasbourg. — *Ovules vaccin Salantale, Pommade-Vaccin Salantale, Recto-Vaccin Salantale, Rhino-Vaccin Salantale, Salantale, Suppo-Vaccin Salantale.*

**Lab. H. Salle**, 4, rue Elzévir, Paris. — *Agamétol, Bronchitol.*



*Conjonctol, Elzévir dentition, Heracléol, Iodo-vitasine, Passival, Phleboguïl.*

**Lab. Salles**, 11, boul. de Strasbourg, Paris. — *Boldolactol.*

**Lab. du Salvoxyl**, 237, rue Lafayette, Paris. — *Noviode.*

**Farine Salvy**, 4, rue Lambrechts, Courbevoie. — *Farine lactée diastasée Salvy.*

**Lab. du Sambul**, 22, rue St-Pierre, Evreux (Eure). — *Dermopode, Sambul.*

**Prod. Sandoz**, 3-5, rue de Metz, Paris. — *Allisatine Sandoz, Belladénal Sandoz, Bellafoline Sandoz, Calcium Sandoz, Félamine Sandoz, Gynergène Sandoz, Optalidon Sandoz, Panthésine Sandoz, Sandoptal Sandoz, Scillarène Sandoz.*

**Sté française des Prod. Sanitaires et Antiseptiques**, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris. — *Crésyls Jeyes, Sanalia.*

**Prod. Sanova**, 41, rue d'Amsterdam, Paris. — *Hépatismine, Iodascérine, Magnacalcine, Uricémine.*

**Lab. de la Santhéose**, 4, rue du Roi-de-Sicile, Paris. — *Santhéose.*

**Lab. A. Savigneux**, 63, rue Victor-Hugo, Lyon. — *Séro Comprimés Mérieux.*

**Lab. Schmit**, 71, rue Ste-Anne, Paris. — *Galliodine, Mangaine, Prélase.*

**Lab. des Prod. Scientia** (Dr E. Perraudin, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe), 21, rue Chaptal, Paris. — *Calcoléol, Diabétifuge, Digestonic, Oxymenthol Perraudin, Peptalmine, Peptalmine magnésinée, Quinéine, Staphylococcine Fraquet, Tricalcine.*

**Lab. Scott et fils**, 348, rue St-Honoré, Paris. — *Magnésie bismurée.*

**Lab. Seguin**, 165, rue St-Honoré, Paris. — *Capsules Joret et Homolle, Phosphofluor Beynet.*

**Sels du Jura**, 11, av. de l'Opéra, Paris. — *Sels du Jura.*

**Lab. Sephyda**, Chabeuil (Drôme). — *Sephydine, Formo-zinc.*

**Lab. Serindat**, 22, rue Poncelet, Paris. — *Phosphobrom, Phosphomagnésium.*

**Lab. J.-M. Serre**, 7, pl. Pey-Berland, Bordeaux. — *Vermifuge Cornet.*

**Lab. Servier**, 25, rue Eugène-Vignat, Orléans (Loiret). — *Gaduase, Muxol, Ozodor, Pyri-pyridium, Spiralgine.*

**Lab. Sevenet**, 10, rue Le Chapelais, Paris. — *Hemagène Tailleur.*

**Lab. Sévigné**, 10, rue du Parc-Loyal, Paris (III<sup>e</sup>). — *Ulcéobalnéine, Ulcéoplaque-Ulcéobande, Ulcéosine, Ulcéosol.*

**Lab. du Siècle**, 94, rue Monge, Dijon (Côte-d'Or). — *Super digestif Legrand, Super-nucléine Legrand.*

**Lab. du Sirop Famel**, 20-22, rue des Orteaux, Paris. — *Sirop Famel.*

- Lab. Soudan**, 6, rue Rosenwald, Paris. — *Bromo-maïsine*, *Euonymine Thibault*, *Iodo-maïsine*, *Lactagol*, *Laxatifs Miraton*, *Oléocidase*, *Valérium*.
- Lab. Souillard et Cie**, 3, rue du Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris. — *Pangaduïne*.
- Lab. A. Soulas**, 119, rue de Sèvres, Paris. — *Pectoral des Dames de France*, *Plagéine Soulas*, *Tannarsol*, *Tœnifuge des Dames de France*.
- « **Specia** » (*Sté Parisienne d'Expansion chimique*), 86, rue Vieille-du-Temple, Paris. — *Acétylarsan*, *Alunozal*, *Anthéma*, *Asciatine*, *Balsoforme*, *Baume Rhodia*, *Cardyl*, *Crisalbine*, *Dmelcos*, *Ergorone*, *Foriod*, *Gardenal*, *Gelobarine*, *Gonacrine*, *Hyrganol*, *Moranyl*, *Néo Dmegon*, *Néo Dmetyls*, *Neptal*, *Novarsénobenzol*, *Ovo-lecithine*, *Pragmoline*, *Propidex*, *Propidon*, *Quinio-Storvasol*, *Rénaleptine*, *Rhodarsan*, *Rhodazil*, *Rhoféine*, *Rubyl*, *Rutonal*, *Sanedrine*, *Sanluol*, *Scurocaïne*, *Scuroforme*, *Soneryl*, *Stovaïne*, *Stovarsol*, *Tecarine*, *Tochlorine*, *Tryparsamide*, *Urazine*, *Vaccins atoxiques stabilisés*.
- Prod. Stalys**, 64, rue La Boétie, Paris. — *Dermo Stalys*, *Dento Stalys*.
- Sté des Lab. Sténé**, 2, pl. des Vosges, Paris. — *Bilifluïne*, *Bouillon vaccin opératoire Sténé*, *Crésopirine*, *Flavurool*, *Hémato-iodine*, *Urifluïne*, *Vaccin anti-pyogène Sténé*, *Vaccin anti-staphylococcique Sténé*, *Vaccin du professeur Minet*, *Vaccin opératoire Sténé*, *Vaccins Sténé*.
- Lab. H. Stouls**, 156, av. Victor-Hugo, Paris. — *Pangastrol*.
- Lab. Substantia**, 13, rue Pagès, Suresnes. — *Calmag-Na*, *Loraga*, *Véganine*.
- Lab. Taetz**, 2, rue Lesdiguières, Paris. — *Asthmylose*, *Capsules Taetz*.
- Lab. Taillandier-Samarcq**, 107, av. Jean-Jaurès, Paris. — *Hémo-hépatext*.
- Lab. H. Tavernier**, 32, rue de l'Ouest, Paris. — *Cinalose*, *Inhalo-bol*, *Inhalo-sel*, *Miroxyl*, *Phospho-Gaiacol Mary*, *Reconstituant Mary*.
- Lab. Paul Termes**, Miramont (L.-et-Gar.). — *Biopulmol*.
- Lab. Teyssède**, 34, faub. d'Angoulême, Limoges. — *Sirop Teyssède*.
- Lab. du Théovadil**, 85, rue des Morillons, Paris. — *Théovadil*.
- Lab. A. Thepenier**, 12, rue Clapeyron, Paris. — *Amylodiastase*, *Bulgarine Thépenier*.

**Lab. de Thérapeutique des Voies digestives**, 223, rue St-Martin, Paris. — *Colluborine Dupuy*, *Fuculose* (gouttes), *Leptandrine Royer*, *Pommades Royer*, *Suppositoires Royer*, *Royerine Dupuy*.

**Lab. de Thérapeutique générale**, 48, rue de la Procession, Paris (XV<sup>e</sup>). — *Endopancrine*, *Holovarine*, *Insuline* (voir *Endopancrine*), *Insuline Phyloze* (poudre et pommade).

**Lab. Thévenot**, 21, rue des Roses, Dijon. — *Azigol*, *Borocalcyl*, *Choléoboldine*, *Cosmargyre*, *Eupnéol*, *Juniodyl*, *Lactofermentine*, *Thiocitrol*, *Sirop Belca*.

**Lab. de la Thiorine**, 39, rue Fondaudège, Bordeaux. — *Thiorine*

**Lab. Thiriet et Cie**, 26-28, rue des Ponts, Nancy. — *Paroxyl*.

**Lab. Thuau**, 22, faub. St-Michel, Angers. — *Hémoglyne Thuau*, *Réparateur Thuau*.

**Lab. Tiffeneau**, 24, rue de Monttessuy, Paris. — *Néfitol*, *Pastilles « Violettes A. B. C. »*, *Purgalax*, *Vin tonic Tiffeneau*.

**Lab. G. Tinard** 134, boul. Péreire, Paris. — *Pangestyl*, *Salypsol*.

**Lab. du Dr G. Tissot**, 34, boul. de Clichy, Paris. — *Broncho-dermine*, *Charbon Tissot*, *Diasto-pepsine*, *Magnecy-thine*, *Nervocithine*, *Suppargyre*.

**Lab. Toraude**, 22, rue de la Sorbonne, Paris. — *Diumnal*, *Emapirine*, *Flévar*, *Fruixatyl*, *Hemo-serosan*, *Hépabyl*, *Lactobactyl*, *Leucagine*, *Leucaginol*, *Néo-serosan*, *Néotrépol*, *Quinarsan*, *Quinobromine*, *Rectagine*, *Réthragine*, *Riceyl Billault*, *Sérosan*, *Somnofan*, *Sornyal*, *Stomarine Billault*, *Trépol*, *Trépoquinol*.

**Lab. Trombetta**, à Blain (L.-Inf.). — *Oxytoires Sorin*, *Vermifuges Sorin*.

**Lab. Trouette-Perret**, 15, rue des Immeubles-Industriels, Paris. — *Aphloïne*, *Gouttes livoniennes*, *Nisaméline*, *Oponucyl*, *Papaïne*, *Romarantyl*.

**Lab. Tulivet**, 52, rue de Poissy, St-Germain-en-Laye (S.-et-O.). — *Céréaline*, *Cigarettes Zani*, *Chlorobaciline*, *Lacticholéine*, *Laxocholéine*, *Laxogélose*, *Paralaxol*, *Poudre Zani*.

**Union chimique belge** (Sté anon. des produits pharmaceutiques Meurice), 61, av. Louise, Bruxelles. — *Mameline*, *Ovaridine*, *Ovarine*, *Orchitine*, *Thyroidine*, *Opothérapiques Meurice*.

**Lab. Unis-Spes**, 14, rue Demarquay, Paris. — *Algophagine*, *Hémotal*, *Hépatodiase*, *Nox*, *Vacciderm*.

**Lab. de l'Uroïodine**, 45, boul. Lafayette, Calais (P.-de-C.). — *Uroïodine*.

**Usine de Blosset**, Moulins-sur-Yèvre (Cher). — *Algbiogyl*, *Cachets Tugrip*, *Cachets du D<sup>r</sup> Ducog*, *Cachets minéralg*, *Comprimés ultraspirine*, *Carnéose du D<sup>r</sup> Spès*, *Dépuratif Berry*, *Elixir supertonique Stella*, *Gargarinal*, *Iasthol*, *Manganéol*, *Montonic*, *Neurogénol*, *Phosbiogyl*, *Phyténergine*, *Potion du D<sup>r</sup> Henry*, *Radiobiogyl*, *Radiovitine*, *Vin de Beef Lavoisier*, *Vin surtonique du Val Notre-Dame*, *Vitaférine*.

**Usines Chimiques des Laboratoires Français**, 89, rue du Cherche-Midi, Paris. — *Oxymuth S. A. C. A.*, *Quinimuthol S. A. C. A.*, *Uclarsyl*.

**Lab. de l'Uvé**, 18, rue St-Amand, Paris. — *Folliculine Crinex*, *Uvé*, *Uvestérol*.

**Lab. de l'Uvéoline** (M. Ambard, Pharmacien), Carces (Var). — *Uvéoline*.

**Lab. E. Vaillant et Cie**, 19, rue Jacob, Paris. — *Pancréastase Defresne*.

**Lab. Valentin**, 79, rue de Wazemmes, Lille. — *Euplasmol irradié*.

**Lab. Valentin Albert**, 1, rue d'Arras, Béthune (P.-de-C.). — *Marubor*.

**Lab. du Valéromenthol**, 10, rue Poncelet, Paris. — *Caoglands*, *Pancréanne*, *Valéromenthol*.

**Lab. de la Valthène** (A. Valat), 51, rue de Tourtille, Paris. — *Valthène*.

**Lab. Vanda**, 16, rue Ficatier, Courbevoie (Seine). — *Iosorbine*.

**Lab. Vargas**, 5, rue Chauveau-Lagarde, Paris. — *Cascara Sagrada Pinard*, *Cachets toni-digestifs Vargas*, *Furol Vargas*, *Preservol*, *Sirop pectoral Fournier*, *Sirop calmant du D<sup>r</sup> Bressy*, *Tonyol « F » Vargas*.

**Lab. de la Varilaxine** (M. Crestey), 164, rue St-Honoré, Paris. — *Rectoline*, *Varilaxine*.

**Lab. J. Variot**, 151 bis, Grande-Rue, Villemomble (Seine). — *Linadeline*.

**Lab. Vaudin et Guillaumin**, 12, rue Charles-V, Paris. — *Elixir eupeptique Tisy*, *Quinotane Valguy*, *Vin de Baudon antiminio-phosphaté*.

**Lab. du Végétol**, 8, rue des Quatre-Fils, Paris. — *Végétol Fournier*.

**Lab. des Prod. Vely**, 132, av. Victor-Hugo, Paris. — *Amphosthène*, *Disolurane*, *Eufosfyl*, *Hypnovel*, *Kalmogastrol*,

*Néospasme, Pansomnine, Phosfodéine, Plexorine, Septométrol, Sodotétrane, Wismuthane.*

**Cie française de la Vénécine**, 7, rue des Italiens, Paris. — *La Vénécine*.

**Lab. Venot**, 101, av. Mozart, Paris. — *Bain Salvia*.

**Lab. Vergelot**, 163, rue de Flandre, Paris. — *Ampolases, Amyliodine, Déméteros, Opolases, Mangratines, Morrhuxine, Nucléasine, Sédo Viète, Sirop Viète, Zistazine*.

**Lab. Verne**, 13, rue du D<sup>r</sup>-Mazets, Grenoble (Isère). — *Boldo Verne*.

**La Verrerie scientifique**, 12, av. du Maine, Paris. — *Chromothermo-thérapie, Diathermie, Infra-rouges, Ultra-violets*.

**Lab. Vicario**, 17, boul. Haussmann, Paris. — *Adonal Vicario, Andryl Vicario, Bibromure de Hg Vicario, Bromadyl Vicario, Collyre des Alpes Vicario, Calomel Vicario, Dimétol Vicario, Héroïne Vicario, Listose Vicario, Nopirine Vicario, Penghaivar Vicario, Plasmodine Vicario, Rhésal Vicario, Trinitrine Vicario, Yohimbine Vicario*.

**Lab. Vidal**, 46, rue de Grenelle, Paris. — *Isorhinol, Kitine, Phosorine*.

**Lab. de la Vigardyne**, 11, rue des Garennes, Chatou, — *Vigardyne*.

**Lab. Vincardi**, 42, av. Borriglione, Nice. — *Artérion Vincardi*.

**Lab. Vincent**, 14, av. Mac-Mahon, Paris. — *Adréna Vincent, Cholecystine, Nigérine, Oléodermine Vincent, Stérinase*.

**Lab. Visconti**, 64, boul. Barbès, Paris. — *Carbocitrol*.

**Lab. du Vitastérol**, 10, rue du Collège, Arras. — *Vitastérol*.

**Sté anon. des Établ. Wander**, 151, bis, route de Joinville, Champigny (Seine). — *Alcacyl, Alucol, Christolax, Formitrol, Gloma pur (Calcio Gloma, Ferro Gloma, Gaya Gloma, Glycéro Gloma, Hémog Gloma, Iodo Gloma, Pepsog Gloma), Jemall, Maltosan, Nutromalt, Ovomaltine, Pneuma, Veguva*.

**Lab. Warin**, 4, chaussée de la Muette, Paris. — *Bucmine, Citrocarbène, Citrofluyl, Fidulax, Hermostyrum, Hydrogemmine Lagasse, Inhaloxyl, Iodassium, Juglamarine, Staphydex*.

**Lab. Weber**, 5 bis, rue des Haudriettes, Paris. — *Glycolymoline*.

**Lab. des D<sup>rs</sup> R. et O. Weil (Etabl. Merminod, concessionnaires)**, 49, rue de Paradis, Paris. — *Agesulf, Bromo-*

*strontiurane, Droserine, Papavhydrine, Psorimangane, Somnacétine, Strontiurane, Spasmopurine, Sphink-térol, Urobényl, Virilium.*

**Lab. A. Welcker et Cie**, 72, rue du Commerce, Paris. — *Sanas.*

**Lab. de la Yaourtine** (L. -J. Mounier), 18, pl. Laborde, Paris.  
— *Yaourtine.*

**Lab. Yvrard**, 17, rue Soufflot, Paris. — *Pneumolipase.*

**Lab. du Dr Zizine**, 24, rue de Fécamp, Paris. — *Agocholine, Gastropansement, Peptodiase Vivoléol, Sédogastrine.*

**Lab. Zyma**, 4, rue Bellart, Paris. — *Dialysés Golaz, Hova (Tablettes), Levure fraîche Mycel, Lipodéterpenol, Pilka (Gouttes), Themsaline, Utéramine, Viscum Zyma.*



---

5983-8-34. — CORBEIL. IMPRIMERIE CRÉTA.

---

